


The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

PHARMACOPŒIAS,
Boyle



PHARMACOPOEA
HELVETICA,

ON·MEDICAL
SOCIETY OF

IN
DUAS PARTES
DIVISA,
QUARUM PRIOR
MATERIAM MEDICAM,
BOTANICO·PHYSICO·HISTORICO·
MEDICE DESCRIPTAM,
POSTERIOR
COMPOSITA & PRÆPARATA,
MODUM PRÆPARANDI,
VIRES & USUM EXHIBET.

SCITU & CONSENSU
GRATIOSI COLLEGII MEDICI
BASILEENSIS
DIGESTA.
PRÆFATUS EST
ALBERTUS de HALLER,

DOMINUS IN GOUMOENS LE JUX, ET FEUDI IN ECLAGNENS.
PRÆSES SOCIETATIS REG. SCIENT. GOETTING.
SODALIS ACADD. REG. SCIENT. PARIS. REG. CHIR. GALL.
IMPER. BEROLIN. SUECIC. BONONIENS. ARCAD. BAVAR.
SOCIET. SCIENT. BRITANN. UPSAL. BOT. FLOR. BATAVIC.
PHYSICO-MEDICÆ BASIL. OECONOM. BERNENS.
IN SENATU SUPREMO BERNENSI DUCENTUMVIR.

ACCEDUNT
SYLLABUS
MEDICAMENTORUM,
IN
CLASSES DIVISUS,
ET
DUO INDICES NECESSARII,
PRIMUS
MORBORUM & CURATIONUM,
ALTER
TRILINGUIS, LAT. GERM. GALL.

BASILEÆ,

Sumptibus & Literis
JOH. ROD. IM-HOF & FILII,
1771.



PRÆFATIO

A D

PHARMACOPOEAM HELVETICAM.

HONORI mihi duco, quod ad insigne opus in docta urbe & perantiqua Academia editum, præfaturus accedam. Sesquiennium Basileæ vixi, neque alia vitæ meæ pars mihi lætior fuit. JOHANNEM BERNOULLIUM audiebam, illustrem senem: & I. RODOLPHUM ZWINGER, qui etiam nunc Academiam patriam ornat. Incidebam cadavera, sæpe ipse prælegebam, juvenibus juvenis. Plantas in fertili agro colligebam. STÆHELINI, DROLLINGERI, candidissimarum animarum fruebar consortio. Valetudo ad omnes labores mihi sufficiebat; artis ambitum, ornamenta poëseos, eo avidiori amplectebam animo, quod ad vastas spes longa aetas & multorum annorum præsidia mihi videbantur parata esse. Grata est ergo ejus urbis recordatio, in qua novissimos Præceptores audiui, prima in docendo stipendia merui, annis 1728. & 1729.

Ipse nunc senex retrospicio in actos labores, & cum dulci certe aliquo desiderio vestigia actæ vitæ re-
lego, quam varii casus cum exteris, aut inter aliena studia partiri coegerunt. Et primum reperio, Pharmaceuticen à me vix unquam tactam esse, neque fere aliqua parte mei otii adjutam: & erubesco pene, de ea arte præfaturus, quam inter universæ medicinæ partes minimè coluerim. Vix enim numero plantas,
(2 . plan-

plantarumque aliquas vires medicas, aut ab analogia repetitas, aut ex alpicolarum, aut ex mea denique experientia: vix mihi fumo corticis Peruviani juvenilibus meis annis in patria exosi plenissimum nunc atque ad varios nervorum morbos extensum usum: vix acoris mineralis, pro veneno olim habiti, felicem certè in morbis malignis, in deprimenda etiam nervorum debilitate, in corrigenda acrimonia humorum, & fide medici dignam efficaciam. Non sufficit vasto artis ambitui mens humana, & quem enixe colit agellus, is sterilem jubet esse reliquum fundum, utut coli sit dignissimus.

Sed ideo quod Pharmaceutica nihil mihi debet, non æquum fuerit ejus artis summam contemnere dignitatem. Eam ut subito & uno verbo depingam, pronuntiâsse sufficiat, in arte curandorum morborum veteres nusquam recentioribus fuisse inferiores, nisi in medicamentorum delectu & præparatione.

Morborum signa, & historias, & eventuum præfagia ab ipso HIPPOCRATE vix quidquam incrementi cepisse, vulgo notum est. Verum in re medicamentaria utique multo veteribus feliciores sumus.

Paucissimas mineras veteres cognoverunt, sales vix ullos, caruerunt hydrargiri potentissimis viribus: caruerunt nitro, acore minerali omni, antimonii emetica vi & sudorifera; caruerunt calcis adminiculo. Aes ustum & pauca alia fere drastica medicamenta ex toto fossilium grege HIPPOCRATI innotuerant. Ex animalibus nondum moschus in Europam advectus fuerat, nondum inventum oleum animale, aut quidquid est salium volatilium urinosorum, in medicorum instrumentum erat receptum.

Plantas non paucas HIPPOCRATES recenset, sed inmensum numerum addidit uterque orbis, superioribus itineribus apertus: numerumque ipsum salubris efficacia novorum medicaminum superat. Mitia, neque calefacientia, remedia alvum ducentia Arabes nobis revelarunt: aromatum copiam ulterior India suppedita.

ditavit, balsama, & omnibus balsamis potentiorē in avertenda putredine corticem Peruvianum America addidit: quo solo medicamento formidatae veteribus febres periodicæ faciliè & tuto superantur, gangræna moram sibi patitur injici, vires corporis languidæ absque calore & stimulo reparantur.

Si in simplicibus medicamentis divitiæ medicæ auctæ sunt, multo majores sunt in compositis accessiones. Chemia, veteribus incognita, alia ad aperiendas, ad augendas corporum vires præsidia adtulit, vires latentes expedit, de quibus vel nemo cogitare potuerat: nemo certè in sale, inque vitriolo, & nitro, penetrabilem illum acorem vel conjecturâ adtigisse potuit, cujus in aqua diluti vis antiseptica vegetabilem acorem longè superat, febresque certius frangit. Ita antimonii reclusâ naturâ, sudorificæ vires & emeticæ in apricum prodierunt: ita argenti vivi mirifica indoles, in omne genus medicamentorum se transformare didicit, omni sub forma potentium: & ipse demum sublimatus mercurius, domitam vim venenatam in tutum medicamentum passus est redire. Sed pauca sunt ex multis, quæ hic recensere datur.

Hæc nunc nuperior Pharmacopoea equidem ipsâ opulentiâ laborat. Paulatim aquarum, siruporum, electariorum numerus in immensum increvit; multaque copia debilium remediorum, magnificis cum titulis, censum medicamentarium tumefecit. Ipsa simplicia medicamenta nimis numerosa, nimis lautis promissionibus effectuum salutarium, confidentem medicum deludunt. Quare utilissimum fuit Britannorum consilium, qui resectis phaleris, pauca, suaque in classe præcipua medicique meritura fiduciam medicamenta, suis in pharmacopoliis retinuerunt. Ità immensi sumtus in evanida, noxiaque pene medicamenta effusi, castigantur, & pharmacopoeo quidem & laboris fit compendium, & ægrotis pretio leviori salus venit.

Nuperæ etiam industriæ laus est, accuratè speciem definire genusque cujusque plantæ, quæ in usus medicos recipitur. Magna hujus peritiæ utilitas est: in aliis aliisque magis Europæorum imperio aut subjectis, aut cer-

tè commerciis nostris patentibus regionibus celebratæ stirpes detegi possunt, quas prius barbaris debebamus, dona naturæ parum curiosè tractantibus. Ita in America septentrionali auro contra cara Aureliana, quæ Ginseng, ex cognito charactere inventa est, & in desertis adgnita. Metus in sene quidem modicus, cæterum in Philanthropo satis gravis est, negligentia Hispanorum, divinam illam corticis Peruviani arborem exhaustum iri, quæ certè fere alterius medicorum brachii jactura foret. Eum metum aliquantum spes minuit, cognitam nunc arborem suis ex notis, in aliis Americæ meridionalis montanis regionibus iri inventum. Neque nullæ utriusque Indiæ plantæ sunt, quæ ad suas species relatæ, vel in beato promontorio bonæ spei, vel in Europa demum coli, recentes adeo & incorruptæ obtineri possunt; quæ spes de Rheo vero nunc magis & magis increbescit. Demum ex analogia, cum sapore & odore conjuncta, poterunt subinde species Europæ speciebus Indicis subrogari, ut in Polygala exemplum est. Non ideo autarkeiam illam nonnullorum velim adfectare, qui omnia in sua frigida sæpe & angusta patria provenire jactarunt, quorum in rebus humanis vera esset utilitas. Mihi autem persuasum est, à sole Europæo neque Cinnamomi nobilissimum aroma excoqui posse, neque Dactyli salubrem dulcedinem: uti neque colores plantarum & animalium calidioris Orientis unquam in frigidiori nostra Europa nasci poterunt, neque Moschi, aut Zibethæ odoramenta.

Quas ergo nostris temporibus divitias Pharmacopœa Europeorum possidet, eas hoc in dispensatorio à Cl. nostris Collegis collectas, breviter & simpliciter accipies, LECTOR benevole; simplicium medicamentorum censum cum melioribus nominibus, & ad bonos fontes ducentibus; plantæ cujusque in pharmacopolia receptæ species & genus rite, & sæpe accuratius determinatum, quàm alias usquam, brevique neque inflata virium medicatorum recensione. Fusiores tractationem medicamentorum compositorum, quæ in nostra Germania uberiora pharmacopoliis inferuntur: artificia, quibus præparantur meliora, verasque in mendo vires. Non licet Cl. Viros laudare, quorum laboribus

boribus hoc opus debetur, aliquanto iis plenius, quæ in hoc genere hæctenus prodierunt. Nomina sua mihi maluerunt ignota esse. Eo liberius testimonium meum profero, perutilem mihi videri, & passim singularem novumque librum, & quem Medicis & Pharmacopœis absque ullo metu imputatæ adulationis commendo.

Liceat nunc ad medicamenta simplicia sola nonnullas notulas adspargere.

Ambraæ adfine bitumen, odore ambrosiaco, friabile & ex spadiceo fuscum memini nobis à BOERHAAVIO anno 1725 adlatum, quod omnium odoramentorum gratiam superabat. Non exigua gleba erat.

Anagallidem certo novi frustra adversus hydrophobiam propinatam esse.

ARNICA *foliis alternis, argute serratis, radicalibus petiolatis* Hist. plant. helv. n. 89. frequentissimo usu est apud nostros alpicolas, cum nomine *Graffengel*. Dulcis est radix, aromatica, & analeptica.

Afarum malè equis propinari, quos vehementissimè exagitat, vi emeticâ, ad quam hoc animal à natura non est factum.

Pro Afaro venenata illa Thora in alpibus occidentalibus propinatur.

Been album & Been rubrum à doctissimo HYDIO depictum (relig. pers.) Valerianæ genus videtur.

Betonica lamiacei generis videtur, neque ultra profutura.

A Lycoperdo cervino duro, coriaceo, insipido, nihil sperare venerei.

Lycoperdi Bovistæ usus non videtur probari debere, cujus incensi vapor adeo manifesto inebrians fit & narcoticus, quem nolis adeo sanguini suas vires cominus impertire.

Rusci fructus ad Coffeæ modum tostos & infusos in Italia commendârunt.

In butyri Cacao usu cautum esse oportet, quod ægrè coctile, per intestina non sine insigni incommodo residerit.

Caryophyllata, quæ LINNÆO Geum, adversus febres intermittentes in Suecia bono cum effectu data est.

Tithymali Cataputix grana alvum ducunt, gratoque sunt sapore, non raro in Aquilejensibus usu.

Ceti sperma ex vulgari Balænarum fluido adipe coquitur, aquâ aliquoties renovatâ. Non placet, potissimum in pulmonis malis, oleum intus propinari, certo obstructionem nobilissimi visceris aucturum: etiam minus placet sebaceus & rancidus odor.

Chamæpityos infusum theiforme in senum arthritide novi profuisse.

Ingratissimus sapor majoris Chelidonii displicet, neque vellem, absque novo experimento, propinari.

Verior Chinæ radix à DILLENIO dicitur, quæ de senecionis est genere, à smilacibus diversa. Debiles omnes, sæpe fucatæ, NEUMANNO teste, neque CAROLO V. levamen attulerunt.

Chinæ Chinæ cortex eo melior est, quo minoribus de ramis deglubitur.

Cicutæ usum frequentem pariter & innoxium fuisse vidi, & adversus cancrum imbecillem. Venenum narcoticum putes igne abigi, dum succus spissatur.

Coccinellam potius, ut insectum, nocentem & suspectam esse putarem: neque multo magis fiderem granis Kermes.

Thymelæa lini folio nuper utuntur ad modum vesicatorii. Corticem nudæ cuti tulum imponunt, aqua inde sudat, absque vesica, neque viæ urinariæ exasperantur, ut solent à cantharidibus.

Colchici radicem recentem manè effossam edi, & planè ut Cl. CRATOCHVILL, rapacei saporis & innoxiam sum expertus.

Gummi Copal nuper discimus, non ex arbore aliqua esse, sed omnino mineralis generis & de bituminis adfinitate, aut succini.

Elaterium etiam robusti viri hydropici ægrè ferunt, ob anxietates, quas excitat mirificas, neque vidi spei respondisse à doctissimo SCHULZIO excitatæ.

Radice Dauci rasâ qui nuper cancrum sanare putârunt, non videntur spes suas repetitis experimentis confirmare.

Fraxinellam nuper laudavit Cl. STOERCKIUS, si ulla alia planta hæc certè vires medicas odore suo promittit, & inflammabili vapore.

Ebuli semina urinam potenter movent, sed inest ingratum aliquid, quod non diu feras.

Euphra-

Euphrasie classis naturalis tota pene suspecta est ingratiq̃ue odoris. Nollem ejusmodi medicamenta tentare.

Neque Fœniculum, neque Melilotum habeo pro emollientibus: rancidi quid habent & acris, & gargarismum manifesto fauces memini inflammâsse.

Adde ad Genipi, quod nigrum vocatur, *Artemisi- am foliis sericeis, radicalibus petiolatis, pinnatis, incis, caulinis petio- latis* Hist. Stirp. Helv. n. 127.

Gratissimum tamen est verum & viride, quod odoratum ex Achilleæ genere: deinde album, quod Absinthium n. 126. Grato est odore, sed minùs vehementi. *Absinthium foliis sericeis, petiolatis, pinnatis, pinnulis trifidis & quinquefidis* n. 125. rarius est.

Grata vis radicis Laserpitii, lobati, & Oreoselini cervariæ mereretur magis excoli.

Gentiana lutea adhibetur ad aquam spirituofam amaram apud Sarunetes frequentem.

Quænam fuerit radix venenata cum Gentiana mista, de qua in Anglia sunt conquesti, & quam aliqui, præter omnem veri speciem, pro Thora habuerunt, cui minimi quasi ungues sunt. An fortè ipsa Gentiana rubra fuerit insalubris, cujus radix ex Norwegia petitur. Certè odor ejus siccata virulenti quid habet, & adfines odori radicum Delphinii aconiti folio. Suspicionem etiam aliquam movet, quod armenta uti Veratrum, ita & Gentianam vitent, neque unquam folia decerpant.

Gummi Guttâ non infrequenter WERLHOFIUS utebatur. Vigefies & ipse sumpsi, nihil inde valde mali expertus, præter flatulentum in ventriculo tumorem.

Chamæclema Angli ajunt equis nocere: an fortè de alia planta locuti?

Diversissima de efficacia utriusque Hellebori legas judicia. Extractum, ut in cicuta, putes vi venenatâ per diffatos vapores liberari. Fortè & ipsi Hellebori, perinde ut adfines ipsis Ranunculi per vetustatem acrimoniam deponunt.

Nondum satis confectum est, ex quo pisce Ichthyocola paretur. Ex vesica natatoria Hufonis optima & pellucida quidem obtinetur, sed plerumque semipellucida prostat, ex variis piscibus, etiam salmonibus cocta.

)()()(

Inter

Inter Ipecacoanhas non negligendæ sunt antillanæ duæ, Violæ utraque species, nuper certo definitæ. Sed etiam vulgaris Violæ radix aliquid habet emetici.

Iris palustris lutea pariter acerrima est alvumque ducit.

Jalapa bonum est medicamentum, neque ingratum, est tamen in odore vapor quidam nauseosus, quem, cum trigesies sumpsissem, non potui ultra ferre. Cæterum certum, valens & innoxium. Radicem ipsam volo, non refinam.

De Mercurialis utilitate subdubito, cum hirsuta species manifesto venenata sit.

Millepedum ad ciendam urinam in sano homine vis aliqua est, non in morbis, quando lotium reses velis expedire.

Moschi vires in nervorum morbis plerumque spei non respondent.

STOERCKII planta ob spicæ laxitatem florumque in ramulis numerum omnino videtur esse Aconitum elatius. Vulgari Napello spica multo est densior & breves pedunculi.

Pinus foliis quinatis triquetris Hist. stirp. helv. n. 1659. Pinafter MICHELI nov. gen. p. 223. T. 15.

In Helvetia, pariter, ut in Sibiria, passim in medicinam recipitur. Esu non ingratus fructus, avellanis proximus, aliquanto magis balsamicus, ad morbos pectoris adhibetur in emulsione.

Brunella inter debiliora est medicamenta, & exigui usus.

Quassia lignum ante hos triginta annos adversus febres malignas in Surinamia notum fuit, ut ex centurione novi, proximâ affinitate mecum conjuncto, qui eo ipso medicamento sanatus fuit. Sed etiam ipsi in debilitate maxima post dysenteriam superstite feliciter hoc ligno sumus usi.

Raphanus rusticanus rarus acrem & efficacem sinapismum præstat, ad plantam pedis adpositus.

Salab paratur ex Orchidis Morionis maris bulbo, sed & ex aliis, etiam palmatis Orchidibus decorticatis, in clibano coctis. In aqua diffluit abique in gelatinam, quæ magnam aquæ portionem spisset. Nutrit, & gelatinosa est, non venerea.

Scrophularia utique cum tota sua classe suspecta est.

Nuperi in Secali corniculato variè animalibus propinato, nihil venenati reppererunt: & in chemica analysi nihil præter olei majorem copiam, & subacre quid. Communi tamen consensu fere omnium clinicorum in Saxonia A. 1717. in Solonienfibus & alibi morbus epidemicus gangrænosus ex esu panis exortus est, quem hæc farina ingrediebatur.

Seseli semen officinarum fere est Laferpitii foliis tripartitis quod Siler.

Ex Sorbo aucuparia parcior sed utilis spiritus vinosus destillat.

Spongia usta strumas nondum confirmatas certo dissolvit, sola, cum saccharo propinata: ex vi falsa ut videtur. Nam etiam aer marinus solus etiam grandes strumas dissipavit. Eadem Spongia in Anglia ad comprimendam sanguinis ex vulnerata arteria jacturam plurimi fit.

Theæ vires & noxæ sunt utique potissimum ex aquæ calidæ indole, frigidum enim infusum immensum differt sapore medicisque viribus. Est tamen præterea in Thea vis quædam narcotica, quam tostione minuunt, sed cujus aliqua tamen vestigia per nupera experimenta in vulgari illo infuso supersunt.

Hæc quidem obiter & ex memoriâ hic addidi, fida tamen, & ab experimento nata. Liceat denique curas meas & in parte maximè necessaria artis nostræ metus & sollicitudines addere. Exigua hæctenus pars materiæ medicæ in certo est constituta: nondum est, ut mentem manifesto aperiâ, de plerisque medicamentis per nulla certa experimenta confectum, quæ earum in medendis morbis vis sit. Innumeræ herbæ, etiam simplices, in pharmacopoliis prostant, quarum medicam efficaciam ex solis veterum commentariis recepimus, sed ii ipsi unde habuerunt? saporis fere & odori tribuerunt plurimum, sæpe non malè, ut nonnunquam tamen vires medicamenti ex neutro omnino sensu vel per conjecturam discas. Nemo ex nauseoso illo corticis Peruviani amarore suspicaretur, adversus febres periodicas in eo inficeto cortice certum latere præsidium, ipsam ab eo gangrænam compesci. Sed neque

vim somniferam in amaro & calido opio divinares : & sic per plurima.

Hoc unum vitium, alterum est in summa incertitudine, num omnino eam plantam teneamus in officina, de qua veteres certas vires medicatas prædicârunt. Nunc certè miser fuerit medicus, qui cum tota schola Pæonia adversus epilepsiam, in exemplo, usus est, si nostra planta omnino non est veterum Pæonia. Et ejusmodi dubia post TOURNEFORTII itinera, post labores FABII COLUMNÆ, innumerabilia occurrunt.

Cæterum neque ab analysi speres quidquam, quod pronuncies, quæ, destructis per ignem elementis, acerrima faciat ex mitissimis. Neque extractorum utriusque generis pondera multum docent, nisi fortè, aquâne, an vino, an spiritu melius vires plantæ alicujus recludantur.

Quid agendum sit, ut cum fiducia aliqua plantis nostris utamur, est ut aperiâ. Consilium dabo rectum, sed longo, non unius sæculi tempore suos præstiturum fructus. Neque tamen aliud est, quo nos ex carceribus liberemus.

In omnibus plantis faciendum est, quod factum est in cortice Peruviano. Sumenda pars medicata, sola, non alio cum medicamento composita, dosi primùm exiguâ, inde auctâ. Adnotandus sapor, odor, acrimonia, blandities. Pulsûs inde nata mutatio, aut urinæ, aut ventriculi, aut intestinorum, calor, frigus, anxietas, levamen, & quæcunque alia ex sumpto medicamento supervenire possunt. Hæc tentanda in herba, in ejus decocto, infuso, extracto, aqua stillatitia. Deinde secundum ea phænomena, quæ in sano homine percepta sunt, ad ægrum corpus eadem planta est transferenda, & exhibenda in eo statu mali, in quo sana ratio aliquid ex data planta speret, aut scholæ permittant. Becchica in pectoris difficili actione, diuretica in urina reside, febrifuga in febre, stomachica in ventriculi debilitate, & porro quodque medicamentum propinandum in eo malo, cui opponi videatur. Urgendum aucta dosi, usu continuato.

Adnotanda, sed absque ulla præconcepta opinione, absque ulla cupidine hujus, neque alterius eventûs, quæ in eo morbo hoc ex medicamento, & solo evenierint.

nerint. Repetenda pericula in aliis aliisque corporibus, ætate, temperamento, mali vehementiâ differentibus. Recipiendi in adversaria hi eventus. Faciliùs vero hæc omnia fiunt in nosodochio, ubi certus sis medicamentum destinatum sumi, suâ dosi sumi, solum sumi.

Ita fiet paulatim materies medica, cui confidas. Ea mihi erat mens, quando de nosodochio academico condendo consilia dabam, quod conditum fuisset, consentientibus proceribus, nisi me infirmitas summa corporis mei coegisset, decidere gradu.

Lentè hæc in aliquot plantarum centuriis procedent. Initium faciendum ab iis, quarum dotes conspicuæ sensibus plus promittunt. Deinde eodem tempore in variis nosodochiis, diversi medici necessaria experimenta capere possent, ut celerius de universo vero constaret. Sed neque dedignabile foret, si lentè res procederet, dum verè & sincerè ageretur. Ut enim nunc res sunt, paucissima fida habemus medicamina: pluribus plantis abstinemus, quod nulla certa habeamus testimonia, in quibus mens soli vero credula acquiescat. Brevissimè hæc omnia in chartas conjeci, quæ à meditantibus plenius poterunt explicari & ornatiùs. Bernæ d. 27. Mart. 1771.



)()()()(

PROLEGO.

PHARMACOPOEÆ
HELVETICÆ

PARS I.

MATERIAM MEDICAM
ORDINE ALPHABETICO
TRADENS.



Catalogum tibi heic tradimus, Benevole Lector! simplicium five eorum corporum naturalium, ex triplici naturæ regno desumptorum, quorum in medicina aliquis est usus.

Artefacta passim interspersimus, quæ ab ipsis pharmacopœis non conficiuntur & plerumque ex distitis regionibus adferuntur, quæque vulgo in Materia Medica inter simplicia recensentur.

In officinis pharmaceuticis recepta, utut sæpe inepta, nomina primo loco posuimus. Hæc sequuntur synonyma CASPARI BAUHINI & recentissimorum inque classicam auctoritatem evectorum scriptorum HALLERI, LINNÆI, WALLERII, aliorum, cum idonea iconne BLACKWELLIANA vel alia.

Nomina gallica & germanica addidimus nostris in oris inque Germania & vicina nobis Gallia maxime usitata.

Etiam loca natalia indicavimus fida quoad inquilina. In exoticis fide maxime dignos scriptores secuti sumus. Multum enim interesse debet pharmacopœum, scire, unde singula, quibus officina sua instructa esse debet, simplicia trahuntur.

Qualitates sensibus patentes, odorem, saporem, colorem, figuram &c. plerumque breviter descripsimus, ex quibus indolem eorum agnoscas.

Vires breviter, sobrie & quantum fieri potuit, fidas passimque propria experientia confirmatas indicavimus. Plurcula tamen, ex enumeratis, simplicia nostris in regionibus vel plane non vel saltem minus usitata sunt, quorum adeo virium recensitionem a melioris notæ autoribus mutuavimus.

Analyfin chemicam, dosin & recensitionem compositorum, quæ simplicia ingrediuntur, lubentes omisimus, ne moles libri præscriptos limites alias jam transgrediens absque vera utilitate au-geatur.

Ordinem alphabeticum quod secuti simus, non est quod excusemus. Commodior est reliquis ideoque præferendus, cum in gratiam artis pharmaceuticæ studiosorum potissimum scripserimus. Basileæ d. 1. April. 1771.

Abelmosch




A. Ω.

PHARMACOPOEÆ HELVETICÆ PROLEGOMENA.

PHARMACOPOEI DOTES & STUDIA.

I.

 Pharmacopœi tam ardua, & nobilis est provin-
cia, ut, si in ea administranda, cum pietate &
virtute, scientia & peritia, studio & industria versetur,
omni laude & honore dignus haberi mereatur; siquidem
communi hominum societati, haud vulgarem utilitatem
præstat, & sanis, & ægris commodam, nec non Medi-
cis & Chirurgis optatam. Quo proin nomine ab agyrtis,
circumforaneis, unguentariis, ciniflonibus, & quibusvis
medicâstris, & impostoribus, longo distat intervallo.

2. Pharmacopœus legitimus, in civili societate, non
solum honestæ famæ, & ab omni turpitudine alienus,
sed præcipuè vir bonus, artisque suæ eximiæ satis peritus
esse

esse debet, in cuius virtute & solertia, fide ac probitate, studio & dexteritate, tam Medici, quàm ægroti, certam fiduciam collocare queant. Igitur esto solidæ pietatis christianæ cultor, ejus sacra præcepta, in Deo omnipotente colendo, & proximo amando, curæ cordique habens; ex ipsâ quoque simplicium medicamentorum copia, ceu luculento naturæ thesauro, almi Creatoris potentiam, sapientiam, ac bonitatem, grato animo agnoscens; atque ab ejus cœlesti benedictione, omnem artis suæ felicitatem & successum sperans; adeoque nullos non conatus & labores suos, ad supremi Numinis gloriam, & mortalium salutem impendens; nihilque antiquius habens, quàm in excolenda professione sua, Deo O. M. placere, & hominum societati prodesse.

3. Ad capeffendam vero tam arduam provinciam, utique opus est ingenio satis idoneo, usuque rationis & memoriæ felici, ad comparandam sibi rerum scientiam, ac peritiam expedito. Nec invito aliquis animo ad hoc studii genus accedat, sed cum prono affectu, & flagrante desiderio, illud amplectatur.

4. Ante omnia dein, qui se huic arti consecrare volet, aliquot linguarum notitiam habere debet, præsertim germanicæ, & gallicæ, utpote quæ sunt in Europa præ cæteris usitatiores, tum & latinæ, siquidem his præcipuè linguis, exarata sunt potiora opera ad pharmacologiam spectantia. Verùm etiam græcè aliquid callere, juvabit, cum plurima nomina, ut morborum, sic quoque medicamentorum, græcæ originis habeantur. Quod si præterea italicæ, belgicæ, anglicæ, linguarum aliqua peritia

ritia accedat, tanto majore commodo, commentarios tali idiomate scriptos, in suum usum poterit convertere. Cæterum vernaculæ linguæ germanicæ puritatem & elegantiam excolere, non minùs Pharmacopœum ornabit, quàm alium quemcumque patrii sermonis studiosum. Latinè autem satis scire, prorsus est necesse, non modo, ut Medicorum præscripta in usum ægrorum remedia accuratè intelligantur, verùm etiam ut authores tam veteres, quàm recentiores, faciliùs usu veniant, qui scilicet totam rem pharmacologicam, præsertim vero historiam materiæ medicæ universæ, & nobilis Chemiæ dogmata, luculentiùs comprehendunt. Insuper etiam artis terminos, longo usu receptos, item notas ponderum, nominum compendia, & abbreviationes, nec non characteres chemicos usitatos, ad unguem callere oportet, si quis in hoc opere, & studio commodè versari velit.

5. Boni dein Pharmacopœi est, solidam & accuratam sibi comparare notitiam ac peritiam, omnium simplicium cujuslibet regni, quæ in usum officinalem veniunt, ut sunt ex regno fossili, terræ, lapides, succi, salia, mineralia, metalla, &c. ex regno vegetabili, species omnivariæ, tam indigenæ, quàm exoticæ, radices, herbæ, musci, flores, fructus, semina, nuclei, cortices, ligna, succi, gummata, resinæ, balsama, &c. ex regno animali, quæcunque ex quadrupedibus, avibus, piscibus, amphibiiis, testaceis, insectis, vel integra, vel quoad partes, aut producta, in usum ducuntur. In qua totius materiæ medicæ cognitione, quo peritior fuerit Pharmacopœus, eo magis suam spartam exornabit.

6. Simplicia indigena, ex hortis in hunc usum cultis, vel ex ipso natali loco, addiscere convenit, interdum ea propter tempestivè susceptis herbilegiis, adjuncto præsertim duce botanico peritissimo, qui omnium plantarum characteres in numero habeat; alias etiam commodum fuerit, in promptu habere Herbarium vivum, in quo omnes species officinales pulchrè ficcatae, & ordine methodico digestae, suisque nominibus, vernaculis & latinis notatae custodiantur. Exotica vero cujuslibet regni, ex museis, seu gazophylaciis rerum naturalium, tum ex optimis auctoribus, qui accuratâ descriptione, vel etiam iconibus idoneis, illa luculenter illustrârunt; vel etiam ex institutione Magistri, hujus scientiæ apprimè gnari, discenda veniunt. Præterea magnopere interest, ubi optima quæque simplicia nascantur, cognoscere, simulque unde, quâ viâ, & per quos, opportunè genuina, recentia, sincera, & optimæ qualitatis, comparari queant, comperitum habere. Quæ res tanto magis curæ esse debet, quoniam in hoc commercio, iniquæ fraudes, & imposturae, multifariam exerceri solent. Idcirco etiam valde juvabit, in alias quoque regiones, ubi res pharmaceutica maximè floret, peregrinationem suscipere, & passim locorum suam notitiam magis magisque stabilire, & amplificare.

7. Præter simplicium peritiam, opus est porro, perspectas habere omnes præparationes, & compositiones officinales, ideoque libros in hunc usum editos diligenter legere, ac præsertim Dispensatorium patrium, ad cujus normam quævis medicamenta paranda veniunt, assiduâ manu versare, ut omnium ratio accuratè cognoscatur.

Neque

Neque vero fatis est, ex libris sapere, sed in ipsa officina, & laboratorio manus admoveere oportet, & quemadmodum omnes & singulæ encheireses, cum dexteritate sint obeundæ, & expediendæ, à Magistro artis peritissimo addiscere.

8. Cùm vero artis pharmaceuticæ longè nobilissima pars sit Jatrochemia, in rimandis corporum naturalium principiis, eorumque natura & proprietatibus cognoscendis, præcipuum lumen affundens, & in medicamentis præstantissimis inveniendis, ac præparandis, optimam viam ostendens, utique oportebit, huic studio & scientiæ strenuam operam navare. Eapropter non fatis erit, in quodam pharmacopolio rudimenta artis ponere, sed magno-pere juvabit, alias quoque officinas nobiliores adire, & ubi Chemia maximè floret, laboribus jatrochemicis diligenter interesse, eâque ratione suam artis peritiam magis magisque augere, & perficere. Interea optimos & probatissimos quosque authores chemicos sibi comparare, & assiduâ lectione velut in succum & sanguinem convertere.

9. Cæteras autem virtutes Pharmacopœi, insigniter cumulabit philoponia, si nempe alienus ab otio & desidia, diu noctuque suo studio intentus, omni opere virium, & ingenii, in eo excolendo, & usque longiùs provehendo, nihil operæ reliquum faciat. Si, dum alii cives otiando, ludendo, voluptatem inanem, ac vanitatem sectando, irreparabile tempus terunt, ipse suum vitæ ævum, in munere & officio suo ornando, cum lætitia consumat, ità Deo dante & sibi, & societati civili, quàm maximè profuturus.

PHARMACOPOEI OPERA & LABORES.

10. Pharmacopœo optabile est, officinam habere commodam, loco idoneo, ficco, temperato, perflabili, salubri sitam, à sordibus, foetore, fumo, omnique squalore remotam, & liberam, omnique ex parte nitidam, & ornatam. Dein curæ sit Laboratorium aptum, suis furnis & camino benè instructum, ad quosvis labores commodum; unà cum instrumentis omnivariis, ad usum officinalem necessariis. Simul præsto sint vasa diversi generis, terrea, vitrea, lignea, cuprea, ænea, stannea, ferrea, parandis, fervandis, & dispensandis medicamentis quàm maximè opportuna, atque ità locata, & disposita, ut in usum præsentem ad manus sint quàm commodissimè. De cætero quoque juvabit totius officinæ fabricam tali artificio componere, quod usui & scopo maximè respondeat; quo etiam pertinet, loculos & repositoria, ordine tam regulari, & concinno disponere, ut in laboribus expediendis, & medicamentis dispensandis, nihil ad compendium desideretur.

11. Collectio Simplicium ex quolibet regno, singulare studium & curam desiderat, scilicet ut lectissima quæque, recentia, genuina & sincera, opportuno tempore comparentur, spuria vero quævis, inertia, vitiosa, vel effœta repudientur. Quocirca omnino necesse est, omnes species officinales examussim habere perspectas, earumque notas bonitatis, quoad omnes qualitates, coloris, odoris, saporis, ponderis, satis exploratas, ne aliud pro alio perperam accipiatur. Veluti quondam Pharmacopœi Celeberrimæ Metropolis Imperialis, pro vera radice *Hellebori nigri*,
longè

longè aliam, toto genere diversam, scilicet radicem *Pseudo-Hellebori* MATTHIOLI, sive *Buphtalmi* DODONÆI, à rhizotomis coëmtam, in suis officinis venundabant, donec Celeb. CLUSIUS, errorem fortè detectum, suo studio emendavit (a). Nec hodienum, quæ isto nomine radix in nonnullis officinis prostat, genuinas Hellebori veri notas habere videtur. Quæ ex Helvetia venalis adfertur, ideo dubium relinquit, quia in nostris montibus, nusquam verus Helleborus niger officinalis sponte nascitur, sed tantum in quibusdam hortis colitur, unde in copia venalis vix haberi potest. Quàm facilè autem Pharmacopœi rudes hallucinentur, passim observare licet. Sic memini, quendam *Flores Lupuli*, pro *Cuscuta*, alium *Lysimachiam luteam*, pro *Virga aurea*, alium radicem *Dentariæ*, pro *Saxifragiæ rad.* à phytopolis accepisse, ne plures ejusmodi errores accumularem.

12. Quoad Exotica, sedulo danda est opera, ut merces recentes, & optimæ notæ, in officinam veniant. Idcirco alendum cum Negotiatoribus extraneis, probatæ fidei ac peritiæ, commercium tempestivum, ab iisque nonnisi genuina & probatissima quæque, quantivis etiam pretii, coëmenda. Lucri vero causâ, à nundinatoribus simplicia viliora, parum efficacia, vel etiam fucata, minore pretio accipere, & dispensare, non est viri honesti, sed fraudulentæ & sordidi philargyri, unde & Medici, & ægroti spes fallitur, ipsiusque pharmacopolæ fama detrimentum patitur.

(a) *Hist. Plant. rar. L. III. C. 20. p. 333.*

13. Nec minoris est momenti, simplicia indigena, opportuno loco, & tempore collecta, mundare, utile ab inutili secernere, tum idoneo loco, puro, nitido, à canum ac felium conspurcatione libero, diligenter siccare, postea vero commodis, nitidis, aptisque repositoriis, vel receptaculis condere, atque à teredine, mucore, putredine, òmnique adeo corruptela, custodire, & ufui tempestivo fervare.

14. Cùm vero non omnia ætatem ferant, sed alia citiùs, alia tardiùs evilescant, vel corruptelam trahant, vigilantis est Pharmacopœi, considerare, quousque sine virium dispendio, vel alteratione, quæque officinalia durare queant; ergo quotannis semel, iterumque, totum apparatus officinalem recensere, & quæ fortè sunt vitiata, aut effœta, rejicere, iisque promptè alia recentia substituere. Ità scilicet pleræque radices, herbæ, flores, fructus, semina: ità aquæ destillatæ simplices, ità syrupi &c. annum ad minimum renovationem postulare solent. Quin etiam varia præparata, & composita, non ultra certum temporis spatium, suam integritatem conservare apta sunt, dum ex opposito alia multa, longiùs servata, nihil detrimenti patiuntur. In qua re, Pharmacopœi peritia, fides & industria se ostendere debet.

15. Igitur præter simplicium curam, Pharmacopœus etiam Præparatis, & Compositis, suum studium, operam & diligentiam adhibere debet, ut omnia & singula, secundum artis leges, & præscriptam à Medicis normam, quàm fidelissimè conficiantur. In quem finem oportet, ubique simplicia recentia, quàm optimæ notæ eligere, atque

atque ad præparationem, & compositionem, nulli artificio, nec labori deesse, sed per omnia stabilitas, & probatissimas artis regulas accuratè observare, quo sic medicamenta secura, debitæ qualitatis, & efficacix elaborentur.

16. Medicamenta vero chemica, ut magnam partem altioris sunt artificii, sic eo majorem solertiam ac industriam requirunt, ut quævis operationes, ex artis præscripto accuratè instituantur, nihilque erroris committatur, qui vel ex imperitia, vel negligentia admissus, in damnum, aut periculum ægrorum, ipsiusque pharmacopœ, vel etiam Medici ignominiam redundare posset. Eâ vero cautelâ longè maximâ opus est, circa medicamenta valde generosa, & heroica, mercurialia, antimonialia, opiata, &c. quæ scilicet ritè elaborata, & tempestivè applicata, salubri auxilio, at perperam confecta, vel sinistrè in usum vocata, damno, vel exitio esse solent. Quam ob rem necesse est, Pharmacopœum non modo iatrochemiæ satis gnarum esse, verùm etiam in præparandis ejusmodi medicamentis, propriam manum, & industriam adhibere, nihilque adeo proprii studii & laboris omittere, aut saltem processus graviores, nulli artis ministro committere, cujus peritia & industria, cum pari fide & probitate, non sit abundè perspecta. Quin imo altero manipulante, nihilominus prudentiæ erit, suâ præfentiâ, suoque præsidio, labores dirigere, & secundare. Quod si aliquis contractioris pharmacopolii Magister, ægrè possit, aut velit ipse chemicos labores obire, ac propriâ manu talia remedia elaborare, huic opus erit, de fideli ac satis perito artifice, sibi circumspicere, à cujus

manu legitimè præparata, æquo pretio sibi comparare queat, cavendo scilicet, ne sibi fortè adulterina, aut parùm fideliter confecta obtrudantur.

17. Quæcumque autem lege artis præparata erunt, sive Galenica, sive Chemica, ea omnia apto loco, ac idoneis vasis recondere, & custodire oportebit, inscripto majoribus literis medicamenti nomine, & minoribus notato anno, ac die, laboris confecti: cavere autem, quoad vasa cuprea, ænea, plumbea, nequid inde in medicamenta vitii redundet, præterea sedulo curare, ut quæcumque officinalia in Syllabo habentur, simplicia, vel præparata, & composita, quovis anni tempore, in apparatu præsto sint, & siquid fortè deficiat, protinus refarciatur; simul quoque in toto pharmacopolio munditiem colere, ac opportuno tempore, vasa quævis & instrumenta de novo mundare, ut omnia prorsus niteant, nihilque usquam squaloris in oculos incurrat.

PHARMACOPOEI OFFICIA.

1. In toto Pharmaciæ munere sanctè & inculpate versari, & per omnia omnipotentis Dei gloriam, cum salute proximi, curæ cordique habere.

2. In officina diligenter præsto esse, ut nullo non tempore venientibus paratum sit ejus officium, etiam noctu, si necessitas urgeat.

3. Avaritiam fugere, & æquitati studere, erga pauperes liberalem se præbere, cæteris omnia justo, & æquo pretio vendere.

4. Cum

4. Cum Collegis pacem & concordiam alere, odium & invidiam fugere.

5. Simplicia officinalia, tam indigena, quàm exotica, recentia, genuina, & optimæ notæ, sibi in usum officinalem comparare, & in promptu habere.

6. Præparata & composita quævis officinalia, juxta normam à Medicis in dispensatorio præscriptam, bonâ fide, accurato studio elaborare.

7. Ab omni fraude, fucò, & mangonio religiosè abstinere, & numquam quid pro quo substituere.

8. Præparata quævis, seu Galenica, seu Chemica, in propria potius officina elaborare, quàm aliunde coëmere.

9. Medicorum formulas extemporaneas, seu magistrales, optimâ fide conficere, & expedire, nihilque in quanto, vel quali mutare, aut aliud pro alio surrogare.

10. Nulli artis famulo Medicamentorum præparationem, & expeditionem committere, qui non artis peritiæ, & probitatis suæ, certam fidem dederit.

11. In praxin medicam non involare, sed intra pharmaciae limites se continere.

12. Venena diligenter clausa custodire, ac nemini suspecto, nulli puero, nec famulo, nisi schedulâ sui Domini munito, illorum aliquid concedere.

13. Nemini Medicamenta vomitoria, vel purgantia, præsertim valentiora, nec opiata, aliave generosa, exhibere, nisi à Medico legitimo præscripta.

14. Fœminis junioribus, præsertim de imprægnatione suspectis, nulla prorsus vomitoria, aut purgantia, nedum fortiora, concedere.

15. Nulli prorsus Fœminæ, medicamenta emmenagoga exhibere, nisi à legitimo Medico imperata.

16. Mulieribus gravidis, puerperis, lactantibus, nulla medicamenta, nisi à Medico legitimo præscripta, præbere, nisi fortè innocentissima.

17. Fœminis gravidis, foetum pellentia, sive abortiva exhibere, scelerati hominis foret, ac homicidæ, non Christiani Pharmacopœi.

18. Si quæ majoris momenti præparatio, aut compositio, in officina suscipiatur, Decanum Facultatis, & Poliatrum, aliumve Medicum practicum, ad inspectionem invitare.

19. Erga Decanum Facultatis, & Poliatrum, cæterosque Medicinæ Doctores legitimos, debitam reverentiam, & in rebus medicis obsequium præstare.

20. Siquid in alicujus Medici præscripto, ambiguum, obscurum, dubium, vel anceps videatur, de eo ipsum authorem modestè interpellare, aut pro re nata, ad Facultatis Decanum, deferre, ejusque judicio, & consilio stare.

21. Formulas remediorum, à Medicis præscribi solitas, in officina non cujusvis oculis exponere, sed à conspectu remotas seorsim reponere.

U S U S D I S P E N S A T O R I I .

I. DISPENSATORIUM rectè concinnatum, est totius materiæ auxiliorum Medicorum, ex quolibet regno, thesaurus & promptuarium. Ejus una pars historiam simplicium succinctam, & luculentam, eorum nomina officinalia antiquo usu recepta, locum natalem, notas & characteres, qualitates sensibiles, coloris, odoris, saporis, ponderis, principia chemica, proprietates ac vires, usu exploratas, comprehendit. Uti vero Mechanicus sua instrumenta, Pictor suos colores, Miles sua arma, Musicus sua organa, examussim cognoscere debet, si ad suum scopum collineare velit, ità & Medico, & Pharmacopœo simplicium notitia prorsus est necessaria, ut in suo munere, & officio feliciter versari queat. Talem vero peritiam ex luculento Dispensatorio commodè haurire licet.

2. Altera pars Dispensatorii, tradit rationem legitimam, Medicamenta quævis officinalia, ad medendi scopum idonea, ritè præparandi, & componendi; hæc Pharmacopœis est norma, secundum quam operationes & labores suos instituere, & absolvere debent: ipsis autem Medicis est velut armamentarium, unde auxilia selecta, & probatissima, quæ rationi indicantium respondere, & consilio therapeutico satisfacere videantur, depromere queant.

3. Itaque si Medicus in numerato habeat simplicia & præparata, vel composita quævis in Dispensatorio comprehensa, in dato morbi casu, indagatâ ejus origine & causâ, indole ac proprietate, secundum omnia phænomena,

d

mena,

mena, nec non ægri temperie, ac virium conditione, secundum artis medendi principia intelliget, an? & quænam ex apparatu officinali, simplicia, vel composita, ad scopum convenire videantur? In tanta illorum copia, vix deficiet aliquod remedium, quod consilio therapeutico, in tantum, vel in totum non possit respondere. Toties ac toties Dispensatorium suppeditabit auxilia jam parata, quæ indicationi satisfacere queant; adeo ut non semper opus sit, ex tempore novas remediorum formulas præscribere.

4. Sine accurata cognitione simplicium, & compositorum, de viribus illorum, & usu tempestivo, nemo cum fiducia judicare potest, unde maxima Dispensatorii utilitas elucescit. Qui ejus rudis, & imperitus est, neque officinalia satis perspecta habet, toties in præscribendis remediis fluctuabit, & si quæ præparata, vel composita in usum trahat, de eorum viribus, & effectu non satis certum judicium habebit; intellectâ demum indole ac naturâ simplicium, & exploratâ ratione præparationum; & compositionum, adhibitâ simul analogiâ chemicâ, & therapeuticâ, licebit de facultate alicujus medicamenti statuere, quo si experimentorum fides accedat, nihil in medicina certius expectari potest. Quod si ad medendi rationem, necesse est, novisse morbum, ejusque causam, & ex his satis exploratis, consilium capere, & invenire auxilia quàm aptissima, facile patet, neminem cæteris paribus melius opem laturum, quàm qui omnium officinalium ex Dispensatorio sit peritissimas.

5. Porro insignis Dispensatorii usus eo pertinet, ut
in

in præscribendis remediis opportunus habeatur delectus, si ne quo illorum administratio vix potest felicem habere successum. Id exemplo tam alterantium, quàm evacuantium, præsertim generosiorum luce clarius apparet. Si ex. gr. ratio indicantium in dato casu, vomitorium postulet, non perinde erit, ex apparatu officinali, quaecumque emeticum adhibere, sed maximè intererit, tale eligere, quod naturæ morbi, & causæ, & ægri conditioni sit maximè conveniens. Jam verò quædam blandius, alia valentiùs, alia valentissimè stomachum moliuntur, quorum proinde indoles ac diversitas ex Dispensatorio accuratè noscenda venit. In molimine naturæ ad vomitum spontaneo, haustus liberalis *Aquæ fontanæ tepesactæ simplicis*, vel adjectâ portione *olei olivarum*, vel *amygdalarum dulcium recentis*, vel *mellis*, interdum satis vomitum adjuvare, vel accelerare solet. Est ubi *Aqua florum Acaciarum*, cum *saccharo* nonnihil cocta, ad Uncias VI. aut plures tepidè propinata, satis vomitum provocare potest. Sed ubi majore stimuli gradu opus est, iterum refert, an *radix Ipecacuanæ*, an *Tartarus*, vel *Syrupus emeticus*, vel *Kermes mineralis*, aut ipsa *Aqua benedicta* RULANDI, eligatur? quorum sanè omnium singularem indolem ac proprietatem, in explorato habere oportet, ipsique indicantium rationi tempestivè accommodare.

6. Idem valet de Cathartîcis, quorum & numerus, & diversitas est maxima, simplicium, & præparatorum, & compositorum, ex quibus nemo rationalem selectum facere aptus erit, nisi ex Dispensatorio, omnium & singulorum naturam, proprietates, ac vires, usu & experimentis compertas, sit edoctus. Exemplo pilularum res fiet clarior, si quanta sit illarum diversitas, conside-

rare libeat. In *Extracto catholico*, præter *Aloën* habetur *extractum Hellebori nigri*, & *Colocynthis*, unà cum *resina Jalappæ* & *Scammonii*, quæ propè violenta sunt omnia. In *extracto panchymagogo*, juxta *Aloën* & alia, continetur *Scammonium*, *Turbith*, *Hermoadactylus*, *Helleborus*, *Colocynthis*, totidem acria & violenta; qualia siquis compositionis imperitus, in subjectis tene-rioribus, valde sensibilibus, & irritabilibus, purgandi scopo præscribat, facilè nimias in nervoso genere turbas, quin imo hypercatharsin concitabit, ubi nonnisi moderatâ subductione opus erat. At *Pilulæ Immanuelis* solam *Aloën* pro basi habent, cum modica additione *Myrrhæ* & *Croci*. *Pilulæ Tartaræ BONTII*, præter *Aloën*, nonnisi *Gummi Ammoniacum* ac *Tartarum vitriolatum* cum *Aceto Scillæ* recipiunt. Quales proin multo lenioris sunt stimuli, & magis ad scopum purgandi consentaneæ, ubi vel temperiei, vel morbi ratio intellecta, mitiorem evacuationem suadet.

7. Nonnihil etiam momenti habet, ex *Dispensatorio*, quorumvis simplicium, & præparatorum, & compositorum, qualitates sensibiles, coloris, odoris, saporis, ponderis, habere perspectas, quo sic illorum usus & applicatio, ad ægrorum ætatem, temperiem & idiosyncrasiam, commodiùs dirigatur. Est, ubi color alius præ alio magis placet. Odorum ut maxima diversitas, sic varius in organa hominum sensoria effectus est. *Fragrantia Rosarum*, *Ambraë*, *Moschi*, &c. vulgò *Fœminis hysteris*, imo & multis aliis valde infensa est, quam alii nonnulli homines in deliciis habent. Saporum ut infinita varietas, sic alius præ alio, ægrorum palato magis aut minus amicus, vel inimicus est. Quorum peritiam in praxi
medi-

medicamentorum aliquid ponderis habere, nemo inficias ibit.

„ Tres mihi Convivæ prope dissentire videntur,
 „ Poscentes vario multum diversa palato.

HORAT. *Epist.*

NOMINA MEDICAMENTORUM FALLACIA.

8. NOMINA, quibus medicamenta donantur, multum fallaciæ in se habere, nemo in dubium vocabit, qui paullo attentius illa considerare velit. Quæ adeptis usu veniunt nomina arcana, *Auri potabilis*, *Panaceæ solaris*, *Eutis primicedrini*, *Tincturæ philosophorum*, &c. quantum obscuritatis, & caliginis præ se ferunt, tantumdem errandi an-
 sam præbere intelliguntur. Sed & alia atque alia nomina remediorum speciosa, vulgo introducta, ostentationem & jactantiam spirant, à modestia, & sincero veritatis studio alienam.

9. Plerumque medicamentis nomina imponuntur, vel 1) ab auctoribus suis: vel 2) à viribus ad corpus humanum relativis: vel 3) à partibus corporis, quibus speciatim convenire videntur: vel 4) à morborum generibus, quorum medelæ adhibentur. Quæ figillatim considerare juvabit, ut quantum fallaciæ involvant, & quàm facile non tantum rudes & plebeios homines, verum etiam Medicos, in fraudem inducant, in apricum veniat.

10. Multæ veterum compositiones, authorum suorum nomina præ se ferunt, velut *Theriaca Andromachi*, *Mithridatium Damocratis*, *Diascordium Fracastorii*. Sic etiam hodie variis officinalibus, nomina Medicorum illu-

strium præfiguntur, SYDENHAMI, STAHLII, HOFFMANNI, BOERHAAVII, &c. Quæ quidem denominationes in se nihil fallaciæ involvunt, sed aliquando duplici incommodo laborant, 1) quod non semper certa authoris præparatio, vel compositio, ab his, aut illis, aliter atque aliter tradatur: 2) quod ex autoritate magni nominis, interdum aliquid præjudicii nascatur, ac si præstantia medicamenti necessario dignitati authoris sui responderet.

11. A viribus & effectu ad corpus humanum relativo, optima fit medicamentorum nominatio, si modo ista virium facultas fatis sit explorata, non autem ex cerebri fictricis ludibrio profecta, prout in multis contigisse videtur. Vis eximia cardiaca, quæ auro, & remediis ex auro paratis, *Bezoardico solari*, *Croco solari*, *Tincturæ solari*, item *Margarithis*, & *Lapidibus pretiosis*, &c. vulgo attribuitur, quis est hodie, qui non planè commentitiam esse credat? ità quæ *Cranio humano*, *Sanguini humano*, *Ossi de corde cervi*, *Ungulæ alcis*, *Astragalo leporis*, &c. adscribuntur virtutes, quis certis experimentis esse compertas, contendat?

12. Verum etiam Medicamenta, quæ à viribus, usu & experimento fatis comprobatis, nomen gerunt, ut *Mollientia*, *Adstringentia*, *Attenuantia*, *Inspissantia*, *Resolventia*, &c. tamen aliquid fallaciæ involvunt, quatenus sub idea tantùm generali, & vaga concipiuntur, quæ non omnibus ejusdem nominis ex æquo competit. Exempli gratiâ, dum *Aperientia* vocantur, quæ meatus, seu canales obstructos referare, & expedire apta sunt, manifestum est, hanc ideam generalem non cuivis obstructio-

ni, nec omnibus & singulis *aperientibus* ità dictis, convenire; siquidem *obstructio* diversi generis & causæ, alia à vitio canalium, alia à vitio fluidi contenti, alia demum à vitio utriusque combinato, eoque diverso admodum, oriunda, non potest à quolibet remedio aperitivo, sed tantum à specialiùs determinato curari. Ac præterea *aperientium* tanta est copia & diversitas, ut sub una notione generali, non possint nisi confusè & obscurè comprehendì. Nimirum alia sunt acria, alcalina, ut *Arum*, *Sinapi*, alia aromatica, ut *Zingiber*, *Calamus*, alia amara, ut *Gentiana*, *Centaureum*, alia gummosa, resinosa, saponacea, salina, mercurialia, antimonialia, martialia, & sic porro, quæ tam insignis diversitas palam facit, valde mancarn & mutilam esse ideam *aperientium* generalem, atque adeo necessariam esse, omnium & singulorum notitiam specialem, si quis illorum usum, ad medendi scopum, rectè & appositè determinare velit.

13. Majori adhuc fallaciæ obnoxia est denominatio medicamentorum topica, quæ fit à variis humani corporis partibus: dum scil. quædam dicuntur *Cephalica*, alia *Stomachica*, *Pectoralia*, *Uterina*, &c. quasi nempe specificam ad certa corporis loca haberent relationem, cum tamen pleraque, communi effectû, non minùs ad alias quoque partes pertinere soleant. Quæ *Cephalica* audiunt, soli capiti amica esse, & nonnisi ejus morbis opem ferre, nec rationi, nec experientiæ consentaneum esse, nemo non agnoscit. Quis dubitet, nobiles herbas cephalicas, *Majoranam*, *Melissam*, *Rutam*, *Salviam*, æquè aliis visceribus, quàm capiti prodesse? si ex pari causa laborent. Nec minùs erronea est opinio, si quis ex idea ge-

nerali cephalicorum, hæc unius generis & naturæ sibi concipiat, cùm tamen non modo quæ diversi, sed etiam unius sunt regni, singula à singulis, plus minùs discrepare, fide sensuum, & experientiæ constet. Quem fugit insigne discrimen inter *Pæoniam* & *Valerianam*, *Castoreum* & *Crocum*, *Cinnabarim* & *Succinum*, &c. Ergo singulorum potiùs cognitionem sibi comparare, quàm nomini cephalicorum credere oportet.

14. Porro fallaciæ plena est denominatio medicamentorum, à morbis curandis desumpta, quando hæc *Antapoplectica*, illa *Antepileptica*, alia *Antasthmatica*, *Antarthritica*, *Antibectica*, *Anthelmintica*, *Antifebrilia*, &c. vocantur; quasi inter vires medicamenti, & morbi sanabilitatem, certissima obtineret relatio, quod tamen rariore exemplo locum habet. Morbi in genere non sunt entia tam simplicia, quibus unum aliquod auxilium certo mederi queat, sed ejusdem nominis mala, plerumque diversæ sunt originis & causæ, diversæ indolis & naturæ, cum diverso symptomatum comitatu, & infinita subjectorum ægroantium varietate, quibus adeo curandis, generale medicamentum aliquod, nequaquam convenire potest.

15. In Dispensatorio habetur *Aqua' epidemica Londinensis*, quod nomen ideam suggerit auxilii, ad morbos epidemicos, seu præcavendos, seu curandos idonei. At vero tales morbi sunt infinitè varii, alio atque alio tempore, & loco, discrepantes, scilicet originis & causæ, naturæ ac proprietatis diversæ, quibus unum idemque antidotum generale neutiquam potest congruere. Etiam in morbis popularibus ejusdem nominis, sed diversi temporis & regionis,

gionis, non eadem remedia valere, experiëntiâ certum est. Quantum igitur à ratione, quantum ab observatiõne procul! generale quoddam alexipharmacum tam diversis hostibus opponere!

16. *Aqua antasthmatica*, vi nominis, asthmati leniendo, vel sanando attribuitur, ac ratione simplicium, ex quibus componitur, fortè in asthmate humorali, catarrho, frigido, pituitoso, auxiliari potest. Sed ejus usum ad quosvis alios casus, diversæ indolis, & causæ, extendere, legibus therapix valde repugnaret.

17. Quid de *Antepileptis* sentiendum sit, nullo negotio intelligitur. Vi nominis inter medicamentum, & epilepsiam, singularis relatio intercedere deberet. Hactenus autem nullum commune remedium antepilepticum, malo in genere debellando valuisse, experientia fidem facit. Nec dabile specificum aliquod esse, ratio suadet, si morbi tam diversam sedem in corpore, tam diversas causas, seu propiores, seu remotiores, in solido, aut fluido vitiato hærentes, seu corporeas, seu mentales consideremus. Nomine *Antepilepticorum*, tot vulgo simplicia, & composita laudantur, quæ nec sensibili qualitate, nec principiis chemicis, nec aliis dotibus conveniunt. Multa eorum superstitiosa, ut *Cranium humanum*, *Sanguis humanus*, alia prorsus inertia, ut *Lapides pretiosi*, nihil opis promittunt. Ex omnibus reliquis unum vel alterum nonnunquam aliquid proficit, si fortè causæ datæ leniendæ, vel profligandæ fuerit congruum. Sed & spontanea *Epilepsix* cessatio fallere potest, si dato remedio acceptum feratur, quod soli naturæ beneficio debebatur.

18. Ex quibus consequitur , nomina medicamento-
rum utcumque speciosa parum fiduciæ mereri, ac potius
ad tempestivum illorum usum determinandum , opus
esse , hinc accuratâ simplicium & compositorum cogni-
tione, inde morborum & causarum , nec non tempera-
menti ægrorum , solidâ peritiâ , ut in dato casu, ex ra-
tione indicantium perspecta, consilium salubre iniri, &
secundum naturæ dictamen, curatio institui queat.



NOMINUM COMPENDIA OFFICINALIA.

Radices quin-
que aperien-
tes majores.

APII.
ASPARAGI.
FOENICULI.
PETROSELINI.
RUSCI.

Radices quin-
que aperien-
tes minores.

CAPPARIS.
ERYNGII.
GRAMINIS.
ONONIDIS.
RUBIÆ Tinctorum.

Herbæ quin-
que emol-
lientes.

ALTHEÆ.
MALVÆ.
MERCURIALIS.
PARIETARIÆ.
VIOLARIÆ.

Herbæ quin-
que capilla-
res.

ADIANTI aurei.
CAPILLI veneris.
CETERACH.
RUTÆ murariæ.
SCOLOPENDRII.

Flores quatuor
cordiales.

BORRAGINIS.
BUGLOSSI.
ROSARUM.
VIOLARUM.

Semina qua-
tuor calida
majora.

ANISI.
CARVI.
CUMINI.
FOENICULI.

Semina qua-
tuor calida
minora.

AMMEOS.
AMOMI.
APII.
DAUCI.

Semina qua-
tuor frigida
majora.

CITRULLI.
CUCUMERIS.
CUCURBITÆ.
MELONUM.

Semina qua-
tuor frigida
minora.

CICHORII.
ENDIVIÆ f. SCARIOLÆ.
LACTUCÆ.
PORTULACÆ.

Myrobalanorum
quinque ge-
nera.

BELLIRICÆ.
CHEBULÆ.
CITRINÆ.
EMBLICÆ.
INDÆ.

Fragmenta Lapi-
dum quinque
pretiosorum.

GRANATI.
HYACINTHI.
SAPHIRI.
SARDÆ, f. CARNEOLI.
SMARAGDI.

Aquæ qua-
tuor cor-
diales.

BUGLOSSI.
BORRAGINIS.
ROSARUM.
VIOLARUM.

Aquæ qua-
tuor pleuri-
ticæ.

CARDUI BENEDICTI.
CARDUI MARIÆ.
SCABIOSÆ.
TARAXACI.

Aquæ qua-
tuor catar-
rhales.

FARFARÆ.
SCABIOSÆ.
TARAXACI.
VERONICÆ.

Unguenta qua-
tuor cali-
da.

AGRIPPÆ.
ALTHEÆ.
MARTIATUM.
NERVINUM.

Unguenta qua-
tuor frigi-
da.

ALBUM CAMPHO-
RATUM.
INFRIGIDANS GALENI.
POPULEUM.
ROSATUM MESUES.

Oleæ tria sto-
machica.

ABSINTHII.
CYDONIORUM.
MASTICHES.

NOMINA AMBIGUA.

Nonnunquam in Medicamentorum designatione, occurrunt nomina simplicium generica tantum, non adeo perspicua & determinata, quin aliquid obscuritatis, vel ambiguitatis relinquatur, quorum proin, vitandi erroris causâ, dilucidatione opus est.

NOMINA AMBIGUA.	DILUCIDATIO.	NOMINA AMBIGUA.	DILUCIDATIO.
Abfinthium -	Latifolium vulgare.	Helleborus -	Niger verus.
Aloe - - -	Socotrina.	Hyoscyamus - -	Albus.
Aristolochia -	rotunda vera.	Iris - - -	Florentina.
Arnica - -	Doronicum Plantagi- nis folio alterum.	Lapathum -	Oxylapa- thum.
Bellis - - -	Minor.	Marrubium - -	Album.
Cardamomum -	Minus.	Opium - -	Thebaicum.
Cardopatium -	Carlina.	Ostrutium -	Imperatoria.
Centaurium - -	Minus.	Papaver - - -	Album.
Cichorium - -	Sylvestre.	Rosa - -	Hortensis rubra.
Dictamnus albus -	Fraxinella	Ruta - - -	Hortensis.
		Scariola - - -	Endivia.
		Squammaria -	Dentaria.

PONDERA.

LIBRA medica habet *Uncias*
duodecim, ubique in hoc Di-
spensatorio accipienda, in
Præparatis, & Compositis.
LIBRA civilis habet *Uncias*

sedecim, nunquam accipien-
da, nisi expresso nomine
scribatur.

UNCIA una habet *Drachmas*
octo.

DRACHMA una habet *Scrupu-
los tres*.

SCRU-

P O N D E R A.

SCRUPULUS habet *Grana viginti.*

GRANUM est pars infima ponderis medici, tamen subdividua in duas, vel plures partes minores.

FASCICULUS, quantum geminatâ manu cômprehendi potest.

MANIPULUS designat eam herbarum, &c. copiam, quæ modicâ manu comprehenditur, pondere circiter æquipollens *Drachmis tribus.*

PUGILLUS, quantum apicibus digitorum ter junctis capitur, circa pars tertia manipuli, pondere æquipollens *Drachmæ uni.*

Sed in Præparatis, & Compositis majoris momenti, accuratioris determinationis causâ, fatius est etiam herbas, & flores, aliaque ad pondus definire.

M E N S U R Æ.

MENSURA liquidi apud nos habet *libras medicas quatuor.*

LIBRA una habet *Uncias duodecim.*

UNCIA una *Drachmas octo.*

DRACHMA una *Scrupulos tres.*

SCRUPULUS - *Grana viginti.*

GUTTA una vulgo æquiparatur *uni Grano.* Sed omnino variant guttæ, ut consistentiâ & mole, sic etiam pondere. Ideoque ubi accuratè dosis definienda est, melius est granorum pondere, quàm guttarum numero illam determinare.

COCHLEARE plenum vulgo *Semunciæ* æquiparatur, sed minùs certâ determinatione, ob diversam cochlearium magnitudinem, & liquidorum pondus & consistentiam; quapropter longè securius est, certo pondere, quàm cochlearis mensurâ, alicujus medicamenti liquidi dosin definire.

NOTÆ ET CHARACTERES VULGATIORES.

Licèt exemplo novissimorum authorum, in hoc opere nullos characteres adhibere visum sit, tamen non abs re erit, saltem vulgatiores ac usitatiores hic apponere, cùm in aliis passim libris, seu chemicis, seu pharmaceuticis, à longo tempore usu veniant.

☼	Aër.	☾	Nox.
▽	Aqua.	⚔	Pulvis.
△	Ignis.	M.	Misce.
◻	Terra.	F.	Fiat.
☉	Sol. <i>Aurum.</i>	Conc.	Concisa.
☾	Luna. <i>Argentum.</i>	Cont.	Contusa.
♀	Venus. <i>Cuprum.</i>	Dest.	Destillare.
♂	Mars. <i>Ferrum.</i>	L. a.	Lege artis.
♃	Jupiter. <i>Stannum.</i>	Ana aa.	Pondus æquale.
♄	Saturnus. <i>Plumbum.</i>	Man.	Manipulus.
☿	Mercurius. <i>Argentum vivum.</i>	Pug.	Pugillus.
♂	Antimonium. <i>Stibium.</i>	Nº.	-	-	-	-	-	Numerus.
♂	Cinnabaris.	Qu. f.	Quantum satis.
O	Alumen.	Qu. pl.	Quantum placet.
⊕	Vitriolum.	B. M.	Balneum maris.
☼	Sal Ammoniacum.	B. V.	Balneum vaporis.
⊙	Nitrum.	℔i.	Libra una.
⊖	Sal.	℔f.	Libra semis.
♁	Sulphur.	℥i.	uncia una.
♁	Tartarus.	℥f.	uncia semis.
♂	Acetum.	℥i.	Drachma una.
☐	Urina.	℥f.	Drachma semis.
☿	Calx viva.	ʒi.	Scrupulus unus.
♂	Spiritus.	ʒf.	Scrupulus semis.
☾	Dies.	Gr.	Granum.



A.

A Belmosch Off.
Alcea ægyptiaca villosa. C. B.

Hibiscus Abelmoschus LINN.
Sp. pl. T. II. p. 980.

Granum moschatum RUMPH.

Amboin. T. IV. p. 38. Tab. 15.

Gall. Graine de Musc, Ambrette.

Germ. Bisamkörner, Abelmosch Saamen.

Frutex est in *Indiis* crescens.

Usu : Semina reniformia, parva, albicantia, odore Moschi & Ambrae.

Vires roborantes, nervinæ, aphrodisiacæ; sed rarius in nostris regionibus in medicos usus trahuntur & frequentius ad gratum aliis rebus odorem conciliandum adhibentur.

Abies alba.

Abies MATTHIOL. p. 102.

Abies conis sursum spectantibus, five mas C. B.

Pinus foliis solitariis, planis, pectinatis, emarginatis
HALL. *Hist.* n. 1658.

Pinus Picea LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1420.

Gall. Sapin blanc.

Germ. Tanne, Weisstanne.

Abies rubra.

Pars I.

Picea MATTHIOL. p. 97.

Picea major prima, five Abies rubra C. B.

Pinus foliis solitariis tetragonis mucronatis HALL. *Hist.* n. 1657.

Pinus Abies LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1421.

Gall. Sapin rouge, Pesse.

Germ. Fichte, nostr. Rothtanne.

Ambæ species in *Helvetia* frequentissime occurrunt.

Usu : Strobili utriusque juniores, Summitates.

Vires balsamicæ, vulnerariæ, antiscorbuticæ.

De Therebinthina, Colophonio, Resina &c. vide suis locis.

Abies canadensis fructu brevi vide Balsamus Canadensis.

Abrotanum mas Off.

Abrotanum mas BLACKW. Tab. 555.

Abrotanum mas angustifolium majus C. B.

Artemisia Abrotanum LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1185.

Gall. Auronne mâle, Garderobe mâle.

Germ. Stabwurz, Ueberaute.

In *Oriente* & calidioribus *Europa* regio-

regionibus spontanea nobis hortensis est stirps suffruticosa, aromatici non ingrati odoris, saporis amari, subacris.

Usu. Herba vel potius Summitates colligendæ mense Augusto.

Vires balsamicæ, stimulantés, roborantes, aperitivæ, emmenagogæ, anthelminticæ, in infuso vinoso, aquoso, infusione &c.

Abrotanum foemina, Santolina, Herba Cupressi, Chamæcyparissi Off.

Abrotanum foemina BLACKW. Tab. 346.

Abrotanum foemina foliis teretibus C. B.

Santolina pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis HALL. *Hist.* n. 123.

Santolina Chamæcyparissus LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1179.

Gall. Garderobe, quod tineas à vestibus avertat.

Germ. Stabwurz = Weiblin, Garten = Cypressen.

In hortis nostris colitur calidiorum regionum incola, suffruticosa planta, grati & aromatici odoris, saporis amari.

Usu. Folia.

Vires fere eadem quæ Absinthio tenuifolio infra dicendo, anthelminticæ, balsamicæ, diureticæ; Etiam pro externo usu resolutivis & discutientibus herbis non absque utilitate quandoque additur.

Absinthium alpinum incanum vide Genipi.

Absinthium ponticum tenuifolium nobile Off.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum C. B.

Absinthium ponticum CAMER. *Epit.* p. 454. BLACKW. Tab. 527.

Artemisia foliis sericeis, duplicato pinnatis, pinnulis parallelis. HALL. *Hist.* n. 129.

Artemisia pontica LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1187.

Gall. petite Absinthe, Absinthe pontique.

Germ. Römischer Wermuth.

Rarius in *Helvetiæ* montanis occurrit, in hortis passim obvium, sequente minus amarum est, magis aromaticum.

Usu. Herba, Summitates.

Vires. Eadem fere quæ Abrotano foeminæ modo dicto.

Absinthium vulgare, romanum Off.

Absinthium vulgare BLACKW. Tab. 17.

Absinthium ponticum five romanum Officinarum & Dioscoridis C. B.

Apfynthium foliis incanis, pinnatis, pinnis primis bilobatis, pinnulis incisis, lanceolatis, spicis heteromallis, floribus pendulis HALL. *Hist.* n. 124.

Artemisia Absinthium LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1188.

Gall. Absinthe, Alouine.

Germ. Wermuth.

Sponte passim ad vias & in ruderosis *Helvetiæ* nascitur & abunde in hortis occurrit.

Odor gravis, caput feriens, nauseosus; sapor amarissimus

Usu. Folia, Summitates.

Vires. Roborans est, calefaciens, summe stomachicum, in acida cruditate utilissimum, antiscorbuticum; etiam contra febres intermittentes valet & contra vermes.

Longo

Longo ejus usu podagram superavit ILL. HALLERUS in seipso facto experimento.

De narcotica ejus vi Cl. Viri merito dubitant, neque de purgante & diuretica certo constat. Externe etiam cum vino cocta herba in fordidis ulceribus & gangræna utilia fomenta suppeditavit & contusam recentem herbam œdematosi cruribus pedibusque applicatam nonnumquam profuisse vidi. Vini absinthitis frequens est apud nos usus etiam Cerevisiæ quandoque licet minus bene loco carioris, Lupuli additur.

Acacia vera Off.

Acacia foliis scorpioidis leguminosæ c. B.

Acacia vera J. BAUH. *Hist.* T. I. p. 429. VESLING. *plant. ægypt.* p. 8.

Acacia BLACKW. Tab. 377.

Mimosa nilotica. LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1506.

Arbor est *Arabiae* & *Ægypti* indigena.

Usu: Succus ex immaturis fructibus expressus & coctione lenta in substantiam duram, ex nigricante rufescentem, tenacem, in aqua solubilem, condensatus.

Vires, adstringentes. Rarius hodie in officinis nostris prostat.

Acacia vulgaris, germanica, nostras Off.

Prunus sylvestris. C. B. BLACKW. Tab. 494.

Prunus spinosa, foliis glabris, serratis, ovato-lanceolatis, floribus breviter petiolatis HALL. *Hist.* n. 1080.

Gall. Prunier sauvage.

Germ. Schlehdorn, Schwarzdorn.

Frutex est ubique ad vias, sepes & in dumetis frequens, floret - Aprili.

Usu: Flores, Fructus exsiccati, Succus fructuum inspissatus.

Vires. Flores frequentissime apud nos in usum veniunt alvum laxandi scopo, nec non in asthmate, tussi convulsiva infantum &c. lacti incocti, vel in infuso theiformi. Fructus & succus vi adstringente celebres sunt.

Acanthus verus, fativus, vide Branca ursina vera Off.

Acanthus vulgaris vide Branca ursina vulgaris.

Acetosa, Oxalis Off.

Acetosa pratensis c. B.

Acetosa BLACKW. Tab. 230.

Lapatum sexubus separatis, foliis sagittatis HALL. *Hist.* n. 1597.

Rumex Acetosa LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 481.

Gall. Oseille.

Germ. Sauerampfer.

Vulgatissima in pratis Majo & Junio florens, grati acidi saporis planta

Usu: Radix & Herba.

Vires, refrigerantes, tonicæ, antiscorbuticæ.

Acetofella, Alleluja, Lujula, Trifolium acetosum Off.

Trifolium acetosum vulgare c. B.

Lujula BLACKW. Tab. 308.

Oxys scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamosa, articulata HALL. *Hist.* n. 928.

Oxalis Acetosella LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 620.

Gall. Alleluja, Pain a Coucou.

Germ. Sauerklee, Buchampfer.

Crescit copiose in umbrosis sepibus & sylvis ad arborum radices; floret Aprili, odoris nullius, saporis gratissime acidi.

Usu: Herba recens.

Vires refrigerantes, antisepticae, antiscorbuticae.

Acmella Off.

Chrysanthemum Bidens sive **Bidens Zeylanica**, flore luteo, Lamii folio, **Acmella** dicta BREYN. *Prodr.* II. p. 42. Ic. p. 48. fig. 4.

ABCdaria RUMPH. *Amboin.* T. VI. p. 145. Tab. 65.

Acmella Zeylanica BLACKW. Tab. 518.

Verbefina Acmella LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1271.

Gall. Acmelle.

Germ. Indianisch Sarnkraut, Ceylanische Messeldoste.

Adscribunt huic plantæ ex Insula Zeylon allatæ nostrisque in Officinis hætenus non prostantis vires incidentes, attenuantes, lithontripticas, diaphoreticas, anodynas &c.

Aconitum salutiferum vide **Anthora**.

Acorus verus vide **Calamus aromaticus**.

Acorus vulgaris, **Pseudo acorus** Off.

Acorus adulterinus c. B. BLACKW. Tab. 261.

Iris caule inflexo, foliis ensiformibus, petalis erectis

minimis, reflexis imberbibus HALL. *Hist.* n. 1260.

Iris Pseudacorus LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 56.

Gall. Faux Acorus.

Germ. Ackeremann, Gelbe Lilien, gelbe Schwertelwurz, falscher Acorus.

Usu: Radix acris & adstringentis saporis.

Vires adstringentes.

Adiantum album vide **Ruta muraria**.

Adiantum aureum, **Polytrichum aureum** Off.

Gall. Percemouffe

Germ. Golden Witherthon.

Duæ diversæ Musci species in plerisque nostris officinis sub hoc nomine asservantur nempe

Polytrichum aureum TABERNÆM. *Icon.* p. 797.

Polytrichum aureum majus C. B.

Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis ferratis DILL. *Hist. Musc.* p. 420. Tab. 54. fig. 1.

Mnium calyptris villosis, foliis ferratis, capsulis quadrangulis, disco infidentibus HALL. *Histor.* n. 1835.

Polytrichum commune LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1573.

Et

Bryum bulbiferum aureum, cabyptra quadrangulari, capsulis pyriformibus nutantibus DILL. *Hist. Musc.* p. 407. Tab. 52. fig. 75.

Mnium foliis ovato lanceolatis, conniventibus, capsulis ovatis reflexis HALL. *Hist.* n. 1852.

Mnium

Mnium hygrometricum LINNÆI *Sp. pl.* T. II. p. 1575.

Prior in sylvis frequens, posterior ad muros, in agris, hortis & sylvis.

Herbis quinque capillaribus a nonnullis adnumerantur.

Adiantum nigrum Off.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro c. B.

Adiantum nigrum BLACKW. Tab. 220.

Asplenium foliis triangularibus, pinnis pinnatis, pinnulis semi pinnatis, lobulis ovatis, ferratis HALL. *Hist.* n. 1692.

Asplenium Adiantum nigrum LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1541.

Gall. Capillaire noire.

Germ. Schwarze Frauenhaar.

In Helvetia transalpina & Asiatie montanis passim frequens.

Convenit viribus cum reliquis herbis capillaribus, in officinis nostris hactenus non prostant.

Adiantum nigrum foliis Coriandri vide Capillus Veneris.

Adiantum rubrum Off. vide Trichomanes.

Ætites, Aquilæ Lapis Off.

Ætites aquilinus LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 179.

Gall. Pierre d'Aigle.

Germ. Adlerstein.

Lapis est tophaceus, ochraceus, variæ magnitudinis, coloris & figuræ, in cujus centro alius inclusus est, quo fit, ut concussus crepitaculi instar sonet.

Passim etiam in Helvetia obvius est.

Vires. A credulis mulierculis ru-

Pars I.

sticisque parturientibus ad partum promovendum alligatur.

Agallochum vide Aloes Lignum.

Agaricus albus, crudus, Agaricum Off.

Agaricus, sive fungus Laricis C. B.

Polyporus sessilis, convexo-planus, anulis discoloribus, fulvis, poris ochroleucis HALL. *Hist.* n. 2284.

Gall. Agaric.

Germ. Lerchenschwamm.

Fungi est species Larici aliisque arboribus adnascens, angulosa, inæqualis, levis, friabilis, quando sicca, internè candida.

Reperitur in alpinis & subalpinis Helvetiæ aliarumque regionum.

Vires purgantes, anthelminticæ, emmenagogæ, an veræ?

Agaricus mineralis vide Lac Lunæ.

Agnus castus, Vitex Off.

Vitex foliis angustioribus, cannabis in modum dispositis c. B.

Agnus Castus BLACKW. Tab. 139.

Vitex agnus castus LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 890.

Gall. Agnus castus.

Germ. Keuschbaum, Schaafmüll.

In Italia spontaneus frutex in arborem sæpe adolescens hinc inde in hortis curiosorum occurrit.

Usu. Semen magnitudinis fere piperis, coloris nigricantis, saporis acris, subadstringentis.

Vires. Dicitur calefacere, men-

B

ses

ses ciere, veneremque cohibere,
usûs apud nos rarissimi.

Agrimonia Off.

Eupatorium veterum, five
Agrimonia c. B.

Agrimonia BLACKW. Tab. 21.

Agrimonia, foliis pinnatis,
pinnis alterne minimis
HALL. *Hist.* n. 991.

Agrimonia Eupatoria LINN.
Spec. plant. T. I. p. 643.

Gall. Aigremoine.

Germ. Odermennig.

Vulgaris ad vias, sepes &c.

Usu. Folia.

Vires balsamicæ, adstringentes,
vulnerariæ.

Alabastrum Off.

Gypsum Alabastrum LINN.
Syst. Nat. T. III. p. 45.

Marmoris, vel juxta alios Gypsi
species est.

Vires illi attribuuntur refrige-
rantes.

Alcea Off.

Alcea vulgaris major c. B.

Alcea BLACKW. Tab. 309.

Malva caule erecto, foliis
scabris, trilobatis, lobis la-
teralibus bipartitis, medio
tripartito & quinquepar-
tito HALL. *Hist.* n. 1071.

Malva Alcea LINN. *Spec. plant.*
T. II. p. 971.

Gall. Alcée ou Mauve fau-
vage.

Germ. Sigmarstrauch.

Usu: Radix & Herba

Vires eadem fere, quæ Malvæ
infra dicendæ, emollientes, de-
mulcentes, etiam in cataracta
incipiente valere dicitur. In
nostris Officinis non prostat.

Alce Off.

Cervus Alces LINN. *Syst. Nat.*
T. I. p. 92.

Animal est ex cervi genere syl-
vas desertas *Europæ & Americæ*
septentrionalis inhabitans.

Usu. Ungulæ.

Vires. Specificâ antepilepticâ vir-
tute à longo jam tempore cele-
bres sunt, sed immerito, cum
vix ac ne vix quidem debilif-
simi absorbentis instar infer-
vire possint.

Alchimilla Off.

Alchimilla vulgaris C. B.

Alchimilla BLACKW. Tab. 72.

Alchimilla foliis ferratis,
palmatis, seminovemfidis
HALL. *Hist.* n. 1566.

Alchimilla vulgaris LINN.
Spec. plant. T. I. p. 178.

Gall. Pied de Lion.

Germ. Sinnau, Frauen Mantel,
Löwenfuß.

In pratis & sylvis occurrit.

Usu: Folia.

Vires vulnerariæ, adstringentes.

Alisma vide **Doronicum.**

Alkanna, Anchusa Off.

Anchusa puniceis floribus c. B.

Anchusa BLACKW. Tab. 112.

Anchusa tinctoria LINN. *Spec.*
pl. T. I. p. 192.

Gall. Orcanette.

Germ. Rothe Ochsenzung.

Ex *Gallia meridionali* advehitur.

Usu: Radix.

Vires. Ob pulcrum colorem rub-
rum ad varia medicamenta
tingenda adhibetur, in tinctoria
arte aliàs celebris radix.

Alkekengi Off.

Solanum vesicarium . c. B.
DODON. *Pempt.* p. 454.

Alkekengi Halicacabum
BLACKW. Tab. 161.

Phyfa-

Physalis foliis conjugatis, cordatis, sinuatis, caule ramoso. HALL. *Hist.* n. 577.
Gall. Alkekenges, Coquelles.

Germ. Judenkirschen.

In vineis nostris passim abunde occurrit, etiam ad sepēs & in sylvis. Floret Junio, Julio.

Usu. Baccæ.

Vires. Edules sunt, dummodo caveas, ne ab amaro calyce eam includente tangantur, lithontripticæ, nephriticæ, diureticæ. Prunis candentibus injectarum baccarum fumo ore excepto haud pauci apud nos ad dentium dolores mitigandos utuntur, neque inutiliter, ut nervos stupefacere videatur, uti Hyosciami semen.

Alliaria Off.

Alliaria C. B. BLACKW. Tab. 372.

Erysimum foliis cordatis HALL. *Hist.* n. 480.

Erysimum Alliaria LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 922.

Gall. Alliaire.

Germ. Knoblauchkraut, Gäuchelkraut.

Ad sepēs & in umbrosis vulgaris floret Aprili.

Usu. Herba.

Vires. Cum contrita recens herba allium redoleat, cum scordio viribus convenire haud pauci autumant, sed aromatico calefaciente principio destituitur, quo scordium abundat. Externe putredini & gangrænæ resistere experti nonnulli asserunt, etiam BOERHAVIUS. Nostræ officinæ ea carent.

Allium sativum C. B. LINN.

Sp. pl. T. I. p. 425.

Gall. Ail.

Germ. Knoblauch.

In hortis passim abunde colitur.

Usu. Bulbus.

Vires. In culinares usus ubique fere receptum vulgatissimum apud Iudæos imprimis ciborum condimentum. Diuretica ei adscribitur vis & anthelmintica, & omnino in nostris regionibus frequentissime lacti incotum ad enecandos & pellendos vermes infantibus propinatur, optato sæpius eventu.

Aloës Off.

Aloë vulgaris C. B. BLACKW. Tab. 229.

Kadanaku, five Catevala. RHEED. *Hort. Malab.* Tom. II. p. 7. Tab. 3.

Aloë perfoliata LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 457. Varietas π. five vera.

Gall. Aloë.

Germ. Aloë.

In India, Africa, etiam Italia spontanea, apud nos in hortis colitur.

Usu. Succus foliorum inspissatus pro diverso puritatis gradu diversimode appellatus, ut, qui purissimus est, splendens, coloris ex rubro fusci, tritus croceus, saporis amarissimi, odoris minus ingrati, Aloë succotrina apelletur. Hæc plus gummofarum partium habet, quàm resinofarum & optima censetur. Secunda Aloës species hepatica dicta minus pura est, coloris obscurioris, minus splendens, odoris magis nauseosi, plus resinæ continens. Hæc ex Insula Barbados advehitur. Tertia eaque impurissima species Aloë Caballina vocatur, arenulis permixta aliisque foribus conspurcata, ut pro præcedentium specierum recremento haberi possit, neque nisi à Veterinariis adhibeatur.

Vires calefacientes, stimulantés, aperien-

aperientes, purgantes, anthelminticæ, hæmorrhoides potenter provocat & menses. Succotrina & Hepatica fere perinde adhibentur.

Aloës Lignum, Agallochum, Xyloaloës Off.

Agallochum LINN. *Mat. Med.* p. 184.

Agallochum Officinarum C.B. Gall. Bois d'Aloë.

Germ. *Paradies- oder Moesholz.* Ex *Indiæ orientalis* variis regionibus varia sub forma advehitur. Arbor ipsa hætenus ignota.

Ufu. Lignum densum, ponderosum, coloris varii, fuscum, ferrugineum, nigricans, etiam purpureum, resinofum, in igne ceræ instar liquefcens, odoris gratissimi, saporis amaricantis, aromatici.

Vires roborantes, analepticæ, cephalicæ.

Nonnulli afferunt verum lignum Aloës in Officinis Europæis vix reperiri, cum in ipso loco natali argento carius sit, illudque, quod vulgo officinale est, esse lignum Arboris, quam RUMPHIUS excæcantem vocat. *Herb. Amb.* T. II. p. 237. T. 79. 80. LINNÆUS verò Excæcariam Agallocham *Spec. pl.* T. II. p. 1471. In *Indiis* circa *Ambonam* crescit, lacteo succo turgescens valde, ut videtur, acri & venenato, cum guttula una, vel altera oculo instillata, inflammationem & cæcitatem inducat, unde ejus nomen. Lignum hujus arboris perinde ac verum Lignum Aloës fragrans est, iisdemque virtutibus præditum.

Alfine, Morsus gallinæ Off.

Alfine media C. B.

Alfine BLACKW. Tab. 164.

Alfine foliis petiolatis, ovato-

lanceolatis, petalis bipartitis HALL. *Hist.* n. 880.

Alfine media LINN. *Spec. plant.* Tom. I. pag. 389.

Gall. Morgeline, Mouron.

Germ. *Sünerdarm, Sünerscherben, Dogelkraut.*

Vulgatissima planta in hortis, agris, vineis, ad vias &c. per totum fere annum floret & viget.

Ufu. Herba tota.

Vires refrigerantes, humectantes; dicitur etiam valde nutrire, indeque atrophicis, & phthificis salutare alimentum præbere. Nobis nullius usûs.

Althea Bismalva Off.

Althea BLACKW. Tab. 90.

Althea Dioscoridis & Plinii C. B.

Althea tomentosa, herbacea, caule erecto, foliis cordato lanceolatis, obsolete trifidis. HALL. *Hist.* n. 1074.

Althæa officinalis LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 966.

Gall. Guimauve, Althé.

Germ. *Eibisch*, nostr. *Ische.*

Sponte passim in *Helvetia* ad fossas occurrit, sed rarius, copiose in hortis colitur.

Ufu: Radix & Folia.

Vires. Emollit, lenit, acre obtundit mucilaginem copiosam, quæ scatet; inde in pectoris morbis, dysenteria, raucedine, stranguria &c. conducit. Externe etiam emollientes vapores, cataplasmata præbet & herbis quinque emollientibus annumeratur. Frequentissimus ejus est in nostris oris usus.

Alumen crudum, vulgare, album Off.

Alumen commune LINN. *Syst. Nat.* Tom. III. p. 101.

Gall. Alun.

Ex

Germ. Alaun.

Ex variis mineris vario modo extractus sal octaëdrus, albus, subpellucidus, saporis subdulcis, valde adstringentis, constans ex acido vitriolico & terra cretacea suæ indolis. Passim mineræ ejus in *Germania*, *Bohemia*, *Anglia* &c. occurrunt. *Vires* possidet adstringentes, exsiccantes &c. Externus plerumque est ejus usus, internus rarior.

Alumen rubrum, romanum, rochæ, rupeum Off.

Alumen romanum LINN. Syst. nat. T. III. p. 101.

Gall. Alun de roche.

Germ. rother Alaun, römischer Alaun.

Ex lapide calcareo aluminari in *Italia* reperiundo extrahitur, coloris ex roseo pallidi, ceterum natura & viribus à præcedente haud diversum.

Alumen plumosum verum Off.

Alumen nativum plumosum. LINN. Syst. nat. T. III. p. 101.

Gall. Alun de plume.

Germ. Echter Federalaun.

Nativi Aluminis species est lanæ instar excrescens in *Hungaria*, *Insula Melitensi*, *Lapponia* &c. obvia. In Officinis nostris non occurrit.

Alumen plumosum Off.

Amianthus plumosus LINN. Syst. nat. T. III. p. 55.

Asbestus fibris parallelis, fragillimis, vix separabilibus WALLER. Mineral. p. 193.

Gall. Alun de plume commun.

Germ. Federweiß, gemeiner Federalaun.

Pars I.

Asbesti five Amianti est species fibris albis, parallelis, fragilibus &c.

Vires. Cuti affricatum ob rigidas fibras rubedinem excitat, sed nostris in oris non nisi à veterinariis expetitur.

Sub nomine Aluminis plumosi in Officinis nostris sæpe occurrit **Alumen** sic dictum scissile. **Gypsum striatum**, filamentis in lamellas compactis **WALLER. Mineral. p. 74.**

Amaracus vide *Majorana*.

Amara Dulcis vide *Dulcamara*.

Amethystus Off.

Gemma pellucidissima, duritie septima, colore violaceo, in igne liquefscens WALLER. Mineral. pag. 158.

Nitrum Fluor violaceus LINN. Syst. nat. Tom. III. p. 85. n. 3. Variet. 1.

Gall. Ametiste.

Germ. Amethyst.

Gemma est violacea, pellucida ex utraque *India* aliisque regionibus allata.

Vires. Gestatus ebrietati mederi veteres crediderunt.

Ambra grisea Off.

Ambra ambrosiaca LINN. Syst. nat. Tom. III. p. 107.

Gall. Ambre gris.

Germ. Grauer Amber, Ambra.

Est substantia cærea, opaca, aquæ innatans, prunis candentibus injecta gratissimum odorem spargens, incertæ originis, ex mare ejecta in litore quandoque reperitur. Affertur præsertim ex *India orientali*, *Æthiopia*, &c. Cum pretiosissimum sit remedium, non inutile erit paucis signa

signa bonitatis ejus hic addere :
Vera igitur Ambra fit levis, in-
tus inæqualis, candente acicu-
la perforata ei non adhærens,
ad ignem facile liquefcens &
combusta nihil relinquens, cum
e contra falsa Ambra minus be-
ne oleat, prunisque infperfa fem-
per aliquid relinquat & canden-
ti aciculæ adhæreat.

Vires analepticæ, calefacientes,
cephalicæ.

Ambra liquida, Liquidambar Off.

Gall. Ambre fluide.

Germ. Flüssiger Amber.

Refina est liquida, consistentiæ fe-
re Balsami Peruviani, coloris
grisei vel ex flavo fusci, saporis
acris, aromatici, odoris fragran-
tis. Arbor ex qua fluit vocatur

Liquidambar. C. B.

Liquidambar *Styraciflua*

LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1418.

Crescit in nonnullis *Americæ* pro-
vinciis.

Vires calefacientes, resolventes,
maturantes; rarius tamen in u-
sum vocatur.

Ambra nigra Off.

Ambra vulgatio *LINN. Syst.*

Nat. T. III. p. 107.

Gall. Ambre noir.

Germ. Schwarzer Amber.

Varietas est anteprecedentis vel
distincta ab ea species, quod,
cum ignota sit utriusque origo,
nondum constat.

Vires anteprecedenti fere similes,
debiliores tamen, sicuti & o-
dore inferior est.

Ammi verum Off.

Ammi parvum foliis fœni-
culi. C. B.

Ammi CAMER. *Epit.* p. 522.

Sison Ammi LINN. *Sp. plant.*
T. I. p. 363.

Gall. Ammi de Candie

Germ. Wahrer oder Cretischer
Ammi.

Umbellifera hæc planta in *Ægyp-
to* aliisque regionibus calidio-
ribus crescit.

Usu. Sæmina parva, striata, spa-
dicei coloris, odoris grati, sapo-
ris acris, aromatici; officinis
nostris hætenus ignota.

Vires calefacientes, carminativæ,
sudoriferæ.

Ammi vulgare Off.

Ammi vulgare DODON. *Pempt.*
p. 415. BLACKW. Tab. 447.

Ammi majus C. B. LINN. *Sp.*
pl. T. I. p. 349.

Gall. Ammi commun.

Germ. Gemeiner Ammi.

In *australi Europa* in agris & vi-
neis occurrit, nobis hortensis.

Usu. Sæmina striata, coloris pal-
lidioris, odoris & saporis fere li-
milis, paulo tamen debilioris.

In officinis nostris pro præcedentis
feminibus substituuntur.

Vires debiliores, cæterum eadem.

Ammoniacum Gummi Off.

Gall. Gomme Ammoniac.

Germ. Gummi Ammoniac.

Gummi refina est externe flaves-
cens, interne albicans, odoris
balsamici, gravis, nauseosi,
saporis acris, ingrati.

Ex planta umbellifera nondum
cognita exstillat & in magnis
frustis ex *India orientali* adve-
hitur. Eligantur frusta ex gra-
nis olibani instar composita, &
ab omnibus sordibus libera

Vires. Tenaces humores potenter
resolvit, & majori paulo dosi
alvum movet, externus etiam
frequens ejus est usus in em-
plastris &c.

Ammoniacum sal, vide Ar-
moniacum sal.

Amomum verum Off.

Gall. Piment

Germ.

Germ. Amömlein, Piment, no-
str: Nägelein-Köpf.

Sunt fructus

Piperis Jamaicensis BLACKW.
Tab. 355.

Myrti Pimentæ LINN. *Sp. pl.*

T. I. p. 676. in *Indiis* crescentis.
Rotundi sunt ex fusco nigrican-
tes, pipere majores, saporis
& odoris quasi ex omnibus
aromatibus compositi

Vires quæ ceteris aromatibus, ca-
lescentes, stimulant, stom-
achicæ &c. sed frequentior eo-
rum est usus oeconomicus quam
medicus

Amomum vulgare Off.

Amomum vulgare BLACKW.
T. 442.

Sison quod Amomum Offi-
cinis nostris. C. B.

Sison Amomum LINN. *Sp. pl.*
T. I. pag. 362.

Planta est umbellifera in *Anglia*
sponte nascens.

Usu. Semina parva, fusca, stria-
ta, saporis subacris, aromatici,
in Officinis nostris non recep-
ta.

Vires illis adscribuntur diureticæ
& lithontripticæ

Amygdalæ amaræ & dulces
Off.

Gall. Amandes ameres &
douces

Germ. Bittere und süsse Mandlen.
Fructus sunt notissimi ejusdem Ar-
boris quæ vocatur

Amygdalus fativa fructu
majore C. B.

Amygdalus amara Tourn:

Amygdalus BLACKW. Tab. 105.

Amygdalus foliis glabris, o-
vato-lanceolatis, ferratis,
imis dentibus & petiolis
glandulosis HALL. *Histor. n.*
1078.

Amygdalus communis LINN.
Spec. pl. Tom. I, pag. 677.

In calidioribus regionibus etiam
Valefia sponte proveniens hacce
arbor alibi in vineis colitur.

Vires. Amygdalæ dulces ob blan-
dissimum oleum, quod conti-
nent, refrigerant, temperant,
demulcent, emolliunt, nutriunt.
Amaræ licet à præcedentibus vix
dignoscendæ diversæ sunt indo-
lis & venenati quid habent,
cum constet vulpibus, felibus,
porcis & plerisque avibus fune-
stas esse, licet homini minori
copia assumptæ non noceant. Oleo
inde expresso plebs nostra fre-
quentissime utitur ad lenien-
dos aurium dolores.

Anacampseros vide Tele-
phium.

Anacardium, Anacardia, A-
nacardium orientale Off.

Anacardium C. B.

Avicennia LINN. *Sp. pl.* Edit. I.
T. I. p. 110.

Bontia germinans LINN. *Sp. pl.*
Edit. II. Tom. II. p. 891.

Gall. Anacarde.

Germ. Elephanten-Laus.

Arbor hæc in *Indiis* crescit.

Usu: Fructus compressus, cor-
datus, niger, splendens, sapo-
ris oleosi, dulcis, fere uti amyg-
dalæ.

Vires ipsi tribuuntur analepticæ,
cerebrum & nervos roborantes,
memoriam languidam reparan-
tes &c.

Anacardium occidentale,
Cafchou Off.

Anacardium occidentale
BLACKW. Tab. 369.

Anacardii alia species C. B.

Anacardium occidentale
LINN. *Sp. pl.* Tom. I. p. 548.

Habitat etiam in *Indiis*.

Usu: Fructus reniformis, fuscus,
durus, intus albus, sapore dulci.

Vires roborantes, aphrodisiacæ.
Utraque species promiscue of-
ficina.

ficinalis est, usus tamen hodie rarissimi.

Anas Boschas LINN. *Syst. Nat.*
Tom. I. pag. 205.

Anas domestica vulgo dicta
Gall. Canard.

Germ. Ente.

Avis notissima lacus & rivulos inhabitat.

Usu: Axungia.

Vires. Uti omnis pinguedo, emollit obtundit, demulcet, maturat.

Anagallis Off.

Anagallis flore phæniceo c. B.

Anagallis terrestris mas BLACK.
Tab. 43.

Anagallis caule procumbente, foliis ovato-lanceolatis, calycis segmentis lanceolatis HALL. *Hist.* n. 625.

Et

Anagallis flore cæruleo c. B.

Anagallis terrestris foemina
BLACKW. Tab. 274.

Anagallis caule procumbente, foliis ovato-lanceolatis, petalis ferratis, calycis foliolis subulatis HALL. *Hist.* n. 626.

Ambas species vel varietates jungit LINNÆUS sub nomine
Anagallidis arvensis *Spec. pl.*
Tom. I. pag. 211.

Gall. Mouron mâle ou à fleur rouge, & mouron femelle ou à fleur bleue.

Germ. Gauchheil, Vogelkraut.

Perinde enim utraque species apud nos adhibetur.

Usu: Herba tota odoris nullius, saporis oleracei, subadstringentis.

Vires huic plantulæ dicuntur inesse diaphoreticæ, cephalicæ,

vulnerariæ, antepilepticæ, antimanicæ, Inprimis autem mor sui canis rabidi mederi ajunt, sed in nostris saltem regionibus in dirissimo hac morbo hætenus incassum adhibita fuit, neque ex inodora hac omnisque fere saporis experte planta tantæ vires expectandæ videntur.

Anchusa vide ALKANNA.

Androface vide Umbilicus Veneris.

Anethum Off.

Anethum hortense c. B.

Anethum BLACKW. Tab. 545.

Anethum graveolens *Spec. pl.* Tom. I. p. 377.

Gall. Anet.

Germ. Dill.

In calida Europa inter segetes sponte provenit.

Tota planta suavis est odoris, saporis subdulcis, aromatici. Semina striata, plana, odoris grati, saporis acris, aromatici.

Usu: Folia & Semen.

Vires anodinæ, stomachicæ, carminativæ, lac augentes. Sed hæc de feminibus præcipue dicta sint, cum folia vix ac ne vix quidem apud nos in usum veniant.

Angelica Off:

Angelica BLACKW. Tab. 496.

Angelica fativa. c. B.

Angelica foliis duplicato pinnatis, ovato-lanceolatis, ferratis HALL. *Hist.* n. 807.

Angelica Archangelica LINN.
Spec: pl. Tom. I. pag. 360.

Gall: Angelique.

Germ: Angelic, Engelwurz.

In Alpibus præsertim Lapponicis spontanea in hortis rusticorum abunde colitur.

Tota

Tota planta odorata est & aromatica.

Ufu: Radix & Semen.

Vires calefacientes, roborantes, incidentes, carminativæ, diureticæ, sudoriferæ.

Eligendæ radices recentes & loco sicco servandæ, cum brevi tempore cariosæ fiant.

Anguilla Off.

Anguilla Muræna LINN. *Syst.*

Nat. Tom. I. pag. 426.

Gall. Anguille.

Germ. 2sal.

Piscis est in lacubus & fluviis passim vulgaris.

Ufu: Hepar & Pinguedo, nobis inusitata.

Vires: Hepar à nonnullis in partu difficili pro specifico laudatur, pinguedo verò vulneraria audit.

Animæ, Animi Gummi, Off.

Gall. Gomme Animé.

Germ. Gummi Anima.

Est Resina flavescens subdiaphana, fragilis, saporis debilis resinosi, odoris, quando accenditur, grati, fragrantis. Arbor ex qua provenit, vocatur

Ceratia diphyllus anteguana

&c. PLUKENET. *Almag.* p. 96. *Phyt.*

Tab. 82. fig. 2.

Itaiba PISON. *Brasil. Hist.* pag. 123.

Hymenæa Courbaril LINN.

Spec. plant. T. I. pag. 537.

Habitat in Indiis.

Vires cephalicæ roborantes, resolventes; plura emplastra ingreditur & ad suffimenta quandoque adhibetur, cum fumo ejus inprimis dentium dolores mitigatos, imo subinde plane sublatos fuisse ipse expertus sim. Interne non assumitur.

Pars I.

Anisum Off.

Anisum herbariis c. B.

Anisum BLACKW. Tab. 374.

Pimpinella Anisum LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 379.

Gall. Anis.

Germ. 2Anis.

Umbellifera est planta, in *Ægypto* spontanea, in *Hispaniæ* & *Germaniæ* nonnullis locis, etiam *Argentorati* in agris colitur.

Ufu: Semen subrotundum, striatum, parvum, coloris ex viridi fusci, saporis & odoris singularis, grati, aromatici, acris. *Vires* carminativæ, incidentes, becchicæ.

Anisum stellatum, Semen Badianæ Off.

Gall. Anis étoilé.

Germ. Stern-Anis.

Ita vocantur capsulæ 5, 6, 7, 8, e communi axe stellæ in formam compositæ. Quælibet capsula matura superne hiat & unicum semen profert. Coloris sunt ceterum ex luteo fusci odoris & saporis Anisi etiam gratioris.

Planta hæc capsulas proferens hætenus dubia vocatur

Anisum preregrinum c. B.

Euonimo affinis philippina

Anisum spirans PLUKN. *Alm.*

p. 140.

Badianifera LINN. *Mat. med.*

p. 180.

An Illicium Anisatum EJUSD.

Spec. plant. T. I. p. 664?

Somo vulgo Skimmi &c.

KÆMPF. *Amœnit. exot.* p. 880.

c. ic.

Autoritate KÆMPFERI non visam sibi stirpem inseruit LINNÆUS & an Anisum stellatum sit, ipse quærit.

Vires eadem fere quæ Aniso, stomachicæ, carminativæ, etiam lithontripticæ?

D

Ano-

Anonis vide Ononis.

Anas Anser LINN. *Syst. nat.* T. I. p. 197.

Gall. Oie.

Germ. Gans.

Notissima Avis cicur.

Usu: Axungia.

Vires lubricantes, laxantes, emollientes, lenientes.

Anserina, Argentina Off.

Potentilla c. B.

Argentina BLACKW. Tab. 6.

Fragaria caule repente, foliis pinnatis, ferratis, tomentosis, petiolis longis unifloris HALL. *Hist.* n. 1126.

Potentilla Anserina LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 710.

Gall. Argentine.

Germ. Genserich, Ganskraut.

Vulgaris herba in humidis ad vias, pagos &c.

Usu: Folia.

Vires vulnerariæ, adstringentes. Imprimis Oris & dentium vitiiis atque doloribus mederi creditur, decocto ejus sæpius per diem ore recepto. Rustici etiam nostrates balnea inde conficiunt ad roboranda infantium rachiticorum membra, bono sæpe cum effectu, ut ipse quandoque vidi.

Anthophylli Off.

Gall. Clou matrice.

Germ. Mutternägelein.

Sunt fructus maturi ejusdem arboris ac Caryophylli aromatici, qui immaturi sunt, viribusque cum iis conveniunt.

Anthora, Antithora Off.

Aconitum salutiferum, five Anthora c. B.

Anthora, five Antithora CAMER. *Epil.* p. 837 & 38.

Anthora BLACKW. Tab. 562.

Aconitum foliis linearibus, profundissime tripartitis, lateralibus lobis bipartitis, incis, mediis duplicato trilobatis. HALL. *Hist.* n. 1199.

Aconitum Anthora LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 751.

Gall. Anthora ou Maclou.

Germ. Giftheil.

Alpina est planta in unico hactenus Thuri monte Genevensi in Helvetia lecta.

Usu: Radix odoris grati, saporis acris, subamari.

Vires adhuc dubiæ, cum nonnulli purgantem & emeticam esse contendunt, alii negent, neque de alexipharmacis & anthelminticis ejus viribus magis constat, & omnino cum Cl. Viris puto, a suspectæ classis plantis hactenus melius abstineri, donec indoles earum magis innotuerit.

Anthos, Rosmarinus Off.

Rosmarinus spontaneus latiore folio c. B. & Rosmarinus hortensis angustiore folio EJUSDEM.

Rosmarinus BLACKW. Tab. 159. HALL. *Hist.* n. 250.

Rosmarinus officinalis LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 33.

Gall. Rosmarin.

Germ. Rosmarin.

Suffruticosa hæc stirps in meridionali Europæ & Helvetiæ parte spontanea in hortis ubique colitur. Tota planta grati & fragrantis est odoris.

Usu: Folia & Flores, licet hi exceptis calycibus inodori ideoque merito rejiciendi sint.

Vires excitantes, stimulant, nervinæ, cephalicæ, menses provocantes, ut oleo ejus essentiali sæpius puellæ nostræ rusti-

rusticæ ad abortum promovendum utantur.

Antimonii minera Off.

Antimonium sulfure mineralisatum striatum WALL. *Mineral.* §. 114. n. 2.

Stibium striatum LINN. *Syst. nat.* T. III. p. 123.

Reperitur in fodinis *Hungariæ Germaniæ* &c.

Minera est ponderosa, striata, coloris plumbei & constat ex Antimonio terrestribus & lapidosis particulis mixto.

Vires. Ad conficiendum Antimonium diaphoreticum a nonnullis præfertur, quod albidius inde fiat.

Ex hac minera separatur

Antimonium crudum, stibium Off.

Gall. Antimoine

Germ. Antimonium, Spießglas.

Substantia est semimetallica, ponderosa, striata, striis longis splendentibus, in igne volatilis, coloris plumbei.

Advehitur plerumque ex *Hungaria.*

Vires sudoriferæ, sanguinem purificantes & in majori dosi propinatum emeticæ. Utiliter omnino adhibetur in rheumatismis, arthritide, scabie, lue venerea &c. Videtur inprimis lymphæ vitiis mederi. Nonnulli etiam contra vermes laudant & contra rachitidem infantum. Datur vel in substantia ab unico grano ad decem, vel in decocto ad unciam unam & ultra. Expetitur quoque frequentissime a veterinariis & ad plures chemicos labores adhibetur.

Antirrhinum Off.

Antirrhinum majus folio

rotundiore & alterum longiori folio C. B.

Antirrhinum DODON. *Pempt.* p. 182.

Antirrhinum foliis ellipticis, obtusis, floralibus spicatis, calycinis obtusis, calcare brevissimo HALL. *Hist.* n. 333.

Antirrhinum majus LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 859.

Gall. Muffe de Veau.

Germ. Löwenmaul.

Calidis regionibus etiam *transalpinae Helvetiæ* indigena est, & ad interiora Urbis nostræ mœnia passim copiose crescit.

Usu: Folia.

Vires. A nonnullis diuretica audit, in oculorum suffusione laudatur & antimagicis annumeratur. Nonnulli hæc virtutes alii speciei adscribunt, quæ vocatur

Antirrhinum arvense majus C. B.

Antirrhinum sylvestre, Phyteuma DODON. *Pempt.* p. 112.

Antirrhinum foliis ellipticis, obtusis, floribus sparsis, calycibus subulatis, longissimis, calcare brevissimo HALL. *Hist.* n. 334.

Antirrhinum Orontium LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 869.

Vulgaris est hæc species in arvis & inter segetes.

Aparine Off.

Aparine vulgaris C. B.

Aparine BLACKW. Tab. 39.

Galium caule terete, foliis senis, linearibus, serratis, petiolis unifloris, seminibus hispidis HALL. *Hist.* n. 723.

Galium Aparine LNN. *S. pl.*
T. I. p. 157.

Gall. Grateron, Rieble.

Germ. Klebkraut.

Ad sepes ubique.

Aquosa est planta, odoris expers,
saporis herbacei.

Usu. Herba tota.

Vires. Externe ea nonnulli utuntur
ad discutiendas scrophulas,
etiam decoctum ejus extus applicatum
mammarum & testium tumores
dissipasse legimus.

In Officinis nostris non prostat.

Aper Off.

Sus scropha LINN. *Syst. Nat.*
T. 1. p. 102.

Gall. Sanglier.

Germ. Wildschwein.

Animal ferum notissimum sylvas
Europæ inhabitans.

Usu: Dentes majores.

Vires olim bezoardicæ, antipleu-
riticæ, diaphoreticæ ipsis ad-
scribebantur, neque hodie de-
sunt Medici, qui de hisce aliis-
que perinde falsis terrestrium &
adfinium remediorum eximiis
virtutibus assertis fidem ad-
hibeant.

Apium Off.

Apium BLACKWELL. Tab. 443.

Apium palustre sive **Apium**
Officinarum C. B.

Apium foliis pinnatis, pinnis
trilobatis HALL. *Hist.* n. 784.

Apium graveolens LINN. *Sp.*
pl. T. I. p. 379.

Gall. Ache.

Germ. Wasser-Eppich, gemeiner
Eppich.

Cum vero hæc planta in *Helvetia*
vix spontanea sit, substituitur
ei varietas hortensis quæ est

Apium dulce, **Celeri** Italo-
rum **TOURNEF.**

Gall. Seleri, Celeri.

Germ. Selleri, Garten-Eppich.

Odor tritæ plantæ fortis non ingra-
tus, sapor acris, subamarus, plu-
ribus acceptus, ut in cibum re-
cipiantur radix & folia.

Usu: Radix & Semen.

Vires. Radix diuretica est, aperi-
tiva, stomachica & inter quin-
que radices aperientes majores
numeratur. Semen easdem
possidet virtutes.

Aquilegia Off.

Aquilegia BLACKW. T. 409.

Aquilegia sylvestris C. B.

Aquilegia foliis trilobatis, lo-
bis petiolatis, tripartitis,
subrotundis, obtuse den-
tatis HALL. *Hist.* n. 1195.

Aquilegia vulgaris LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 752.

Gall. Ancolie, Gants de nô-
tre Dame.

Germ. Akeley, Narrentappen.
In dumetis & sylvolis frequens.

Usu: Flores & Semen nigrum,
læve, splendens, saporis suba-
cris, mucilaginosi.

Vires. Flores dicuntur esse anti-
scorbutici, diuretici, demulcen-
tes, ut in febre hectica profu-
rint, nobis inusitati.

Semini virtutes adscribuntur alexi-
pharmacæ, antiictericæ, partum
promoventes & inprimis in
morbis exanthematicis ad ex-
pulsionem laudantur, sed &
hæc apud nos in pariori usu sunt.

Arabicum Gummi Off.

Gall. Gomme arabique.

Germ. Arabischer Gummi.

Substantia est gummosa, pel-
lucida, flavicans vel albescens,
odoris expers, saporis muci-
laginosi. Arbor, unde venit,
supra dicta est sub titulo *Aca-
ciæ veræ*, neque eadem cum
Arbore Gummi Senegal fun-
dente, uti hæctenus fere cre-
ditum

ditum est. Eligendum album, pellucidum.

Vires. Gummi hocce omnis acrimoniæ expers, mere mucilaginosum, egregium est remedium demulcens, involvens, incrassans, subadstringens.

Ardea Off.

Ardea cinerea major GESN.
ALDROVAND. &c.

Ardea cinerea LINN. *Syst. Nat.*
T. I. p. 236.

Gall. Heron.

Germ. Reiger.

Nota avis in sylvis.

Usu. Axungia.

Vires. Resolvit, attenuat, lenit.

Argentum Off. & omn. auct.

Nobile hoc metallum nimis notum est, quam ut pluribus id describere necessarium sit.

Usus ejus in Chemia varius, ad lapidem infernalem, crystallos lunæ &c. Argentum foliatum, five bracteatum ad obducendas deterioris saporis & odoris pilulas commodum, ut palato gratiores reddantur. Vanissima sunt, quæ de cephalica & antepileptica hujus metalli virtute veteres tradiderunt.

Argentum vivum, Mercurius vivus, Hydrargyrum Off.

Hydrargyrum virgineum
LINN. *Spec. plant.* T. III. p. 119.

Gall. Mercure, Vifargent.

Germ. Quecksilber.

In *Austriæ, Idriæ, Hungariæ* fodinis reperitur.

Semimetallum notissimum, fluidum, post Aurum & Platinam ponderosissimum, rarius nativum frequentissime ex Cinnabari extrahitur, vel ex aliis mineris.

Usus ejus medicus frequentissimus, celeberrimus, ut haud

Pars I.

pauci pro universali medicina illud suaserint. Sed hæc nimia. Videtur inprimis in lympham agere, ejusque acrimoniam corrigere, ut omnino in scabie, lue venerea &c. caute præscriptum plurimum valeat. Crudum interne rarius assumitur, nisi in pilulis. In Ileo tamen morbo ad libram & ultra deglutitum pondere suo & fluiditate sæpe proficuum fuit. Decoctum ejus omnino vermes enecare sæpius expertus sum. Placet cl. PLENK methodus crudum mercurium cum Arabico gummi subigendi, ut forma liquida propinari possit. Externe axungiae porcinae immixtum & membris illitum scabiem & luem veneream perinde ac intus assumtum tollit, etiam pediculos necat. Plurima inde composita medicamina in altera parte videantur.

Aristolochia longa vera Off.
& C. B.

Aristolochia longa LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1364.

Gall. Aristolochie longue véritable.

Germ. Lange Osterluzey.

In *Hispania, Italia* &c. sponte provenit.

Usu: Radix.

Vires vulnerariae, uterinae, alexipharmacæ.

Aristolochia rotunda vera Off.

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro C. B.

Aristolochia rotunda LINN.
Spec. plant. T. II. p. 1364.

Gall. Aristolochie ronde véritable.

Germ. Echte runde Osterluzey.

Usu: Radix.

Vires. Cum præcedenti convenit.
E Aristo-

Aristolochia rotunda vulgaris Off.

Fumaria bulbosa radice cava major C. B.

Fumaria radice bulbosa, cava, caule simplici, bifolio, bracteis ovato-lanceolatis.

HALL. *Hist.* n. 348.

Fumaria bulbosa LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 983.

Gall. *Aristolochie* ronde commune.

Germ. *Gemeine runde Osterluzey oder Sohlwurz.*

Ad sepes & in sylvis primo vere.

Usu: Radix.

Vires ei adscribuntur eadem, quæ præcedentibus & *Aristolochiæ* vulgari, cui tamen sententiæ Ill. Hallerus haud adstipulatur & quidem merito. Apud nos rarius, si unquam in usum venit.

Aristolochia vulgaris Off.

Aristolochia clematitis recta, C. B.

Aristolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis HALL. *Hist.* n. 1029.

Aristolochia clematitis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1364.

In calidioribus regionibus in vineis &c. spontanea, apud nos in hortis abunde luxuriat.

Usu: Radix & Folia.

Vires eadem, quæ longæ & rotundæ veræ, vulnerariæ, emmenagogæ, antipodagricæ & decocto foliorum vinoso sæpissime nostrates utuntur ad vulnera, fucillationes, contusiones &c.

Armenius Lapis Off.

Cuprum Armenum LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 145.

Gall. *Azur*, *Pierre armenienne*,

Germ. *Armenierstein*, *Bergblau*.

Minera est Cupri in Comitatu *Tirolensi* præcipue reperiunda.

Vires. Scopu emetico olim propinabatur in hydrope, mania &c. Hodie nonnisi a pictoribus expetitur.

Armoniacum, *Ammoniacum* Sal Off.

Gall. *Sel Armoniac.*

Germ. *Salmiac*, *Salmoniac.*

Substantia est salina, alba, pellucida, constans ex alcali volatili, & acido salis.

In magnis frustis, sive patellis hinc convexis, inde planis, intus albis, extus nigricantibus ex *Ægypto* advehitur, ubi sublimationis ope, ex fuligine conficitur, quæ ex combustis variorum animalium, etiam hominis excrementis (quibus ob nimiam ligni caritatem pauperes utuntur) oritur.

Veram hocce sal præparandi methodum primus nos docuit cl. Hasselquist in descriptione itineris sui in Palæstinam & *Ægyptum* suscepti p. 577. edit. germ.

Vires. Refrigerat, resolvit, etiam extus & intus adhibitum antisepticam virtutem exserit & ad mechanicos usus etiam inservit.

Armoracia vide *Raphanus rusticanus*.

Arnica Off.

Doronicum plantaginis folio alterum C. B.

Arnica foliis conjugatis, ovatis, integerrimis HALL. *Hist.* n. 90.

Arnica montana LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1295.

Gall. *Betoine de montagne.*

Germ. *Arnica*, *Salfraut*, *Wolferley* &c.

Habitat in pratis montanis & subalpinis *Helvetiæ*, *Alsatiæ*, *Lotharingiæ*, *Germaniæ* &c.

Odo.

Odorata est stirps & acris.

Usu: Folia & Flores.

Vires. Ad resolvendum sanguinem ex lapsu vel ictu effusum & coactum summis laudibus a multis extollitur. Etiam pectoralis audit, diuretica, vulneraria & caute præscribi debet, cum alias facile nauseam & vomitum excitet. Plerumque in infuso vel leni decocto, rarius in substantia propinatur.

Arsenicum album Off.

Arsenicum crystallinum album WALLER. *Mineral*. p. 558.

Gall. Arsenic blanc, de la Mort aux rats.

Germ. Weisser Arsenik, Mäusegift.

Ex farina sive pulvere arsenicali & sale alcali sublimatur.

Vires. Cum præsentissimum sit venenum, tutius erit eo abstinere, licet a nonnullis in debellandis febribus intermittentibus valde laudetur.

Arsenicum flavum, citrinum Off.

Arsenicum flavum WALLER. *Mineral*. p. 558.

Gall. Arsenic jaune.

Germ. Gelber Arsenik.

Constat ex una parte sulphuris & 10 partibus Arsenici albi mixtis & sublimatis.

Ob additum sulphur paulo mitius & pictoribus inprimis inservit.

Arsenicum rubrum Off.

Arsenicum rubrum WALLER. *Mineral*. p. 558.

Gall. Arsenic rouge.

Germ. Rother Arsenik.

Hoc ex 2 partibus sulphuris & 10 partibus Arsenici constat.

Expetitur a tinctoribus & pictoribus.

Artemisia rubra & alba Off.

Artemisia vulgaris major C. B.

Artemisia BLACKW. Tab. 431.

Artemisia foliis inferne tomentosis, pinnatis, pinnis acute dentatis, spica paniculata, erecta HALL. *Hist.* n. 130.

Artemisia vulgaris LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1188.

Gall. Armoise.

Germ. Beyfuß, nostr. rothe und weisse Buckten.

Ad vias, fossas & in arenosis crescit.

Acris est planta, aromatica.

Usu: Folia & Summitates.

Vires emmenagogæ & vulnerariæ.

Arthanita, Cyclamen, Parnis porcinus Off.

Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascence C. B.

Artanita Cyclamen BLACKW. Tab. 147.

Cyclaminus flore cernuo, segmentis revolutis HALL. *Hist.* n. 635.

Cyclamen Europæum LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 207.

Gall. Pain de Pourceau.

Germ. Schweinsbrodt, Saubrodt, Cyclamen.

In submontanis & subalpinis Helvetiæ passim occurrit, nobis hortensis.

Usu. Radix informe & crassum tuber est, odoris nullius, saporis primo mitis & mucilaginosi, dein valde acris.

Vires. Drastrictum est sursum & deorsum purgans, ut etiam tritum unguentum det, quod ventri inunctum purgantem su-

am vim exferat. Sed rarius Eligenda pura, coloris rosei, ceræ præscribitur. instar lenta.

Arum Off.

Arum vulgare maculatum

& non maculatum C. B.

Arum BLACKW. Tab. 228.

Arum foliis sagittatis, spatulas recta, clava cylindrica

HALL. Hist. n. 1302.

Arum maculatum LINN. Sp.

plant. T. II. p. 1370.

Gall. Pied de veau.

Germ. Aronentrout.

In sepibus umbrosis & sylvis frequens.

Tota planta recens odoris est nullius, saporis acerrimi, ut linguam exurat.

Usu. Radix, rarius Folia.

Vires saponaceæ, resolventes, aperientes, incidentes, diureticæ.

Quot annis recens debet colligi radix, cum diutius servata insipida fiat & inutilis.

Afa foetida Off. C. B.

Gall. Assa foetida.

Germ. Teufelsdröck, stinkender Asant.

Gummi-resina est coloris rosei vel flavescens, saporis nauseosi, acris, odoris vehementis, ingratisimi, ad allium accedentis.

Planta, ex qua stillat, vocatur

Assa foetida disgunensis umbellifera, Ligustico affinis

KÆMPF. Amœnit. p. 535. c. icon.

Ferula Assa foetida LINN. Spec.

plant. T. I. p. 356.

Crescit in Persia.

Vires anthelminticæ, antihystericæ, ut ad compescendos spasmos Castoreum mihi videatur superare, & omnino, nisi foetor ejus obstaret, frequentius præscribi mereretur.

Rustici fumo ejus sagas fugant & dæmones, & a veterinariis sæpius adhibetur.

Afa dulcis, vide Benzoë.

Afarum Off.

Afarum C. B. BLACKW. Tab. 383.

Afarum foliis reniformibus, subhirsutis HALL. Hist. n.

1547.

Afarum Europæum LINN. Spec.

plant. T. I. p. 633.

Gall. Cabaret ou Oreille d'homme.

Germ. Salswurz.

In sylvis nostris umbrosis, præsertim montosis frequens.

Usu. Folia & Radix odoris grati, fere piperis, saporis acris, amaricantis.

Vires. Emetica sunt & purgantia folia & radix in substantia vel infuso propinata, cum aqua vero decocta, diuretica fiunt & emmenagoga, ut puellæ nostræ rusticæ hac planta quandoque ad abortum promovendum abutantur. Rarius a medicis nostris præscribitur, frequentius a veterinariis.

Aschia, Thymallus Off.

Salmo Thymallus LINN. Syst.

Nat. T. I. p. 512.

Gall. Ombre.

Germ. Asche, Esche.

Piscis est in montosis rivulis frequens, salubris, delicatus, truttæ æquiparandus.

Usu. Axungia.

Vires. Ophthalmica est, & melle permixta, cutis maculas tollere foveasque post variolas relictas explere dicitur.

Aselli vide Millepedes.

Aspalathum lignum Off.

Agal-

Agallochum præstantiffi-
mum C. B.

Gall. Bois d'Aspalat.

Germ. Rhodiserdorn.

Lignum hocce, quod ex *India o-
rientali* adfertur, ligno Aloës pro-
ximum est, laxius tamen & cras-
sius, coloris pallidioris, saporis re-
sinosi, odoris debilioris.

Arbor ipsa hætenus ignota est.

Vires eadem, quæ ligno Aloës,
debiliores tamen.

Asparagus Off.

Asparagus sativus C. B.

Asparagus BLACKW. T. 332.

Asparagus foliis filiformi-
bus, stipulatis. HALL. *Hist.*
n. 1239.

Asparagus Officinalis LINN.
Spec. pl. T. I. p. 448.

Gall. Asperge.

Germ. Spargel, nostr. Sparsel.

In arenosis ad *Rhenum* haud longe
ab urbe nostra sponte provenit &
in hortis copiose colitur.

Usu: Radix & Turiones.

Vires. Radices aperiunt & urinam
cient. Turiones esculenti sunt,
diuretici, uti radices; ut
majori copia assumti mictum
cruentum & diabeten produxe-
rint. Urinam peculiari ingra-
tissimo odore imbuunt.

Asperula vide Matrisylva.

Asphaltum, Gummi Asphal-
tum, Bitumen Judaicum
Off.

Bitumen friabile atrum. LINN.
Syst. Nat. T. III. p. 110.

Bitumen solidum coagula-
tum. WALLER. *Mineral.*
§. 204.

Gall. Bitume Judaique.

Germ. Juden Pech.

In comitatu *Neocomensi* au *val de
Travers* abunde reperitur & id

Pars I.

quidem optimum censetur, alias
etiam mari passim innatat v. g.
Mari mortuo, versus *Chinam*
&c.

Substantia est bituminosa, nigra,
splendens, dura, plus minus
fragilis, candentibus carbonibus
injecta pessime foetens, quæ con-
sistentia liquida vel molli passim
e terra vel maris fundo prodit
& tum demum aeri exposita in
solidam substantiam condensa-
fatur. Sæpius etiam ex pice &
oleo empyreumatico conficitur.

Vires. Externe pro vulnerario, de-
tergente, discutiente habetur,
& fumus ejus foetore suo an-
tihystericus est.

Asphodelus, Hastula Regis
Off.

Asphodelus luteus flore &
radice C. B.

Asphodelus verus, luteus
BLACKW. Tab. 233.

Asphodelus caule folioso,
foliis angulatis, striatis,
stipulis maximis HALL. *Hist.*
n. 1206.

Asphodelus luteus LINN. *Spec.*
pl. T. I. p. 443.

Gall. Asphodele.

Germ. Goldwurz, gelber Affo-
dill.

In *Italia*, etiam *Helvetiæ* valle *Tel-
lina* provenit, & in hortis co-
litur.

Usu. Radix.

Vires diureticiæ, emmenagogæ,
maturantes.

Ab aliis radix Asphodeli albi pro
vera officinali assumitur.

Quæ vero in Officinis nostris pro
Asphodeli radice servatur, potius
est radix

Lilii, floribus reflexis, mon-
tani C. B.

Martagon CAMER. *Epit.* p. 617.

F

Lilii

- Lilii foliis verticillatis, floribus pendulis revolutis *HALL. Hist. n. 1233.*
 Lilii Martagon LINN. *Spec. pl. T. I. p. 435.*
 In montosis sylvosis per totam *Helvetiam* vulgare.
Vires. Nonnisi a rusticis mulieribus sub nomine *Goldwurz* expectantur, quæ ad curandam atrophiam & rachitidem eas in petia ligatas collo infantum appendunt.
- Asplenium, vide Ceterach.
 Astrantia alba, vide Imperatoria.
 Astrantia nigra, Imperatoria nigra Off.
 Helleborus niger faniculæ folio C. B.
 Astrantia nigra BLACKW. Tab. 470.
 Astrantia foliis quinquelobis, trifidis, *HALL. Hist. n. 790.*
 Astrantia major. LINN. *Sp. pl. T. I. p. 339.*
Gall. Otruche noire.
Germ. Schwarze Meisterwurz, rhyzotomis alpicolis *Astranzen.*
 In montanis & alpinis totius *Helvetiæ.*
Usu. Radix acris.
Vires purgantes, apud nos tamen non nisi veterinarii ea utuntur.
- Atriplex Off.
 Atriplex hortensis alba, five pallide virens C. B.
 Atriplex hortensis LINN. *Spec. pl. T. II. p. 1493.*
 Atriplex BLACKW. Tab. 99.
Gall. Arroche.
Germ. Melte, Melde.
 In hortis colitur.
- Usu.* Semen.
Vires emeticæ & purgantes ei adtribuuntur, nobis inusitata.
- Avellana Off.
 Corylus, sylvestris C. B.
 Corylus fativa BLACKW. Tab. 293.
 Corylus sepium *HALL. Histor. n. 1625.*
 Corylus Avellana LINN. *Spec. pl. T. II. 1417.*
Gall. Noisetier.
Germ. Haselstaude.
 In sylvosis & sepibus frequens.
Usu: Nuclei subrotundi, saporis blandi, dulcis, oleum continent blandum oleo Amygdalarum haud dispar.
Vires. Oleum expressum crebri apud nos usus est ad capillorum post morbos acutos vel alio casu delapsorum incrementum promovendum.
- Avena Off.
 Avena vulgaris, five alba C. B. & Avena nigra EJUSD.
 Avena BLACKW. Tab. 422.
 Avena fativa LINN. *Spec. pl. T. I. p. 118.*
 Avena diantha, locustis pendulis, floribus cartilagineis inæqualibus, majori aristata *HALL. Hist. n. 1494.*
Gall. Avoine.
Germ. Haber.
 Ubique fere terrarum in agris colitur.
Usu: Semen.
Vires lenientes, diureticæ, nutrientes, ut etiam tempore annonæ Tritico vel Secali mixtum ad panem conficiendum sumatur. Rarius in usum medicum venit nisi in Decocto Avenæ Loweri.

Aurantia, Arantia Off.

Gall. Oranges.

Germ. Pomeranzen.

Sunt fructus notissimi, odoris suavissimi, saporis varii amari, dulcis &c. cujus varietates quamplurimæ existunt. In Officinis illi adhibentur, qui amaro cortice vestiti sunt. Arbor, quæ eos producit, appellatur

Malus Aurantia major C. B.

Citrus Aurantium LINN. Sp.
pl. T. II. p. 1100.

Gall. Oranger.

Germ. Pomeranzenbaum.

India vera est hujus arbusculæ patria, sed in meridionali *Europa* nunc copiose colitur.

Usu: Cortex & Folia Floresque, sed de hisce sub nomine *Naphæ* florum plura dicentur.

Vires. Cortices, cum amari sint & grate aromatici, roborantibus, stomachicis, carminativis remediis optimo jure adnumerantur. Foliis nuperis quidem experimentis antepilepticas vires inesse nonnulli contendunt. Utinam id constans esset, sed plus una vice ea in tristissimo hoc morbo & quidem semper incassum tentavi.

Auricula Judæ, Fungus sambucus Off.

Fungus membranaceus, auriculam Judæ referens sive sambucus C. B.

Auricula Judæ BLACKW. T. 334.

Peziza bracteata, cespitosa, plana, extus sericea HALL.
Hist. n. 2220.

Tremella auricula LINN. Sp.
Sp. T. II. p. 1625.

Gall. Oreille de Judas.

Germ. Judasohr, Zolder schwamm, Sliccoerschwamm.

Fungi est species passim arboribus putridis in & adnascens.

Vires. Gargarismatibus quandoque additur in angina, &c. sed rarissime si unquam hodie præscribitur.

Auricula muris, Pilosella Off.

Pilosella major repens hirsuta C. B.

Pilosella BLACKW. Tab. 365.

Hieracium caule unifloro, stolonibus reptantibus, foliis petiolatis, ovatis, longe pilosis, subtus tomentosis HALL. Hist. n. 55.

Hieracium foliis integerimis, ovatis, subtus tomentosis, caule repente, scapo unifloro LINN. Sp. pl.
T. II. p. 1125.

Gall. Piloselle, Oreille de souris.

Germ. Mausohrlein, gelbe Mausohrlein.

In aridis tenui gramine tectis abunde, floret æstate.

Usu: Folia nobis parum usitata.

Vires adstringentes, pectorales.

Sub nomine *Auriculæ muris* in Officinis nostris plerumque prostat *Pes cati* infra dicendus, qui etiam a mulieribus *Mausohrlein* vocatur.

Auripigmentum Off

Arsenicum sulphure & lapide spathoso & micaceo mineralifatum, minera flavesciente WALLER. Miner. §. 224.

Pyrites Auripigmentum LINN. Syst. Nat. T. III. p. 113.

Gall. Orpiment, Orpin.

Germ. Operment, Auripigment.

Minera hæc arsenicalis ex *Hungaria* & *Oriente* advehitur, variaeque quoad coloris intensitatem & pulcritudinem, ejus dantur

dantur species. Optima cense-
setur & majore pretio venit ex
Turcia aurei coloris.

Usu. In medicina vix alicujus est
usus; pro depilatorio tamen eo
utuntur. A pictoribus & tinctori-
bus frequentius adhibetur.

Aurum Off. & omnium
Auctorum.

Aurum nativum LINN. *Syst.*
nat. T. III. p. 151.

Notissimum & primarium metallum
ex *Hungaria, Africa, America* in-
primis advehitur neque *Helvetia*
eo caret, ubi passim in rivulis &
fluviis reperitur.

Vires. Ad medicos usus hodie vix
inservit nisi bracteatum sive fo-
liatum, quo pilulae frequen-
tissime obducuntur. Pulveribus
etiam nonnullis, ut visum dele-
ctent, concisa auri folia im-
miscentur.

B.

Balaustia, Balaustiorum, Ba-
laustriæ flores Off.

Gall. Balaustes.

Germ. Granatenblütthe.

Frutex flores hosce proferens ap-
pellatur

Balaustia flore pleno majore
& minore C. B.

Granatus, Punica mala BLACK.
Tab. 97.

Punica spinosa, foliis niten-
tibus, ellipticis, integer-
rimis floribus sessilibus
HALL. *Hist.* n. 1098.

Punica Granatum LINN. *Spec.*
pl. T. I. p. 676.

In meridionali *Europa* spontanea
arbuscula in hortis nostris ubi-
que occurrit.

Vires. Adstringentibus fortioribus
annumerantur.

Ballote vide Marrubium nig-
rum.

Balsamus Canadensis Off.

Gall. Baume de Canada.

Germ. Balsam von Canada.

Refina est liquida alba sive Te-
rebinthinæ species ex arbore
fluens, quæ vocatur

Abies canadensis fructu bre-
vi TOURNEF.

Abies minor, pectinatis foliis,
conis parvis, subrotundis
PLUCKN. *Phytogr.* Tab. 121.
fig. 1.

Pinus Balsamea LINN. *Spec.*
plant. T. II. p. 1421.

Gall. Epinette ou Sapinette
de Canada.

Germ. Canadischer, Virgini-
scher Tannenbaum.

Crescit in *Canada, Virginia.*

Vires. Convenit cum Terebinthi-
na, quam vide.

Balsamus Copaivæ, de Co-
paiva, de Copaiba Off.

Gall. Baume de Copaiva, de
Copau, de Bresil.

Germ. Balsam von Copaiva.

Est substantia resinosa, limpida,
ex albo flavescens, odoris mi-
hi quidem non valde grati ad
Terebinthinam quodammodo
accedens, saporis acris, amari,
nauseosi.

Arbor ex qua vulnerata stillat
vocatur,

Copaiba PISON. *Brasil.*

Copaiva JAQUIN. *Hist. pl. Americ.*
p. 21. T. 86.

Copaifera Officinalis LINN.

Spec. pl. T. I. p. 557.

Crescit in *Brasilia.*

Vires.

Vires. Vulnerarius est & in gonorrhæa, fluore albo interne forma pilularum vel emulsionis præscribitur.

Eligi debet limpidus, albescens, nonnimis vetustus, cum ætate intenso flavus, tenacissimus, foetidus evadat.

Balsamus indicus albus, peruvianus albus Off.

Gall. Baume blanc du Perou.

Germ. Weisser peruvianischer Balsam.

Resinosus est liquor, consistentiæ mellis recentis, coloris albi vel flavescentis, saporis acris, amari, odoris fragrantis, suavis, ad Benzoen accedentis. Fluit ex incisa arbore nondum satis cognita sequente

Cabureiba PISON. *Brasil.* 57. 119.

Peruifera LINN. *Mat. med.* p. 181.

Crescit in *Mexico, Peru, Brasilia* &c.

Vires vulnerariæ, balsamicæ, etiam interne in gonorrhæis aliisque ab ulceribus internis provenientibus malis adhibetur, sed nostris in Officinis rarius invenitur.

Balsamus peruvianus niger, indicus niger Off.

Gall. Baume du Perou.

Germ. Peruvianischer Balsam.

Substantia est resinosa, liquida, coloris ex nigro rubentis, saporis acris, amaricantis, odoris grati, fragrantis. Ex modo dictæ arboris cortice & concisso ligno per coctionem obtinetur.

Vires eadem quæ præcedenti, balsamicæ, roborantes, vulnerariæ. Interne & externe adhibetur & præcedente multo vulgarior est.

Balsamum indicus ficcus Off.

Pars I.

Gall. Baume rouge sec.

Germ. Trockener Indianischer Balsam.

Ex eadem iterum arbore oritur, quo præcedentes, quando nimirum e ramis abscissis vel cortice vulnerato extillans liquor cucurbitinis corticibus excipitur & ad solem densatur, & tunc quidem resinam sistit pelucidam rubram, picis instar tenacem & ductilem, odoris suavissimi, saporis acris, amari. *Vires* eadem quæ præcedentibus.

Balsamus orientalis verus, vide **Opobalsamum.**

Balsamus Tolutanus Off.

Gall. Baume de Tolu.

Germ. Balsam von Tolu.

Resinosus est liquor, consistentiæ fere Terebinthinæ venetæ, coloris flavi, saporis dulcis, aromatici, odoris grati. Creditur extillare ex sequente arbore

Balsamum tolutanum foliis Ceratiæ similibus c. B.

Toluifera LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 549.

Crescit in *America.*

Vires balsamicæ, vulnerariæ, maturantes &c.

De Balsamis officinalibus generatim hoc adhuc monemus, ple-
rorumque originem hætenus incertam esse, cum plerumque adulterati ad nos perveniant & prouti vel ex ramis vel trunco, cortice &c. arboris sponte vel incisus stillant, vel coctione obtinentur, diversimode appellen-
tur.

Barba Capræ, Barba caprina, Ulmaria, Regina prati Off.

Barba Capræ floribus compactis c. B.

Ulmaria BLACKWELL Tab. 465.

Filipendula foliis pinnatis,
G acute

acute ferratis, minimis
intermistis, extrema tri-
lobata, maxima HALL. *Hist.*
n. 1135.

Spirea Ulmaria LINN. *Sp. pl.*
T. I. p. 702.

Gall. Reine des prés.

Germ. Geißbart.

In pratis humidis & ad rivulos
vulgaris, floret æstate.

Usu. Radix.

Vires adstringentes, vulnerariæ.

Bardana, Lappa major,
Personata Off.

Lappa major five Arctium
Dioscoridis c. B.

Bardana major BLACKW. Tab.
177.

Lappa HALL. *Hist.* n. 161.

Arctium Lappa LINN. *Spec.*
plant. T. II. p. 1143.

Gall. Bardane, Glouteron.

Germ. Klettenwurz.

Ad vias & fossas ficcas abundat.

Usu: Radix & Semen.

Vires. Sudorifera est, diuretica,
resolvens radix, cujus decoctum
in lymphæ vitiis, arthritide,
rheumatismis, podagra &c. sæ-
pissime profuisse vidi. Semen
valde amarum inter validiora
diuretica reponi debet, nobis
inusitatum.

Basilicum, Ocimum Off.

Ocimum caryophyllatum
majus c. B.

Ocimum CAMER. *Epit.* p. 308.

Ocimum Basilicum LINN.
Spec plant. T. II. p. 833.

Gall. Basilic.

Germ. Basilicum, Basiliens-
kraut.

In hortis colitur. *Indiæ & Persiæ*
indigena planta, odoris fortis
sed grati, aromatici.

Usu: Folia & Semen.

Vires cephalicæ, uterinæ, sed

frequentior ejus est usus in
culinis.

Bdellium, Gummi Bdelli-
um Off.

Gall. Bdellium.

Germ. Gummi Bdellium.

Gummi Refina est ceræ instar te-
nax, attactu quasi pinguis,
glutinosa, coloris nigricantis
vel purpurei, saporis amari, suba-
cris, odoris grati myrrhæ. Arbor
ex qua fluit hætenus ignota est.

Vires balsamicæ, vulnerariæ, dis-
cutientes, roborantes. Interne
apud nos vix præscribitur.

Beccabunga, Anagallis aqua-
tica Off.

Anagallis aquatica major fo-
lio subrotundo c. B.

Anagallis aquatica BLACKW.
Tab. 48.

Veronica foliis ovatis, ferra-
tis, glabris, ex alis race-
mosa HALL. *Hist.* n. 534.

Veronica Beccabunga LINN.
Spec. plant. T. I. p. 16.

In rivulis & aquis purioribus vul-
garis.

Usu: Herba recens vel ejus Suc-
cus.

Vires saponacæ, antiscorbuticæ,
aperientes, antipodagricæ.

Been, Ben, Nux five Ba-
lanus myrepica, Glans
unguentaria Off.

Glans unguentaria c. B.

Balanus myrepica BLACKWELL,
T. 386.

Gall. Noix de Ben.

Germ. Ben-Nuß.

Fructus est magnitudine fere avel-
lanæ, triqueter, ex cortice con-
stans & nucleo candido, pingui,
saporis amaricantis, acrisculi,
oleosi, nauseosi.

Arbor huncce fructum ferens ap-
pellatur

Lig-

Lignum peregrinum, aquam
cæruleam reddens C. B.

Moringha Zeylanica, fo-
liorum pinnis pinnatis,
flore majore, fructu an-
gulofo BURM. *Zeyl.* p. 162.
Tab. 175.

Morungu RUMPH. *Herb. Amboin.*
T. I. p. 184. Tab. 74. 75.

Guilandina Moringa LINN. *Sp.*
pl. T. I. p. 546.

Vires. Oleum fructus sursum &
deorsum purgat, illitum vero
resolvit. Sed vix hodie adhi-
betur nisi ad olea destillata adul-
teranda & pro corpore balsamo-
rum sumitur.

De ligno hujus arboris nephritico
appellato infra dicetur.

Been, five Behen album Off.

Behen album RAUWOLF. *Itin.* C. B.

Centaurea Behen LINN. *Spec.*
plant. T. II. p. 1292.

Gall. Been blanc.

Germ. Weisser Behen, Wider-
stoss.

In Asia & M. Libanon crescit.

Usu: Radix hodie fere obsoleta.

Vires cardiacæ, alexipharmacæ.

Been, five Behen rubrum Off.

Limonium maritimum ma-
jus C. B.

Limonium BLACKW. T. 481.

Statice Limonium LINN. *Sp.*
pl. T. I. p. 394.

Gall. Been rouge.

Germ. Rother Behen, rother
Widerstoss.

Ad Litora maris crescit.

Usu: Radix coloris rubri, sapo-
ri subaromatici, adstringentis,
hodie parum usitata.

Vires adstringentes, roborantes.

Belladonna, Solanum fu-

riosum, Solanum ma-
niacum Off.

Solanum melanocerafus C. B.

Solanum lethale DODON. *pur-*
gant. p. 360.

Belladonna caule herbaceo,
brachiato, foliis ovato
lanceolatis, integerrimis
HALL. *Hist.* n. 579.

Atropa Belladonna LINN. *Sp.*
pl. T. I. p. 260.

Gall. Belladonna.

Germ. Tollbeeren, Waldnachts-
schatten.

In sylvis præsertim cæduis & mon-
tosis passim frequens.

Usu: Herba, Baccæ, in offi-
cinis nostris quidem haud pro-
stantes, cum vero de earum usu
plura apud auctores extent, non-
nulla ex eis excerpta hic adde-
re liceat.

Vires. Folia in cancris tumo-
ribus dudum jam laudata sunt
& in mammarum ulceribus ca-
taplasmatis forma applicata.

Interne decoctum eorum & infu-
sum in similibus morbis etiam in
arthritide &c. cl. Viri præscrip-
ferunt non absque effectu. Sed
abstineamus potius ab usu suspec-
tæ imo venenatæ plantæ, quæ si
quandoque profuit, tamen etiam
nocuit, ut furorem, cæcitatem,
inflammationem ventriculi, con-
vulsionem, mortem induxerit.

Baccæ olim in nostra urbe Myr-
tilli fructibus immixtæ venditæ
pluribus in Nosodochio habitan-
tibus lethales fuerunt.

Bellis, Bellis minor Off.

Bellis sylvestris minor C. B.
BLACKW. Tab. 200.

Bellis scapo nudo HALL. *Hist.*
n. 93.

Bellis perennis LINN. *Spec. pl.*
T. II. p. 1248.

Gall. Paquerette.

Germ. Maßlieben, nostr. Maßblümlein.

Vulgatissima planta ad vias & in graminosis toto fere anno floret, colligenda tamen primo vere.

Usu. Tota planta cuiusvis notissima & apud nos usitatissima.

Vires. Inter leniora vulneraria & adstringentia collocanda, in phtisi aliisque pectoris morbis perutilis, ut vix species pro infuso theiformi pectorali apud nos præscribantur, quibus non addita sint. Plerique Medici flores saltem præscribunt, nonnulli & quidem melius totam plantam.

Benzoe, Benzoin, Gummi Benzoe, Afa dulcis Off.

Gall. Benjoin.

Germ. Benzoe, wohlriechender Balsam.

Resinosa est massa, dura, sicca, splendens, coloris varii, rufescentis, granis, sive maculis albicantibus plus minus referta, saporis resinosi, balsamici, odoris dulcis, pergrati. Eligantur frusta a quisquiliis libera & majori copia granorum alborum instructa, quæ cum omnino amygdalarum segmenta referant, talia frusta nomine Benzoës amygdaloidis veniunt.

Arbor quæ hancce resinam largitur creditur esse

Arbor virginiana Citreæ vel Limonii folio, Benzoinum fundens COMMEL. Hort. Amst. T. I. p. 189. Tab. 97.

Laurus Benzoin LINN. Spec. plant. T. I. p. 530.

Hæc arbor in Virginia crescit, sed plerumque si non omne Benzoe ex India orientali adfertur. Ergo vel alius arboris est productum vel eadem arbor in utraque India provenit.

Vires calefacientes, incidentes, attenuantes, pectorales, nervi-

næ, sed inprimis ad emplastra & suffimenta adhibetur.

Berberis Off.

Berberis dumetorum C. B.

Berberis BLACKW. Tab. 165.

Berberis racemifera foliis ciliatis HALL. Hist. n. 828.

Berberis vulgaris LINN. Spec. plant. T. I. p. 471.

Gall. Epine vinette.

Germ. Saurach, Erbselen, Weinnägelein.

In sepibus, dumetis & sylvis frequens floret Aprili, Baccæ maturæ colligendæ Octobri.

Usu: Baccæ rubræ acidissimæ.

Vires refrigerantes, antisepticæ. Baccarum siccarum decoctum in acutis & putridis febribus gratum & utilissimum potum præbet.

Betonica Off.

Betonica purpurea C. B.

Betonica BLACKW. Tab. 46.

Betonica foliis petiolatis, imis cordatis, superioribus ovatis, crenatis, spica brevi, foliis insidente HALL. Hist. n. 264.

Betonica officinalis LINN. Sp. pl. T. II. p. 810.

Gall. Betoine.

Germ. Betonien, braune Betonien.

In sylvosis, collibus & pascuis nemorosis frequens, floret æstate.

Usu: Herba & Flores.

Vires huic plantæ tribuuntur cephalicæ, incidentes, diaphoreticæ, diureticæ, uterinæ, pectorales &c. sed nimis mihi laudibus extolli videtur.

Betula Off.

Betula C. B. BLACKW. T. 240.

Betu-

*Betula foliis cordato lanceo-
latis ferratis* HALL. *Hist.*
n. 1628.

Betula alba LINN. *Sp. pl.* T. II.
p. 1393.

Gall. Bouleau.

Germ. Birckenbaum, Besen-
baum, cum scopæ ex hujus
arboris ramis apud nos confi-
ciantur.

In sylvis passim occurrit.

Usu: Aqua ex vulnerato primo
vere caudice exstillans.

Vires huic aquæ tribuuntur diure-
ticæ, lithontripticæ, antipo-
dagricæ. In phtisi incipiente
etiam apud nos aliquando pro-
fuisse vidi, & in scabie aliis-
que cutis vitiis.

Bezetta cœrulea vide *Torna*
Solis cœrulea.

Bezetta rubra vide *Torna*
Solis rubra.

Bezoar occidentale Off.

Calculus Bezoar LINN. *Syst.*
Nat. T. III. p. 176. Variet. β.

Gall. Bezoar occidental.

Germ. Occidentalischer Bezoar.
Calculus est sive concretum cru-
staceæ indolis, variæ magnitu-
dinis, subrotundum, scabrum,
coloris cineritii, saporis terre-
stris. Reperitur in ventriculo
plurium animalium America-
norum.

Vires perinde ut sequenti bezoar-
dicæ, alexipharmacæ, analep-
ticæ ipsi tribuuntur, sed præter
debilem absorbentem virtutem
a talibus remediis vix quidquam
utilitatis expectes, quicquid de
eis alii gloriantur.

Bezoar orientale Off.

Calculus Bezoar LINN. *Syst. Nat.*
T. III. p. 176. Var. α.

Gall. Bezoar oriental.

Germ. Orientalischer Bezoar.

Calculus est ovalis figuræ, mag-
Pars I.

nitudinis variæ, coloris fusci
vel pallide virescentis, levis,
splendens, ex laminis sibi in-
vicem incumbentibus compa-
ctus, intus sæpe cavus, odoris
nullius, saporis terrestris. In-
venitur in ventriculo

Capricervæ KÆMPF. *Amœnit.*
exot. p. 398. ic. p. 407. fig. 2.

Capræ bezoardicæ LINN. *Syst.*
nat. T. I. p. 96.

Vires. Quæ de occidentalis Bezoar
viribus notavimus etiam de hu-
jus dicta sint.

Cum pretiosissimus sit hicce lapis,
sæpissime adulterari solet.

Bismalva vide *Althæa.*

Bismuthum vide *Marcafita.*

Bistorta, *Serpentaria vulga-
ris*, *Colubrina* Off.

Bistorta major, radice ma-
gis & minus intorta C. B.

Bistorta BLACKW. Tab. 254.

Polygonum radice lignosa,
contorta, spica ovata,
foliorum petiolis alatis
HALL. *Hist.* n. 1559.

Polygonum Bistorta LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 516.

Gall. Bistorte.

Germ. Natterwurz, Schlän-
genwurz.

In pratis udis & pascuis monta-
nis frequens.

Usu. Radix.

Vires valde adstringentes.

Boletus Cervinus Off.

Tubera cervina. C. B.

Lycoperdon cervinum LINN.
Spec. plant. T. II. pag. 1653.

Gall.

Germ. Sirschenbrunst.

Fungi est species subterranea,
subrotunda, nucis juglandis
magnitudine, cortice duro con-
stans includente farinam nig-
ram subtilissimam.

H

Vires.

Vires. Pro aphrodisiaco habetur, & à rusticis & veterinariis petitur.

Bolus alba Off.

Bolus alba WALLER. *Mineral.* pag. 27.

Argilla Bolus LINN. *Syst. Nat.* T. III. pag. 203. Var. *α*.

Gall. Bol blanc.

Germ. Weißer Bolus.

Argillæ est species passim occurrens.

Vires adstringentes, exsiccantes.

Bolus armena Off.

Argilla Bolus. LINN. *Syst. nat.* T. III. p. 203. Var. *δ*.

Gall. Bol d'Armenie.

Germ. Armenischer Bolus.

Ex Oriente olim advehebatur nunc etiam passim in Germania & Gallia reperitur.

Vires adstringentes. Etiam internus ejus est usus in diarrhœis, dysenteria, fluore albo &c.

Bolus rubra vulgaris Off.

Gall. Bol rouge.

Germ. Rother Bolus.

Mera est præcedentis varietas.

Vires eadem quæ præcedentibus. Externe saltem adhibetur in ulceribus vetustis, erysipelate &c.

Bombax, Gossypium Off.

Gossypium frutescens, semine albo C. B.

Bombax BLACKW. Tab. 357.

Gossypium herbaceum LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 975.

Gall. Coton.

Germ. Baumwollenstaude.

In America vera sua patria passimque in insulis Archipelagi aliisque Orientis regionibus abunde colitur.

Usu. Semen nigrum, rotundum pisi majoris magnitudine, nucleo albo, dulci, oleoso.

Vires. Ob oleum blandum, quod continet, demulcet, lenit, lubricat, in asthmate, nephritide &c. olim laudatum, nunc fere obsoletum.

Bonus Henricus, Lapatum unctuosum, Tota bona Off.

Lapatum unctuosum C. B. MUNTING *Herb. Britt.* p. 191.

Mercurialis BLACKW. Tab. 311.

Chenopodium foliis triangularibus, undulatis, integerrimis, subtus farinosis HALL. *Hist.* n. 1578.

Chenopodium Bonus Henricus LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 318.

Ubique in ruderosis, ad vias & fineta provenit.

Usu. Folia.

Vires. Pro egregio vulnerario a nonnullis habetur vulneribus recentibus & antiquis ulceribus recens herba applicata. Cum butyro frixa hæmorrhoidum dolores lenire vulgo creditur.

Borax, Borax veneta Off.

Borax depuratus albus octangularis WALL. *Mineral.* p. 248.

Borax nudus LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 94.

Gall. Borax de Venise.

Germ. Venetianischer Borax.

Substantia est salina, alba, semidiaphana, quoad figuram alumini similis, saporis nitrosi, acris.

Minera hujus salis ex China, Tranquebar &c. advehitur & Amstelodami atque Venetiis methodo hætenus ignota depuratur.

Vires incidentes, stimulant ut urinam, menses, partum promoveat.

Borrago

Borrigo Off.

Buglossum latifolium Borrigo C. B.

Borrigo BLACKW. Tab. 36.

Borrigo foliis asperis, lanceolatis, palis florum duplicatis HALL. *Histor.* n. 607.

Borrigo officinalis LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 197.

Gall. Bourrache.

Germ. Borretsch.

In hortis ubique colitur & in incultis quandoque occurrit.

Usu. Herba recens, Flores.

Vires cardiacæ, antimelancholicæ ipsi tribuuntur, sed potius refrigerantes, humectantes & demulcentes possidere videtur, cum nitroso sale abundet. Flores sicci, & herba exsiccata inutiles.

Botrys, Botrys vulgaris Off.

Botrys ambrosioides vulgaris C. B.

Botrys BLACKW. Tab. 314.

Chenopodium foliis oblongis, semipinnatis, viscidis, dentibus subrotundis HALL. *Hist.* n. 1585.

Chenopodium Botrys LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 320.

Gall. Botrys, Ambroisie.

Germ. Traubenkraut.

In *Valesia* & circa *Genevam* spontanea planta grate odorata, saporis subacris, aromatici.

Usu. Herba in officinis nostris vix prostant.

Vires antasthmaticæ, antihystericæ, carminativæ.

Botrys mexicana Off.

Botrys ambrosioides mexicana C. B.

Chenopodium ambrosioides LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 320.

Gall. Thée du Mexique

Germ. Mexicanischer Thee, Mexicanisch Traubenkraut.

In *Mexico* sponte provenit & in hortis colitur.

Gratior adhuc & fortior odor quam præcedenti, cum quo ceterum etiam ratione virium magnam similitudinem habet.

Usu: Herba.

Viribus dicitur convenire cum præcedente, etiam anthelminticum esse. Pro Thee passim non optime vendebatur, cum recens siccatae plantæ infusum inebriare dicant. Neque hæc nostris Officinis nota est.

Bovista, Crepitus Lupi Off.

Fungus maximus, rotundus, pulverulentus, dictus Germanis Bovist. JOH. BAÜH.

Hist. pl. T. III. p. 848.

Lycoperdon vulgare TOURNEF. SCHÆFFER. *Fung. Bavar.* Tab. 191.

Lycoperdon faccatum, cinereum, polline obscure viridi HALL. *Hist.* n. 2172.

Lycoperdon Bovista LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1653.

Gall. Vessè de Loup

Germ. Bovist.

In sylvis & pascuis post autumnum frequens subrotundus fungus, pediculo carens, magnitudinis variæ, ut sæpe infantis caput adæquet.

Vires. Pollen subtilissimum hujus fungi vulneribus inspersum hæmorrhagias etiam periculosissimas sistere dicitur, frequentius tamen olim quam hodie usitatum.

Branca ursina vera, Acanthus verus, sativus Off.

Acanthus sativus sive mollis Virgilii C. B.

Acanthus, Branca ursina
BLACKW. Tab. 89.

Acanthus mollis LINN. *Sp. pl.*
T. II. p. 891.

Gall. Branche ursine, Acan-
the.

Germ. Bärenklau.

In Italia sponte provenit & in
hortis curiosorum occurrit.

Usu. Folia.

Vires. Inter emollientes herbas re-
ferebant veteres hanc plantam in
Officinis hodie vix reperiundam,
cum recentiores sequentem ei
substituerint licet minus bene.

Branca ursina vulgaris, A-
canthus vulgaris, Sphon-
dylum Off.

Spondylum vulgare hirsu-
tum C. B.

Spondylum DODON. *Pempt.*
p. 304.

Spondylum foliis hirsutis,
pinnatis, pinnis quinquelo-
bis HALL. *Hist.* n. 809.

Heracleum Spondylum
LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 358.

Gall. Branche ursine commu-
ne.

Germ. Gemeiner Bärenklau.

In pratis ubique vulgaris.

Usu. Folia.

Vires. Inter emollientes herbas
uti jam dictum sed male refer-
tur, cum potius acris videatur
esse & Russi potum inebriantem
ex ea conficiant.

Brunella vide Prunella.

Bruscus, Ruscus Off.

Ruscus C. B.

Ruscus myrtifolius aculea-
tus TOURNNEF.

Bruscus sive Ruscus BLACKW.
Tab. 155.

Ruscus foliis ovato-lanceola-

tis, pungentibus, petiolis
brevissimis vaginosis HALL.
Hist. n. 1238.

Ruscus aculeatus LINN. *Sp. pl.*
T. II. p. 1474.

Gall. Petit Houx, Houffon,
Frelon.

Germ. Mäusedorn, Bruschwurz.
In Gubernio Aquilejensi & transal-
pina Helvetia ad sepes & in du-
metis provenit.

Usu: Radix.

Vires incidentes, aperientes,
diureticae, & inter quinque radi-
ces aperientes recensetur.

Bryonia Off.

Bryonia alba baccis rubris &
nigris C. B.

Bryonia alba BLACKW. Tab. 37.

Bryonia foliis palmatis, u-
trinque calloso scabris HALL.
Hist. n. 534.

Bryonia alba LINN. *Spec. plant.*
T. II. p. 438.

Gall. Bryone, Coulevrée.

Germ. Saunrüben, Stickwurz,
nostr. Schmerwurz.

Ad sepes ubique frequens.

Usu. Radix magna, crassa, al-
ba, succulenta, odoris subfoetidi,
saporis amari, acris, nauseosi.

Vires. Purgans est ex fortioribus,
ferum educit, menses provocat,
& anthelminticis adnumeratur.
Externe discutit, resolvit.

Buglossum Off.

Buglossum angustifolium ma-
jus. C. B. & minus EJUSD.

Buglossum BLACKW. Tab. 500.

Anchusa officinalis LINN. *Spec.*
plant. T. I. p. 191. &

Anchusa angustifolia EJUSD.
l. c.

Buglossum foliis linguiformi-
bus, asperis, spicis supre-
mis

mis gemellis HALL. *Hist.* n. 599.

Gall. Buglose.

Germ. Ochsenzung.

Varietas minor, five angustifolia LINN. in *Rhetia* & transalpina *Helvetia* passim ad vias abundat, major vero, five officinalis LINN. in hortis colitur.

Usu: Radix, Herba, Flores.

Vires eadem quæ Borragini.

Bugula vide *Consolida media*.

Bursa pastoris Off.

Bursa pastoris major folio sinuato c. B.

Bursa pastoris BLACKW. Tab. 5.

Nasturtium filiquis triangularibus HALL. *Hist.* n. 514.

Thlaspi Bursa pastoris LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 903.

Gall. Tabouret, Bourse a Berger.

Germ. Täschleinkraut, Seckeleinkraut.

Vulgatissima planta ad vias, in ruderosis &c.

Usu. Herba.

Vires. Inter vulnerarias & astringentes recensetur externe & interne adhibita.

Butua vide *Pareira brava*.

Buxus Off. BLACKW. Tab. 184.

HALL. *Hist.* n. 1610. LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1394.

Buxus arborescens c. B.

Gall. Buis.

Germ. Bur, Buchs.

In montosis apricis ditionis Basilienfis passim abunde provenit ex gr. supra *Fridlingen*, *Crenzach*, *Höllstein*, *Liechstall* &c.

Usu. Lignum, Folia.

Vires. Ligni decoctum a nonnullis tanquam succedaneum ligni Quajaci in morbis venereis laudatur. Ad capillorum incrementum idem decoctum externe adhibetur, quo scopo alii oleo ligni Buxi utuntur. Folia nauseosi, amari saporis alvum ducunt.

C.

Cacao Off. CLUS. *Exot.* pag. 55.

Amygdalis similis quatinensis c. B.

Cacao Cacavate BLACKW. Tab. 373.

Theobroma Cacao LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1100.

Gall. Cacao.

Germ. Cacao, Cacaobohnen.

In meridionali *America*, *Peru*, &c. ad latera montium crescit & passim in Americæ provinciis & insulis colitur procera Arbor.

Usu: Semina subrotunda vel ob-

longa, inæqualia, magnitudine fere amygdalæ, cortice tenui fragili, fusco constantia & nucleo denso, obscure rubente, pingui, amaricante ex 4, 5, 6 lobulis s. acervulis conglobato. Pro diversitate regionis & soli, ubi colitur, diversos bonitatis gradus obtinent, ut optima censentur Cacao Carraque dicta, his proxima Cacao Marignan appellata, quibus succedunt Cacao Martinique &c.

Vires. Ob copiosissimum (ad tertiam partem totius ponderis & ultra) oleum, quod continent butyraceum sive sebaceum, flavescens, aromaticum, subdul-

ce, blandum, valde nutriunt, ideoque analeptica sunt, roborantia, etiam lenientia, demulcentia, aphrodisiaca &c. De potu illo hodie vulgatissimo Succoladæ vel Chocoladæ nomine veniente in altera parte videatur.

Cadmia fossilis vide Calaminaris Lapis.

Cadmia nativa vide Cobaltum.

Caffee vide Coffee.

Cajeput Oleum Off.

Ex *India* advehitur, de qua inter Botánicos nondum constat, plerique tamen putant ex Cardamomi aliqua specie destillari.

Vires ipsi tribuuntur cephalicæ, antepilepticæ, etiam contra cardialgiam &c. ad guttas 3, 4, 6. &c.

Calaminaris Lapis, Cadmia fossilis Off.

Zinci minera terrea, colore flavescente vel fusco WALLER. Mineral. p. 220.

Zincum Calaminaris LINN. *Syst. Nat. T. III. p. 126.*

Gall. Pierre calaminaire.

Germ. Gallmei.

In *Germaniæ*, *Hungariæ*, *Angliæ* &c. fodinis reperitur.

Vires exsiccentes, adstringentes.

Calamintha Off.

Calamintha vulgaris & officinarum Germaniæ c. B.

Calamintha montana BLACK. Tab. 166.

Melissa foliis subhirsutis, ovatis, acuminatis, acute ferratis, petiolis ramosis, folia superantibus HALL. Hist. n. 241.

Melissa Calamintha LINN. *Sp. pl. T. II. p. 827.*

Gall. Calament ordinaire.

Germ. Gemeine Bergmünz, Calamenten.

In dumetis, collibus & montosis frequens floret Augusto.

Tota planta fortis est odoris non ingrati ad menthæ odorem accedentis.

Ufu: Folia.

Vires calefacientes, stomachicæ, uterinæ.

Calamintha montana Off.

Calamintha magno flore c. B.

RIVIN:

Melissa grandiflora LINN. *Sp. pl. T. II. p. 827.*

Gall. Calament a grandes fleurs.

Germ. Bergmünz mit grossen Blumen, wohlriechende Bergmünz.

In calidoribus regionibus spontanea apud nos quandoque in hortis reperitur.

Ufu. Folia nobis inusitata.

Vires eadem quæ præcedenti.

Calamintha pulegii odore Off.

Calamintha pulegii odore five Nepeta c. B.

Calamintha Officinalis BLACKW. Tab. 167.

Melissa foliis hirsutis, ovatis, acuminatis, leniter ferratis, petiolis ramosis folia superantibus HALL. Hist. n. 240.

Melissa nepeta LINN. *Spec. plant. T. II. p. 828.*

Gall. Calament a odeur de Pouliot.

Germ. Wilder Poley, Bergmünz mit Poley Geruch.

Ad sepes passim & vias apud nos occurrit & antepæcedenti nonnunquam substituitur, & omnino licet odore paulum differant, viribus

ribus vix evidentem discrepare videntur, ut etiam in Anglia hæc ultima, tanquam vulgatiores ibi, sola officinas intret.

In iis vero regionibus, ubi ambæ dictæ species spontaneæ non reperiuntur, plerumque sequens planta in Officinis prostat, nempe

Calamintha arvensis verticillata C. B.

Mentha verticillata RIVIN.

Mentha floribus verticillatis, foliis hirsutis, ovato lanceolatis, verticillis tomentosis HALL. *Hist.* n. 223.

Mentha arvensis LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 806.

Gall. Menthe des champs.

Germ. Kornmünz, Feldmünz. Inter stipulas passim frequentissima.

Calamus aromaticus, Acorus verus Off.

Acorus verus five *Calamus aromaticus* Officinarum C. B.

Acorus verus BLACKW. T. 466.

Acorus HALL. *Hist.* n. 1307.

Acorus Calamus LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 462.

Gall. Acorus, Calamus aromaticus.

Germ. Calmus.

In piscinis passim abundat.

Usu. Radix odorata, acris, aromatica.

Vires stomachicæ, roborantes, carminativæ.

Calcatrippa, Delphinium, Consolida regalis Off.

Consolida regalis arvensis C. B.

Consolida regalis CAMER. *Epit.* p. 521.

Delphinium unifiliquum, caule brachiato, diffuso, floribus sparsis HALL. *Hist.* n. 1203.

Delphinium Consolida LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 748.

Gall. Pied d'Alouette.

Germ. Rittersporen.

In agris inter segetes & stipulas passim frequens.

Usu. Flores cœrulei inodori.

Vires ipsis tribuuntur opthalmicæ, diureticæ, vulnerariæ, quo jure vix dixerim.

Cum hæc planta non ubique spontanea sit, passim ei hortensis species substituitur, quæ vocatur

Consolida regalis hortensis flore majore simplici & multiplici C. B.

Consolida regalis BLACKW. T. 26.

Delphinium unifiliquum, caule recto, spicato HALL. *Hist.* n. 1202.

Delphinium Ajacis LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 748.

Calcitrapa Off.

Carduus stellatus foliis papaveris erratici C. B.

Carduus muricatus vulgo *Calcitrapa dictus* C.

Hist. pl. pag. VII.

Calcitrapa foliis hirsutis, pinnatis, pinnis dentatis, floribus in alis sessilibus HALL. *Hist.* n. 194.

Centaurea Calcitrapa LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1297.

Gall. Chardon étoilé, Chauffe-Trape.

Germ. Stern-Distel.

In calidiori *Helvetia* ad vias provenit etiam circa *Huningen* & in *Alsatia* abunde.

Ufu. Radix & Semen.

Vires. Radicem in Gallia pro febrifugo habent ad drachmam unam assumtam. Semina diuretica sunt. Nostris in Officinis neutrum prostat.

Calendula Off.

Caltha vulgaris C. B.

Calendula Officinalis LINN.

Sp. pl. T. II. p. 1304.

Gall. Souci.

Germ. Ringelblumen.

In hortis ubique colitur.

Ufu. Flores lutei, odoris fortis non grati.

Vires alexipharmacæ, emmenagogæ, resolventes, anthelminthicæ.

Calx viva Off.

Gall. Chaux vive.

Germ. Ungelöschter Kalch.

Est substantia lapidosa, ex albo cinerea, summe acris & caustica, ignis vi exusta plerumque ex lapide dicto

Lapis calcareus.

Calcareus particulis scintillantibus WALL. *Mineral.* p. 56.

Marmor rude LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 41.

Gall. Pierre a Chaux.

Germ. Kalchstein.

Haud raro ex aliis lapidibus conficitur, etiam ex testaceis marinis &c.

Vires. Requiritur ad aquam calcis vivæ conficiendam, ad cauterium potentiale &c. de quibus in altera parte agetur.

Camphora, Camphoræ Gummi, Cafura Off.

Gall. Camfre, Camphre.

Germ. Campfer, Camfer.

Substantia est solida, sicca, alba, semipellucida, odoris fragran-

tissimi, saporis acris, subamari, inflammabilis, summe volatilis, ut aeri exposita brevi tempore evanescat, & nullum sui vestigium relinquat.

Ex radicibus, trunco, ramis, foliis mox dicendæ Arboris in Japonia sublimationis ope educitur rudisque inde in Belgium advehitur, ubi nova sublimatione depuratur. Arbor, ex qua obtinetur, vocatur

Laurus camphorifera KÆMPF.

Amoen. exot. pag. 770. icon. p. 771.

Camphora BLACKW. Tab. 347.

Arbor Camphorifera Iaponica, foliis laurinis, fructu parvo, globoso BREYN.

Prodr. II. p. 44. ic. pag. 16. fig. 2. COMMEL. *Hort. Amst.* T. I. p. 185. Tab. 95.

Laurus Camphora LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 528.

In Japonia crescit.

Vires alexipharmacæ, diaphoreticæ, resolventes, nervinæ. In exanthematicis morbis, ubi vires ad expellendum miasma non sufficiunt egregie prodest, ut omnino calefaciat. Ad Epilepsiam cum Moscho &c. permixtam sæpius sperato cum effectu præscripti.

Cancrorum Chelæ Off.

Gall. Pattes d'Ecrevisses de Mer.

Germ. Meerkrebscheeren.

Sunt Chelæ Cancri marini, vulgaris qui vocatur

Pagurus GESN. ALDROVAND.

Cancer Pagurus LINN. *Syst. nat.* T. I. p. 1044.

Vires ipsis olim tribuebantur & adhucdum a nonnullis adscribuntur alexipharmacæ, antifebriles &c. Sed præter absorbentem vim, quam cum omnibus

nibus testaceis communem habent, vix quidquam inde expectare licet.

Cancrorum Lapides, Oculi Cancrorum Off.

Gall. Yeux d'Ecrevisses.

Germ. Krebsstein, Krebsaugen. Magna copia ex *Borussia*, *Ponia* &c. adferuntur.

Sunt lapilli orbiculati, hinc convexi, inde plano concavi, albi vel coerulescentes, duri, magnitudine utcunque dimidii pisi majoris, ex lamellis compositi, odoris nullius, saporis terrestris, adhærentes mensibus æstivis extrinsecus ventriculo Cancri, qui vocatur

Astacus fluviatilis plur. Auctor.

Cancer Astacus LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 1051.

Vires. Absorbentium remedium optimum sunt, ut reliquis omnibus facile carere possemus. Ceteræ, quæ eis tribuuntur, virtutes, minus evidentes & certæ mihi esse videntur, nequæ facile eos perinde ac reliqua absorbentia præscriberem, nisi præsentibus acidi in primis viis hærentis signis, cum alias facile coagulum lapideum efficiant, ventriculo inimicum & nullo modo fere solubile.

Sæpissime factitii occurrunt ex *Creta* &c. compositi, qui tamen a veris defectu lamellarum facile distinguuntur.

Canis Off.

Canis familiaris LINN. *Syst. nat.* T. I. p. 56.

Gall. Chien.

Germ. Hund.

Notissimum animal domesticum
Usu: Axungia.

Pars I.

Vires lubricantes, emollientes, demulcentes pectorales. Etiam interne subinde in pectoris morbis propinatur; ad hunc vero scopum debet esse recens ex sano cane desumpta.

Cannabis Off.

Cannabis sativa & *erratica* C. B.

Cannabis femina & *mas* BLACKW. T. 322. a. & b.

Cannabis sativa LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1457.

Gall. Chanvre.

Germ. Hanf.

Ubique in agris colitur.

Usu. Semen & Oleum inde expreßum.

Vires. Semen a nonnullis adversus icterum & in pectoris morbis commendatur. Oleum maculas post variolas relictas tollere creditur.

Cantharis Off.

Meloe vesicatorius LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 679.

Gall. Cantharide.

Germ. Spanische Fliege, Mücke.

In pratis & sylvosis passim copiose apud nos reperitur, imprimis ubi *Ligustrum* abundat.

Usu. Totum insectum foetidissimum, acerrimum & urens.

Vires. Urinam valde cient & vernerem potentissime stimulant. Sed nimis acres sunt, quam ut tuto interne adhiberi possint, cum mictum cruentum excitaverint & summum urinæ ardorem &c. Externe applicatæ pro vesicatorio frequenter adhibentur, sed & hic cautela opus est, cum sæpius in urinarias vias suam vim exseruerint, ac si interne assumptæ fuissent.

Capillus Veneris, Adiantum vulgare, Off.

K

Adian-

Adiantum foliis *Coriandri*
C. B.

Adiantum vulgare BLACKW.
T. 367.

Adiantum petiolis ramosis,
foliis flabelliformibus,
lobatis HALL. *Hist.* n. 1713.

Adiantum *Capillus Veneris*
LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1558.

Gall. *Capillaire* commune,
Capillaire de Montpellier.

Germ. *Frauenhaar, Venushaar,*
nostr. *Capillairekraut.*

In australiori *Helvetia* & *Europa*
ad muros, in puteis &c. cres-
cit.

Ufu. Herba tota.

Vires ipsi, licet forsan immerito,
tribuuntur aperientes, attenuan-
tes, becchicæ. Frequentissi-
mus ejus est nostris in oris usus
in infuso theiformi. Syrupus ejus
etiam notissimus, cujus vires,
si quas habet, Ill. Hallerus
aquæ Naphæ, quæ ad gratiam
additur, tribuendas esse putat,
posset forsan addi & saccharo.

Capillus Veneris *Canadensis*,
Adiantum *Canadense*
Off.

Adiantum fruticosum brasili-
anum C. B.

Adiantum americanum COR-
NUT. *Hist. pl. Canad.* pag. 6.
& 7. c. icone.

Adiantum pedatum LINN. *Sp.*
pl. T. II. p. 1557.

Gall. *Capillaire* de Canada.

Germ. *Capillaire-Kraut aus Ca-*
nada.

Ufu. Herba tota.

Vires eadem quæ præcedenti, cui
a nonnullis præfertur.

Capo Off.

Gall. *Chapon.*

Germ. *Capaun.*

Ita vocatur Gallus Gallinaceus ca-
stratus, ut pinguescat.

Ufu. Axungia.

Vires. In tussi convulsiva infantum,
pleuritide & omnibus fere pec-
toris morbis pectori inuncta plu-
rimum laudatur & adhibetur, ha-
ctenus utilis, quod emolliendo
partes externas spasmos leniat
& dolores a nimia thoracis con-
cussione ortos sedet.

Capparis Off.

Capparis spinosa, fructu mi-
nore, folio rotundo C. B.

Capparis BLACKW. Tab. 417.

Capparis pedunculis solita-
riis, unifloris, stipulis spi-
nosus, foliis annuis, cap-
sulis ovatis HALL. *Histor.* n.
1077.

Capparis spinosa LINN. *Sp. pl.*
T. I. p. 720.

Gall. *Caprier.*

Germ. *Cappern, Capperlein.*

In meridionalibus *Europæ* regioni-
bus etiam transalpina *Helvetia*
ad muros & petras crescit.

Ufu. Radicis Cortex & Gem-
mæ Florum.

Vires. Cortex inter aperientia re-
media numeratur. Flores ina-
perti aceto & sale conditi diure-
tici audiunt, antiiclerici &c. in-
culinis magis noti.

Carannæ Gummi Off.

Gall. *Gomme Caragne.*

Germ. *Caranna-Gummi.*

Resina est dura, tenax, ductilis,
e cinereo nigricans, saporis acri-
usculi, amari, ingrati, odoris,
quando accenditur, fragrantis.

Arbor, unde desumpta, nondum be-
ne nota appellatur

Caranna C. B.

Tlahueliloca *Quahuatl* i. e.
Arbor infantiæ *Caragne*
nuncupata HERNAND. *Me-*
xic. p. 56.

Caran-

Caranna LINN. *Mat. med.* pag. 182.

Vires calefacientes, resolventes, vulnerariæ. Interne vix adhibetur.

Cardamomum majus Off.

Cardamomum majus officinarum C. B.

Cardamomum medium CAMER. *Epit.* p. 11.

Figura hujus fructus extat in BLACKW. *Herb.* Tab. 385. fig. 2. 5. 6. &c.

Sunt fructus oblongi, graciles, obtusi, trigoni, striati, triloculares, semina includentes angulosa, oblonga, compressa, purpurascencia. Advehuntur hi fructus ex India orientali. Arbor ipsa eos ferens nondum satis nota est.

Ufu: Semina.

Vires aromaticæ, calefacientes, roborantes, nervinæ &c. nostris in Officinis non prostant.

Cardamomum maximum vide Paradisi grana.

Cardamomum minus Off.

Cardamomum simpliciter in Officinis dictum C. B.

Cardamomum minus BLACKW. T. 385. fig. 1. &c.

Amomum Cardamomum LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 2.

Gall. Petit Cardamome.

Germ. Kleine Cardamomen, Cardamomlein.

In Indiis crescit.

Ufu: Semina angulosa, rugosa, rubentia, vel pallida, contenta in capsulis striatis, ovatis, trigonis, trivalvibus & trilocularibus. Hæc usitatiores sunt.

Vires eadem, quæ præcedenti.

Cardiaca Off.

Marrubium Cardiaca dictum C. B.

Cardiaca BLACKW. T. 171.

Cardiaca foliis tripartitis, lanceolatis HALL. *Hist.* n. 27. 4.

Leonurus Cardiaca LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 817.

Gall. Agripaume.

Germ. Herzgespann, Herzgesperr.

In ruderosis & ad vias provenit.

Ufu. Folia.

Vires. Cordis palpitaciones ab inflato ventriculo ortas tollere dicitur; antihysterica etiam audit, diuretica, emmenagoga, anthelmintica &c. Rarius apud nos præscribitur.

Cardopatium vide Carlinæ.

Carduus benedictus Off.

Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus C. B.

Carduus benedictus BLACKW. Tab. 476.

Centaurea benedicta LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1296.

Gall. Chardon benit.

Germ. Cardebenedicte.

In australibus regionibus spontaneus in hortis apud nos colitur.

Ufu. Radix, Folia amarissima.

Vires tonicæ, stomachicæ, calefacientes, anthelminticæ. Folia crebro in usu sunt, radix rarius.

Carduus Mariæ Off.

Carduus albis maculis notatus vulgaris C. B.

Carduus Mariæ BLACKW. Tab. 79.

Silybum nervis foliorum albis HALL. *Hist.* n. 181.

Carduus marianus LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1158.

Gall. Chardon Marie.

Germ. Marien Distel.

In ruderosis & fimetis nonnunquam

reperitur, ex rejectaneis forsan hortorum, vix enim puto vere spontaneum esse. Sed in hortis colitur.

Usu. Folia, Semen, ambo amara.

Vires. Semina ad emulsiones adhibentur in pleuritide & aliis pectoris morbis, nec non scopo diuretico & diaphoretico. Ex foliis inutilis aqua destillatur.

Caricæ, Ficus passæ Off.

Gall. Figues seches.

Germ. Gedörrte Feigen.

Sunt fructus oblongi pyriformes, pingues, succulenti, saporis dulcis, grati. Arbor eos ferens nuncupatur

Ficus communis c. B.

Ficus BLACKW. Tab. 125.

Ficus Carica LINN. *Spec. pl.*

T. II. p. 1513.

In australi Europa plurima colitur & sponte etiam crescit. Optimi adferuntur ex Italia & Gallia Narbonensi.

Vires demulcentes, lenientes, laxantes, in morbis pectoris, raucedine &c. usitatissimi. Externe emolliunt, leniunt, maturunt, discutunt.

Carlina, Cardopatium Off.

Carlina acaulos magno flore c. B. &

Carlina caulescens magno flore EJUSD.

Carlina f. Leucacantha DODON.

Pempt. p. 726. & 27. &

Carlina altera EJUSDEM ibid.

Carlina caule unifloro HALL.

Histor. n. 183.

Carlina acaulos LINN. *Spec. pl.*

p. II. p. 1160.

Gall. Carline, Carline noire.

Germ. Eberswürz.

Ambæ varietates in montosis pascuis per Helvetiam frequentes sunt.

Usu: Radix saporis & odoris aromatici.

Vires Calefacientes, stomachicæ, carminativæ, sed nostris in oris vix nisi a Veterinariis adhibentur.

Carpobalsamum vide Opobalsamum.

Carthamus, Cnicus vulgaris Off.

Cnicus fativus sive Carthamus Officinarum c. B.

Cnicus vulgaris CLUS. *Hist. p. CI. II.*

Carthamus tinctorius LINN.

Spec. plant. T. I. p. 1163.

Gall. Cartame, Saffran bartard, Saffranon.

Germ. Safflor, wilder Saffran.

In Ægypto provenit & passim in Asia, Palatinatu &c. colitur.

Usu. Flores & Semen.

Vires. Flores diuretici sunt & incidentes. Semen ad drachmas duas in emulsione adsumtum purgat, & minori dosi diureticum est. Sed ambo hodie fere obsoleta.

Carvi, Carum, Cuminum pratense Off.

Carum pratense, Carvi Officinarum c. B.

Carum CAMER. *Epit. p. 516.*

HALL. *Hist. n. 789.*

Carum Carvi LINN. *Spec. pl.*

T. I. p. 378.

Gall. Carvi.

Germ. Wiesenkümmel, Kümmich.

In pratis ubique crescit.

Usu. Semen oblongum striatum, odoris & saporis grati, aromatici.

Vires

Vires calefacientes, stomachicæ, carminativæ.

Caryophyllata Off.

Caryophyllata vulgaris C. B.

Caryophyllata BLACKW. Tab. 253.

Geum foliis pinnatis, pinna ultima trilobata, floribus patulis, tubis aduncis HALL. *Hist.* n. 1130.

Geum urbanum LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 716.

Gall. Benotte, Benoite, Recife, Galiote.

Germ. Benediktenwurz.

Ad sepes & in umbrosis frequens.

Usu. Radix odoris debilis Caryophyllorum.

Vires adstringentes, roborantes, nervinæ. Adnumeratur etiam bezoardicis & aphrodisiacis medicamentis.

Caryophilli aromatici Off.

Gall. Cloux de Girofle.

Germ. Gewürz-Nelken oder Nägelein.

Sunt fructus immaturi calyce patente quadrifolio coronati Arboris quæ vocatur

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo C. B.

Caryophyllus aromaticus BLACKW. Tab. 338. LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 735.

In *Indiis* crescit.

Gratissimi odoris sunt hi fructus, saporis aromatici, fere ignei.

Vires. Ob calidissimum & acerrimum, quod continent, oleum valde calefaciunt, cardiaci sunt, cephalici, stomachici &c.

Fructuum maturorum superius sub titulo Antophyllorum mentionem fecimus.

Pars I.

Cascarilla, **Chacarilla** Off. **Rhcinoides Elæagni folio** CATESBY *Carolin.* T. II. p. 46. T. 46.

Clutia Eluteria LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1476.

Gall. Chaquerille.

Germ. Schakerille, Cascarille. In *Americæ* nonnullis provinciis crescit.

Usu. Cortex in tubos convolutus, compactus, coloris extus cinerei, intus fusci vel ferruginei, odoris balsamici, aromatici, saporis amari, acris.

Vires adstringentes, tonicæ, diaphoreticæ, antifebriles.

Cassia caryophyllata Off.

Caryophyllus aromaticus, fructu rotundo, **Caryophyllon** Plinii C. B.?

Caryophyllus aromaticus *Indiæ occidentalis*, foliis & fructu rotundis PLUCKN. *Almag.* p. 188. *Phytogr.* Tab. 155. fig. 3.

Myrtus caryophyllata LINN. *Spec. plant.* Tab. I. p. 675.

In *Americæ* nonnullis provinciis provenit & in *Insula Zeylon*.

Gall. Canelle geroflée.

Germ. Nelkenrinde, Nelkenzimmet.

Usu: Cortex in tubulos convolutus, ex fusco ferrugineus, odoris Caryophyllorum aromaticorum sed debilioris, saporis acris, aromatici.

Vires eadem quæ Caryophyllis, sed multo debiliores.

Cassia fistula Off.

Cassia fistula Alexandrina C. B. COMMEL. *Hort. Amst.* T. I. p. 215. Tab. 110.

Cassia fistularis BLACKW. T. 381.

L

Cassia

Cassia fistula LINN. *Spec. pl.*

T. I. p. 540.

Gall. Casse en bâton.

Germ. Cassienröhlein.

In *Ægypto* & *India* habitat.

Usu. Pulpa. Fructus nimirum five filiqua longissima, pedalis & ultra in plurimas cameras five loculaimenta transversa dividitur, quorum quodvis semen nitidum, compressum, continet pulpa circumdatum nigra, splendente, saporis dulcis, acriusculi.

Vires Lenitur alvum ducit, & refrigerat, atque demulcet.

Cassia lignea, *Xylo-Cassia* Off.

Cinamomum five *Canella malabarica* & *javanensis* C. B.

Cinamomum perpetuo florens, folio tenuiore, acuto BURM. *Zeylan.* pag. 63. Tab. 28.

Cassia lignea BLACKW. Tab. 391.

Laurus Cassia LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 528.

Gall. Casse.

Germ. Cassienrinde, Mutterzimmet.

In *India Orientali* crescit.

Usu. Cortex crassus, convolutus, colore, odore & sapore ad *Cinamomum* accedens, quo tamen debilior, lignosior & magis mucilaginosus est.

Vires debiliores, ceterum eadem quæ *Cinamomo*. A nonnullis in affectibus hystericis compescendis valde laudatur.

Castoreum Off.

Gall. Castoreum.

Germ. Bibergeil.

Ita vocantur folliculi glandulosi, membranacei, pingues, oleosi, magnitudine ovi gallinacei, coloris fusci, saporis acris, odo-

ris gravis, foetidi. Protuberant in regione inguinali statim sub cute Animalis quod vocatur

Castor GESN. &c.

Castor Fiber LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 78.

Gall. Castor.

Germ. Biber.

Habitat in *Europa* præsertim septentrionali, *Asia* & *America*.

Optimum habetur Castoreum quod ex *Russia* adfertur & *Canadensi* longe præfertur. Eligendum carnosum, ponderosum, odoris vehementis.

Vires. Calefaciens est medicamentum, aperiens, nervinum, in affectibus hystericis convulsivis sæpius præsentaneum remedium, inde etiam anodinum audit & sedativum.

Cataputia major, *Ricinus*, *Palma Christi* Off.

Ricinus vulgaris C. B.

Cataputia major & *Ricinus* BLACKW. Tab. 148.

Ricinus communis LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1430.

Gall. Ricin.

Germ. Wunderbaum, Semina vero Purgierkörner, Treibkörner.

In *Indiis* spontanea, arborea, perennis apud nos in hortis colitur aliquot pedum altitudine, herbacea, annua.

Usu. Semina oblonga, glabra, variegata, acria, amara.

Vires. Inter drastica remedia referenda, vehementer fursum & deorsum purgantia, ut cautissime, si unquam adhibenda sint.

Cataputia minor, *Lathyris* Off.

Lathyris Major C. B.

Cata-

Cataputia minor, Lathyris
BLACKW. Tab. 123.

Tithymalus foliis ellipticis,
stipulis umbellaribus qua-
ternis, petalis bicornibus
succiferis HALL. *Hist.* n. 1044.

Euphorbia Lathyris LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 655.

Gall. Epurge.

Germ. Springkörner, Treib-
körner.

In australiori *Helvetia*, *Gallia*, *Ita-*
lia &c. sponte provenit & in
hortis passim occurrit.

Usu. Semina rotunda, magni-
tudine pisi, glabra, acria.

Vires eadem, quæ Cataputiæ
majori.

Catechu, Terra Catechu,
Terra Japonica Off.

Gall. Cachou.

Germ. Japonische Erde.

Est succus condensatus, indura-
tus, resinofus, ex purpureo nig-
ricans, odoris expers, saporis
subadstringentis.

Exprimitur ex fructu modo dicen-
dæ arboris & folis calore in so-
lidam massam exsiccat. Arbor
vocatur

Palma cujus fructus sessilis
Fausel dicitur C. B.

Pinanga RUMPH. *Herb. Amboin.*
T. I. p. 26. Tab. 4.

Areca Catechu LINN. *Spec. pl.*
T. II. p. 1659.

Habitat in *India*.

Vires tonicæ, adstringentes. In
diarrhœis, dysenteria, lenteria,
fluore albo &c. sæpe cum fruc-
tu propinatur.

Catus sylvestris Off.

Felis Catus LINN. *Syst. Nat.*
T. I. p. 62.

Gall. Chat sauvage.

Germ. Wilde Katz.

In sylvis habitat.

Usu. Axungia.

Vires. Dicitur calefacere, articu-
lorum dolores mitigare. Sed
omnibus fere axungiis eadem
videntur esse vires, ut pleræ-
que ex officinis proferri pos-
sent.

Centaurium minus Off.

Centaurium minus C. B.
BLACKW. Tab. 452.

Gentiana caule dichotomo,
floribus infundibuliformi-
bus, striatis, quinquefidis
HALL. *Hist.* n. 648.

Gentiana Centaurium LINN.
Spec. plant. T. I. p. 332.

Gall. Petite Centaurée.

Germ. Tausendguldenkraut.

In pascuis & sterilibus montosis
frequens.

Usu. Herba & Summitates
cum floribus.

Amarissima est tota planta, mi-
nus tamen radix & flores quam
folia, ut non bene Summita-
tes cum floribus præferantur.

Vires roborantes, stomachicæ,
antiictericæ, emmenagogæ,
anthelminticæ. Decoctum pur-
gare nonnulli asserunt.

Centumnodia vide **Polygo-**
num.

Cepa Off.

Cepa vulgaris C. B.

Allium Cepa LINN. *Sp. pl.* T. I.
p. 431.

Gall. Oignon.

Germ. Zwiebel.

In hortis & agris ubique colitur.

Usu. Bulbus.

Vires. Subinde ad cataplasmiata
emollientia & discutientia cepa
assata adhibetur, notior ceterum
in culina, cum vulgatissimum
neque tamen omnibus accep-
tum sit ciborum condimentum.

Cera Off.

Gall. Cire.

Germ. Wachs.

Substantia est notissima, tenax, resinosa, oleosa, sui generis, qua apes in apiariis favos construunt. Saporis est suboleosi, odoris grati. Distinguitur in flavam & albam, quæ posterior frequenti aquæ adspersione & insolatione ex priori paratur.

Vires balsamicæ, resolventes, emollientes. Basis est plerorumque emplastrorum.

Cerasa acida Off.

Cerasa rubra BLACKW. Tab. 449.

Cerasus foliis glabris, ferratis, ovato lanceolatis, mucrone producto HALL. *Hist.* n. 1083.

Prunus Cerasus LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 679.

Gall. Cerises rouges aigres.

Germ. Saure Kirschen, Wiehslen, nostr. zahm-zweigte Kirschen.

In montis *Muteti* latere orientali & australi in pratis copiose crescunt & passim coluntur.

Usu. Fructus rubri, acidi grati saporis.

Vires refrigerantes. Requiruntur ad syrupum ceraforum acidorum gratissimum.

Cerasa nigra dulcia Off.

Cerasus sylvestris, fructu nigro & rubro c. B.

Cerasa nigra BLACKW. Tab. 425.

Cerasus foliis ovato-lanceolatis, ferratis, inferne subhirsutis, mucrone producto HALL. *Hist.* n. 1082.

Prunus avium LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 680.

Gall. Cerises noires.

Germ. Schwarze, wilde Kirschen.

In sylvis &c. ubique occurrunt.

Usu. Fructus notissimi, atropurpureascentes, dulces, grati; præferuntur ad medicos usus parvi, nigerrimi pedunculis rubentibus.

Vires. Refrigerant, temperant, sitim tollunt. Ex toto fructu cum nucleo contuso aqua destillatur frequentissimi apud nos usus in tussi, morbis infantum facile omnibus, in affectibus hysterics, &c. ut mulierculis nostris vera medicina polychresta sit.

Ceraforum Gummi Off.

Gall. Gomme de Cerisier.

Germ. Kirschen Gummi, Land-Gummi.

Substantia est gummosa, ex flavo rufescens, pellucida, odore carens, saporis mitis, mucilaginosi, ex modo dicta arbore exsudans.

Vires eadem quæ Gummi arabisco.

Cerefolium vide Chærefolium.

Cerussa alba Off.

Gall. Ceruse, Blanc de Plomb.

Germ. Bleyweiß.

Est calx plumbi aceto facta. Differt quoad colorem. Præfertur veneta.

Vires exsiccantes, adstringentes.

Cerussa citrina Off.

Gall. Ceruse jaune.

Germ. Bleygelb.

Est calx plumbi ad flavedinem calcinata.

Vires. Pictoribus inservit.

Cervi Cornu Off.

Gall. Corne de Cerf.

Germ. Hirschhorn.

Sunt

Sunt Cornua omnibus quoad externam formam nota Animalis, quod vocatur

Cervus GESN. ALDROVAND. &c.

Cervus Elaphus LINN. *Syst.*

Nat. T. I. p. 93.

Gall. Cerf.

Germ. Hirsch.

Sylvas inhabitat.

Vires. Ob gelatinam blandam, quam continet, temperat, demulcet, nutrit.

Prostant in officinis Cornu Cervi raspatum, tornatum, philosophice præparatum & ustum, quorum duo priora frequentissime ad ptisanas & gelatinas adque Coffeæ decoctum clarificandum adhibentur, posteriora, inprimis ultimum absorbentia sunt.

Cervi Priapus Off.

Gall. Priape de Cerf.

Germ. Hirschruthe.

Penis est modo dicti animalis.

Vires. Siccatus & in pulverem tritus commendatur in pleuritide, colica, diarrhoea, calculo & ad venerem stimulamdam. Nobis inusitatus.

Cervi Sebum, Cervinum Sebum Off.

Gall. Suif de Cerf.

Germ. Hirschenunschlitt.

Vires emollientes, lenientes & inprimis ad perniones laudatur.

Ceterach, Scolopendrium verum, Asplenium Off.

Ceterach Officinarum C. B.

Asplenium, Ceterach, Scolopendria BLACKW. T. 216.

Asplenium foliis pinnatis, pinnis in basi dilatatis, obtusis, subtus muscosis HALL. *Hist.* n. 1694.

Pars I.

Asplenium Ceterach LINN.

Sp. pl. T. II. p. 1538.

Gall. Ceterac.

Germ. Milztraut, Ceterach.

In rupibus & muris *Helvetiæ* passim reperitur.

Usu. Herba tota.

Vires ei adscribuntur lithontriptica, antiicterica; & inprimis splenis morbis mederi Veteres credebant. Refertur inter quinque herbas capillares, apud nos obsoletum.

Ceti sperma Off.

Gall. Blanc de Baleine.

Germ. Wallrath, nostr. Sperma Ceti.

Est substantia albissima, sicca, pinguis, squamosa, ex peculiari pingui liquore in ventriculis cerebri piscis mox dicendi indeque propriis vasis, per omnes partes corporis ductis contenta certis encheiresibus addito lixivio alcalino parata. Piscis hanc substantiam largiens vocatur

Cete CLUS. *Exot.* pag. 131.

Catodon fistula in cervice

ARTED. *Ichtyol.* p. 108.

Physeter macrocephalus

LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 107.

Gall. Baleine.

Germ. Walfisch.

In Oceano septentrionali habitat.

Vires abstergentes, lubricantes, demulcentes, emollientes, in urinæ difficultatibus, colicis feminarum doloribus a retentis mensibus vel lochiis, raucedine, tussi &c. Externe emollit, discutit.

Chærefolium, Cerefolium, Chærophyllum Off.

Chærophyllum fativum C. B.

Chærefolium BLACKW. Tab. 236.

M

Cere-

- Cerefolium**, foliis glabris, triplicato pinnatis, lobulis obtusis HALL. *Hist.* n. 747.
- Scandix Chærefolium** LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 368.
- Gall.* Cerfeuil.
- Germ.* Körfeilkrout, Körbelkrout.
- Abunde in hortis colitur & nunquam ad sepes sponte occurrit.
- Ufu*: Herba recens & Semen odoris & saporis acris, grati.
- Vires* diureticæ, aperientes. Jusculis medicatis vernali tempore consuetis plerumque additur & ad ciborum condimentum inque acetariis frequenter adhibetur.
- Chalybs** vide Ferrum.
- Chamædrys** Off.
- Chamædrys major repens** C. B. & minor repens EJUSD.
- Chamædrys Triffago** BLACKW. Tab. 180.
- Chamædrys** foliis firmis, ovatis, crenatis, verticillis paucifloris HALL. *Hist.* n. 286.
- Teucrium Chamædrys** LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 790.
- Gall.* Germandrée, petit Che-
ne,
- Germ.* Gamanderlein.
- Ad vias aridiores & in collibus siccis frequens.
- Ufu*. Folia saporis amari, subadstringentis, odoris debilis aromatici.
- Vires* stomachicæ, tonicæ, emmenagogæ. Laudatur etiam contra febres intermittentes, arthritidem, hydropem, vermes &c.
- Chamæpitys**, Iva arthritica Off.
- Chamæpitys lutea vulgaris** sive folio trifido C. B.
- Chamæpitys** CAMER. *Epit.* p. 679. BLACKW. Tab. 528.
- Bugula** foliis imis linearibus, caulinis trifidis HALL. *Hist.* n. 284.
- Teucrium Chamæpitys** LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 787.
- Gall.* Ivette.
- Germ.* Feldcypressen, Erdtiefer, Harzkrout.
- In agris lapidosis inter stipulas vulgaris.
- Ufu*. Tota herba odoris resinosi uti summitates pini, saporis amari, subacris.
- Vires* aperientes, sudoriferæ, antarthriticæ, antipodagricæ, emmenagogæ, vulnerariæ &c.
- Chamomilla foetida**, **Cotula foetida** Off.
- Chamæmelum foetidum** C. B.
- Cotula foetida** BLACKW. Tab. 67.
- Chamæmelum** foliis glabris, duplicato-pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, seminibus exasperatis HALL. *Hist.* n. 104.
- Anthemis Cotula** LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1261.
- Gall.* Maroute, Camomille fetide.
- Germ.* Rostkamillen, stinkende Chamillen.
- In agris, ad vias & fimeta occurrit.
- Ufu*. Flores odoris vehementis, ingrati.
- Vires* sudoriferæ, resolventes, antihystericæ &c. Sed hodie fere obsoleti sunt.
- Chamomilla romana**, nobilis Off.

Chamæ-

Chamæmelum nobile five
Leucanthemum odoratius
C. B.

Chamæmelum romanum
flore multiplici CAMER.
Epit. p. 646.

Chamæmelum foliis subhir-
sutis, nervo duro, pinnis
pinnatis, pinnulis lanceo-
latis incisfis HALL. *Hist.* n. 102.

Anthemis nobilis LINN. *Spec.*
plant. T. II. p. 1260.

Gall. Camomille romaine.

Germ. Römische Chamillen.

In hortis plerumque colitur & in
agris.

Usu. Flores pleni grate odorati,
apud nos valde usitati.

Vires anodinæ, carminativæ, an-
tispasmodicæ, antihystericæ.

Chamomilla vulgaris Off.

Chamæmelum vulgare five
Leucanthemum Dioscori-
dis C. B.

Chamæmelum BLACKW. Tab.
298.

Matricaria foliis planis,
capillaribus, duplicato
pinnatis, pinnulis lanceo-
latis, bifidis, trifidisque
HALL. *Hist.* n. 101.

Matricaria Chamomilla LINN.
Spec. pl. T. II. p. 1256.

Gall. Camomille.

Germ. Chamillen, Badblüm-
lein.

In agris pinguibus & subhumidis
passim frequentissima.

Usu. Flores odorati, notissimi.

Vires anodinæ, carminativæ, an-
tispasmodicæ, emmenagogæ,
sudoriferæ, antisepticæ. Inpri-
mis colicos dolores feminarum
a retentis vel segnius fluenti-
bus menstruis obortos egregie

leniunt. In febribus intermit-
tentibus multo cum fructu jam
sæpius præscripsi. Externe dis-
cutiunt, emolliunt.

Cheiri, Keiri Off.

Leucojum luteum vulgare
C. B. &

Leucojum luteum magno
flore EJUSD.

Keiri BLACKW. Tab. 179.

Leucojum foliis glabris, lan-
ceolatis, integerrimis HALL.
Hist. n. 443.

Cheiranthus Cheiri LINN. *Sp.*
plant. T. II. p. 924.

Gall. Giroflée jaune.

Germ. Gelbe Viole.

Ad moenia urbis nostræ muros-
que & in tectis vetustis passim
abunde provenit & in hortis u-
bique colitur. Floret Aprili,
Majo.

Usu. Flores lutei, fragrant.

Vires resolventes, aperientes, an-
tiictericæ, menses partumque
promoventes &c.

Chelidonium, Chelidonium
Majus Off.

Chelidonium majus vulgare
C. B.

Chelidonium BLACKW. Tab. 91.

Chelidonium lobis foliorum
subrotundis HALL. *Hist.* n.
1059.

Chelidonium majus LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 723.

Gall. Chelidoine, Eclair.

Germ. Schöllkraut.

Ad muros & maceries abundat.
Tota planta croceo succo turget
acri, odoris & saporis ingrati,
nauseosi.

Usu. Herba recens ejusque Suc-
cus & Radix.

Vires Herba recens in infuso theiformi & radix ad podagram, calculum, obstructions hepatis, icterum, cachexiam, chlorosin laudantur. Folia trita verrucis impofita eas auferre dicunt. Succus ad oculorum vitia commendatur, ob acrimoniam tamen multa aqua diluendus.

Chelidonium minus, Ficaria Off.

Chelidonia rotundifolia minor C. B.

Chelidonium minus BLACKW. Tab. 51.

Ficaria HALL. *Hist.* n. 1160.

Ranunculus Ficaria LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 774.

Gall. Petite Chelidoine, petite Eclaire, petite Scrophulaire.

Germ. Klein Schöllkraut, Feigwarzenkraut, Scharbockkraut.

In umbrosis & ad sepes vulgaris primo vere floret.

Ufu. Radix ingrati, subacris saporis, nostris officinis ignota.

Vires áperientes, antiscorbuticæ, etiam cœcarum hæmorrhoidum dolores extus ungenti sub forma applicata sedat.

Chermes vide Kermes.

China, Chinæ Radix Off.

China Radix C. B.

Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa Chinæ dicta KÆMPF. *Amœn. exot.* p. 781. ic. p. 782.

Smilax (China) caule aculeato, teretiufculo, foliis inermibus, ovato-cordatis, quinquenerviis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1459.

Gall. Esquine.

Germ. China = Wurzel.

Crescit in China, Japonia &c.

Ufu. Radix multiformis, oblonga, nodosa, extus fusca, intus ex albo purpurascens, vel etiam fusca, odoris nullius, saporis fatui, subviscidi, mox resinosa, durissima, ut cultro vix cedat, mox levis, spongiosa, facillime incidenda. Præfertur sed male levior, cum ponderosa & resinosa mihi quidem efficacior videatur.

Vires. Magnis laudibus a nonnullis extollitur in lymphæ vitiis corrigendis, scabie, lue venerea &c. ut non facile sanguinem depurans sic dictum decoctum præscribatur, quod non ingrediatur. Nondum vidi tantis encomiis effectum respondisse.

Datur & alia Chinæ radicis species nostris officinis equidem, quantum mihi constat, ignota, notior tamen alibi & inprimis in Anglia. Ipsa planta appellatur

China spuria nodosa C. B.

China BLACKW. Tab. 433.

Smilax virginiana, spinis innocuis armata, latis Cannelæ foliis, radice arundinacea, crassa, nodosa & carnosâ PLUKN. *Almag.* p.

349. *Phytogr.* Tab. 110. fig. 5.

Smilax (Pseudo China) caule inermi, tereti, foliis inermibus, caulinis cordatis, rameis ovali-oblongis, quinque nerviis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1461.

In Virginia, Jamaica &c. crescit viribusque cum præcedenti convenire dicitur.

China China, Chinchina, Kin-

Kinkina, Quinquina, Peruvianus Cortex Off.

Gall. Quinquina, Kinkina.

Germ. Kinkina, Chinarinde, Sierberrinde.

Est cortex in tubulos convolutus mediocris crassitie extus cinereus, scaber, sæpius Lichene albo obductus, intus ex fusco rufescens, odoris aromatici, ingrati, saporis adstringentis, amari. Arbor, unde defumitur, vocatur.

Arbor febrifuga peruviana, China Chinæ & Quinquina & Gannanaperide dicta RAJ. *Hist. pl. T. II.* p. 1796.

Quinquina CONDAMIN. *Æt.*

Paris 1738. p. 319. Edit. Holl.

Cinchona officinalis LINN. *Sp. pl. T. I.* p. 244.

In sylvis *Peruviae* inprimis circa *Loxa*. &c. crescit.

Vires. Celebratissimum est medicamentum, in quamplurimis morbis vere divinum. Sed nimis longum foret omnes, de quibus constat, salutare ejus effectus hic enumerare. Sufficiat breviter dixisse præstantius vix proflare remedium roborans, nervinum, antifebrile, antisepticum &c. hinc in omnibus morbis a nimia solidorum laxitate & debilitate, nervorum atonia, humorumque tenuitate vel putrida indole optime convenire. Propinatur in substantia, infuso aquoso vel vinoso, decocto & extracto.

Eligatur cortex aliquot lineas crassus, facile diffringendus, a ligno liberus, ex fusco rufescens, saporis balsamico-aromatici, leniter adstringentis.

Chrysocolla vide Viride tanum.

Cicer Off.

Pars I.

Cicer sativum c. B.

Cicer arietinum DODON. *Pempt.* p. 525.

Cicer foliis ferratis HALL. *Hist.* n. 399.

Cicer arietinum LINN. *Spec. plant. T. II.* p. 1040.

Gall. Pois chiches.

Germ. Kichern Erbsen.

In hortis & agris passim feritur calidiorum regionum incola.

Usu. Semina pisus majora, subrotundo-angulosa, extus rubra.

Vires. Decoctum in calculosis doloribus laudatur nec non ad expellendas variolas. Externe farina eorum catasplasmata emollientia & discutientia quandoque ingreditur. Nostris in oris rarior est eorum usus.

Cichorium, Cichorium sylvestre Cichoreum Off.

Cichorium sylvestre sive Officinarum c. B.

Cichorium sylvestre BLACKW. Tab. 183.

Cichorium foliis pinnatis, pinnis triangularibus, dentatis, floribus sessilibus HALL. *Hist.* n. 1.

Cichorium Intybus LINN. *Sp. plant. T. II.* p. 1142.

Gall. Chicorée sauvage.

Germ. Wegweisen, wilde Wegwart, Sündlaufwurz.

Ad vias & agrorum margines ubique.

Usu. Radix amara.

Vires saponaceæ, aperientes, resolventes, tonicæ, stoniachicæ.

Cichorium hortense vide Endivia.

Cicuta Off.

Cicuta major c. B.

Cicuta BLACKW. Tab. 451. N STOERCK.

STOERCK. in propr. libello c.
bon. icone. HALL. *Hist.* n. 766.

Conium maculatum LINN.

Spec. plant. T. I. p. 349.

Gall. Ciguë.

Germ. Schirling.

In ruderosis, ad vias & agros
passim frequens.

Tota planta inprimis trita ingratum
tetrum odorem spargit.

Usu. Herba recens & ficcata, Suc-
cus ex tota planta expressus.

Vires. Venenata est planta ut o-
lim passim inter publica suppli-
cia locum invenerit, anxietates,
cardialgias, vertigines, con-
vulsiones &c. inducens. Ex-
terne tamen in scrophulosis scir-
rhosis & cancris glandularum
tumoribus cataplasmatibus vel fo-
menti forma applicata haud raro
proluit. Sed & internum ejus
usum innocuum, imo in quam-
plurimis morbis salutarem esse
Cl. STOERCK autor est aliique ejus
vestigia secuti. Qui brevem &
accuratam omnium Cicutæ in-
terne & externe adhibitæ effe-
ctuum enumerationem desiderat,
adeat ILL. HALL. *Hist. Stirp. Hel-
vet.* locum supra citatum. Sum-
matim Cicutæ succus in extra-
cti consistentiam inspissatus lau-
datur in induratis malis, scir-
rhosis tumoribus, scrophulis,
cancro, fistulis, sinibus, an-
tiquis ulceribus, incipiente ca-
taracta, gangræna, rheumatif-
mis, arthritide, podagricis to-
phis &c.

Sed omnes hosce admirandos
effectus, si paucos haud mag-
ni momenti scrophulosos tumo-
res resolutos exceperis, nostris
in oris summa licet cum cu-
ra ex succo recenti paratum
Cicutæ extractum nescio quo fa-
to edere recusat, licet non
negaverim passim sed rarius in
officinis ex incuria vel ignoran-
tia alias plantas cicutæ loco sum-
tas fuisse v. g. Cicutam mino-
rem, Myrrhidem sylvestrem se-

minibus lævibus &c. a qua po-
steriori planta alias simillima
maculis in inferiori caulis parte
rubicundis & foetido odore di-
stinguitur.

Plerumque si inutiliter etiam in-
nocenter adhibitum fuit. Vidi
tamen quandoque sed rarissime
appetitum prostratum, cardial-
giam, syncopen, vertiginem
inde ortas.

Quomodo unum idemque reme-
dium eodem modo paratum
pro diversitate regionis mox
stupendos & saluberrimos effe-
ctus edat mox omni fere vir-
tute destitutum sit alii dijudi-
cent.

**Cina, Cyna, Semen Zedoa-
riæ, Semen sanctum, Se-
men Santonici, Semen
contra Off.**

Gall. Barbotine, Sementine.

Germ. Wurmsaamen, Zittwer-
saamen.

Sub hoc nomine diversæ seminum
species in Officinis prostant,
ob parvitatem & copiam fordi-
um, quibus permixtæ sunt
vix rite distinguendæ. Præfe-
rendum tamen, quod forti bal-
samico & aromatico odore &
sapore valde amaro gaudet.

Planta hocce semen ferens credi-
tur esse

**Absinthium Santonicum
Alexandrinum C. B.**

Semen Sanctum LOBEL. *Icon.*
p. 756.

Artemisia Santonicum LINN.

Spec. plant. T. II p. 1185.

In *Persia, Tataria* &c. provenit.
Vires anthelminticæ notissimæ &
probata, ut ad enecandos lum-
bricos vix melius notum sit re-
medium.

**Cinamomum, Cinnamo-
mum Off.**

Gall. Canelle fine.

Germ.

Germ. Zimmet, Canell.

Est cortex tenuis, cannulatus, ex fusco rubescens, saporis acris, dulcis, gratissimi, odoris fragrantis.

Arbor unde colligitur vocatur Cinamomum five Canella Zeylanica c. B.

Cassia cinamomea HERMANN.
Hort. Lugd. bat.

Cinamomum foliis latis, ovatis, frugiferum BURMANN. *Thef. Zeylan.* pag. 62. Tab. 27.

Laurus Cinnamomum LINN.
Spec. pl. T. I. p. 528.

Crescit in Zeylon Insula.

Vires calefacientes, roborantes, analepticae non satis deprædicandæ.

Cinnabaris nativa Off.

Hydrargyrum sulfure mineralisatum, minera rubra WALLER. *Mineral.* pag. 285.

Hydrargyrum Cinnabaris LINN. *Syst. Nat. T. III.* pag. 119.

Gall. Cinnabre mineral.

Germ. Bergzinner.

Minera est ex mercurio & sulphure constans, rubra, ponderosa, striata, friabilis.

Eligenda ad internum usum, quæ granulata est & antea sublimatione probe depuranda.

Reperitur in fodinis Hungariæ, Idriæ, Germaniæ &c.

Vires. Ad varios morbos Veteres commendarunt, & hodierno adhuc die contra epilepsiam & morbos convulsivos a nonnullis laudatur, quæ tamen vires ei ab aliis prorsus denegantur. Factitia, quæ pulverisata ex Hollandia adfertur, Minio tantum non semper adulterata nonnisi pictoribus inservit.

Cinamomum vide Cinamomum.

Citrullus Off.

Anguria Citrullus dicta c. B.

Citrullus Anguria BLACKW. *T. 157.*

Cucurbita Citrullus LINN. *Sp. pl. T. II. p. 1435.*

Gall. Citrouille.

Germ. Citrulle, Wassermelone, Angurie.

In calidioribus regionibus copiose colitur.

Usu. Semina.

Vires refrigerantes, demulcentes, diureticae. In emulsionibus adhibentur & inter quatuor semina frigida majora referuntur.

Citrus Off.

Malus medica c. B.

Citria malus BLACKW. Tab. 361.

Citrus medica LINN. *Spec. pl. T. II. p. 1100.*

Gall. Citronier.

Germ. Citronenbaum.

Copiosissime crescit & colitur in meridionali Europa, Oriente &c.

Usu. Succus fructuum, Cortex eorum & Semen.

Vires. Succus acidus gratus refrigerat, reficit, sitim egregie extinguit, antisepticus & in acutis morbis, scorbuto &c. utilissimus. In tinctoria arte etiam notus. Cortex grate amarus est, odoris fragrantis, stomachicus, roborans. Semen amarum anthelminticum audit & alexipharmacum, nobis inusitatum.

Cobaltum, Cadmia nativa, Off.

Cobaltum arsenico mineralisatum, minera difformi, granulis colore plumbeo micantibus WALLER. *Miner.* p. 300.

Cobaltum arsenicale LINN. *Syst. nat.* T. III. p. 129.

Gall. Cobalt, Cadmie, Calamine de Berry.

Germ. Kobalt, Kobold, Fliegenstein, Muckengift.

Minera hæc arsenicalis ex denominatione satis dignoscenda passim ex fodinis Germaniæ &c. eruitur.

Vires. Nonnisi ad enecandas muscas apud nos adhibetur.

Coccinella Off.

Coccinella Cacti LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 584.

Figura extat in MERIAN. *Ins. Surinam* pag. 2. Tab. 2.

Gall. Cochenille.

Germ. Cochenille, Coccinell.

Insectum est ovatum, hinc planum, inde compressum, transverse rugosum, lentis minoris magnitudine, extus ex cinereo cœrulescens, tritum purpureum. In America plurimum passim reperitur *Ficui Indicæ sive Opuntia* copiose inhærens.

Vires ei adtribuuntur cardiacæ, resolventes, diureticæ, alexipharmacæ. Sed vix apud nos nisi ob colorem idque rarissime præscribitur, in tinctoria arte notissimum.

Coccognidium, Cocca Gnidia, Grana Gnidia, Laureola, Mezereum, Chamelæa Off.

Sub hoc nomine tres plantæ plerumque intelliguntur, nempe primo

Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina C. B.

Daphnoides CAMER. *Epit.* pag. 937.

Thymelæa spica cylindrica, superne foliosa HALL. *Hist.* n. 1024.

Daphne Mezereum LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 509.

Gall. Mezereon, Bois gentil, Germ. Zylandt, Kellerhals, Seidenblast.

Crescit in omnibus fylvis & mense Februario, Martio floret.

Secundo

Thymelæa sempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas C. B.

Laureola DODON. *Pempt.* p. 365. BLACKW. Tab. 62.

Thymelæa foliis ellipticis, perennantibus, floribus ex alis nutantibus HALL. *Hist.* n. 1025.

Daphne Laureola LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 510.

Gall. Laureole.

Germ. Uti præcedens.

Reperitur in montanis supra *Muttenz, Mænchenstein, Gempen* &c. Floret Februario, Martio &c.

Tertio denique

Thymelæa foliis lini C. B.

Thymelæa CAMER. *Epit.* pag. 974.

Daphne Gnidium LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 511.

Gall. Garou.

Germ.

Reperitur in Gallia, Hispania, Italia.

Conveniunt omnes indole & viribus, ut absque magno errore altera alteri substitui possit. Nobis prima species usualis est. Acerimo & urente sapore præditæ sunt, non statim sese manifestante. Odor florum prioris speciei gratus sed dolorem capitis, imo syncopen faciens.

Usu. Cortex, Baccæ.

Vires. Ob summam acrimoniâ inter drastica referenda, sursum & deorsum cum summa vi purgantia, ut omnino in tanta abundantia securiorum remediorum melius a talibus abstineatur.

tur. Apud nos baccae saepius a Doliariis sub nomine *Esigbeer* ren expetuntur, qui aceto ex debili & aquoso vino facto acorem inde conciliant.

Cocculi Indici, Cocculæ orientales Off.

Gall. Coques de Levant.

Germ. Cocculi, Kockelkörner, Fischkörner, nostr. Kuselbeere, Kuselum.

Sunt fructus rotundi, fusci, rugosi, magnitudine baccarum lauri. *Arbor* eos ferens appellatur.

Cocculus officinarum C. B.

Arbor Aristolochiae foliis maderaspatana, fructu parvo medicæ adinstar convoluto *PLUKN. Almag. p. 43.*

Phytogr. Tab. 13. fig. 2.

Natsjatum BLACKW. Tab. 389.

Menispermum Cocculus

LINN. Spec. pl. T. II. p. 1468.

Habitat in India.

Vires venenatae. Nonnisi ad pediculos enecandos & capiendos pisces inserviunt.

Cochlearia Off.

Cochlearia folio subrotundo C. B.

Cochlearia batava BLACKW. Tab. 227.

Nasturtium foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis, subsinuatis HALL. Hist. n. 503.

Cochlearia officinalis LINN. Spec. pl. T. II. p. 903.

Gall. Herbe aux cuilliers.

Germ. Löffelkraut.

In hortis colitur.

Usu. Herba recens.

Vires antiscorbuticæ notissimæ, diureticæ.

Coffee, Caffee Off.

Pars I.

Gall. Caffé, Coffé.

Germ. Kaffee, Coffeebohnen.

Ita vocantur nuclei sive semina oblonga, semiovalia, hinc nempe convexa, inde plana & sulco sive rima per medium longitudinaliter decurrente notata, quorum semper duo in molli, dulci & mucilaginosa pulpa fructus sive baccae subrotundæ, magnitudinis cerasi minoris, rubræ, purpureæ, vel violaceæ continentur. Pro variis, ubi crescunt vel coluntur, regionibus, magnitudine, colore, sapore & odore differunt, varias inde denominationes sortiuntur & diverso pretio veneunt. Optima censentur sub titulo Caffæ levanticæ nota. Bonæ indolis semina sunt parva, ponderosa, ex viridescenti flava, multis fordibus permixta, sicca, in aqua fundum petentia, odoris grati, saporis viscosi.

Licet varia, uti jam diximus, ratione differant hæc semina, ab una tamen eademque arboris specie veniunt, quæ vocatur

BON ALPIN. Plant. Egypt. p. 36. c. ic.

Evonimo similis Ægyptiaca, fructu baccis Lauri simili C. B.

Jasminum arabicum Lauri folio, cujus semen apud nos Coffé dicitur JUSSIEU Act. Paris. 1713. p. 292. T. 7.

Coffee BLACKW. Tab. 337.

Coffea arabica LINN. Sp. plant. T. I. p. 245.

Vera hujus Arbusculæ patria est Arabia felix, Insula Bourbon & Æthiopie pars. Plurima colitur in insulis Java, Martinique, St. Dominge &c. Optimæ semina advehuntur ex Arabia.

Vires. Infusum vel decoctum torum Coffæ seminum vulga-

O

tissi

tissimum hodie est potulenti genus a regibus ad plebem usque in deliciis habitum. Modice assumtum leniter calefacit, stomachicum est, animum exhilarat, alvum aperit, urinam promovet, frigidis & phlegmaticis corporibus salubre. Immodicus vero ejus usus utique nocet, sanguinem nimis commovet, nervos afficit, ut tremores artuum, anxietates, agrypnia &c. inde oriantur. Abstineant ab eo inprimis macilenti, cholerici, plethorici, atrabilarii, hemorrhoidibus aliisque hæmorrhagiis obnoxii.

Colchicum Off.

Colchicum commune c. B.

Colchicum FUCHS. *Hist.* p. 356.

357. STOERCK. in propr. libello.

Colchicum flore folium longe præcedente, petalis ovatis HALL. *Hist.* n. 1255.

Colchicum autumnale LINN.

Spec. pl. T. I. p. 485.

Gall. Colchique.

Germ. Zeitlosen, Winterblumen, Herbstblumen, nostr. etiam Rubpuppen.

In pratis autumnno fere ubique.

Usu. Radix variis temporibus eruta mihi semper insipida omnisque acrimoniæ expers visa est, alii vero eam acrem faciunt, imo causticam.

Vires. Inter acerrimas & venenatas plantas nonnulli retulerunt, ut ventriculum inflammaret, alvi dejectiones copiosissimas ad mortem usque, vomitus horrendos aliaque funesta symptomata produxerit. Etiam animalia hac radice pasta passim interiisse legimus.

Dein ILL. STOERCK pro suo plantas suspectas & venenatas in medicos usus convertendi studio etiam in Colchici vires inquisivit oxymelque inde confec-

tum in hydropo pectoris & ascite inque asthmate utilissimum reperit.

Hæc omnia ab aliis negantur, inersque radix & absque omni effectu data dicitur, & omnino etiam in nostra urbe non semel Oxymel Colchici, sed, ut verum fatear, hætenus inutiliter adhibitum est.

Colocynthis Off.

Colocynthis fructu rotundo major c. B.

Colocynthis BLACKW. T. 441.

Cucumis Colocynthis LINN.

Spec. plant. T. II. p. 1435.

Gall. Coloquinte.

Germ. Coloquinte.

In Turcia provenit.

Usu. Poma & Semina, ambo amarissima, acria.

Vires. Pulpa pomorum spongiosa inter drastica haud infimum tenet locum ad flagitium usque sursum & deorsum purgans, ut nonnisi minima dosi aliis lenioribus permixta exhiberi debeat. Ob summam amaritiam inter præcipua anthelmintica refertur. Semen, quod copiosum in pulpa residet, obsoletum est.

Colophonia, Colophonium

Gall. Colophone, Bray sec.

Germ. Colophonium, Geigenharz.

Est resina Abietis coctione in substantiam siccam, duram, friabilem, semipellucidam, ex flavo rubicundam indurata. Plerumque ex residuo olei Terebinthinæ conficitur.

Vires roborantes, siccantes. Emplastra varia ingreditur & fumus ejus tenesmo, prolapsui ani & uteri procidentiae mederi dicitur.

Colubrina vide Bistorta.

Colubrinum Lignum Off.

Cle.

Clematis spinosa foliis luteis

C. B.

Modira-caniram RHEEDE *Hort.*

Malab. Tom. VII. pag. 10.

Tab. 5.

Strychnos Colubrina LINN.

Spec. plant. T. I. p. 271.

Crescit in *India*.

Usu. Radix sub nomine Ligni, dura, spongiosa, saporis acris, amarissimi.

Vires. Contra serpentum morsum, febres intermittentes, vermes &c. decoctum ejus laudatur. Aliis ob affinitatem cum nuce vomica usus ejus suspectus est.

Consolida major, *Symphytum* Off.

Symphytum Consolida major C. B. BLACKW. Tab. 252.

Symphytum foliis ovato lanceolatis, decurrentibus HALL. *Hist.* n. 600.

Symphytum officinale LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 195.

Gall. Grande Consoude.

Germ. Wallwurz, Schwarzwurz.

In pratis humidis & ad rivulos frequens est albo & rubro flore.

Usu: Radix nigra, magna, inodora, saporis mucilaginosi, fatui.

Vires consolidantes, adstringentes.

Consolida media, *Bugula* Off.

Consolida media pratensis purpurea & cœrulea C. B.

Consolida media BLACKW. T. 64.

Bugula foliis ovatis, dentatis, flagellis reptans HALL. *Hist.* n. 282.

Ajuga reptans LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 785.

Gall. Bugle.

Germ. Gulden Bünzel, gulden Wundkraut.

In pratis & ad vias abundat; floret Aprili, Majo.

Usu. Herba amari, subadstringentis saporis, apud nos non usitata.

Vires detergentes, adstringentes, vulnerariæ.

Consolida regalis vide *Calcatrippa*.

Consolida farracenica, *Solidago*, *Virga aurea* Off.

Virga aurea, angustifolia, ferrata C. B.

Solidago farracenica FUCHS. IOH. BAUH. *Hist. pl.* Tom. II. p. 1062.

Senecio foliis lanceolatis, ferratis, glabris, floribus umbellatis HALL. *Hist.* n. 65.

Senecio farracenicus LINN. *Spec. pl.* T. II. pag. 1221.

Gall. Verge d'or.

Germ. Seydnisch Wundkraut. In sylvis montanis totius Helvetiæ provenit.

Usu. Folia.

Vires vulnerariæ, adstringentes, lithiontripticæ.

Cum hæc planta non ubique sponte proveniat, sæpius ei sequens substituitur

Virga aurea latifolia ferrata C. B.

Virga aurea vulgaris latifolia JOH. BAUH. *Hist. pl.* T. II. p. 1062.

Solidago caule anguloso, hirsuto, foliis ovato lanceolatis, dentatis, racemis multifloris, congestis HALL. *Hist.* n. 69.

Solidago Virgaurea LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1235.

In sylvis ubique.

Viribus cum præcedente convenit.

Contrayerva Off.

Cyperus longus odoratus peruanus C. B.

Drakena Radix CLUS. *Exot.* p. 83.

Dorstenia Contrayerva LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 176.

Gall. Contrayerva.

Germ. Contrayerve, Peruvianische Bittwurzel.

Crescit passim in *America*.

Usu. Radix longa, tenuis, nodosa, fibrosa, extus ex fusco obscure rubra, intus pallida, odoris debilis, aromatici, saporis subacris, leniter adstringentis.

Vires alexipharmacæ, roborantes.

In febribus malignis, & intermittentibus, inque dysenteria inprimis commendatur.

Copaivæ Balsamus vide Balsamus **Copaivæ**.

Copal Gummi Off.

Gall. Copal.

Germ. Gummi Copal.

Substantia est resinosa, dura, pelliculosa, ex albo flavescens, odorata. Arbor seu Frutex, unde defluit, vocatur

Rhus virginianum Lentisci foliis RAJ. *Hist. plant.* T. II. p. 1799.

Rhus obsoniorum similis americana, gummi candidum fundens, non ferrata, foliorum rachi medio alata PLUKN. *Almag.* p. 318.

Phytogr. Tab. 56. fig. 1.

Rhus Copallinum LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 381.

In *America septentrionali* crescit.

Vires. Nonnisi in suffimentis quandoque adhibetur discutiendi &

roborandi scopo. Præcipue autem solida & nitidissima inde vernix conficitur.

Corallia alba, Corallium album Off.

Corallium album oculatum officinarum JOH. BAUH. *Hist. plant.* T. III. p. 805.

Corallium verum album, Corallium officinarum BLACKW. Tab. 342.

Madrepora oculata LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 1281.

Gall. Corail blanc.

Germ. Weiße Corallen.

Inter Lithophyta numerandum in *Oceano Indico* occurrens.

Vires mere absorbentes.

Corallia rubra, Corallium rubrum Off.

Corallium rubrum C. B. BLACKW. Tab. 341. a & b.

Isis Asteria LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 1288.

Gall. Corail rouge.

Germ. Rothe Corallen, Corallen - Sinken.

In *Mari mediterraneo* reperitur.

Perinde ac præcedens inter Lithophyta recensendum.

Vire eadem quæ præcedentis. A quamplurimis Medicis tanquam adstringens in diarrhœis, dysenteria, hæmorrhagiis &c. laudatur.

Corallina, Muscus Corallinus Off.

Muscus marinus, sive Corallina officinarum C. B.

Corallina altera TABERN. *Icon.* p. 813.

Corallina officinalis LINN. *Syst. Nat.* T. I. pag. 1305.

Gall. Coralline, Mouffe marine.

Germ.

Germ. Meer-Mooß.

Zoophyton est in *Mari Anglico & mediterraneo* obvium, conservæ arboreæ simile, falsum, amarum.

Vires. Anthelminticis medicamentis optimo jure adnumeratur.

Coriandrum Off.

Coriandrum majus c. B.

Coriandrum BLACKW. Tab. 176.

Coriandrum fructibus globosis HALL. *Hist.* n. 764.

Coriandrum fativum LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 367.

Gall. Coriandre.

Germ. Coriander.

In *Italia* spontaneum passim apud nos a rusticis in hortis & vineis colitur.

Tota planta recens inprimis vero femina detestandum cimum odorem spirant, digitos contactu inficientem, ut vix ablui possit.

Usu Semina subrotunda, striata, recentia foetidissima, gratum, per siccitatem, odorem contrahunt, saporem vero aromaticum, acrem.

Vires stomachicæ, roborantes, carminativæ, anthelminticæ? Memoriam etiam augere & vertigini mederi dicunt. In culinis notum ciborum condimentum.

Costus amarus nostrarum Officinarum, alias arabicus sive verus Off.

Costus arabicus c. B. LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 2.

Costus amarus & dulcis BLACKW. Tab. 394.

Gall. Costus arabique, amer.

Germ. Bitter Costus = Wurzel, bitterer Costus, Arabischer Costus.

In utraque *India* crescit.

Usu. Radix longa, satis crassa, extus flavicans vel cinerea, in-

Pars I.

tus albescens, odoris grati ad radicis Iridis florentinæ odorem accedentis, saporis aromatici, acris, amaricantis.

Vires ipsi tribuuntur eadem, quæ Galangæ, calefacientes, roborantes, nervinæ &c.

Costus corticosus vide Winteranus Cortex spurius.

Costus dulcis Off.

Sub hoc nomine in officinis nostris cortex prostat a Canella alba sive cortice Winterano spurio prorsus non diversus.

Quæ vero apud veteres scriptores sub hoc nomine describitur radix recentiorum autorum consensu ab amaro sive arabico Costo vere non differt.

Cranium humanum Off.

Gall. Crane humain.

Germ. Menschen-Sirnschale.

Vires olim ipsi tribuebantur antiepilepticæ & antispasmodicæ, sed ex mera superstitione. Optimum foret si plane ex foro medico proscriberetur.

Crassula vide Telephium.

Creta alba Off.

Creta cohærens solida WALKER. *Mineral.* §. 10. n. 1.

Calx Creta LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 206.

Gall. Craye blanche.

Germ. Kreide, weisse Kreide.

Olim ex insula *Creta* afferebatur, hinc & Terra Cretica dicta, nunc in variis regionibus *Galliæ, Angliæ, Germaniæ* reperitur. Celebratur præ aliis Colonienfis.

Est substantia terrea, sicca, farinosa, cum acidis effervescens, linguæ promte adhærens, nec adstringens.

Vires. Acidum absorbet, hinc in ardore ventriculi soda dicta plurimum celebratur, tum & in dysuria ab urinæ acrimonia, sed

P

cau-

cautus sit ejus usus internus, quod cum tenaci ventriculi mucosum facile in pastam concreascit. Externe ulcera humida ficit, & quandoque pulveribus ad erysipelas admiscetur.

Crocus Off.

Crocus BLACKW. Tab. 144.

Crocus sativus C. B.

Crocus autumnalis sativus

MORIS. *Hist. Ox.* T. II. pag. 335. Sect. 4. T. 2. fig. 1.

Crocus spatha univalvi radicali, corallæ tubo longissimo LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 50.

Sed conjungitur cum Croco spontaneo verno, a quo tamen manifeste differt, tuba profunde trifida, in tria longa segmenta divisa, quorum finis æque trifidus est, uti tota tuba spontanei verni Croci. Flos multo major. Deinde hæc tria tubæ cornua odorata sunt, & aromatica, non ita vero ea spontanei HALL. *Hist.* n. 1257.

Gall. Safran.

Germ. Safran.

In variis locis Gallie, Austriae, in Oriente &c. colitur, olim & frequens Basileæ ejus cultura erat, hodie amplius nulla.

Usu. Cornua illa tubæ odorata, rufopunicea, odore peculiari, acris, aromatico, subtili, sapore amariusculo prædita.

Vires. Ad spiritus animales excitandos adhibetur; minori dosi exhilarat, majori sensus omnes sopit, fere uti vinum & opium. Calidum remedium, sudores & menses pellit, exanthematum eruptionem promovet, dolores & spasmos sopit, ad tussim mitigandam confert, putredinem potenter arcet, urinam rubro colore inficit. A populis quam plurimis pro optimo ciborum condimento habetur. Sed & solus nimius Croci odor capi-

tis gravitatem & soporem producit, & cives Basileenses olim ex nimia dosi Croci cum vino permixta risu involuntario affectos fuisse observatum est.

Cristallus, & CrySTALLUS montana Off.

Cristallus hexagona non colorata WALL. *Mineral.* §. 54. n. 1.

Nitrum CrySTALLUS montana LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 84.

Gall. Cristal, Cristal de Roche.

Germ. Crystall, Bergcrystall.

In variis fodinis, præsertim montibus Helvetiæ reperitur.

Est Gemma mollis, translucida, aquam in glaciem congelatam referens; figura columnam hexagonam utrinque acuminatam plerumque refert.

Vires olim ipsi attribuebantur abforbentes, adstringentes, quin & lithontripticæ, & ad diarrhoeas, fluorem album mulierum, ad lac augendum, quin & calculum adhibebatur. Sed grossiuscule contrita vulnerat, in pollinem redacta equidem innocua sed exiguae virtutis est. Ad pulveres dentifricos adhibetur, sed facile eburneam dentium laminam deterere potest.

Cubebæ Off.

Gall. Cubebes.

Germ. Cubeben, Schwindelförner.

Sunt fructus seu grana exsiccata, sphaerica, Piperis magnitudine vel paulo majora, pedunculo tenui infidentia; corticem habent e cinereo fuscum, rugosum; pericarpium tenue, fragile, unicapulare, semen includit subrotundum, extus nigricans, intus albidum. Sapore sunt suavi, acris, aromatico, copiosam salivam eliciente, odore fragrante.

Ex

Ex insula *Java* Indiae orientalis ad nos afferuntur. Planta vero ipsa, quæ hos fructus profert, hactenus incognita est & an *Piperis* congenera sit, dubitatur. Vocatur

**Cubebæ vulgares nec Arabum Cubebæ, nec Gale-
ni Carpesium** C. B. *pin.* p. 412. Dicuntur a Javanensibus nunquam nisi prius aqua decoctæ divendi, ne apud exteros quoque plantentur.

Arbor Bisnagarica Myrti amplioribus foliis, perficcitatem nigris, Cubebæ sapore **PLUCKN. Phytogr. Tab.** 140.

Cubeba (an Piperis species)? **LINN. Mat. med.** p. 185.

Vires. Aromaticæ sunt, calefaciunt, fibras relaxatas roborant, nervos stimulant, hinc ad mukum lentum incidendum, flatus discutiendos, & specificè contra vertiginem, tum & apoplexiam, paralylin, memoriæ imbecillitatem commendantur.

Cucumis asininus, sylvestris, agrestis Off.

Cucumis sylvestris, asininus dictus. C. B.

Cucumis agrestis, asininus **BLACKW. Tab.** 108.

Momordica Elaterium **LINN. Spec. plant. T. II. p.** 1434.

Gall. Concombre sauvage.

Germ. Eselskürbse.

Planta est cucurbitacea, in *Italia*, *Sicilia* sponte crescens, apud nos in hortis colitur.

Usu: Radix quæ ut tota planta valde amara est, & *Fructus* qui exiguus, hirsutus, quando maturus est leniter attactus semina cum impetu expellit, inde *Elaterium* græcis dictus. Ex

hujus succo expresso & inspissato paratur *Elaterium*.

Vires. Radicis succus vel & infusum vehementer purgat, in hydropè quandoque exhibetur; Externe ad tumores duos emolliendos, & scirrhus resolvendos, & in collutione oris ad dentium dolores commendatur. *Elaterii vires* vid. *Part. II. p.* 59.

Cucumis vulgaris Off.

Cucumis fativus vulgaris C. B.

Cucumis fativus **LINN. Spec. pl. T. II. p.** 1437. **BLACKW. Tab.** 4.

Gall. Concombre.

Germ. Gurken, Cucumern.

Colitur in hortis & agris.

Usu: Fructus carne firma, translucida, succosa valde gaudens, & **Semen.**

Vires: Fructus crudi vel cocti in cibum recipiuntur. Jusculis incocti sanguinem nimis acrem aut dissolutum corrigere valent, hinc in febribus, etiam hecticis ex ulcere pulmonum feliciter fuerunt exhibiti: Semina inter quatuor frigida majora referuntur, & scopo refrigerandi, demulcendi, in febribus, nephritide, urinæ ardore emulsionem ingrediuntur.

Cuminum, Cyminum Off.

Cuminum semine longiore C. B.

Fœniculum orientale, Cuminum dictum **TOURN. I. R. H. p.** 312.

Cuminum, Cyminum **LINN. Spec. plant. T. I. p.** 365.

Gall. Cumin.

Germ. Römischer Kümmel, Langer Kümmel.

Umbellifera est planta, in *Ægypto*

to & *Æthiopia* spontanea ; in *Melita* insula copiose feritur.

Usu : Semen oblongum , angustum , striatum , e cinereo spadiceum , ad tres lineas longum , saporis acris , aromatici , haud grati , odoris valde gravis & vehementis.

Vires. Referuntur inter semina quatuor calida majora, attenuant, resolvunt, calefaciunt, hinc ubi nimius mucus in corpore peccat, in colica flatulenta, tympanitide , asthmate glutinoso &c. commendantur ; tum & externe in fomento, cataplasmate , tumoribus aquosis scroti, ad lac discutiendum adhibentur.

Cupressus herba, vid. *Abrotanum femina*.

Cupressus Off.

Cupressus c. B.

Cupressus mas BLACKW. Tab. 127.

Cupressus sempervirens LINN. *Spec. plant.* T. II. pag. 1422.

Gall. Cypres.

Germ. Cypressenbaum.

Arbor est conifera resinam fundens in *Creta* sponte crescens, alibi in hortis culta.

Usu. Fructus seu Nuces subrotundæ , confragosæ , sapore acerbæ , ætate in plura clavata tubera dehiscentes, inter quorum commissuras semina continentur rufa, oblonga ; & Lignum solidum, pallidum, atro-rubescens, suaviter odoratum.

Vires. Nuces præcipue sed & Lignum vi adstringente eximia scatent, & eo scopo in alvi fluxu, hæmorrhagiis, gonorrhœa, fluore albo mulierum tam interne quam externe, tum in pulvere, tum in infuso sive decocto adhiberi solent. Insuper vis febrifuga iis tribuitur.

Cuprum, Aes, Venus Off.

WALLER. *Mineral.* p. 353.

Cuprum LINN. *Syst. nat.* T. III. p. 143. & omn. Aut.

Gall. Cuivre.

Germ. Kupfer.

Metallum est notum , durum, coloris rubri, splendentis, ab ære vel aqua æruginem contrahens , ex variis suis mineris passim obviis excoctum , vel nativum.

Vires. Intus sumtum sursum. & deorsum purgat cum violentia, ut inter fortissima drastica referendum sit cautissime adhibenda. Singularem tamen ei vim antepilepticam nonnulli adscribunt. Varia inde composita in altera parte occurrent.

Curcuma seu Terra merita Off.

Curcuma radice longa HERMAN. *Hort. Lugdb.* p. 208. & 209.

Curcuma BLACKW. Tab. 396.

Manjella - Kua Hort. *Malabar.* Tom. XI. p. 21. Tab. II.

Curcuma longa LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 3.

Gall. Souchet des Indes , ou Saffran des Indes.

Germ. Gilbwurzel, Gelbsücht wurzel, gelber Ingwer, Curcuma.

Ex *India orientali* ad nos affertur.

Usu : Radix oblonga , parva, tuberosa, nodosa, coloris flavi seu crocei, saporis subacris, amaricantis , odoris haud ingrati, fere ut Zingiber.

Vires possidet incidentes & solventes , hinc ad pulmonum, jecoris, lienis, uteri obstructions referandas & præcipue ceu specificum in ictero prædicatur. Diuretica quoque est, & urinam croceo colore tingit. In arte tinctoria frequens in usum trahitur. Cus-

Cuscuta Off. & Epithymum Off.

Cuscuta major C. B. & Epithymum seu Cuscuta minor C. B.

Cuscuta BLACKW. Tab. 554.

Cuscuta floribus sessilibus HALL. Hist. n. 654.

Cuscuta Europæa LINN. Spec. plant. T. I. p. 180.

Gall. Varietas prior dicitur Cuscuta, Goute de Lin, altera Epithym.

Germ. Flachseide, Silzkrant; & altera varietas Thymseide, Cretische Thymseide.

Prior & major varietas Urticæ ple-
rumque innascitur, & pestis fre-
quens est Trifolii sativi & Lini;
minor in Thymo nascens, Epi-
thymum Veterum, in Sideriti-
de, Serpillo, Origano, Erica a-
liisque plantis minoribus prove-
nit, vulgaris in calidis rupibus,
filamentis tenerioribus rubris
constat. Utraque parasitica cir-
ca plantas obvias se convolvit,
& papillas fectorias emittit, quæ
in poros corticis plantarum se
infigunt, & nutrimentum inde
hauriunt.

Usu. Herba cum floribus tota.

Vires. Succo prægnat subacido.
Vim videtur habere resolventem,
nitrosam, saponaceam absque
morsu, hinc in morbis hypo-
chondriacis convenire potest &
obstructionibus, ubi absque im-
petu resolvendum est. Veteres
succum inter medicamenta pur-
gantia retulerunt, sed vim adeo
debilem habet, ut ejus usus jam
diu obsoleverit. Vix apud nos
in usu est.

Cyanus Off.

**Cyanus segetum flore cœ-
ruleo C. B.**

**Cyanus minor BLACK. Tab. 270.
Pars I.**

**Cyanus foliis imis ellipticis,
dentatis, supremis lineari-
bus, semiflosculis latis-
simis HALL. Hist. n. 191.**

**Centaurea Cyanus LINN.
Spec. pl. T. II. p. 1289.**

**Gall. Bleuët, Aubifoin, Bar-
beau, Casse lunette.**

**Germ. Blaue Kornblume.
Vulgaris est inter segetes.**

Usu. Flores.

Vires exiguæ, cum sapore atque
odore careant. Cum aqua in-
fusi flores recentes expressi, ele-
gantem colorem dant, ob cujus
pulchritudinem forte creditum
est oculorum inflammationes
tollere, urinam movere, & in
hydrope prodesse. Ad pictorios
usus adhibetur.

**Cyclamen vide Arthanita.
Cydonia Off.**

**Cotonea Malus I. B. Hist. pl.
T. I. p. 35.**

**Mala Cotonea majora, &
minora C. B.**

**Cydonia, Mala cotonea ma-
jora BLACKW. Tab. 137.**

**Pyrus Cydonia LINN. Sp. pl.
T. I. p. 687.**

**Gall. Coignier & Cognassier
Germ. Quitten, Quittenbaum.
Colitur passim apud nos in vineis,
& viridariis.**

Usu. Fructus magnitudine & fi-
gura varius, torulis eminen-
tibus tuberosus, densa lanugi-
ne rasili obductus, carne firma,
melina, odorata, austera, adstrin-
gente & subacida & Succus ex-
pressus & Semina extus cortice
spadiceo cincta intus vero me-
dullâ albâ, quæ in aquam de-
jecta lentorem viscidum depo-
nit, ipsamque mucilaginosam
reddit, referta.

Vires fructuum adstringentes, robo-
rant.

rantes; hincin vomitu, diarrhœa, sanguinis fluxu, tam pro cibo quam pro medicamento adhibiti egregium usum præstant, conducunt quoque inlaxitate faucium, tussi & angina pituitosa. Semen aqua maceratum mucilaginem præbet summe lenientem, lubricantem, refrigerantem & acre omnem demulcentem, hinc si interiora oris, faucium erosa, vel mucus deterfus dolorem facit, egregie mitigat; Hinc & in lippitudine, fissuris linguæ, mammarum, cum fructu adhibetur. Mucilago aqua rosarum vel plantaginis extrahitur.

Cyna vide Cina.

Cynoglossum Off.

Cynoglossum majus vulgare C. B.

Cynoglossum BLACKW. T. 249.

Cynoglossum foliis ellipticis, lanceolatis, sericeis, caule folioso HALL. Hist. n. 587.

Cynoglossum officinale LINN. Spec. pl. T. I. p. 192.

Gall. Langue de Chien, Cynoglosse.

Germ. Hundszunge.

Planta asperifolia ubique ad vias & fossarum aggeres frequens.

Usu. Herba & Radix, utraque odore narcotico quodammodo gravi gaudens.

Vires narcoticæ, anodynæ, licet aliqui negent, cum coctione facile id exhaletur. Interne rarius adhibetur, laudatur tamen ad gonorrhœam, phthisin, diarrhœas. Cataplasma olim laudabatur ad ambusta.

Plantæ odor pediculos fugare dicitur.

Cynosbata Off. Cynosbati fructus Off.

Gall. Gratte Cul.

Germ. Hagbutten.

Sunt fructus Rosarum sylvestrium ovati, glabri, rubentes, corallini, saporis grati, lapillis durioribus; multa lanugine vestitis, referti. Planta, quæ hos producit, est

Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato C. B.

Rosa canina seu sylvestris BLACKW. Tab. 8.

Rosa spinis aduncis, foliis septenis, calycibus tomentosis, segmentis pinnatis, & semipinnatis, tubis brevissimis. HALL. Hist. n. 1101.

Rosa canina LINN. Spec. plant. T. I. p. 704.

Gall. Rosier sauvage.

Germ. Wilde Rosen, Feld- und Heck-Rosen.

In sepibus & dumetis frequentissima est.

Vires. Fructus hi edules sunt cocti, vel in pastam comminuti, & saccharo conditi, aciduli, leniter adstringentes, ad alvi fluxus laudantur, & ad ventriculum roborandum. Pulvis fructus exsiccati ad calculum laudatur, sed decocta cum fructibus aqua eum in scopum frustra fuit adhibita.

Huic fructui frequenter innascitur tuberculum villosum, quod debetur peculiari muscæ, quæ junioris floris germen pungendo & secando id enasci facit, vocatur communiter

Cynosbati fungus, vel spongia, tum & Bedeguar Off. estque nidus fere insectorum villosus, hirtus, qui aqua maceratus intumescit & canes necat, quod ita expansus ventriculo exire nequeat.

Vires. Olim celebrabatur ceu antidoton ad hydrophobiam, & apud Siculos etiam adversus alios venen-

venenatorum animalium mor-
sus quin & morbos magicos
in usu est, Sanatodos inde dic-
tus. Alii ad renum morbos
& calculum laudant, sed fru-
stra.

Cyperus longus Off.

Cyperus odoratus, radice lon-
ga sive **Cyperus Officina-**
rum C. B.

Cyperus culmo triquetro
foliofo, panicula foliofa,
supradecomposita, pe-
dunculis nudis, spiculis al-
ternis LINN. *Mat. Med.*
p. 10. n. 29.

Cyperus longus LINN. *Spec.*
plant. T. I. p. 67.

Gall. Souchet long.

Germ. Lange Cyperwur3.

In *Italia*, & *Gallia meridionali*
nascitur.

Usu. Radix longa, tenuis, no-
dosa, contorta, foris subnigra,
intus subalbicans: saporis grati,
aromatici, odoris fragrantis.

Vires stomachicæ, incidentes,
carminativæ, motum excitantes,
hinc ad menses & urinam

pellendam commendatur. Ho-
die apud nos vix in usu est.

Cyperus rotundus Off.

Cyperus rotundus orientalis
major. C. B.

Cyperus rotundus DODON.
Pempt. p. 338.

Cyperus culmo triquetro,
subnudo umbella decom-
posita, spiculis alternis, li-
nearibus LINN. *Mat. Med.* p.
11. n. 30.

Cyperus rotundus LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 67.

Gall. Souchet rond.

Germ. Runde Cyperwur3.

In *Ægypto* juxta *Nilum* & in
paludibus crescit.

Usu. Radix subrotunda, fere oli-
væ magnitudine, scabra, striata,
extus rubens, intus subalbida;
plures ex uno capite quasi filis
dependent. Saporis & odoris
ut *Cyperus longus*.

Vires attribuuntur eadem quæ *Cy-
pero longo*, unice debiliores. U-
traque potius pro odoramentis
apud aromatarios reconditur,
quam usu medico celebris est.

D.

Dactyli Off.

Gall. Dattes.

Germ. Dattlen.

Sunt fructus oblongi, carnosii,
ex flavo fusci vel rubentes,
saporis dulcis, grati. Arbor,
unde colliguntur, appellatur

Palma major C. B.

Palma hortensis mas & fœ-
mina KÆMPF. *Amœn. exot.*
p. 688. Tab. I. 2.

Dactylus Palma BLACKW. T.
202.

Phoenix dactylifera LINN. *Sp.*
plant. T. II. pag. 1658.

Gall. Palmier Dattier.

Germ. Dattelbaum, Palmen-
baum.

Crescit in *India*.

Vires. Nutriunt, temperant, de-
mulcent, hinc in raucedine,
tussi, ardore urinæ &c. pro-
sunt. Nostratium nonnulli a-
quosum horum fructuum infu-
sum tenellis infantibus ptisanæ
loco pro potu ordinario pro-
pinant, non optime, cum facile
in ventriculo in fermentatio-
nem abeat indeque flatulentix,
colicæ, diarrhœis &c. ansam præ-
beat.

Daucus creticus Off.

Sub hoc nomine duæ specie paulum diversæ plantæ intelliguntur, nempe

Daucus creticus CAMERAR.
Epit. p. 536.

Daucus alpinus multifido
longoque folio, umbella
candida C. B.

Libanotis foliis hirsutis, tri-
plicato pinnatis, lobulis
profundissime bipartitis
HALL. *Hist.* n. 745.

Athamanta (cretensis) fo-
liolis linearibus, planis,
hirsutis, petalis biparti-
tis, seminibus oblongis,
hirsutis LINN. *Spec. plant.* T. I.
p. 352.

Et

Daucus creticus BLACKW. Tab.
471.

Myrrhis tenuifolia annua
cretica, semine lanugine
alba pubescente MORISON.
Hist. Ox. Tom. III. pag. 302.
Sect. IX. Tab. 10. fig. 9.

Daucus foliis fœniculi te-
nuissimis C. B.

Athamanta (annua) foliis
multipartitis: laciniis li-
nearibus, teretiusculis,
acuminatis LINN. *Sp. plant.*
T. I. p. 353.

Gall. **Daucus de Crete.**

Germ. **Möhrenkummel, Creti-**
scher Vogelneß = Saamen.

Prior species in *Helvetiæ* etiam
Basilienfis agri montanis occur-
rit, altera cujus *Creta* patria
esse dicitur in hortis colitur.
Parum omnino differunt & po-
sterior species apud nos ple-
rumque officinalis est.

Usu. Semen oblongum, striatum,
villosum, odoris & saporis aro-
matici, acris.

Vires lithontripticas, stomachi-
cas & uterinas ei veteres ad-
scripserunt. Hodie fere negli-
gitur.

Daucus vulgaris, fativus
Off.

Pastinaca tenuifolia sylve-
stris Dioscoridis vel Dau-
cus Officinarum C. B.

Daucus sylvestris BLACKW. T.
546.

Daucus involucris cavis,
communibus pinnatis, pe-
culiaribus lineari lanceo-
latis HALL. *Hist.* n. 746.

Daucus Carota LINN. *Sp. pl.*
T. I. p. 348.

Et varietas ejus fativa, quæ vo-
catur

Pastinaca tenuifolia fativa
radice lutea C. B.

Gall. Varietas fativa appellatur
Carotte, sylvestris vero *Carotte*
sauvage, *faux Chervis*.

Germ. Sativa **Möhren**, gelbe
Ruben, Spontanea, wilde
Möhren, Vogelneß.

Sylvestris **Daucus** in agris, pra-
tis, ad vias &c. vulgatissimus
est. Alter in hortis & agris
colitur.

Usu. Radix fativi & Semen syl-
vestris.

Vires. Radix lutea vel ex luteo
rufescens, notissima, aromatica,
dulcis, in cibum vulgo recipitur,
salubrem, stomacho amicum.
Sed & medica virtute pollet
crude comesta vermes, inprimis
lumbricos sed & tænias quan-
doque enecans atque expellens,
uti sæpissime expertus sum. Se-
men diureticum est, incidens,
aperiens, hodie parum usitatum.

Delphinium vide Calcatrip-
pa.

Dens

Dens Leonis vide Taraxacum.

Dentaria major Off.

Orobanche radice dentata major C. B.

Dentaria BLACKW. Tab. 430.

Squamaria caule simplicissimo, floribus pendulis, labio inferiori trifido HALL. *Hist* n. 297.

Lathræa Squamaria LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 844.

Gall. Grande Dentaire.

Germ. Schuppenwurz, Streubelwurz &c.

In sylvis umbrosis, montosis *Helvetiæ* passim frequens.

Usu. Radix ex squamis albis succulentis alterne eminentibus compacta.

Vires ei tribuuntur antepilepticæ. Nostris in officinis non prostat.

Dentaria minor Off.

Dentaria minor CAMER. *Epit.* p. 708.

Dentaria heptaphyllos C. B. &

Dentaria pentaphyllos EJUSD.

Dentaria foliis quinatis, digitatis HALL. *Hist.* n. 469.

Dentaria pentaphyllos LINN. *Spec. pl.* T. II. pag. 912.

Gall. Petite Dentaire.

Germ. Schnwurz, weisse Steinsbrechwurz.

In umbrosis montosis sylvis *Helvetiæ* passim non rara.

Usu. Radix alba, succulenta, ramosa, orbiculatis squamis incisa.

Vires exsiccantes & adstringentes possidere dicitur.

Nostris in officinis plerumque sub titulo radices Saxifragæ albæ prostat, & rarissime in usum trahitur.

Dictamnus albus, Diptamnus albus, Fraxinella Off.

Dictamnus albus vulgo Fraxinella C. B.

Dictamnus albus, Fraxinella BLACKW. Tab. 75.

Fraxinella HALL. *Hist.* n. 1029.**

Dictamnus albus LINN. *Spec. plant.* T. I p. 548.

Gall. Fraxinelle, Dictame blanc.

Germ. Weisser Diptam, gemeiner Diptam.

Passim in *Helvetiæ* sponte provenit & in hortis colitur.

Usu. Radix seu potius Radicis Cortex albicans, convolutus, amarus.

Vires alexipharmacæ, uterinæ, emmenagogæ, anthelminticæ. Rarius apud nos in usum vocatur.

Dictamnus creticus, Diptamnus creticus Off.

Dictamnus creticus C. B. BLACKW. Tab. 462.

Origanum Dictamnus LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 823.

Gall. Dictame de Crete ou de Candie.

Germ. Cretischer Diptam.

In *Creta* insula crescit.

Usu. Folia odoris & saporis grati, aromatici.

Vires calefacientes, roborantes, alexipharmacæ, uterinæ, usus tamen hodie rarioris.

Doronicum Off.

Doronicum radice scorpii C. B. &

Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus EJUSD. quale in hortis evadit.

Doronicum Romanorum BLACKW. Tab. 239.

Doronicum foliis cordatis, obtusis, imis longe petiolatis, superioribus amplexicaulibus HALL. *Hist.* n. 88.

Doronicum pardalianches LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1247. Gall. Doronic.

Germ. Genssenwurz.

In montibus Thuri & Saleva Genevensibus invenitur.

Usu. Radix subdulcis, aromatica. Vires. Capitis debilitati & imprimis vertigini mederi nonnulli afferunt, celebrior olim quam hodie radix.

Dulcamara, Dulcis amara, Amara dulcis, Solanum scandens Off.

Solanum scandens five **Dulcamara** c. B.

Solanum lignosum, Dulcamara BLACKW. Tab. 34.

Solanum caule flexuoso, frutescente, foliis supremis tripartitis & cordato lanceolatis HALL. *Hist.* n. 575.

Solanum Dulcamara LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 264.

Gall. Morelle rampante, Douce amere.

Germ. Hirschkraut, Je länger je lieber.

In dumetis humidis locisque aquosis occurrit.

Usu. Radix saporis ex dulci & amaro mixti, odoris narcotici.

Vires resolventes, saponaceæ. Laudatur in hydropo, ictero, asthma, pleuritide mucosa, arthritide, lue venerea &c. ut ILL. BOERHAAVIUS Chinæ & Sarsaparillæ prætulit.

E.

Ebenum Lignum Off.

Ebenus c. B. *pin.* p. 448. &

Palma americana spinosa c. B. *pin.* p. 508. PLUKN. *Phytogr.* T. 101. f. 1.

Ebenus LINN. *Mat. Med.* pag. 178. n. 504.

Gall. Ebene.

Germ. Ebenholz.

Ex Indiis affertur, sed arbor nondum satis nota.

Usu. Lignum durissimum, ponderosissimum, nigrum.

Vires perhibentur sudoriferæ esse, ut illæ Guajaci; sed usus magis mechanicus est quam medicus.

Ebulus Off.

Sambucus humilis seu **Ebulus** c. B.

Ebulus BLACKW. Tab. 488.

Sambucus herbacea, floribus umbellatis HALL. *Hist.* n. 671.

Sambucus Ebulus LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 385.

Gall. Yeble.

Germ. Altsich, Acker Solunder, Aelten nostratibus.

In locis humidis & umbrosis crescit.

Odor totius plantæ, ut & sapor ingratus, nauseosus, amarus.

Usu. Radix & Cortex radicis, Folia, Flores, Baccæ & Semina.

Vires quam Sambuci majores, sed ingratiore. Radix & radicis Cortex alvum sursum & deorsum movent, urinas pellunt, & in hydropo utiliter adhibentur. Folia in cataplasmate ad œde-

oedemata hydropicorum valent,
& ad contusa laudantur. Flores
sudores movent. Ex Baccis
roob præparatur, cujus usus
frequentissimus ad obstructions
referandas in morbis chronicis.

Ebur Off.

Gall. Ivoire.

Germ. Elfenbein.

Ex Africa & India orientali affer-
tur.

Ita vocantur duo dentes lanarii
maxillæ superioris, elongati &
reflexi Animalis, quod dicitur

Elephas maximus LINN. Syst.

Nat. Tom. I. pag. 48.

Usu. Rasura, & Pulvis.

Vires conveniunt cum cornu cer-
vi; ex eo paratur similiter ge-
latina demulcens. Ad albedi-
nem calcinatum spodium dici-
tur, quod magis absorbens &
adstringens est.

Elaterium, vide Cucumis
asfininus.

Elemi gummi Off.

Gall. Gomme Elemi.

Germ. Gummi Elemi.

Est resina mollis, pallidi, virides-
centis aut flavescentis coloris,
odoris validi, non ingrati.
Arbor ex qua provenit per-
hibetur esse

Elemifera PLUKN. Phyt. Tab. 173.

& 218. LINN. Mat. Med. 518.

Icicariba MARGR. Brasil. 98.

An Amyris Elemifera LINN.

Sp. plant. T. I. p. 495.

Habitat in Nova Hispania.

Alia & præstantior species dicitur
ex Æthiopia afferri, quæ vero
rarius Officinas nostras ingre-
ditur, & Planta, ex qua produ-
citur, hætenus incognita est.

Vires emollientes, suppurationem
promoventes; hinc balsama
& unguenta vulneraria ingre-
ditur.

Elleborus albus, vide Helle-
borus albus.

Elleborus niger, vide Helle-
borus niger.

Endivia, Cichorium sativum
Off.

Intybus sativa latifolia sive
Endivia vulgaris C. B.

Endivia BLACKW. Tab. 378.

Cichorium sativum annuum
foliis glabris, integris,
dentatis, Veterum Intybus
HALL. Hist. ad n. 1. p. 2.

Cichorium Endivia LINN. Sp.
plant. T. II. pag. 1142.

Gall. Endive commune ou
Chicorée blanche.

Germ. Andivien, Endivien.

In hortis feritur culinaris planta.

Usu. Herba & Semen.

Vires abstergentes, sed longe de-
biliores ac in Cichorio sylvestri.
Semina sunt inter quatuor fri-
gida minora, demulcent.

Enula, Helenium, Enula
campana Off.

Helenium vulgare C. B.

Helenium BLACKW. T. 473.

After foliis ovato lanceola-
tis, ferratis, subtus to-
mentosis: calycinis ova-
to-lanceolatis maximis
HALL. Hist. n. 72.

Inula Helenium LINN. Sp. pl.
T. II. p. 1236.

Gall. Aunée, Enule cam-
pane.

Germ. Allant.

Apud nos in hortis colitur.

Usu: Radix, quæ amara, acris,
odorata, aromatica.

Vires. Roborat laxa, præcipue
ventriculum in debili ciborum
digestione, in doloribus colicis a

causa acida, in malo hypochondriaco; vermes necat, mensēque pellit. Sed & pectori prodest, ad asthma, tussim ferinam, & obstructions quaslibet. Externe pulvis in unguento ad scabiem confert.

Epithymum, vide Cuscuta.
Equisetum, Cauda equina Off.

Equisetum arvense longioribus setis c. B.

Cauda equina BLACKW. T. 217. fig. 2. 3. 4.

Equisetum caule florifero nudo, sterili verticillato, radiorum duodecim HALL. Hist. n. 1676.

Equisetum arvense LINN. Sp. plant. T. II. p. 1516.

Gall. Prêle, Queue de cheval.
Germ. Pferdswanz, Kessenschwanz.

In agris humidis frequens, bobus & vaccis dentium vacillationem & diarrhoeam, excitare, equis & ovibus innoxium esse dicitur.

Usu. Herba.

Vires ipsi attribuuntur adstringentes; sed planta aquosa, parum acris, vires medicas vix ullas promittit.

Erica Off.

Erica vulgaris glabra c. B.

Erica prima CAMERAR. Epit. pag. 75.

Erica foliis imis appressis, simplicibus, floralibus calcaratis HALL. Hist. n. 1012.

Erica vulgaris LINN. Sp. plant. T. I. p. 501.

Gall. Bruyere.

Germ. Seide, Seidekraut.

In sylvis apud nos passim crescit exosa agricolis stirps.

Usu. Herba.

Vires censentur adstringentes. Commendatur ad nephritidem & calculum; nobis vix in usu.

Eruca Off.

Eruca latifolia alba fativa Dioscoridis c. B.

Sinapi filiquis tetragonis, hirsutis, floribus venosis. HALL. Hist. n. 464.

Brassica Eruca LINN. Spec. pl. T. II. p. 932.

Gall. Roquette.

Germ. Weisser Senf.

In hortis colitur, sed & in *Valesia* sponte crescit.

Usu: Semen & Folia.

Vires. Ob saporem plantæ acrem potenter viscidos humores incidit, solvit, stimulat; hinc in morbis lentis, in hydropis initio, in scorbuto lento & apoplexia serosa & paralyfi commendatur.

Eryngium Off.

Eryngium vulgare c. B.

Eryngium CAMER. Epit. p. 447.

Eryngium foliis semipinnatis pinnis pinnatis, pinnulis lobatis, spinosis HALL. Hist. n. 735.

Eryngium campestre LINN. Spec. pl. T. I. p. 337.

Gall. Panicaut, Chardon roland, Chardon a cent testes.

Germ. Mannstreu, Lausdistel. Frequens apud nos ad vias crescit.

Usu. Radix, quæ dulcis, saporis grati.

Vires prædicantur diuretici, aperientes, olim & aphrodisiaca habebatur. Nobis vix in usu est.

Aliis in locis in usum trahitur

Eryn-

Eryngium maritimum C. B.
& LINN. *Spec. plant.* T. I.
p. 337. n. 5.

Eryngium BLACKW. Tab. 297.
Id enim maxima radice gaudet,
& vires præstantiores possidere
videtur.

Erysimum Off.

Erysimum vulgare C. B.

Erysimum BLACKW. T. 28.

Erysimum foliis pinnatis,
pinnis rectangulis, acutis,
extrema triangulari, maxi-
ma, filiquis adpressis
HALL. *Hist.* n. 478.

Erysimum officinale LINN.
Sp. plant. T. II. p. 922.

Gall. Velar, ou Tortelle.

Germ. Wegsensf.

Ad vias & in ruderos abunde
provenit.

Usu. Folia saporis nasturcini,
vix acris.

Vires. Laudantur ad pectoris mor-
bos chronicos, in raucedine,
asthmate, ad mucum inciden-
dum, dummodo febris absit.
Recens trita & imposita
vesicas excitare & tumores
mammarum scirrhosos resolvere
dicuntur.

Esula & *Esula minor* Off.

Hoc nomine variæ *Tithymalo-*
rum species in usum trahun-
tur, frequentissime autem reci-
pitur maxime vulgaris, quæ est

Tithymalus cyparissias C. B.

Esula RIVIN. Tab. 113. BLACKW.
T. 163. fig. 3.

Tithymalus foliis linearibus,
stipulis numerosis, florali-
bus cordiformibus, petalis
lunatis HALL. *Hist.* n. 1047.

Euphorbia cyparissias LINN.
Sp. pl. T. I. p. 661.

Pars I.

Gall. Esule, ou petite Esule.
Germ. Wolfsmilch, Teufels-
milch.

Crescit ubique ad vias.

Usu. Radix acris, lacte plena.

Vires. Vi purgante infamis usui
interno damnosa. In hydropo
commendatur tum & ad febres
intermittentes, sed, viscera ut sa-
na sint, requiritur; ab ejus usu
intra 30. minuta mortem secu-
tam legimus, alias oculorum
inflammationem, cæcitatem
&c. sed & externe abdomini
applicata tumorem & sphacelum
produxit.

Eupatorium cannabinum
Off.

Eupatorium cannabinum
C. B.

Eupatorium Avicennæ
BLACKW. Tab. 110.

Eupatorium foliis ovato-lan-
ceolatis, tripteris HALL. *Hist.*
n. 136.

Eupatorium cannabinum
LINN. *Spec. plant.* T. 1173.

Gall. Eupatoire.

Germ. Wasserdost, Kuni-
gundenkraut.

In locis humidis reperitur.

Usu. Folia odore acris, sapore
peramaro prædita.

Vires purgantes, & urinam pel-
lentes, hinc in ictero, cachexia,
hydropo frequens a plebe &
cum successu adhibetur. Febres
intermittentes, ulcera pedum
tumida sanare ILL. BOERHAAVIUS
refert. In fomento hydropicis
cruribus, & scroti tumori mede-
tur.

Eupatorium Veterum, vide
Agrimonia.

Euphorbium Off.

Est Gummi-resina in guttas vel
lacrymas ex pallido-flavescentes,
splendidas concreta, saporis a-

S

cerri-

cerrimi, exurentis, nauseosi,
 odoris nullius.
 Planta quæ huncce succum stil-
 lat est

Euphorbium verum Anti-
 quorum BLACKW. Tab. 339.
 & 340.

Euphorbium antiquorum
 verum COMMEL. *Hort. Amst.*
 T. I. p. 23. Tab. 12.

Shadidacalli *Hort. Malab.* T. II.
 p. 81.

Euphorbia aculeata, nuda,
 multangularis, aculeis ge-
 minatis LINN. *Mat. Med.*
 p. 89. n. 254.

Euphorbia antiquorum
 LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 656.
 Habitat in *Africa*.

Vires vehementissime purgantes,
 exulcerationem, & inflamma-
 tionem excitantes, hinc non
 facile interne exhibeatur, licet

ad hydropem commendetur.
 Errhinum præbet infame.
 Pulvis a chirurgis in carie ossium
 cum fructu adhibetur.

Euphrasia Off.

Euphrasia officinarum C. B.

Euphrasia BLACKW. T. 427.

Euphrasia foliis ovato-lan-
 ceolatis, argute dentatis
 HALL. *Hist.* n. 303.

Euphrasia officinalis LINN.
Sp. pl. T. II. p. 841.

Gall. Eufraise.

Germ. Augentrost.

Ufu. Herba amara, sapore non
 grato, odore nullo prædita.

Vires. Ad oculorum mala valere
 creditur sed in calidiori malo
 potius nocet.

Infusum ejus theiforme ad visum
 roborandum apud nos frequen-
 tissime adhibetur; effectu, quod
 sciam, non respondente.

F.

Faba C. B.

Faba major BLACKW. Tab. 19.

Vicia Faba LINN. *Sp. pl.* T. II.
 p. 1039.

Gall. Fève de Marais.

Germ. Bohne, grosse Bohne.

In agris colitur.

Ufu. Stipites, Flores & Se-
 mina.

Vires. Stipitum cineres ad lixiviam
 antihydrica, diuretica adhi-
 bentur & sal ex eis paratur. Ex
 floribus aqua grate odorata cos-
 metica destillatur. Seminum fa-
 rina cataplasmata discutientia &
 emollientia ingreditur.

Faba S. Ignatii, Faba In-
 dica Off.

Gall. Fève de S. Ignace.

Germ. St. Ignatius-Bohne.

Est faba sive semen nuce avellana

paulo majus, oblongum, sub-
 angulosum, figuræ variæ, du-
 rissimum, quasi corneum, ex-
 tus albescens vel ex cinereo fus-
 cum, saporis valde amari. Ad
 viginti quatuor horum seminum
 continentur in pulpa flava &
 amara fructus melonis similis.
 Planta huncce fructum ferens
 nondum satis nota est. Vocatur
 Igasur sive Nux vomica le-
 gitima Serapionis Camelli,
 Faba S. Ignatii vulgo RAJ.
Dendrol. p. 118.

Cucurbitifera Malabathri fo-
 liis, scandens, cujus nuclei
 faba S. Ignatii dicti PLUKN.

Crescit in *America*.

Vires emeticæ, roborantes, anti-
 spasmodicæ, antepilepticæ ipsis
 adscribuntur, nullius amplius
 apud nos usus.

Faba-

Fabaria vide Telephium.

Farfara, Tussilago Off.

Tussilago vulgaris c. B.

Tussilago, Farfara BLACKW. Tab. 204.

Petasites scapo unifloro, flore radiato HALL. *Hist.* n. 143.

Tussilago Farfara LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1214.

Gall. Pas d'Ane, Tussilage. Germ. Rosshube, Huslattich.

In agris humidis locisque argillosis frequens Februario & Martio floret.

Usu. Radix, Folia, Flores.

Vires. Tota planta pectoralis est, leniens, aperiens. Succus recentis plantis ad calculum laudatur. Fumus ore haustus phtisicis & asthmaticis conducit.

Ferrum, Mars, Chalybs Off.

Ferrum, Mars WALLER. *Mineral.* p. 327. &

Ferrum durissimum & purissimum, ad filicem scintillans, Acies, Stomoma, Chalybs EJUSD. p. 564.

Gall. Fer, Acier.

Germ. Eisen, Stahl.

Vulgatissimum in Europa & utilissimum metallum est; omnibus notum, ut descriptione opus non sit. Certis encheiresibus depuratum & induratum Chalybs vocatur.

Vires. Inter tonica, roborantia & aperientia medicamenta primum fere locum tenet, hinc in omnibus a nimia laxitate & fibrarum debilitate ortis-malis, cachexia, chlorosi, fluore albo, mensibus retentis, malo hypochondriaco, hydrope incipiente &c. utilissimum. Nocet vero, si plethora adest, fibræ nimis tensæ sunt vel viscerum ali-

qua labes subest, & modico motu usus ejus concomitandus est.

Ficaria vide Chelidonium.

Ficus passæ vide Caricæ.

Filipendula, Saxifraga rubra Off.

Filipendula vulgaris an Molon Plinii c. B.

Filipendula BLACKW. Tab. 467.

Filipendula foliis pinnatis, minimis intermissis, extremo trilobato HALL. *Hist.* n. 1136.

Spiræa Filipendula LINN. *Spec. plant.* T. I. pag. 702.

Gall. Filipendule.

Germ. Rother Steinbrech, Erda Eichel.

In pascuis nonnullis montanis inter *Muttenz* & arcem *Birseck* copiose provenit.

Usu. Radix apud nos vix usitata.

Vires adstringentes, vulnerariæ, diureticæ.

Magno errore in Pharmacopœa Wurtembergica cum *Filice florida sive Osmunda regali* pro una eademque planta habetur, a qua toto cœlo differt.

Filix femina Off.

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis c. B.

Filix femina BLACKW. Tab. 325.

Filix foliis triplicato pinnatis, pinnis nervosis, integerrimis, ultimis lanceolatis HALL. *Hist.* n. 1688.

Pteris aquilina LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1533.

Gall. Fougere commune, Fougere femelle.

Germ. Farnkraut Weiblein.

In sylvis & pascuis sylvaticis passim crescit.

Usu. Radix amara, ingrata, viscida.

Vires tonicæ, resolventes & in-
primis anthelminticæ ejus lau-
dantur, effectu tamen sæpius
non respondente.

Filix mas Off.

Filix mas non ramosa dentata

C. B.

Filix mas BLACKW. Tab. 323.

Polypodium pinnis pinnatis,
obtusis, dentatis HALL. *Hist.*
n. 1701.

Polypodium Filix mas LINN.

Spec. plant. T. II. p. 1551.

Gall. Fougere mâle.

Germ. Farnkraut Männlein.

In sylvis & sylvosis abunde, præ-
cendenti apud nos multo vul-
gator, unde in Officinis no-
stris sæpissime ei substituitur.

Usu: Radix nobis inusitata.

Vires eadem quæ præcedenti.

Fœniculum romanum, dul-
ce Off.

Fœniculum dulce C. B.

Fœniculum dulce majori &
albo femine JOH. BAUH.

Hist. plant. T. III. p. 2.
TOURNEF.

Gall. Fenouil doux.

Germ. Süßer, Römischer Fenchel.

In Italia, Sicilia &c. provenit.

Juxta HALLERUM & LINNÆUM
varietas est sequentis.

Usu. Semen oblongum, striatum,
ex albido virens, sequenti majus,
odoris fragrantis, saporis sua-
vis, dulcis, acris. Apud nos ra-
rius in usum venit.

Vires eadem quæ sequenti.

Fœniculum vulgare Off.

Fœniculum vulgare germa-
manicum C. B.

Fœniculum BLACKW. T. 288.
HALL. *Hist.* n. 760.

Anethum Fœniculum LINN.

Spec. plant. T. I. p. 377.

Gall. Fenouil.

Germ. Fenchel.

In vineis & hortis abunde passim
occurrit, etiam quasi sponte.

Usu. Radix, Herba, Semen.

Vires. Radix alba, acris, inter quin-
que aperientes numeratur, diu-
retica, emmenagoga &c. Herba
becchica audit, stomachica, in-
cidens, ophtalmica, lac augens.
Semen calidius est, aromaticum,
carminativum, pectorale.

Fœnum græcum Off.

Fœnum græcum CAMER. *Epit.*
p. 1095.

Fœnum græcum fativum
C. B.

Trigonella Fœnum græcum
LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1095.

Gall. Fenugrec.

Germ. Bockshorn, nostr. Fœnum-
græcum.

Passim in agris seritur.

Usu. Semen subrotundo-angulo-
sum, lentis majoris magnitudine,
flavum, saporis farinosi, odo-
ris, inprimis quando ficcum,
vehementis, non grati. Eundem
odorem planta ficcata per plu-
res annos in horto sicco retinet.

Vires. Ad cataplasmata discutien-
tia, emollientia sæpius adhibe-
tur ejus farina, rarius ad clys-
mata. Frequentissime a Vete-
rinariis expetitur.

Folium Indi vide Malaba-
thrum.

Formica Off.

Duæ species apud nos in usum
medicum trahuntur nimirum,
Formica minor e fusco nigri-
cans RAIL.

Formica nigra LINN. *Syst. nat.*
T. I. p. 963.

Gall. Fourmi, petite Fourmi.

Germ. Ameiße, kleine Ameiße.

Ubique

Ubique occurrit.

Et

Formica media rubra RAIH.

Formica rufa LINN. *Syst. Nat.*

T. I. p. 962.

Gall. Grande Fourmi.

Germ. Grosse, rothe Ameis,
nostr. Wallhengst.

In sylvis ad arborum radices
plerumque occurrunt. & inpri-
mis præferuntur sub Pinis sive
Abietibus habitantes.

Vires. Penetranti acido succo tur-
gent. Toti earum acervi cum
spiritu vini destillantur, nec
non ad balnea adhibentur ro-
borantia in atrophia, paralyfi
apud nos frequentissima. Re-
quiruntur plerumque ad hæc bal-
nea rubrarum formicarum acer-
vi in Pineto vel abiegna sylva
collecti, cum plerumque resina
harum arborum scateant.

Fraga & Fragaria Off.

Fragaria vulgaris C. B.

Fragaria BLACKW. Tab. 77.

Fragaria foliis ternatis, fla-
gellis reptans HALL. *Hist.*
n. 1112.

Fragaria vesca LINN. *Sp. pl.*
T. I. p. 708.

Gall. Fraiser.

Germ. Erdbeerekraut.

Ubique in sylvis & collibus pro-
venit.

Usu. Radix, Herba, Fructus
sive Baccæ.

Vires Radix & Herba adstrin-
gunt & urinam movent. Fruc-
tus gratissimi, aciduli, jucun-
di odoris, temperant, refici-
unt, refrigerant, calculum fran-
gunt, non omnibus tamen pe-
rinde salubres, cum homines
etiam robustissimos alias nove-
rim, qui, quoties vel tantillum

horum fructuum degustarent,
lipothymiam patiebantur.

Frangula Off.

Alnus nigra baccifera C. B.

Alnus nigra BLACKW. T. 152.

Rhamnus inermis, foliis
ovato lanceolatis, inte-
gris, floribus quinquefi-
dis, androgynis HALL.
Hist. n. 821.

Rhamnus Frangula LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 280.

Gall. Bourgene, Frangula.

Germ. Faulbaum, Zapfenholz.

In sylvis, dumetis & sepibus pas-
sim frequens.

Usu. Cortex medius flavus, sa-
poris ingrati, subadstringentis.

Vires. Sursum & deorsum vehe-
menter purgat, rarius apud
nos in usu.

Fraxinella vide Dictamnus
albus.

Fraxinus Off.

Fraxinus excelsior C. B.

Fraxinus CAMERAR. *Epit.* p. 64.
BLACKW. Tab. 328.

Fraxinus apetala, foliis pin-
natis, ferratis HALL. *Hist.*
n. 528.

Gall. Fresne,

Germ. Esche.

In sylvis occurrit satis procera ar-
bor.

Usu. Cortex, Semen.

Vires. Cortici vires adscribun-
tur aperientes, diureticæ anti-
pleuriticæ, febrifugæ, ut Cor-
ticis peruviani succedaneum
esse nonnulli contendunt. Lig-
num vulnerarium audit. Se-
men acre, amaricans eisdem
viribus instructum esse dicitur,
etiam lithontripticis, aphrodisia-
cis. Ambo nostris in oris fere
obsoleta.

De Manna hujus Arboris pro-
ducto vide suo titulo.

Fumaria, Fumus terræ Off.
Fumaria officinarum & Di-
oscoridis c. B.

Fumaria BLACKW. Tab. 237.

Fumaria foliis multifidis,
lobis subrotunde lanceo-
latis, fructibus monosper-
mis HALL. *Hist.* n. 346.

Fumaria Officinalis LINN. *Sp.*
pl. T. II. p. 984.

Gall. Fumeterre.

Germ. Erdrauch, Taubenkröpf-
lein.

Ubique in agris, vineis & hortis
occurrit.

Usu. Herba inodora, amara.

Vires saponaceæ, resolventes, ape-
rientes, sanguinem depurantes,
inde in obstructionibus visce-
rum, scorbuto, scabie aliisque
cutis vitiis &c. commendatur.

Fungus sambucinus vide
Auricula Judæ.

G.

Galanga Off. Galanga ma-
jor & minor Off.

Wanhôm KÆMPF. *Amœn.* pag.
901. & 902. cum icone.

Katsjula-Kelengu Hort. *Ma-*
lab. T. II. p. 81. T. 41.

Kæmpferia foliis ovatis fessi-
libus LINN. *Hort. Cliff.* p. 2.
T. I. *Mat. med.* p. 3. n. 6.

Kæmpferia Galanga LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 3.

Gall. Grand & petit Galan-
ga.

Germ. Grosser und Kleiner Gal-
gant.

Planta crescit in India.

Usu. Radix major tuberosa, no-
dosa, geniculata, intorta, zo-
nis circularibus cincta, pollicem
crassa, odoris aromatici, sapo-
ris acris, amaricantis, fauces
exurentis, Zingiberis modo.

Minor in omnibus similis, sed
odore saporeque magis acri præ-
dita.

Vires calefacientes, roborantes,
aromaticæ, carminativæ. Sed
aliquid nauseosi habet.

Galbanum Gummi Off.

Gall. Galbanon.

Germ. Galban, Mutter-Gum-
mi.

Est substantia pinguis, ceræ instar
ductilis, semipellucida, splen-
dens, media inter gummi &
resinam; dum recens est albi-
cat, dein flavicat & rufescit;
saporis est amaricantis, odoris
gravis, valde ingrati. Stillat spon-
te, vel ex vulnerata planta um-
bellifera, quæ vocatur

Ferula africana galbanifera,
folio & facie Ligustici
HERMAN. *Paradis. Bat.* p. 163.

Bubon Galbanum LINN. *Spec.*
plant. T. I. p. 364.

Crescit in Africa & Persia.

Vires. Viscidos humores potenter
resolvit, deobstruit, menses pel-
lit, antihystericum. Externe in-
greditur plura unguenta & em-
plastra emollientia, discutientia,
hysterica.

Galega Off.

Galega vulgaris floribus cæ-
ruleis c. B.

Galega seu Ruta capraria
BLACKW. T. 92.

Galega foliis ellipticis, spinis
& filiquis acutis HALL. *Hist.*
n. 394.

Gale-

Galega officinalis LINN. *Sp. pl.*
T. II. p. 1062.

Gall. Galega.

*Germ. Geißrauten, Fasanen-
kraut.*

Usu. Herba.

*Vires alexipharmacæ & sudoriferæ
olim ei tribuebantur, hodie fe-
re negligitur.*

Gallæ Off.

Gall. Noix de Galle.

Germ. Galläpfel.

Sunt excrementiæ quercubus ad-
nascentes, figura, magnitudine,
colore, pondere diversæ, suc-
co acido adstringente plenissimæ,
quas muscæ aliquæ compungen-
do excitant; ex Asia potissimum
inimere ad nos advehuntur, eu-
ropeæ enim deteriores sunt.
Arbor in qua reperiuntur, est

*Quercus cum longo pedicu-
lo c. B. & cum brevi pe-
diculo EJUSD.*

Quercus BLACKW. T. 487.

*Quercus foliis glabris, semi-
pinnatis, pinnis obtusis,
superioribus majoribus*
HALL. *Hist.* n. 1626.

Quercus Robur LINN. *Spec. pl.*
T. II. p. 1414.

Arbor in tota *Europa* frequens.

*Vires adstringentes, ad nigrum
cum ferro colorem parandum,
& ad atramentum præcipue ad-
hibentur. A quibusdam ad febres
intermittentes commendantur.*

Gallinæ Ventriculi Off.

Gall. Gifieres.

Germ. Hühner-Magen.

Sunt tunicæ vel membrana ex-
tracta, eluta, atque exsiccata ex
interiore parte ventriculi *Avis*
domesticæ, quæ est

Gallus GESN. *Hist. Animal.* de
Avib. p. 395. *Gallina EJUSD.*

p. 340. & *Capus EJUSD.* pag.
427.

Phasianus Gallus LINN. *Syst.*
Nat. T. III. p. 270.

*Vires olim putabantur adstringen-
tes, ventriculum roborantes,
imo lithontripticæ; revera au-
tem nullæ sunt.*

Gallium Off.

Gallium luteum c. B.

Gallium BLACKW. Tab. 435.

*Galium foliis octonis, linea-
ribus, perangustis, race-
mis multifloris, spicatis*
HALL. *Hist.* n. 710.

Galium verum LINN. *Sp. pl.*
T. I. p. 155.

*Gall. Caillelait, petit Mu-
guet.*

*Germ. Nieserkrout, Waldstroh,
Bettstroh.*

Ubique ad vias crescit.

*Usu. Herba odoris peculiaris,
haud ingrati.*

*Vires. Lac coagulat, syrupum vio-
larum rubro colore tingit, ficit,
adstringit, vulnera sanat, ad
morbos hystericos commenda-
tur. Sed vix in usu est*

*Gambogia, vide Gutta
Gummi.*

Genipi Off. Alpicolarum.

Hoc nomine tres diversæ plantæ
alpinae insigniuntur, nempe pri-
mo

*Tanacetum alpinum odora-
tum* c. B. & SCHEUCHZ. *It.*
alp. T. II. p. 242. Tab. 21. fig. 3.
& p. 462.

*Achillea foliis glabris, punc-
tatis, pinnatis, pinnis sim-
plicibus* HALL. *Hist.* n. 112.

Crescit in alpibus *Rheticis* & *Vale-
siacis.* Verior *Genipi.*

*Usu. Herba grato odore, aroma-
tico, penetrabili, prædita.*

Vires. Ad pleuritides, febresque antidotus est alpicolarum, & in theæ modum pota sudorem movet; calidior tamen planta facile nocens, si non sanat.

Secundo

Millefolium alpinum incanum, flore specioso JOH. BAUH. *Hist. plant. T. III.* pag. 138. MORISON. *Hist. Ox. T. III.* p. 39. S. VI. *T. XI.* fig. 11.

Achillea foliis tomentosis, pinnatis, pinnis simplicibus & incisiss HALL. *Hist.* n. 113.

Achillea nana LINN. *Sp. plant. T. II.* p. 1267.

Crescit in *Alpibus Helveticis*.

Usu. Herba odoris aromatici, sed diversi a priori.

Vires eadem ac prioris, sed paulo debiliores.

Tertio

Absinthium alpinum incanum C. B.

Absinthium sericeum montanum candidum SCHEUCHZER. *Itin. alp.* Tom. I. pag. 29. Tab. 3. fig. 1.

Ap-sinthium ex alis floridum, foliis angustis, sericeis, pinnatis, pinnis trifidis & quinquefidis HALL. *Hist.* n. 126.

Perinde in alpinis provenit & *Genipi blanc* nec non *Gäbuse* vocatur.

Vires. Infusum contra pleuritidem laudant alpicolæ nec non contra febres intermittentes, ad vulnera consolidanda & menstruum fluxum restituendum.

Genista Off.

Genista angulosa & scoparia C. B.

Genista BLACKW. *T.* 244.

Spartium foliis inferioribus ternatis, hirsutis, superioribus simplicibus HALL. *Hist.* n. 354.

Spartium scoparium LINN. *Spec. plant. T. II.* p. 996.

Gall. Genet commun.

Germ. Genist, Ginst, Prie-men-krant.

In *Helvetia* transalpina, *Alsatia*, *Gallia*, *Germania* &c. passim reperitur.

Usu. Folia, Flores & Semen.

Vires. Tota planta amara, multum salis diuretici, tartari vitriolati affinis continet, hinc in decocto & lixivio ad hydropem adhibetur. Flores & semina vomitum movent.

Cum hæc planta in agro nostro non occurrat sapissime sequens ejus loco in officinis nostris prostat.

Genista tinctoria germanica C. B.

Genistella RIVINI.

Genista inermis foliis glabris, confertis, ellipticis, lanceolatis, floribus sessilibus, spicatis HALL. *Hist.* n. 350.

Genista tinctoria LINN. *Spec. pl. T. II.* p. 998.

Gall. Spargelle.

Germ. Kleine Ginste, Prie-men-krant, nostr. Färbkraut.

In sylvosis & sterilibus pascuis.

Vires adstringentes a nonnullis ei tribuuntur. Sed ad lanas flavo colore inficiendas apud nos frequentissimus ejus usus est.

Gentiana alba, *Cervaria alba* Off.

Libanotis latifolia altera sive vulgatio C. B.

Seseli Æthiopicum herba DODON. *Pempt.* p. 312.

Laserpitium foliis cordatis, inciso

inciso ferratis HALL. *Hist.*
n. 792.

LasERPitium latifolium LINN.
Spec. plant. T. I. p. 356.

Gall.

Germ. Weisser Enzian, weisse
Hirschwurz.

In montosis sylvosis agri nostri
passim frequens.

Usu. Radix albicans, resinosa,
odorata, acris, aromatica.

Vires alexipharmacæ, calefacien-
tes, stomachicæ; in Germania
frequentissime a veterinariis in
usum trahitur, nostris in oris
vix nota.

Gentiana, *Gentiana lutea*
Off.

Gentiana major lutea C. B.

Gentiana CAMER. *Epit.* p. 415.

Gentiana caule folioso, foliis
ovatis, nervosis, flori-
bus verticillatis, rotatis
HALL. *Hist.* n. 637.

Gentiana lutea LINN. *Sp. pl.*
T. I. p. 329.

Gall. Gentiane.

Germ. Enzian, Bitterwurz.

In montanis, & subalpinis Helve-
tiæ frequens crescit.

Usu. Radix amarissima, a ve-
tustissimis temporibus celebris.

Vires stomachicæ, roborantes, in-
cidentes, anthelminticæ, em-
menagogæ; ad febres intermit-
tentes, podagram, & calculum
quoque laudatur.

Gentiana nigra, *Cervaria*
nigra Off.

Daucus montanus apii folio
major C. B. &

Daucus campestris apii folio.
EJUSD.

Cervaria Rivini.

Selinum foliis duplicato pin-
natis, pinnulis semibilo-

Pars I.

bis, circumferratis HALL.
Hist. n. 804.

Athamanta Cervaria LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 352.

Gall.

Germ. Schwarzer Enzian,
Schwarze Thieswurz.

In montosis graminosis & lapi-
dosis frequens.

Usu: Radix magna, extus fusca,
intus alba, resinosa, saporis
acris, aromatici, odoris grati,
fortis.

Vires omnino haud parvas promit-
tit, apud nos tamen hactenus
inusitata. Laudatur a nonnul-
lis in febribus intermittentibus,
podagra &c. In Germania a
veterinariis passim expetitur.

Gentiana rubra Off.

Gentiana major purpurea
C. B.

Gentiana foliis ovatis, lan-
ceolatis, nervosis, flori-
bus campaniformibus, fas-
ciculatis, rariter punctatis
HALLER. *Hist.* n. 639.

Gentiana purpurea LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 329.

Gall. Gentiane rouge.

Germ. Rohter Enzian.

Ex Alpibus *Helveticis* a Rhizoto-
mis ad nos affertur.

Vires eadem ac luteæ, quæ huic
sæpe substituitur.

Geranium robertianum Off.

Geranium robertianum pri-
mum C. B.

Geranium robertianum
BLACKW. Tab. 480.

Geranium foliis duplicato-
pinnatis, pinnis ultimis
confluentibus, calycibus
striatis, hirsutis HALL. *Hist.*
n. 943.

U

Ger-

Geranium robertianum LINN.

Spec. plant. T. I. p. 955.

Gall. Herbe a Robert.

Germ. Rupertskraut, Storchen
schnabel, rothe Gottsgnaden.

In dumetis, & ad sepes frequens
reperitur.

Usu: Folia lamiacei foetidi odo-
ris.

Vires vulnerariæ; ad fissuras lin-
guæ, papillarum commendan-
tur.

Ginseng vide Ninsi.

Glacies Mariæ Off.

Spatum speculare LINN. *Syst.*

Nat. T. III. pag. 48.

Gypsum lamellis rhomboi-
dalibus (parallelis) pellu-
cidum WALLER. *Mineral. p.*

72.

Gall. Amiante.

Germ. Frauen Eis.

Est species spati pellucida, albi-
cans, quæ cultri ope facile in
tenues lamellas separatur.

Reperitur in variis fodinis Helve-
tiæ ubi gypsum eruitur.

Vires absorbentes, ficcantes; in
dentifriciis adhibetur.

Glans quercina vide Quer-
cus.

Glans unguentaria vide
Been.

Glycirrhiza vide Liquiritia.

Gramen Off.

Gramen caninum arvense
seu gramen Dioscoridis
C. B.

Triticum radicibus repenti-
bus, vaginosis, foliis hir-
sutis, locustis quinque-
floris HALL. *Hist. n. 1426.*

Triticum repens LINN. *Sp. pl.*
T. I. p. 127.

Gall. Chiendent.

Germ. Hundsgras, Quecken-
gras.

In hortis, vineis & agris exosa
agricolis planta abunde crescit.

Usu. Radix geniculata, inter-
nodiis serpens, & ex cacumine
novas radices spargens, dulcis.

Vires resolventes, abstergentes,
aperientes, saponaceæ. Ad de-
cocta diætetica frequens adhi-
betur.

Granatorum flores vide Ba-
lauftia.

Granatus lapis Off.

Borax (Granatus) tessella-
tus, solidus, politus, scin-
tillans LINN. *Syst. nat. T. III.*

p. 72.

Gemma plus minus pellu-
cida, duritie octava, co-
lore obscure rubro, in
igne permanente, lapide
liquefcente WALLER. *Mi-
neral. p. 159.*

Gall. Grenat.

Germ. Granat.

Gemma in Hispania, Bohemia,
aliisque locis reperiunda; sed
orientalis omnium pulcherrima.

Vires ab Arabibus tribuebantur cor-
diales, venenis resistentes, ho-
die vix in usum trahuntur.

Granata Poma & Cortex
Off.

Malus punica fativa C. B.

Granatus Punica Mala
BLACKW. *Tab. 145.*

Punica spinosa, foliis niten-
tibus, ellipticis, integerri-
mis, floribus sessilibus
HALL. *Hist. n. 1098.*

Punica Granatum LINN. *Spec.*
plant. T. I. p. 676.

Gall. Pomme & Ecorce de
Grenade.

Germ.

Germ. Granatapfel, und Granaten Schale.

Arbor in meridionali Europa spontanea, apud nos in hortis colitur.

Usu: Pomum ejusque Cortex, qui Malicorium audit.

Vires. Semina acida sunt, & syrupum grati saporis dant ad sitim, & in febribus. Cortex fortioribus adstringentibus adnumeratur, & a tinctoribus ad nigrum colorem requiritur.

Gratiola Off.

Gratiola centaurioides C. B.

Gratiola BLACKW. Tab. 411. HALL. *Hist.* n. 329.

Gratiola officinalis LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 24.

Gall. Gratiolle, Herbe a pauvre homme.

Germ. Wild Aurin, Gottsgnaden.

Passim in Helvetia locis humidis crescit.

Usu. Folia amarissimi & ingrati saporis.

Vires purgantes sursum & deorsum, & quidem vehementer. Ad tæniam laudatur, sed quandoque absque effectu esse ipse expertus sum.

Guajacum lignum Off.

Guajacum magna matrice C. B.

Arbor ligni sancti vel Guajacum SEBÆ *Thesaur.* T. I. p. 86. Tab. 53. fig. 2.

Lignum vitæ ex Jamaica, Guajacum BLACKW. Tab. 350. fig. 1. & 2.

Guajacum foliis pinnatis, foliolis quaternis, obtusis LINN. *Mat. Med.* p. 70. n. 207.

Guajacum officinale LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 546.

Gall. Bois de Gayac.

Germ. Franzosenholz.

Ex America ad nos affertur.

Lignum est valde densum, ponderosum, solidum, parte interiori ex viridi nigricans, in ambitu pallide flavescens, saporis subacris, fauces compungentis; odoris dum incalescit, aut comburitur, fragrantis. Tegitur cortice lignoso, tenui, nitido, ex plurimis lamellis coagmentato, ex cinereo viridescente & nigricante, cujus sapor acris, amarus, ingratus. Resinam vulneratum stillat, quæ gummi Guajaci dicitur.

Usu. Lignum, Cortex & Resina.

Vires calefacientes, stimulant, attenuantes, aperientes, urinam & sudorem pellentes, hinc non solum ad luen venereum curandam celebratissimum præbet remedium, sed & ad varia lymphæ vitia per sudorem eliminanda, ad rheumatismum, scabiem, achores, glandulas tumefactas &c. cum regimine calido toties cum fructu adhibetur, nec tamen omnibus convenit.

Gutta Gummi, Gutta Gamba, Gambogia Off.

Gall. Gomme Gutte.

Germ. Gummi Gutt.

Est succus gummosus & resinofus, densus, durus, nitidus, ex croceo flavescens, in massas orbiculares, vel baculos cylindricos compactus, odoris nullius, saporis, dum aliquandiu ore tenetur, parum acris. Hunc supeditat arbor quæ vocatur

Coddam Pulli Hort. Malab. T. I. p. 41. Tab. 24.

Cambogia Gutta LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 728.

Crescit in India orientali.

Vires drastica, hydragoga, sursum deorsumque purgantes ut plerique ejus usum minus tu-

tum esse censeant, licet alii mitius de eo sentiant. Pictoribus magis in usu est, quam medicis.

H.

Hæmatites Lapis Off.

Ferrum mineralisatum, minera figurata, rubra, aut tritura rubente WALL. *Mineral.* p. 336.

Ferrum Hæmatites LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 140.

Gall. Pierre Hematite.

Germ. Blutstein.

Est substantia ferruginea, dura, ponderosa, colore obscure rubente, sapore terreo & adstringente, quæ fracta fibras instar ligni longas, tenues, acuum in modum acutas habet.

In ferri fodinis reperitur.

Vires adstringentes, siccantes, roborantes, uti in ferro & croco martis. Dicitur equidem in hæmoptysi & ulcere pulmonum ulcus exsiccare, & sanare, sed hoc nimium.

Halicacabum vide Alkeken-
gi.

Hastula regia, v. Asphodelus.

Hedera arborea Off.

Hedera arborea C. B.

Hedera BLACKW. T. 188.

Hedera foliis sterilibus trilobatis, fructiferis ovatis lanceolatis HALL. *Hist.* n. 826.

Hedera Helix LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 292.

Gall. Lierre.

Germ. Epheu, Baumwinde.

Crescit fere ubique in arboribus putrescentibus, & muris.

Ufu: Folia saporis amari & nauseosi; & Baccæ, quæ acidæ.

Vires. Folia in pulvere exhibita

laudantur ad atrophiam puerilem, & imponuntur ulceribus & partibus quæ cauteria læserunt; in cataplasmate mammas confirmant & lac dispellunt; ex iisdem coctis mucilago paratur ad fonticulos utilis.

Baccæ dicuntur sudorem movere.

Ex eadem hacce arbore vulnerata in calidis regionibus India, Persia, quin & in Italia, imo Geneva stillat resina, quæ dicitur

Hederæ Lacrima, vel Gummi Off.

Est substantia resinosa, arida, dura, colore fusco, rubiginoso, nonnihil pellucida & rubra si in parva ramenta disrumpitur, sapore subacri, leviter adstringente, parum aromatico, odore nullo.

Vires detergentes, balsamicæ; ad vulnera adhibetur.

Hedera terrestris Off.

Hedera terrestris vulgaris
C. B.

Hedera terrestris BLACKW. T. 225.

Chameclema caule procumbente, radicato, foliis reniformibus, rotunde crenatis HALL. *Hist.* n. 245.

Glechoma hederacea LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 807.

Gall. Lierre terrestre, Terrette.

Germ. Gundelreben, Gundermann.

Juxta sepes apud nos frequens crescit.

Ufu.

Ufu: Folia amara, cum aliqua acrimonia, absque aromate.

Vires vulnerariæ esse dicuntur, aperientes. Ad ulcera interna, & morbos pectoris commendatur.

Helenium vide Enula.

Helianthemum Off.

Chamæcistus vulgaris C. B.
Flos Solis, panax chironium
CAMER. *Epit.* p. 501.

Cistus foliis conjugatis, ellipticis, hirsutis, integerimis, petiolis unifloris, subhirsutis HALL. *Hist.* n. 1033.

Cistus Helianthemum LINN.
Spec. plant. T. I. p. 744.

Gall. Heliantheme, Herbe d'or, Hysope des Garrigues.

Germ. Sonnengünsel, Seyde Isop.

Ubique ad vias apud nos crescit.

Ufu. Herba succo lento & glutinoso scatens.

Vires vulnerariæ & adstringentes, ad fluxum sanguinis & alvi compescendum, ad oris ulcera commendatur. Nobis haud in usu est.

Heliotropium vide Torna folis cœrulea.

Helleborastrum Off.

Helleborus niger foetidus
C. B.

Helleboraster BLACKW. T. 57.

Helleborus caule ramoso, multifloro, foliis multipartitis, ferratis, stipulis ovato-lanceolatis, coloratis
HALL. *Hist.* n. 1193.

Helleborus foetidus LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 784.

Gall. Pied de Griffon.

Germ. Laüßkraut, stinkende schwarze Nieswurz.

Pars I.

In dumetis & sylvosis frequens, floret Martio.

Tota planta ingratissime foetet.

Ufu. Folia & Radix. Licet nomen in Officinis nostris ignotum sit, sæpissime tamen ibi radix ejus prostat loco verioris *Hellebori nigri*.

Vires. Radix alvum ducit etiam vehementius quam *Helleborus niger*. Folia contra vermes laudantur, etiam contra tæniam ad drachmæ pondus in infuso vel dimidiæ drachmæ in pulvere. Aliquoties ad tæniam debellandam etiam per 3 & 4 hebdomades meo consilio ejus usus continuatus est sed frustra, nisi quod continuos fere vomendi conatus, dolores colicos vehementes & tandem cardialgiam fere insuperabilem excitaverit.

Helleborus albus, Elleborus albus Off.

Helleborus albus flore subviridi C. B.

Elleborum album CAMER. *Epit.* p. 939.

Veratum spica paniculata, floribus maribus & feminis
HALL. *Hist.* n. 204.

Veratrum album LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1479.

Gall. Ellebore, Hellebore blanc.

Germ. Weiße Nieswurz.

In montanis & subalpinis *Helvetiæ* passim abunde.

Ufu. Radix flavescens ex capite sive tubere plurimas longas fibras demittens, saporis valde acris, fauces & labia mordentis.

Vires. Fortissimum est drasticum vehementissime per superiora & inferiora purgans, ut potius inter venena referri debeat. Errhinum præterea est summum. Cautè igitur præscribendum,
X

bendum, & non nisi in desperatis malis v. g. in mania, hydrope rebeli &c. Decoctum ejus pediculos necat.

Helleborus niger, **Elleborus niger** Off.

Gall. Hellebore, **Ellebore noir.**

Germ. Schwarze Niesß-Wurzel, Christ-Wurzel.

Variae a variis plantis suppeditatae radices sub hoc nomine in officinis prostant, quas hic breviter enumerare lubet.

Primo

Helleborus niger flore roseo
C. B.

Helleborus niger vulgaris flore roseo BLACKW. T. 506. & ejus varietas Tab. 507. & orientalis Tab. 505. & Styriacus Tab. 508. merae enim varietates sunt.

Helleborus niger LINN. *Spec. plant.* p. 783.

In *Styria*, *Oriente* &c. provenit, in hortis apud nos passim frequens, floret Decembri, Januario.

Hic vulgo pro vero antiquorum Helleboro nigro sumitur.

Secundo

Helleborus niger flore viridi C. B.

Helleborus niger Styriacus flore viridi major BLACKW. Tab. 509. & minor Tab. 510. & minoris varietas Tab. 511. merae varietates.

Helleborus foliis multipartitis, ferratis, caule paucifloro HALL. *Hist.* n. 1192.

Helleborus viridis LINN. *Sp. plant.* p. 784.

Passim in *Helvetia* provenit sed rarius.

Tertio

Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore C. B.

Helleborus Hippocratis BLACKW. Tab. 504.

Adonis radice perenni, flore dodecapetalo HALL. *Hist.* n. 1157.

Adonis vernalis LINN. *Sp. plant.* p. 771.

In *Valesia* segetibus inque *Thuringia*, *Bohemia* &c. provenit, nobis hortensis.

Quarto

Helleboraster paulo superius jam dictus.

Alias, ne nimis longi simus, passim pro vero Helleboro nigro divenditas, plantas silentio praetereamus.

Verus ergo est **Helleborus niger**, primo loco dictus, licet tertius nostris in officinis frequentius reperiatur.

Usu. Radix sive potius Fibræ Radicis succulenta, foris nigra, intus albentes, quas truncus sive caput crassum, nodosum, plurimas demittit. Sapor amarus est acris, sicuti & odor.

Vires multifariae huic radici tribuuntur. Purgans ejus vis jam Veteribus nota erat, si quidem de eadem stirpe locuti sunt. Etiam ad flagitium usque alvum quandoque movisse, ut convulsiones, intestinorum inflammatio, ipsa mors inde secuta fuerint, passim legimus. Porro in mania, febre quartana, podagra, retentis mensibus &c. saepius utiliter adhibita est. Veterinarii etiam ea frequenter utuntur.

Hepatica fontana vide **Lichen petræus**.

Hepatica nobilis, Herba Trinitatis Off.

Trifo-

Trifolium hepaticum flore simplici C. B.

Hepatica nobilis BLACKW. T. 207.

Hepatica foliis trilobis, integerrimis HALL. *Hist.* n. 1156.

Anemone hepatica LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 756.

Gall. Hepatique, Hepatique noble.

Germ. Edel Leberkraut.

In *Helvetiæ* sylvis præsertim abiegnis passim abunde occurrit & primo vere floret.

Usu. Folia apud nos satis usitata. Vires adstringentes, vulnerariæ.

Hepatica stellata vide *Matri-sylva*.

Hermodactylus Off.

Iris tuberosa, folio anguloso C. B.

Hermodactylus folio quadrangulo TOURNEF. *Corall.* ad I. R. H. p. 50.

Iris tuberosa LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 58.

Gall. Hermodatte.

Germ. Hermodattlen, Syrische Zeitlose.

Hujus plantæ radix vulgo esse creditur, quæ in Officinis sub nomine *Hermodactyli* prostat. Albicans est nodosa, paulum compressa, utcunque cordiformis, dura, solida, saporis subdulcis, acriusculi, odoris nullius.

Ex Syria, Smirna &c. advehitur.

Vires. Inter sanguinem depurantia sic dicta remedia refertur. Leniter laxat, urinam movet & in arthritide, lue venerea a nonnullis utiliter adhibita est. Externe in collyrio adversus guttam serenam laudatur, nobis fere obsoleta.

Herniaria, Millegrana, Herba Turca Off.

Polygonum minus five Millegrana major C. B.

Herniaria BLACKW. Tab. 320.

Herniaria glabra, glomerulis multifloris HALL. *Hist.* n. 1552.

Herniaria glabra LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 317.

Gall. Turquette, Herniole.

Germ. Sarnkraut, Bruchkraut.

In arenosis agris & fluviorum litoribus, nec non in viis glareosis passim apud nos frequens.

Et

Herniaria hirsuta IOH. BAUH. *Hist. plant.* T. III. pag. 379.

Herniaria hirsuta, glomerulis paucifloris HALL. *Hist.* n. 1553.

Herniaria hirsuta LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 317.

In agris lapidosis passim abunde. Ambæ species promiscue in Officinis nostris prostant, neque videntur viribus differre.

Usu. Herba.

Vires adstringentes, diureticiæ. Ad hernias etiam laudatur, nec non adversus oculorum caliginem, rarioris apud nos usus.

Hippopotamus Off. & plurim. Autor.

Hippopotamus amphibius LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 101.

Gall. Hippopotame.

Germ. Seepferd, Meerroß.

Nilum aliosque fluvios majores *Africæ* & *Asiæ* inhabitat amphibium animal magnitudine fere Elephantis, Behemot Jobi vulgo creditum.

Usu. Dentes laniarii, magni, prominentes, recurvi, ad basin cavi, versus apicem solidi, albi, ponderosi.

Vires ipsis antepilepticiæ & antispasmo-

spasmodicæ, adstringentes, hæmorrhagias fistentes, partum promoventes ex mera superstitione tribuebantur, merito ergo hodie pene neglecti.

Hircus Off.

Capra Hircus LINN. *Syst. Nat.*

T. I. p. 94.

Gall. Bouc.

Germ. Boek.

Animal notissimum.

Ufu. Sanguis & Sevum.

Vires. Sanguis in clibano exsiccatus & in pulverem tritus a longo jam tempore plurimum laudatur ad resolutionem sanguinis coagulati & extravasati in casu ab alto, etiam in pleuritide, dysenteria, calculo a nonnullis commendatur. Sebum iisdem viribus pollet, quibus cervinum sebum.

Hirundinaria vide Vincetoxicum.

Hirundo Off.

Hirundo domestica GESN.

ALDROVAND. &c.

Hirundo rustica LINN. *Syst.*

Nat. T. I. p. 343.

Gall. Hironnelle.

Germ. Schwalbe, Hauschwalbe.

Notissima Avis.

Ufu. Pulli integri in cineres combusti & eorum Nidus.

Vires. Combustæ hirundines antiepilepticæ audiunt & in angina fauciumque & tonsillarum inflammatione commendantur.

Nidus in cataplasmate adhibitus resolvere & discutere dicitur.

Hirudo Off.

Hirudo medicinalis RAJI, LINN.

Syst. Nat. T. I. p. 1079.

Hirudo major & varia

GESN. *Hist. Pisc.*

Gall. Sangsue.

Germ. Blutigel, Blutsauger.

Habitat in aquis dulcibus, stagnantibus vel lente fluentibus.

Vermes est aquatilis, apodus, niger, lineis & punctis varius.

Vires. Corpori quocunque in loco applicata sanguinem exsugit, hinc in hæmorrhoidibus cœcis, odontalgia &c. perutilis. Methodus eas applicandi ex Chirurgia petendus.

Hispidula vide Auricula muris.

Hordeum crudum, mundatum, perlatum Off.

Hordeum distichon C. B.

LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 125.

Gall. Orge.

Germ. Gerste.

Ubique colitur.

Ufu. Semen, quod folliculo suo adhuc inclusum, integrum sive crudum, rohe, raube Gerste, ab eo liberum, mundatum, bloße, gerennelte Gerste, tandem in minora rotunda margaritis similia granula molæ peculiaris ope comminutum, perlatum, reine Gerste, Gersten Graupe vocatur.

Vires demulcentes, refrigerantes, diluentes, temperantes, nutrites, ut ab omni fere tempore in cibum receptum sit, & in quamplurimis morbis utilissimum decoctum largiatur.

Horminum vide Sclarea.

Hyacinthus Lapis Off.

Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubente, igne liquefscens, Hyacinthns WALL. *Mineral.* p. 160.

Ni-

Nitrum fluor purpureo-fulvum LINN. *Syst. Nat.* T. III. pag. 85. n. 3. Variet *a*.

Gall. Hyacinthe.

Germ. Syacintb.

Gemma est pellucida, ex flavo vel croceo purpurascens & ex utraque *India* adfertur. Præfertur tamen *orientalis*.

Vires roborantes, analepticæ, antispasmodicæ Veteres ei tribuebant. Eodem jure in Medicina adhibetur, quo ceteræ gemmæ.

Hydrargyrum vide **Argentum vivum**.

Hyosciamus Off.

Hyosciamus vulgaris & niger C. B.

Hyosciamus CAMERAR. *Epit.* pag. 807. STOERCK. *de Aconit.* &c. c. bon. icone Tab. I.

Hyosciamus foliis amplexicaulibus, sinuatis, floribus sessilibus HALL. *Hist.* n. 580.

Hyosciamus niger LINN. *Spec. pl.* p. 257.

Gall. Jusquiame, Hannebanne.

Germ. Gemein Bilsenkraut, Schlafkraut.

Ad fimeta & vias publicas provenit.

Et

Hyosciamus albus major & minor C. B.

Hyosciamus albus BLACKW. Tab. 3. LINN. *Sp. plant.* p. 257.

Gall. Jusquiame blanche.

Germ. Weiß Bilsenkraut.

In calidiori *Europa* crescit, nobis passim hortenſis.

Perinde utraque species adhibetur & à nonnullis albus tanquam mitior & tutior præfertur.

Usu. Radix, Folia, Semen.

Parſ I.

Tota planta odoris narcrotici, foetidi.

Vires emollientes & narcoticas insignes possidet, ut mentis alienationes, deliria, sopores, convulsiones &c. imo ipsa mors ejus usum secuta fuerint. Radix rarius in usum venit. Folia recentia externe applicata, anodina sua vi quoscunque dolores mitigant, & ad apostemata laudantur. Seminum fumus ad dentium dolores sedandos apud nos usitatissimus, utique ex falsa opinione, vermiculos in dentium cavo nidulantes inde enecari.

Interne rarius adhibebatur, donec ILL. STOERCK etiam hujus venenatæ stirpis vires exploraverit, ejusque succum in extracti consistentiam inspissatum in convulsionibus, crampo, vehementibus doloribus, tussi sicca, epilepsia, hæmoptoë, mania, melancholia &c. bono passim cum effectu propinaverit.

Hypecacuanha vide **Ipecacuanha**.

Hypericum, Fuga Dæmonum, Perforata Off.

Hypericum vulgare C. B.

Hypericum BLACKW. Tab. 15.

Hypericum caule terete, alato, ramosissimo, foliis ovatis, perforatis HALL. *Hist.* n. 1037.

Hypericum perforatum LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1105.

Gall. Millepertuis.

Germ. St. Johanniskraut.

In agris sterilibus, ad vias & in dumetis frequens.

Usu. Herba sive potius Summitates cum floribus.

Vires. Balsamica est planta, resinosa, ad ignem oleum fundens terebinthinacæ indolis. Hinc

Y

vul-

vulneraria est præstantissima, detergens, aperiens, nervina. Etiam diuretica, febrifuga, antimagica audit.

Hypocistis Off. c. B. CAMERAR.
Epit. pag. 96, 97.

Asarum Hypocistis LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 633.

Cytinus Hypocistis E. J. U. S. D.
Syst. Nat. Edit. XII. Tom. II. pag. 602.

Gall. Hypociste.

Germ. Sypocist.

In calidioribus regionibus *Cisti* cujusdam radicibus innascens, parasitica planta, succulenta.

Usu. Succus ex tota planta expressus, spontanea evaporatione vel igne in siccam massam condensatus, nigram, resinoso-gummosam, saporis acerbi, adstringentis.

Vires adstringentes, eadem quæ succo Acaciarum.

Hyssopus, **Hyssopus** Off.
Hyssopus officinarum cœrulea, sive spicata c. B.

Hyssopus BLACKW. Tab. 296.

Hyssopus foliis linearibus, punctatis, verticillis in spicas continuatis HALL. *Hist.* n. 249.

Hyssopus officinalis LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 796.

Gall. Hysope.

Germ. Isop, Ysop, Hyssop.

In hortis colitur.

Usu. Folia odorata, acria, aromatica.

Vires resolventes, incidentes, pectorales. An & stomachicæ, diureticæ, anthelminticæ, antiepilepticæ?

I.

Jalapa, **Jalappa**, **Jalapium**, **Mechoacanna nigra** Off.
Solanum mexicanum flore magno c. B.

Jalapium BLACKW. Tab. 404.

Mirabilis (Jalappa) floribus congestis, terminalibus, erectis LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 252.

Gall. Jalap.

Germ. Jalappenwurzel.

Ex America ad nos affertur orbiculatim dissecta.

Usu: Radix turbinata, crassa, oblonga, foris nigricans, intus fusca vel cinerea, resinosa, flammam concipiens, sapore nonnihil acri & nauseoso. Recens lactescit.

Vires purgantes, notissimæ. Haud raro nauseam vel vomitum movet, etiam spasmos excitat, in-

primis in sensilioribus. Phlegmaticis & infantibus tuto adhibetur, licet ab ea abstinere aliqui suadeant.

Vid. etiam **Mechoacanna nigra**.

Jasminum Off.

Jasminum vulgatius flore albo c. B.

Jasminum album BLACKW. Tab. 13.

Jasminum officinale LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 9.

Gall. Jesmin.

Germ. Jasmin.

In hortis colitur apud nos planta in India sponte crescens.

Usu. Flores suavi fortique odore præditi, quem & oleo infusæ communicant.

Vires reficientes. Sed magis ad capillos grato odore imbuendos adhibentur, quam in usum medicum.

Ich-

Ichthyocolla Off.

Gall. Colle de poisson.

Germ. Hausenblase, Fischleim.

Est gluten, quod in *Moscovia* præcipue ex Hufonis piscis partibus variis membranaceis & cartilagineis maceratis, in pultis consistentiam excoctis, dein in pelliculas diductis, tandem in spiras cogitur & exsiccat. Piscis, ex quo præcipue paratur, est

Huso Germanorum WIL-
LUGHBEI *Ichthyol.* 243.

Acipenser tuberculis carens
ARTED. Gen. 65. Syn. 92.

Acipenser cirrhis quatuor,
squamis dorsalibus 13,
caudalibus 43. LINN. *Syst.*
Nat. T. I. pag. 404.

Gall. Poisson, dont on tire
la colle de poisson.

Germ. Hausen.

In *Danubio* & fluviis imperii *Ru-*
benici reperitur.

Vires mucilaginosæ, incrassantes,
demulcentes, in dysenteria qui-
busdam laudatur; sed usus ip-
sius magis oeconomicus, quam
medicus.

Impatiens vide Noli me
tangere.

Imperatoria, Imperatoria al-
ba, Ostruthium Off.

Imperatoria major c. B.

Imperatoria BLACKW. T. 279.
HALL. *Hist.* n. 805.

Imperatoria Ostruthium
LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 371.

Gall. Imperatoire.

Germ. Meisterwurz, weisse Mei-
sterwurz.

In alpibus *Helveticis* sponte cre-
cit, & in hortis colitur.

Usu. Radix acris, aromatica,
multum resinæ continens.

Vires alexipharmacæ, nam sudo-

res & urinam movet, & majo-
ri copia alvum, coagula resol-
vit; hinc utilis in morbis pec-
toris mucosis, lentis, in mor-
bis frigidis & hydrope, ad co-
licam & ventriculum debilem.
Radix masticata potenter sali-
vem ciet.

Indigo, Indicum, Indicus
color Off.

Gall. Inde.

Germ. Indig, blau Indigo.

Est pigmentum cæruleum singu-
lari artificio ex herba Anil dic-
ta, maceratione & comminu-
tione præparatum. Planta ex
qua conficitur est

Isatis indica foliis rorisinari-
ni, glasto affinis c. B.

Anil seu Nil Indorum color
IOH. BAUH. *Hist. plant.* T. II.
p. 945.

Indicum, Tarron RUMPH.
Herb. Amboin. Tom. V. pag.
220. Tab. 80.

Indigofera leguminibus ar-
cuatis, incanis, racemis
folio brevioribus LINN.
Mat. Med. p. 123. n. 348.

Indigofera tinctoria LINN. *Sp.*
pl. T. II. p. 1061.

Habitat in *India* utraque.

Vires summe adstringentes esse
perhibentur, sed vix in usu
nisi ad artem tinctoriam.

Ipecacuanha, Hypecacuanha
Off.

Gall. Ipecacuanne.

Germ. Indianische Brechwur-
zel.

Dux radices in officinis nostris
cum hoc nomine reperiuntur,
scilicet cinerea & fusca; & au-
tores adhuc mentionem faciunt
Ipecacuanhæ albæ, quam adul-
terinam vocant. De plantis ip-
sis nihil certi hætenus constat.

Cinerea duas tresve lineas crassa, tortuosa, annulatim quasi exasperata, dilute fusca vel cinerea, densa, fragilis, resinosa, cum nervo exiguo in media radice; sapore subacri, amaricante. Hæc ex *Peruvia* allata, *Peruviana* dicitur, & cæteris, quod mitior sit ejus operandi ratio, anteponitur. An hæc est *Euphorbia Ipecacuanhæ* LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 653?

Fusca tortuosa, rugis magis exasperata, quam cinerea, tenuior, lineam crassa, foris fusca vel nigricans, intus alba, leviter amaricans. Hæc a loco, ubi crescit, *Brasilensis* dicitur; & longe vehementiorem vomitum excitare perhibetur. Plantæ hac radice gaudentis meminit MARCGRAV. *Hist. nat. Brasil.* p. 17. cum icone rudiori & PISO *de medic. Brasil.* pag. 101. cum ead. ic.

Alba, seu adulterina, tenuis, lignosa est, rugis caret, amaroris expers est, & ex albo flavicat. Hæc nec vomitum nec alvum movet. De hac brevem mentionem facit PISO loco citato.

Vires. Emeticum est lene, & tutissimum, satis notum. Pro specifico in dysenteria celebratur, nec tamen in ea aliis emeticis plus præstat. In parva dosi idem quandoque præstare, quam in consueta, ipse post anglos propria experientia edoctus sum. Vim purgantem unice in cortice residere angli asserunt.

Iris florentina Off.

Iris alba florentina C. B.

Iris florentina BLACKW. Tab.

414.

Iris (florentina) corollis bar-

batis, caule foliis altiore, subbifloro, floribus sessilibus LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 55.

Gall. Iris de florence.

Germ. Florentinische Violett-Wurzel.

Crescit in *Europa* australi.

Usu. Radix, quæ nobis affertur in frustis crassis, geniculatis, candidis, a quibus cortex detractus est, odore grato, violaceo, & sapore acri prædita est.

Vires attenuantes, incidentes lympham tenaciorem; hinc in asthmate laudatur. Infantibus sæpe alvum & urinam movet.

Iris nostras Off.

Iris vulgaris germanica sive sylvestris C. B.

Iris nostras hortensis BLACKW. Tab. 69.

Iris foliis ensiformibus, distichis, petalis reflexis, barbatis: tubalium arcu obtuso HALL. *Hist. n.* 1258.

Iris germanica LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 55.

Gall. Iris bleu, Flambe ou Glayeul.

Germ. Blaue Schwertel, Lilien.

In hortis colitur, licet & sponte, sed rarius, apud nos crescat.

Usu. Radix crassa, gravi odore; dum recens est, prædita; gratiori in ficcata.

Vires. Inter hydragoga valentiora recensetur, phlegma & bilem ducens, in nimia dosi etiam sanguinem, & bilem atram. Ad hydropem commendatur radix recens, vel succus radicis.

Iva arthritica vide Chamæpitys.

Judaicus lapis, Olivæ lapideæ Off.

Echi-

Echinorum claviculæ lapideæ WALL. *Mineral.* p. 483.

Helmintholithus (Judaicus) obovatus, crenulato-striatus, subpetiolatus LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 165.

Gall. Pierre judaïque.

Germ. Judenstein.

A *Judæa* nomen habet, ubi olim colligebatur, nunc passim etiam in nostro agro occurrit. Est lapis oblongus, olivæ figura, striis & sulcis secundum longitudinem excurrentibus, & æquidistantibus distinctus; pro radio Echini marini petrefacto hodie habetur.

Vires olim putabantur esse diureticæ & lithonthricticæ.

Juglans nux Off.

Nux juglans sive regia vulgaris C. B.

Juglans BLACKW. Tab. 247.

Juglans foliis septenis, ovato-lanceolatis, integerrimis HALL. *Hist.* n. 1624.

Nux regia LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1415.

Gall. Noix, & Noyer.

Germ. Nuß, und Nußbaum.

Juxta vias copiose apud nos colitur.

Ufu. Nuces earumque Cortex.

Vires. Nuces in cibum cedunt faucibus inimicum, & oleum dant leniens, emolliens, etiam edule, ad vermes utile. Extractum aquosum ex immaturis nucibus paratum ceu anthelminticum summum deprædicatur in infantibus. Conditæ etiam in officinis prostant & roob dianucum ad aphthas vulgo commendatum.

Jujubæ, Zizypha Off.

Jujubæ majores oblongæ C. B.

Gall. Jujubes.

Pars I.

Germ. Røthe Brustbeeren.

Sunt fructus rubri, rugosi, olivæ magnitudine, pulpa instructi molli, fungosa, in cujus medio osficulum oblongum, saporis dulcis & vinosi. Arbor, cui innascuntur, est

Jujuba sylvestris C. B.

Zizyphus DODON. *Pempt.* p. 807.

Jujubæ, Zizyphus BLACKWELL. Tab. 569.

Rhamnus Zizyphus LINN.

Spec. pl. T. I. p. 282.

Habitat in *Italia*, *Hispania*, *Gallia* calidiori.

Vires demulcentes, mucilaginosæ; ad humorum acrimoniam obtundendam in pectoris affectibus utiles.

Juniperus Off.

Juniperus vulgaris fruticosa C. B.

Juniperus BLACKW. Tab. 184.

Juniperus foliis convexo-concavis, aristatis, baccis alaribus HALL. *Hist.* n. 1662.

Juniperus communis LINN.

Spec. pl. T. II. p. 1470.

Gall. Genevrier, & fructus Genevre.

Germ. Wachholderbaum, und Beeren, nostr. Reckholder.

Ubique fere in montosis macilentis locis crescit.

Ufu. Lignum & Baccæ; odore & sapore aromatico gaudentes.

Vires. Lignum incensum ob sua veolentiam ad aerem pravis halitibus inquinatum emendandum adhibetur, idemque in decocto sudoriferum est, resolvit & roborat, & ad luem veneream commendatur. Baccæ aromaticæ, stomachicæ, urinam potenter pellunt, & menses; ad morbos pectoris, & viscera obstructa, calculosam quæ materiem expellendam laudantur.

Inter lignum & corticem hujus fruti-

Z

fruticis in calidis regionibus boni odoris resina colligitur, quæ in Africa sponte vel per corti-

cis incisiones stillat, diciturque Sandaracha *Arabum* de qua suo loco.

K.

Keiri vide Cheiri.

Kermes, Chermes Grana Off.
Coccus baphica Diosc.

Gall. Graines de Kermes,
Graines d'Escarlatte, Vermillon.

Germ. Scharlachbeeren, Kermesinbeeren.

Sunt folliculi membranacei, pisi magnitudine, ex rufo fusci, innumeris turgentes ovulis rubentibus; digitis attriti liquorem fundunt coccineum, saporis subacris, odoris non ingrati. Adhærent foliis & teneris furculis Arboris, quæ dicitur

Ilex aculeata cocciglandifera
C. B. GARIDEL. *Hist. des plant.*
d'Aix pag. 245. Tab. 53.

Quercus (coccifera) foliis ovatis, indivisis, spinoso-

dentatis, glabris LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1413.

Habitat in Gallia Narbonensi, Hispania, Italia &c.

Producuntur vero hi folliculi, plane uti Gallæ in Quercubus, a punctura vel vulnere arbori inflicto ab insecto, quod ad familiam Gallo-insectorum REAUMURII (Gall. Gallinsectes) pertinet, & est

Coccus Ilcis LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 740.

Historia naturalis hujus insecti cum figuris necessariis extat in GARIDELLI opere modo citato pag. 247. & seq. Tab. 2.

Vires leniter adstringentes, & roborantes; cardiacæ plerisque habentur, præsertim syrupus Kermes inde confectus, & confectio Alkermes.

L.

Labdanum, Ladanum Off.
Gall. Labdanum.

Germ. Ladan, Gummi Ladanum.

Est substantia resinosa, in spiras circumvoluta, & contorta, sicca, fragilis, arenâ nigra plerumque permixta, coloris nigricantis, odoris grati, saporis amaricantis; dicitur

Gall. Labdanum en tortis.

Germ. Ladan in Rollen.

Datur vero & alia species longe præstantior, in massas majores molles compacta, emplastri fere consistentia, intra digitos lentescens, odoris magis fra-

grantis, coloris ex rufo nigrescentis. Hæc vesicis involuta longe minus arenæ continet, sed rarius in Officinis nostris prostat, dicitur

Gall. Labdanum en masses ou en Pains.

Germ. Ladan in Brodt.

Planta, ex cujus foliis hæc resina æstivo tempore exsudat, est

Cistus ladanifera cretica, flore purpureo. TOURNEF.
Coroll. *Inst. Rei herb.* p. 19.

Ladanum creticum PROSP.
ALPIN. *Exotic.* p. 88. & 89.

Cistus cretica LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 738.

Cres-

Crescit in insula *Creta* aliisque *Maris Ægei* insulis.

Vires. Externo usu emollit, attenuat, resolvit, hinc ad emplastra cephalica & stomachica adhibetur; interne adstringit, roborat, sed raro in usum trahitur.

Lac Off.

Gall. Lait.

Germ. Milch.

Liquor in animali corpore ex ingestis præparatus, unicuique notissimus, ab omni tempore & alimentum, & remedium præstantissimum exhibet.

Vires nutrientes, demulcentes, lubricantes, emollientes: hinc edulcorandis acrioribus humoribus in ægris hæcticis, arthriticis, rheumaticis, scorbuticis & debilibus, præ aliis quam maxime conducit.

Lactis vero insignis est diversitas pro diversitate alimenti, climatis, & animalis ex quo defumitur. Sic facultate nutriendi omni alio Lacte præstantius est Lac muliebre ex ipsis uberibus exsuctum. Huic suppar censetur Lac asininum, dein caprillum sequitur, cui subjungitur ovillum (quod tamen apud nos vix in usu est) & tandem vaccinum, quod vere & æstate optimum, dum recentibus herbis in lætis pascuis vacca fruitur. Egregia ex hoc lacte possidemus præparata, lactis serum, lac ebutyratum, cremorem lactis, butyrum, caseum, lac spissum &c. multi & in medicina, & in re oeconomica usus.

Lac Lunæ, Agaricus mineralis Off.

Creta friabilissima, levissima, non cohærens, alba

WALLER. *Mineral.* p. 18.

Calx (Gur) fixa, impalpa-

bilis, farinosa LINN. *Syst. nat.* T. III. p. 267.

Gall. Agaric mineral, Lait de Lune.

Germ. Mondmilch.

Est substantia fungosa, friabilis, levis, sicca, candida, agarico vulgari similis saporis & odoris expers, quam aqua pluvia dissolvit, & in rimas petrarum, & speluncas exsudare & destillare facit.

Reperitur præcipue in monte pileato five *Pilati* dicto *Helvetiæ*.

Vires. Cum acidis effervescebat, hinc absorbens est. Ob colorem lacteum olim credebatur nutritibus lac augere.

Lacca Gummi Off.

Gall. Gomme Lacque.

Germ. Lacka, Lack.

Est species ceræ, coloris rubri, quæ ab insectis quibusdam, & quidem a formicis rubris volantibus, in *Indiæ orientalis* regionibus variis, ex arboribus seu plantis colligitur, & ramulis arborum, præcipue *Jujubæ indicæ* Ber dictæ, cujus icon extat apud BLACKW. Tab. 388. agglutinatur, & in cellulas parvas, oblongas, fere ut apum alveolaria efformatur. Hæ cellulæ primum pallidæ sunt, postea vero rubicundum colorem acquirunt, si ova his alveolis inclusa, in vermiculos & chrysalides rubicundissimas mutata succum hunc emittant, si calor solaris ope tota massa tingatur.

Tres in officinis species occurrunt.

1. **Lacca in ramulis & bacillis** coloris fusci est, saporis subadstringentis, odoris fere nullius, hæc optima, subamara, salivam colore purpureo tingit, & sola deberet in usum medicum adhiberi.

2. **Lacca in granis** jam suo colore tingente orbata est, quia incolæ ramulos grossiuscule confusos,

tufos, ad varias res colore rubro imbuendas prius impendunt, & residuum iterum fificant.

3. Lacca in tabulis parari creditur, si priores blando igne liquefiunt, & calida massa marmoris infunditur, undæ tabulæ fragmentis vitri antimonii haud abfimiles obtinentur.

Vires leniter adstringentes. Ad ulcera laxa, & gingivarum laxitatem firmandam adhibentur. Frequentius vero ad laccam figillatoriam & vernicem faciendam infervit.

Lacca cærulea, vide Torna folis cærulea.

Lacca florentina Off.

Gall. Lacque fine de Florence.

Germ. Florentiner-Lack.

Pigmentum purpureo-rubrum, singulari artificio ex Coccionella, vel & ex ligno Brasiliensi, lixivio & alumine paratum.

Vires adstringentes. Ad tingenda pharmaca & remedia dentifricia adhibetur.

Lacca in globulis Off.

Gall. Lacque colombine.

Germ. Kugellack.

Arte, ut præcedens, parari dicitur ex ligno Brasiliensi, lixivio, Alumine & Creta; dilute purpurei vel rosei est coloris.

Vires & usus, ut proxime præcedens.

Lactuca Off.

Lactuca fativa C. B.

Lactuca BLACKW. Tab. 88.

Lactuca foliis rotundatis, caule corymbofo LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1118.

Gall. Laitue.

Germ. Lattich, Gartenlattich.

In hortis frequens colitur toto anno.

Usu. Folia, & Semina.

Vires refrigerantes, humectantes, demulcentes. Ad bilis acrimoniam temperandam, alvi tarditatem corrigendam in malo hypochondriaco commendatur, indeque apozemata & juscula refrigerantia parantur. Semina referuntur inter quatuor frigida minora.

Ladanum, vide Labdanum.

Lamium album, vide Urtica mortua.

Lamium Plinii, vide Melissa montana.

Lapathum acutum, Oxylapathum Off.

Lapathum folio acuto plano C. B.

Lapathum acutum BLACKW. Tab. 491.

Lapathum petiolo latefcente, foliis longe lanceolatis, calyce ferrato. HALL. *Hist.* n. 1591.

Rumex acutus LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 478.

Gall. Parelle, ou Patience sauvage ordinaire.

Germ. Grindwurz, Mengelwurz, Gendenwurz.

Apud nos fere ubique ad vias crescit.

Usu: Radix crassa, extus fusca, intus flava, & Folia.

Vires adstringentes. Ad decocta, ut vocant sanguinem depurantia commendatur in scabie, scorbuto, & ad podagræ prophylaxin. Extus ad morbos cutis in lavamentis & unguentis adhibetur. Folia recentia ulceribus vetustis non absque fructu imponuntur.

Varias Lapathi species, quæ hinc inde in Officinas recipiuntur, lubens

lubens omitto, cum hæc sola a nostratibus in usum trahi soleat.

Lappa major, vide Bardana.

Lavandula angustifolia & latifolia, Spica Off.

Lavandula angustifolia C. B. & latifolia Ejusd.

Lavandula BLACKW. T. 294. & Spica latifolia EJUSD. T. 295.

Lavandula foliis linearibus, spicis nudis HALL. Hist. n. 232.

Lavandula Spica LINN. Spec. plant. T. II. p. 800.

Gall. Lavande mâle & femelle, Spic, Aspic.

Germ. Lavendel. nostr. Lavan-der.

In calidioribus Europæ locis sponte crescit, etiam in ipsa Helvetia, apud nos in hortis colitur.

Usu. Herba & Flores odore fragrante præditi.

Vires calefacientes, stimulant, aromaticæ, cephalicæ, nervinæ, uterinæ prædicantur. Ad odoramaenta frequens adhibetur.

Laureola, vide Coccognidium.

Laurus Off.

Laurus vulgaris C. B.

Laurus BLACKW. Tab. 175.

Laurus foliis ovato lanceolatis, ramis florigeris folio brevioribus. HALL. Hist. n. 1602.

Laurus nobilis LINN. Sp. pl. T. I. p. 520.

Gall. Laurier.

Germ. Lorbeerbaum.

In Italia & Gallia calidiori spon-

Pars I.

te habitat, apud nos in hortis.

Usu. Folia, quæ odorata sunt, & Baccæ penetrantiori adhuc sapore & odore aromatico instructæ.

Vires calefacientes, carminativæ, sudoriferæ, emmenagogæ. Ad clysmata & fomenta externa frequentissime adhibentur. Baccæ rusticis nostris (sicuti folia urbis incolis) pro ciborum condimento inserviunt, & earum pulvis a veterinariis frequentissime adhibetur.

Lazuli Lapis, Off.

Lazuli lapis obscure cæruleus, punctulis pyritaceis WALLER. Mineral. pag. 131. n. 2.

Cuprum? (Lazuli) cæruleum scintillans LINN. Syst. Nat. T. III. p. 145.

Gall. Pierre d'Azur.

Germ. Lasurstein.

Durus est, florum cyani cærulei colore, aureis argenteisque punctulis & venulis exornatus.

Ex fodinis auri, argenti & cupri eruitur & orientalis germanico vel italico præstantior censetur.

Vires purgantes sursum & deorsum, an a particulis cupri quas in se continet? sed negant alii cuprum huic mineræ inesse. Satis incongrue olim confectio- ni Alkermes admiscebatur. Princeps hodie usus est ad conficiendum pulcherrimum pigmentum cæruleum Ultramarin dictum.

Lemnia Terra Off.

Bolus colore carneo WALTER. Mineral. p. 28. n. 5.

Argilla (lemnia) incarnata,

A a

ta, fracturis glaberrimis

LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 201.

Gall. Terre Lemnienne.

Germ. Erde auß Lemnos.

Est terra argillacea, pinguis nempe, tenax, & lubrica, colore pallide rubro.

Vires. Olim habebatur pro certissimo antidoto contra venena; sed unice absorbet, & leniter adstringit.

Lens Off.

Lens vulgaris C. B.

Lens HALL. *Hist.* n. 421. RIVIN. Tab. 35.

Ervum Lens LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1039.

Gall. Lentille.

Germ. Linsen.

Seritur hinc inde in agris.

Usu. Semina, in cibum recepta ab omni tempore pro alimento duro, & difficilis coctionis habita.

Vires. Farina vel semen contusum ad tumores duros emolliendos & maturandos laudatur. Mulierculæ nostrates non bene decocto lentium utuntur ad variolarum expulsionem.

Lens palustris Off.

Lenticula palustris vulgaris C. B.

Lens palustris BLACKW. Tab. 380.

Hydrophace monorhiza, foliis planis, ovatis HALL. *Hist.* n. 1900.

Lemna minor LINN. *Spec. pl.* pag. 1376.

In aquis stagnantibus ubique frequens.

Vires. Putatur refrigerare, fotuque inflammationes tollere, etiam cum lacte cocta; metus tamen est, ne frigore noceat. Nobis haud in usu est.

Lentiscinum Lignum Off.

Lentiscus vulgaris C. B.

Lentiscus BLACKW. Tab. 195.

Pistacia foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis

LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1455.

Gall. Bois de Lentisque.

Germ. Mastirholz.

Arbor in *Maris Ægei* insulis, *Hispania* & *Italia* crescit.

Lignum nodosum est, intus album, cortice cinereo obductum; saporem habet acerbum, odorem gratum, resinofum. Ex hac arbore in insula Chio resina stillat, Mastiche vocata alibi dicenda.

Vires balsamicæ, adstringentes, roborantes.

Lepus Off.

Lepus (timidus) cauda abbreviata, auriculis apice nigris LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 77.

Gall. Lievre.

Germ. Haas.

Animal in tota *Europa* frequens.

Usu. Axungia quæ ad rumpendos abscessus, & ad festucas cuti infixas eliciendas laudatur; & Talus seu Astragalus, cui miras virtutes ad epilepsiam, colicam, calculum &c. veteres ex superstitione tribuebant.

Levisticum, Ligusticum Off.

Ligusticum vulgare, an Libanotis fertilis Theophrasti C. B.

Levisticum BLACKW. Tab. 275.

Ligusticum foliis multiplicibus, foliolis superne incisiss LINN. *Sp. plant.* T. I. pag. 359.

Gall.

Gall. Livèche, ou Ache de Montagne.

Germ. Liebstöckel.

In montibus *Apenninis* crescit & apud nos in rusticorum hortis colitur.

Tota planta odorem fortem, aromaticum & medicamentosum spirat, qui in semine adhuc magis viget.

Usu. Radix, Semina & Caules.

Vires calefacientes, roborantes, incidentes, carminativæ, diureticæ, sudoriferæ. Per caules intus cavos five fistulosos nostrates aquam vel infusum theiforme adstringens hauriunt in Angina serosa & faucium doloribus, hosque fistulas in officinis sub nomine *Liebstöckelröhren* expectant.

Lichen petræus, Hepatica fontana Off.

Lichen petræus caliculo pileolum sustinente c. B.

Hepatica vulgaris major, sive officinarum Italiae MICH. *nov. plant. gen.* p. 3. Tab. 2. fig. 1.

Marchantia verrucis asperis, capitulis conicis HALL. *Hist.* n. 1889.

Marchantia conica LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1604.

Gall. Hepatique commune.

Germ. Steinleberkraut.

Locis umbrosis ad saxa rorida montium nascitur.

Usu. Herba saporis herbacei, amaricantis, odoris quasi aromatici, bituminosi.

Vires incidentes, abstergentes, & consolidantes. Ad humores crassos resolvendos, tonumque partium firmandum commendatur in viscerum obstructionibus, in febre hectica infantum, phthisi, ictero. Juscula aperientia ingreditur.

Hujus in locum sæpe in officinas nostrates recipitur

Lichen petræus latifolius, sive Hepatica fontana c. B.

Lichen fontanus maior, stellatus æque & umbellatus, & cyathoideus DILL. *Hist. Muscor.* p. 523. Tab. 76. fig. 6.

Marchantia linea frondem bipartiente, cyathis scobiferis ferratis; fetis umbellatis & stellatis decemfidis HALL. *Hist.* n. 1891.

Marchantia polymorpha LINN. *Spec. plant.* T. II. pag. 1603. a.

Locis humidis, umbrosis, ad muros frequens apud nos provenit.

Vires cum priori conveniunt, unice debiliores censentur.

Lichen terrestris cinereus Off.

Lichen cinereus BLACKW. T. 3. 6.

Lichen fronde subrotunde lobata, inferne reticulata, peltis convexo-concavis HALL. *Hist.* n. 1988.

Lichen caninus LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1616.

Gall. Hepatique terrestre cendrée.

Germ. Aschfarbigt Erdleberkraut.

Locis macilentis in sylvis inter muscos habitat.

Vires. Saporem ingratum & mucidum habet. Laudabatur olim ad morsum canis rabidi, & pulverem antilyssum Londinensium cum pipere constituit. Sed nuperis experimentis pulvis hicce iners fuit repertus.

Ligusticum, vide Levisticum.

Ligustrum Off.

Ligustrum germanicum c. B.

Ligustrum BLACKW. Tab. 142.

HALL. *Hist.* n. 530.

Ligustrum vulgare LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 10.

Gall. Troëne.

Germ. Hartriegel, Beinholz, Mundholz.

In sepibus apud nos abunde crescit.

Usu. Flores.

Vires adstringentes. Externe potissimum in collutorio oris & faucium adhibentur inque gingivarum laxitate, & angina serosa.

Lilium album Off.

Lilium album flore erecto & vulgare C. B.

Lilium album BLACKW. Tab. II.

Lilium foliis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris HALL. *Hist.* n. 1231.

Lilium candidum LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 433.

Gall. Lis blanc.

Germ. Weiße Lilien.

In Syria sponte nasci dicitur, apud nos in hortis colitur.

Usu. Radix squamosa, ex numerosis bulbis compacta, flava & Flores gratissimi odoris.

Vires emollientes demulcentes, maturantes, & suppurationem promoventes, usu externo.

Lilium convallium Off.

Lilium convallium album C. B.

Lilium convallium BLACKW. Tab. 70.

Polygonatum scapo diphylo, floribus spicatis, nutantibus, campaniformibus HALL. *Hist.* n. 1241.

Convallaria majalis LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 451.

Gall. Muguet, ou Lys des Vallées.

Germ. Mayenblümchen.

In sylvis montosis apud nos nascitur.

Usu. Flores fragrante odore gaudentes, rarius Radix & Baccæ.

Vires celebrantur cephalicæ, nervinæ, in apoplexia, vertigine, paralyfi, aliisque frigidis capitis morbis. Florum pulvis sternutationem excitat. Baccæ ad epilepsiam fuerunt adhibitæ, & vermes necasse dicuntur.

Limax ruber Off.

Limax magna colore rufo.

Aldrovand. *Hist. Insect.* p. 102.

Limax subrufus LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 1081.

Gall. Limaçon rouge.

Germ. Rothe Schnecke.

Locis umbrosis, humidis reperitur.

Vires. Limaces, visceribus exemptis sale admixto rite mundati, cum aqua vel & carnis jure cocto, dant juscula parum gelatinosa, quæ in phthisi, atrophia, febre hæctica laudantur.

Limon, vide Citrus.

Linaria Off.

Linaria vulgaris lutea flore majore C. B.

Linaria lutea vulgaris BLACKW. Tab. 115.

Antirrhinum foliis linearibus ascendentibus, congestis, caule erecto, spicato HALL. *Hist.* n. 336.

Antirrhinum Linaria LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 858.

Gall. Linaire ou Lin sauvage.

Germ. Keintraut, Harntraut, Flachstraüt.

Ad vias & fossas frequentissime reperitur.

Usu.

Ufu. Herba cum floribus foetet, & muscæ inde necari dicuntur.

Vires. Intus sumta urinam & alvum movere dicitur. Externe in cataplasmate & unguento hæmorrhoidibus dolentibus cum levamine adhibetur.

Lingua cervina, Scolopendria vulgaris, Scolopendrium Off.

Lingua cervina officinarum C. B.

Lingua cervina, Phyllitis BLACKW. Tab. 138.

Asplenium petiolis hirsutis, folio longe lineari-lanceolato, integerrimo, postice cordato HALL. *Hist.* n. 1695.

Asplenium Scolopendrium LINN. *Spec. plant.* T. II. pag. 1537.

Gall. Langue de Cerf, ou Scolopendre vulgaire.

Germ. Hirschzunge.

In montibus nostratibus frequens occurrit.

Ufu. Folia simplicissima, saporis subnauseosi, dum manduntur salivam faciunt affluere.

Vires. Habita est pro planta resolvente, quæ coagula solvat, lienem minuat, sed revera ficit & adstringit, ficque viscerum tonum firmat & roborat, inde & vulnera sanat & claudit; quæ fere communis plantarum capillarium, in quarum classem & hæc nostra pertinet, proprietas est. Admiscetur speciebus pro Thee helvetico vulnerario.

Linum catharticum Off.

Linum pratense floribus exiguis C. B.

Linum catharticum BLACKW.

Pars I.

Tab. 368. LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 399.

Linum foliis conjugatis ovatis, calycibus aristatis, patulis, lanceolatis HALL. *Hist.* n. 839.

Gall. Lin sauvage purgatif. *Germ.* Purgier-Flachß, Klein Leintraut

In pascuis pratis &c. abundat.

Ufu. Herba tota saporis amarissimi, nauseosi.

Vires. Alvum absque incommodo solvere dicitur, sive in pulvere, sive in infuso assumatur. Nobis rarius in usu est.

Linum fativum Off.

Linum fativum C. B.

Linum calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis, alternis, caule subsolitario LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 397.

Gall. Lin.

Germ. Leintraut, Flachßtraut.

In variis regionibus copiose feritur, rarius vero apud nos.

Ufu. Semina, quorum lævitas mitem & innoxiam farinæ intus contentæ indolem jam indicare videtur.

Vires emollientes, demulcentes, anodynæ. Infusum theiforme tussim, dolores nephriticos, etiam a calculo obortos, mire solatur; idem in pleuritide, dysenteria, hæmoptoe, empyemate, ad sanguinem effusum solvendum utile est. In cataplasmate tumores inflammatorios lenit, & in clysteribus egregii usus est.

Oleum recens expressum temperat, alvum ciet, relaxat, expectorationem promovet, hinc in pleuritide, colica, alvi obstructione pertinacissima sæpe efficacax

B b

ficax; idem cochleatim exhibitum ceu specificum laudatur in ileo.

Liquidambar vide Ambra liquida.

Liquiritia, Glycirrhiza Off. Glycirrhiza filiquosa, vel germanica C. B.

Glyzirrhiza BLACKW. T. 495.

Glycirrhiza leguminibus glabris, stipulis nullis LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1046.

Gall. Reglisse.

Germ. Süßholz.

Sponte nascitur in Hispania, Italia, Gallia Narbonensi & in Germania passim colitur.

Usu. Radix longa, sarmentosa, digiti crassitie, colore extus cineraceo, intus luteo, sapore dulci.

Vires. Acrimoniam humorum demulcet, expectorationem promovet, ad dolores nephriticos mitigandos laudatur. Inter omnes res dulces liquiritia sola fitim tollit.

Lithargyrium Off.

Gall. Litharge.

Germ. Silberglätte und Goldglätte.

Est plumbum vitrificatum, quale obtinetur, dum calx vel cinis plumbi fortissimo igne subito liquatur, ut olei instar fluat; id tunc frigefactum, dat substantiam lævem, foliatam, coloris ex fulvorufescentis cum micis splendentibus aurei vel argentei coloris. Conficitur plerumque in metallorum fornacibus, ubi argentum a plumbo separatur, vel plumbi ope ab aliis metallis repurgatur. Duæ species habentur nempe

Lithargyrium auri, Chrystitis dictum, rubicundioris coloris quia magis excoctum, & calcinatum; &

Lithargyrium argenti, Argyritis, quod colore pallidius est.

Vires. Exsiccat, adstringit, refrigerat, & externo usu ad ulcera, intertrigines, inflammata, cum fructu adhibetur.

Lithospermum, vide Milium solis.

Lucius Piscis Off.

Lucius GESNER. *de Piscib.* p. 500.

Efox rostro plagio plateo ARTED. *Ichth.* Gen. 14. Syn. 26. Spec. 53.

Efox (Lucius) rostro depresso, subæquali LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 516.

Habitat in fluviis, lacubus & piscinis.

Usu. Maxilla seu Mandibula & præcipue inferior

Vires. In pleuritide specificum olim putabatur: sed præter vim parum absorbentem nulla inest. Calcinata ad strumas valere dicitur.

Lujula vide Acetofella.

Lumbrici, Lumbrici terrestres Off.

Lumbricus terrestris minor, &

Lumbricus major RAJ. *Hist. Insector.* 2. & 1.

Lumbricus lævis LINN. *Faun. suec.* n. 1271.

Lumbricus (terrestris) trifariam retrorsum aculeatus LINN. *Syst. nat.* T. I. p. 1076.

Gall. Vers de Terre.

Germ. Regenwürmer.

Habitant in terra spongiosa.

Vires eis tribuuntur anodynæ, diureticæ, sudoriferæ, in convulsione, arthritide, rheumatismo, & urinæ difficultate; an satis probatæ?

Lupu-

Lupulus, Lupulus salictarius Off.

Lupulus mas & femina C. B.

Lupulus femina CAMER. *Epit. Plant.* p. 933.

Lupulus, Humulus BLACKW. Tab. 536. a. & b.

Lupulus HALL. *Hist.* n. 1618.

Humulus Lupulus LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1457.

Gall. Houblon.

Germ. Hopfe.

Ad sepes apud nos sponte crescit. Turiones primo vere prorumpentes olus haud ingratum exhibent.

Usu: Strobili, seu fructus, amari, aromatici; qui improprie Flores dici solent.

Vires diureticae, imo lithonthropicae haud inertes, cum decoctum intra triduum durissimum calculum solvat; idem in scabie & lue venerea commendatur. Ad cerevisiam parandam adhiberi notissimum est.

Lycopodium, Plicaria Off.

Musculus terrestris clavatus C. B.

Lycopodium TABERNÆMONT. *Hist.* p. 1199.

Musculus terrestris, Lycopodium BLACKW. Tab. 535.

Lycopodium ramis prolixis spicis petiolatis, gemellis, foliis linearibus, pilo aristatis HALL. *Hist.* n. 1722.

Lycopodium clavatum LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1564.

Gall. Lycopodion.

Germ. Bärlappen, Gürtelkraut. In sylvis abiegnis Helvetiae copiose reperitur.

Usu. Pollen flavescens, glaberrimus, lævissimus, qui in capsulis spicarum abundat, & flammæ admotus fulgurat, Semen vulgo dictus.

Vires. Intertrigines infantum adpersus sanat, ad vulnera & papillarum fissuras valet. Interne ad nephritidem, calculum, dysenteriam, tormina infantum, mitigando & leniendo cum fructu adhibetur.

Lyncis Lapis, Lyncurius Lapis, Dactylus Idæus, Belemnites Off.

Petrificata animalia Holothuriorum WALLER. *Mineral.* p. 462.

Helmintholithus Belemnites LINN. *Syst. Nat.* Tom. III. pag. 170.

Gall. Pierre de Lynx, Belemnite.

Germ. Belemnit, Pfeilstein, Luchsstein, Donnerstein, Alpschoßstein.

In Ida, Cretæ monte, olim repertus, nunc in Helvetia & alibi frequens occurrit.

Est lapis cylindricus, vel conicus, in apicem obtusum desinens, coloris modo albicantis, modo obscuri; quandoque materie terrestri plenus, quandoque concavus, cavitate conica per diaphragmata distincta. In distracto lapide a medulla ad circumferentiam lineis radiorum ad instar percurritur; est ut plurimum digiti crassitie & longitudine, licet & brachii crassitiem æquantes reperti fuerint. Omnibus inest cavitas secundum longitudinem excurrent. Creduntur esse animalia marina, testacea hætenus incognita, petrificata.

Vires. Olim contra incubum & renum calculos valere credebatur, hodie nullo in usu est.

Lyfimachia lutea Off.

Lyfimachia lutea major, quæ Dioscoridis C. B.

Lyfimachia BLACKW. Tab. 278.

Lyfimachia foliis ovato-lanceolatis, spicis paniculatis
HALL. *Hist.* n. 630.

Lyfimachia vulgaris LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 209.

Gall. Perubosse, Chassebosse, *Lyfimachie*.

Germ. Gelb Weiderich.

Apud nos in pratis udis & fossis crescit.

Vires adstringentes, vulnerariæ; sed nostratibus haud in usu.

Lyfimachia purpurea spicata Off.

Lyfimachia spicata purpurea, forte Plinii c. B.

Lyfimachia purpurea TABERNÆM. *Hist.* p. 1236.

Salicaria foliis lanceolatis,

subhirsutis, floribus spicatis HALL. *Hist.* n. 854.

Lythrum Salicaria LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 640.

Gall. *Lyfimachie*.

Germ. Brauner Weiderich, nostratibus Durchsäule-Kraut.

Ad fossas, & ripas rivulorum vulgaris apud nos planta.

Usu. Folia.

Vires adstringentes, vulnerariæ.

Mulierculæ nostrates herbam linteo inclusam collo infantum aphthis laborantium alligare solent, & in gargarismate applicant, etiam in angina, non sine utilitate. Ad dysenteriam laudatur, & in laxitate intestinorum a diarrhæa vel dysenteria superstita valere experientia confirmavit Cl. de HAEN.

M.

Macis vide *Nux moschata*.

Magnetis Lapis Off.

Ferrum mineralisatum, minera ferrum trahente & repellente, & polos mundi ostendente, Magnes WALL. *Mineral.* p. 338.

Ferrum (Magnes) attractorium LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 142.

Gall. Aiman.

Germ. Magnet.

In ferri fodinis passim reperitur.

Est minera ferri ob qualitates suas ferrum attrahendi & polos mundi respiciendi notissima, compacta, coloris plerumque ferrei vel ex cinereo albicantis.

Vires illi eadem quæ reliquis ferri mineris, nonnullis tamen venenatus audit. Ferrum ex corpore extrahere veteres ridicule credebant. Siccandi scopo non-

nullis emplastris additur, nullius ceterum apud nos usus.

Majorana, *Amaracus* Off.

Majorana vulgaris c. B.

Majorana BLACKW. Tab. 319.

Origanum Majorana LINN. *Sp. plant.* T. II. pag. 825.

Gall. Marjolaine.

Germ. Majoran.

In hortis colitur odorata & aromatica stirps.

Usu. Folia.

Vires cephalicæ, stimulantés, emmenagogæ, errhinæ. Etiam in culenarios usus cedit.

Malabathrum, *Folium Indum* Off.

Cadegi indi, id est folium indum Arabibus c. B.

Katou Karva RHEED. *Hort. Malab.* Tom. V. p. 105. T. 53.

Sunt

Sunt Folia ovato-oblonga, acuta, crassa, glabra, trinervia, saporis & odoris aromatici, grati. Cujusnam sint arboris nondum satis constat.

Vires calefacientes, stimulantibus &c. nonnullas compositiones ingrediuntur, sed rarius in officinis nostris occurrunt.

Malicorium vide Granatorum Cortex.

Malva arborea, rosea, hortensis Off.

Malva rosea folio subrotundo C. B.

Malva arborea BLACKW. Tab. 54.

Alcea rosea LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 966.

Gall. Mauve de Jardin, Rose Tremiere.

Germ. Winterrosen, Herbstrosen, Pappelrosen.

Usu. Flores.

Vires. Ob copiosam mucilaginem, qua scatent, emolliunt & leniunt, in inflammatis faucibus & tonsillis utilia gargarismata exhibentes.

Malva vulgaris Off.

Malva sylvestris folio sinuato C. B.

Malva vulgaris BLACKW. Tab. 22.

Malva caule erecto, foliis lobatis, lobis serratis, quinque & septenis HALL. *Hist.* n. 1069.

Malva sylvestris LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 969.

Gall. Mauve.

Germ. Pappeln, Gänspappel, Sassenpappel.

Ad vias crescit.

Usu. Radix, Folia, Flores & Semen.

Pars I.

Vires. Totæ plantæ, perinde ut præcedenti, copiosum viscidum gluten inest, hinc emollit, lubricat, lenit, laxat interne & externe adhibita, frequentissimi apud nos usus ad clysmata emollientia &c.

Mandragora Off.

Mandragora fructu rotundo C. B.

Mandragora BLACKW. Tab. 364. HALL. *Hist.* n. 578.

Atropa Mandragora LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 259.

Gall. Mandragore.

Germ. Allraunwurz.

In hortis curiosorum passim occurrit.

Usu. Radix vel potius radicis Cortex.

Vires narcoticas & stupefacientes suæ classis possidet, ut melius ab ejus usu abstineamus; dudum jam apud nos negligitur.

Manna Off.

Gall. Manne.

Germ. Manna.

Est substantia viscosa, grumosa, ex albo flavicans, in aqua solubilis, saporis acriusculi, dulcis, nauseosi, odoris debilis.

Arbor huncce succum largiens vocatur

Fraxinus humilior sive altera Theophrasti, minore & tenuiore folio C. B.

Fraxinus Ornus LINN. *Sp. pl.* Tom. II. p. 1510.

Gall.

Germ. Manna Esche.

In Sicilia, Calabria, Gallia australi &c. spontanea.

Stillat sponte aut ex vulnerata arbore & folis calore in solidam consistentiam ficitur.

Pro vario puritatis, ficitatis, albedinis gradu, vel & pro varia, ubi colligitur, regione, Cc diver-

diversas obtinet denominationes.

Manna Siciliana optima est, ficcissima, albicans, granulosa. Hanc sequitur **Calabrina** usitatissima, præcedenti paulo minus sicca minusque pura. Ex duabus his speciebus electa frusta longa, a fordibus libera **Mannæ canellatæ** s. electæ nomine veniunt. Tandem fusca, humida, majori fordium copia inquinata & in majores glebas compacta **Manna crassa** audit.

Vires. Lenissimum, tutissimum & apud nos usitatissimum est purgans etiam infantibus & gravidis tuto propinandum. In dysenteria epidemica anni 1767. vix aliud remedium efficacius erat etiam Rhabarbaro aliisque prugantibus longe præferendum.

Marcasita, Bismuthum Off.
Wismuthum arsenico & cobalto mineralisatum, punctulis galenæ instar micantibus. **WALL. Mineral.** pag. 315.

Wismutum commune **LINN. Syst. Nat. T. III. p. 128.**

Gall. Marcassite, Bismuth.
Germ. Wismuth.

Passim in fodinis argenti &c. reperitur.

Est semimetallum albicantis vel argentei coloris, durum, fragile.

Vires. Nonnisi externe ad cosmetica & varios mechanicos usus adhibetur.

Margaritæ, Uniones, Perle Off.

Calculi animalium, concharum **WALLER. Mineral.** pag. 517.

Calculus (Margarita) Conchilii **LINN. Syst. Nat. Tom. III. p. 177.**

Gall. Perles.

Germ. Perlen.

Sunt lapilli rotundi vel subrotundi, albi, plus minus pellucidi, magnitudinis variæ, reperiuntur in variis concharum speciebus & distinguuntur vulgo in orientales & occidentales. Illæ pulciores, cariores, his merito præferuntur. Splendidissimæ in *Sinu Persico* reperiuntur.

Vires olim eis tribuebantur cordiales, alexipharmacæ summæ, sed mere absorbentes sunt, merito ob maximum earum pretium ex foro medico relegandæ.

Marrubium, Marrubium album, Prassium, Prasium Off.

Marrubium album vulgare
C. B.

Marrubium album **BLACKW. Tab. 479.**

Marrubium dentibus calycinis denis, recurvis **HALL. Helv. n. 258.**

Marrubium vulgare **LINN. Sp. plant. T. II. p. 816.**

Gall. Marrube blanc.

Germ. Weisser Andorn.

Crescit locis ruderosis & ad vias.

Ufu: Herba odoris validi, saporis valde amari.

Vires attenuantes, resolventes, stimulant, emmenagogæ. Ab omni tempore laudatur ad morbos pectoris, tussim & asthma pituitosum, ad viscerum & præcipue hepatis obstructionem a bile viscida, quin & in phthisi ipsa, & abscessu pulmonum.

Marrubium nigrum, Balote,

lote , Prassium nigrum
 Off.
 Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis
 C. B.
 Marrubium nigrum, Ballote
 BLACKW. Tab. 136.
 Ballote foliis cordatis, serratis , verticillis nudis
 HALL. *Hist.* n. 259.
 Ballote nigra LINN. *Sp. plant.*
 T. II. p. 814.
 Gall. Marrube noir.
 Germ. Schwarzer Andorn.
 Ad sepes & muros frequens apud
 nos nascitur.
 Ufu. Herba integra , amara &
 foetida.
Vires debiliores ac præcedentis;
 ad affectiones hystericas laudatur,
 & sudores movere dicitur;
 sed vix in usu est.

Mars vide Ferrum.

Marum verum , Marum
 syriacum Off.
 Marum Cortusi IOH. BAUH.
Hist. T. III. p. 242.
 Tragoriganum latifolium
 C. B.
 Marum verum BLACKW. Tab.
 47.
 Teucrium (Marum) foliis
 integerrimis, ovatis, subtus
 tomentosis , utrinque
 acutis : racemis fecundis,
 calycibus villosis
 LINN. *Spec. plant.* T. II. pag.
 788.
 Gall. Marum.
 Germ. Edler Majoran, Amberkraut,
 Katzenkraut.
 Frequens est in *Stæchadum* insulis,
 & in *Valentia*; apud nos in
 hortis colitur.
 Ufu. Herba & Summitates, sapore
 acri, amaro, odore vehemen-

ti & aromatico præditæ.
Vires stimulantæ , incidentes,
 cephalicæ, nervinæ, in morbis
 frigidis convenientes. Vix tamen
 in usu , nisi ad pulveres
 sternutatorios.

Marum vulgare , Marum
 Mastich, Mastichina Off.
 Sampsuchus , five Marum
 mastichen redolens C. B.

Marum vulgare BLACKW. T.
 134.

Thymus (Mastichina) verticillis
 lanuginosis: dentibus
 calycinis setaceis, pilosis
 LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 827.

Gall. Marum Mastich.

Germ. Gemeines Marum, Mastichkraut.

In *Hispania* aliisque calidis regionibus
 sponte crescit; apud nos
 in hortis colitur.

Ufu. Herba integra, odoris haud
 ingrati, sed paulo vehementioris.

Vires quæ præcedentis , sed adhuc
 rarius in usum trahitur.

Mastix , Mastiche , Resina
 lentiscina Off.

Gall. Mastic.

Germ. Mastich, Mastix.

Est lacryma resinosa, pellucida, ex
 flavo pallescens, fragilis; masticata
 lentescit ad instar ceræ, prunis
 injecta odorem gratum spirat,
 saporem habet leviter aromaticum,
 subadstringentem. Provenit vel
 sponte vel ex vulnerato cortice,
 trunco & ramis Arboris, quæ dicitur

Lentiscus vulgaris C. B.

Lentiscus BLACKW. Tab. 195.

Pistacia (Lentiscus) foliis abrupte
 pinnatis, foliolis lanceolatis
 LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1455.

Crescit in insula *Chio*, unde præstantissima Maltix advehitur, nam ignobilior censetur quæ ex *Italia* & *Sicilia* affertur.

Vires adstringentes, roborantes, calefacientes, balsamicæ; hinc ad tussim diuturnam, dysenteriam, hæmoptysin, ventriculi laxitatem, & in genere ad fibræ debilem & laxam roborandam commendatur. In suffitu ad odontalgiam & otalgiam adhibetur; unguenta vulneraria & digestiva, & emplastra discutientia ingreditur.

Mater perlarum Off.

Concha margaritifera BELLON.

Aquatil. p. 402.

Concha valvis æqualibus, inæqualiter, mediocriter & leviter umbonata.

LANG. *Testac.* p. 69.

Testa (Mytili margaritiferi) compresso-plana, suborbiculata; basi transversa imbricata tunicis dentatis

LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 1155.

Gall. Nacre de Perle.

Germ. Perlenmutter.

Reperitur in oceano utriusque *Indiæ*, splendore & lævitate margaritas referens.

Vires sunt absorbentes, lapidibus cancrorum analogæ.

Matricaria, Parthenium Off.

Matricaria vulgaris seu fativa C. B.

Matricaria BLACKW. Tab. 192.

Matricaria foliis pinnatis pinnis semipinnatis, laciniis obtusis: floribus umbellatis HALL. *Hist.* n. 100.

Matricaria Parthenium LINN.

Spec. pl. T. II. p. 1255.

Gall. Matricaire, Espargoutte.

Germ. Mutterkraut.

Passim apud nos locis ruderosis provenit, & in hortis colitur.

Usu. Folia & Summitas, utraque odore gravi & vehementi prædita.

Vires calefacientes, resolventes, roborantes, validæ; ab omni tempore habetur pro remedio menses & lochia pellente, dolores a partu sopiente, carminativo; in infuso etiam ad hydropem laudatur.

Matrisylva, Hepatica stellata C. B.

Asperula, five Rubeola montana odorata C. B.

Asperula odorata Aspergula BLACKW. Tab. 60.

Asperula caule erecto, foliis octonis, petiolis ramosis, erectis, seminibus hirsutis HALL. *Hist.* n. 728.

Asperula odorata LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 150.

Gall. Petit Muguet, Muguet des Bois.

Germ. Waldmeister, Sternleberkraut.

Habitat apud nos in sylvis montosis.

Usu. Herba cum Floribus, grati suavisque odoris.

Vires aperientes, roborantes; laudatur ad icterum, menses suppressos, ad vulnera cum inflammatione, sed rarius in usu est.

Mechoacanna alba, Off.

Gall. Mechoacan.

Germ. Weiße Jalappen, Indische Saunrüben.

Est radix in taleas albas secta, cortice rugoso, substantia molliuscula, in qua vix fibra ulla apparet; sapore subdulci cum quadam acredine, quæ nauseam quan-

quandoque movet; Eligenda recens, albicans, gravis, nam triennium ejus efficacia vix perdurare asseritur.

Planta, unde hæcce Radix desumitur, hæctenus nondum satis certo cognita est, & dicitur

Bryonia Mechoacanna alba
C. B.

Jeticucu MARCGRAF. *Brasil.* pag. 41.

Mechoacanna alba BLACKW. Tab. 571.

Convolvulus americanus
Mechoacan dictus LINN.
Mat. med. p. 28. n. 83.

Habitat in *America meridionali, Brasilia, Quito.*

Vires purgantes benigne & sine molestia; tuto exhibetur, & non injucunde, cum saporis fere expers sit. Rarius in usum trahitur, ab eo tempore quo Jalappa nobis innotuit, cum hæc parva dosi eundem effectum præstare soleat, ac Mechoacanna quadruplâ vel & sextuplâ vix produceret.

Mechoacanna nigra, Jalappa Off.

Postquam, quæ supra lit. I. de Jalappa dixi, impressa jam erant, ut corrigi amplius non potuerint, reperi in MILLERI *Dictionarii Edit. germ.* II. plantam Jalappam largientem diversam esse a Mirabili & veram Convolvuli speciem.

Deleantur igitur synonyma ibi apposita & substituantur sequentia.

Bryonia mechoacana nigricans C. B. *Prodr.* p. 135, *Pin.* p. 298. JOH. BAUH. *Hist. plant.* Tom. II. p. 151.

Convolvulus americanus Jalapium dictus RAJ. *Hist. pl.* T. I. p. 724.
Pars I.

Convolvulus (Jalapa) foliis variis, pedunculis unifloris, radice tuberosa MILLER *Diction.* Edit. II. germ. Tom. I. pag. 809. n. 31.

Convolvulus (Jalapa) caule volubili, foliis difformibus, cordatis, angulatis, oblongis lanceolatisque, pedunculis unifloris LINN. *Mantiss. ad Edit. II. Spec. pl.* p. 43. n. 45.

Crescit in *Mexico, Vera Cruce &c.*

Mel Off.

Gall. Miel.

Germ. Sonig.

Est succus dulcis, in nectariis florum præsertim balsamicorum & aromaticorum reperiendus, ibique a sedulis & ingeniosis apibus collectus, in earum ventriculo magis elaboratus, & in alveolarium cellulas depositus; unde arte vel vi ignis elicitur spissiusculus, unguinoso - mucilagineus, in aqua totus solubilis, saporis dulcissimi, odoris grati. A diversitate plantarum, ex quibus mel colligitur, pendet differentia saporis, odoris & salubritatis.

Vires non solum nutrientes, sed & abstergentes, demulcentes, pectorales, emollientes sunt; saponis instar oleosa aquosis miscet, bilem resolvit, alvum movet, vulnera munda reddit & consolidat, & putredini resistit. In faucium & oris variis affectibus, angina, tussi, malo hypochondriaco, diathesi atrabilaria &c. cum fructu adhibetur.

Melilotus Off.

Melilotus officinarum Germaniæ C. B.

Melilotus BLACKW. Tab. 80.

Trifolium odoratum, seu
D d Me-

Melilotus vulgaris flore luteo JOH. BAUH. T. II. pag.

370.

Melilotus filiquis racemosis, pendulis, acutis, rugosis, dispermis HALL. Hist. n. 362.

Trifolium Melilotus officinalis LINN. *Sp. plant.* T. II. pag.

1078.

Gall. Melilot, ou Mirlirot.

Germ. Melilot, Steinklee, Honigklee.

In agris & ad vias frequens apud nos reperitur.

Ufu. Folia, quæ recentia fere odore carent, exsiccata autem peculiaris, acrisque odoris sunt, amara, nauseosa; & Flores odorati.

Vires censentur emollientes, dolorem mitigantes, suppurationem promoventes, eoque scopo ad clysmata, fomenta, cataplasmata adhibetur. Sed acris planta videtur potius irritans & discutiens esse, quam emolliens. Infusum florum ad colicos dolores, & ischuriam laudatur.

Melilotus cærulea, Trifolium odoratum Off.

Lotus hortensis odora c. B.

Lotus fativa odorata, annua, flore cæruleo IOH. BAUH. T. II. pag. 368.

Lotus urbana BLACKW. T. 284.

Trifolium (Melilotus cærulea) spicis oblongis, leguminibus feminudis, mucronatis, caule erecto LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1077.

Gall. Lotier odorant, Trefle musqué, ou faux Baume de Perou.

Germ. Siebengezeit, zahmer blauer Steinklee.

In hortis apud nos colitur.

Ufu. Herba & Flores, odore aromatico valde durabili prædita.

Vires cum priori conveniunt; alexipharmacæ consentur, menses & urinam pellunt. Vix tamen in usu.

Adhibetur ad confectionem casei Glaronensium rasilis, viridis.

Melissa Off.

Melissa hortensis c. B.

Melissa BLACKW. Tab. 27.

Melissa foliis cordatis, serratis, petiolis unifloris, folio brevioribus HALL. Hist. n. 242.

Melissa officinalis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 821.

Gall. Melisse.

Germ. Melisse, Citronen-Melisse, Bienenkraut.

Frequens apud nos in hortis colitur.

Ufu. Herba integra gratissimi odoris, ad citrum accedentis, qui in infusum theiforme transit. Ad plantas aromaticas debiliores referri debet.

Vires reficientes, nervinæ, carminativæ, diureticæ, emmenagogæ. Balnea nervina ingreditur. Ad melancholiam olim laudabatur.

Passim adhuc duæ plantæ Melissæ nomine in officinas recipiuntur, scilicet

Melissa canariensis Off.

Dracocephalum (canariense) floribus spicatis, foliis compositis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 829.

Quæ in America provenit, & fragrantissimo odore prædita esse dicitur. Hæc nostris officinis plane incognita.

Et

Melissa turcica Off.

Meliss-

Melissa peregrina folio oblongo c. B.

Dracocephalon (Moldavica) floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ferraturis capillaceis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 830.

Hæc in *Moldavia* crescens in hortis apud nos colitur, nec tam grato odore se commendat.

Vires attribuuntur ei plane eadem, ac *Melissæ* vulgaris.

Melissa montana, *Lamium Plinii*, *Melissophyllum* Off.

Lamium montanum, *melissæ* folio c. B.

Melissophyllum verum FUCHS. *Hist.* p. 498. HALL. *Hist.* n. 244.

Melittis *Melissophyllum* LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 832.

Gall. *Melisse sauvage*.

Germ. *Waldmelisse*, *Bergmelisse*, *Grieskraut*.

In montibus nostratibus copiose crescit.

Usu. Herba integra, odoris lamiaecei, sed gratioris, imo in exsiccata planta gratissimi, saporis subacris, & amaricantis.

Vires vulnerariæ. Ad mala calculosa, urinæ suppressionem, & morbos pectoris chronicos sæpius egregie conducit infusum ejus theiforme.

Melo Off.

Melo vulgaris c. B.

Melo BLACKW. Tab. 329.

Cucumis (*Melo*) foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1436.

Gall. *Melon*.

Germ. *Melone*.

In hortis colitur.

Usu. Fructus inter gulæ delicias habitus, & Semina.

Vires. Fructus humectat, refrigerat, reficit, hæcticis & scorbuticis commendatur; Semina inter quatuor frigida majora recensentur, & scopo demulcente exhibentur in emulsionibus.

Mentha Off.

Duæ plerumque *Menthæ* species nostris in Officinis prostant nempe.

Mentha crispa Off.

Mentha rotundifolia crispa spicata c. B.

Mentha foliis rugosis, brevissime petiolatis, verticillis spicatis HALL. *Hist.* n. 230.

Mentha crispa LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 805.

Gall. *Menthe des Jardins*, *Baume*.

Germ. *Krausemünz*, *Gartenmünz*.

In hortis colitur.

Usu. Folia, odoris egregii, aromatici, saporis amaricantis.

Vires calefacientes, stomachicæ, carminativæ, emmenagogæ, ad nauseam, vomitum, singultum, tussim, colicam, morbos uteri ab atonia ortos egregiæ. Externe in cataplasmate ad dolores intestinorum, morbos hystericos, dolores a partu superstites valet.

Et

Mentha spicata Off.

Mentha angustifolia spicata c. B.

Mentha BLACKW. T. 290.

Mentha foliis elliptico lanceolatis, glabris, spicis cylindricis HALL. *Hist.* n. 229.

Mentha viridis LINN. *Spec. pl.* n. 804.

D d 2

Gall.

Gall. Menthe.

Germ. Spitzmünz, Garten-Fischmünz.

Hortensis planta, licet hinc inde ad vias apud nos reperiatur.

Præcedenti paulo minus grata est, viribus ceterum vel iisdem vel parum diversis.

Quæ sequuntur *Menthæ* species equidem apud nos inusitatæ sunt, cum tamen passim alibi in officinas recipiantur, earum nomina saltem hic addimus.

1. *Menthastrum* Off.

Mentha sylvestris folio longiore c. B.

Menthastrum BLACKW. Tab. 292.

Mentha foliis elliptico-lanceolatis, ferratis, subtus tomentosis, spicis cylindricis, staminibus flore duplo longioribus HALL. *Hist.* n. 227.

Mentha sylvestris LINN. *Spec. plant.* Tom. II. p. 804.

Gall. Menthesauvage, Chevaline.

Germ. Wassermünz, Fischmünz. Ad fossas & rivulos apud nos crescit.

2. *Mentha sylvestris* rotundiore folio c. B.

Mentha spicis cylindricis foliis ovatis, rugosis HALL. *Hist.* n. 226.

Mentha rotundifolia LINN. l. c. p. 805.

Hæc species apud nos abunde passim ad vias & fossas provenit.

3. *Mentha verticillata* Off.

Mentha crispa verticillata c. B.

Mentha (fativa) floribus verticillatis, foliis ovatis, acutiusculis, ferratis, staminibus corolla longioribus LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 805,

In hortis colitur.

4. *Mentha piperis* sapore BLACKW. Tab. 291.

Mentha piperitis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 805.

In Anglia sponte crescit.

5. *Mentha hortensis verticillata* Ocymi odore c. B.

Mentha quarta FUCHS.

Mentha gentilis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 805.

In hortis colitur.

Mercurialis Off.

Mercurialis testiculata, five Mas c. B. &

Mercurialis spicata, five femina EJUSD.

Mercurialis mas & femina BLACKW. Tab. 162.

Mercurialis caule annuo brachiato, foliis glabris, conjugatis, ovato lanceolatis HALL. *Hist.* n. 1008.

Mercurialis annua LINN. *Spec. plant.* p. 1465.

Gall. Mercuriale.

Germ. Bingelkraut, Hundskohl, nostr. Baumlekraut.

In hortis & vineis copiose provenit.

Usu. Herba aquosa, subsalsa.

Vires. Inter quinque herbas emollientes recensetur, & eodem scopo etiam in clysteribus adhibetur. Succus expressus & decoctum alvum laxant.

Reperitur & apud nos alia *Mercurialis* species, quæ est

Mercurialis montana testiculata c. B. &

Mercurialis montana spicata EJUSD.

Mercurialis caule perenni, indiviso, foliis hirsutis, ovato-lanceolatis HALL. *Hist.* n. 1601.

Mer.

Mercurialis perennis LINN. Gall. Gremil, ou Herbe aux perles.

Sp. pl. p. 1465.

Crescit apud nos in sylvis montosis.

Germ. Meerhirs, Perlehirs, Steinsamen.

Hæc cum priori non confundenda, ut alicubi fieri legimus, cum vires possideat narcoticas & funestas.

Frequens apud nos ad vias & in sylvis crescit.

Usu. Semina dura, expolita, nitida, exiguis margaritis similia, insipida, terrea, ut cum acidis effervescent.

Mercurius, vide Argentum vivum.

Meum, Meu, Meum athamanticum Off.

Meum foliis Anethi C. B.

Meum HALL. *Hist.* n. 761.

Athamanta (Meum) foliis capillaribus, seminibus glabris, striatis LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 353.

Gall. Meu, Fenouil sauvage.

Germ. Bärwurz, Mutterwurz.

Crescit in montosis; in monte *Alsatiæ* Ballon dicto.

Usu: Radix odorata & acris, & Semina aromatica.

Vires ipsis tribuuntur lithontriplicæ & diureticæ etiam a veterinariis ad hunc scopum expetuntur. Cum tamen mere terrestria sint, vix veram aliquam utilitatem habere videntur, imo tota planta ob affinitatem cum Cynoglossò, cui etiam odore accedit, ILL. HALLERO suspecta est.

Huic, cum non ubique spontaneum sit, passim substituitur

Vires calefacientes, carminativæ, diureticæ, emmenagogæ, hysteriæ, roborantes, in morbis frigidis efficaces. Nec tamen frequenter in usum adhibetur nisi a Veterinariis.

Lithospermum arvense radice rubra C. B.

Lithospermum BLACKW. T. 436.

Heliotropium foliis lingulatis, floribus tubulosis HALL. *Hist.* n. 594.

Lithospermum arvense LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 190.

Ubique inter segetes crescit.

Millefolium Off.

Mezereum, vide Coccognidium.

Milium Solis, Lithospermum Off.

Lithospermum majus erectum C. B.

Lithospermum arvense TABERN. *Ic.* p. 850.

Lithospermum caule erecto, ramosissimo, floribus calycem vix superantibus HALL. *Hist.* n. 595.

Lithospermum Officinale LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 189. *Pars I.*

Millefolium vulgare album C. B. &

Millefolium vulgare purpureum minus C. B.

Millefolium BLACKW. Tab. 18.

Millefolium foliis pinnatis, punctatis, pinnis æqualibus, pinnulis trifidis & quinquefidis HALL. *Hist.* n. 107.

Achillea Millefolium LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1268.

Ee

Gall.

Gall. Millefeuille.

Germ. Garbenkraut, Schafgarben.

Ubique in graminosis & ad vias crescit.

Usu. Herba & Flores, odore quodam aromatico insignes, & sapore amaricante præditi.

Vires. Terreis elementis abundat; hinc modice adstringit, & commendatur ad hæmorrhagias internas, diarrheam, solidorum laxitatem, spasmodicas fibrarum contractiones, & STAHLIO celebratur remedium summe tonicum & sedativum. Ad dolores hæmorrhoidum cæcarum ceu specificum laudatur.

Millefolium nobile Off.

Tanacetum minus album, odore Camphoræ c. B.

Achillea foliis tomentosis pinnatis, pinnis crenatis, pinnulis semipinnatis HALL.

Histor. n. 109.

Achillea nobilis LINN. Spec. pl. T. II. p. 1268.

Gall. Millefeuille a odeur de Camfre.

Germ. Edel-Garbenkraut.

Crescit apud nos versus Hagenheim, Alschwyl & Neuweyler.

Distinguitur a præcedente foliis latioribus, brevioribus, pallidioribus, magis incanis, floribus constanter ex albo pallide sulfureis, odore balsamico, gratiore, ad camphoram omnino accedente, inprimis si trita fuerit, ideoque plus virium promittit quam præcedens & mereretur in ejus locum substitui.

Millegrana, vid. Herniaria.

Millepedes, Afelli, Off.

Afellus asininus, seu vulgaris RAJ. Hist. Insector. p. 41. n. 1.

Oniscus (Asellus) ovalis, cauda obtusa, stylis simplicibus LINN. Syst. Nat. Tom. I. p. 1061.

Gall. Cloportes.

Germ. Mauresel, Kellersesel, nostr. Thierlein, Mülleresel.

Habitat in muris, cellis, lignis putridis, insectum notissimum.

Vires. Odore sunt debili, sed ingrato, sapore parum acri, sed nauseoso. Commendantur ad obstructions viscerum abdominis, urinæ suppressionem, icterum, arthritidem, rheumatismum, scorbuticam sanguinis acrimoniam, visus debilitatem &c. sed tantas virtutes ipsis tribuere nimium videtur.

Minium, Minium rubrum Off.

Gall. Minium.

Germ. Mennig, rother Mennig, Minium.

Est Calx plumbi in furno reverberii calcinata in pulverem rubicundissimum, cinnabari æmulum. Singulare in hac præparatione est, quod minium sic præparatum plus ponderis habeat, quam Calx plumbi quæ adhibita fuit.

Vires, ut reliqua plumbi præparata, exsiccantes, refrigerantes, adstringentes, externis usibus aptæ. A pictoribus etiam in usum trahitur.

Momordica, Balsamina mas Off.

Balsamina rotundifolia repens, seu mas c. B.

Momordica Balsamina mas BLACKW. Tab. 539.

Momordica (Balsamina) pomis angulatis, tuberculatis, foliis glabris, patenti-palma-

matris LINN. *Sp. plant.* T. II. Sponte crescit in *Italia*, & per totam fere Europam colitur.

p. 1433.

Gall. Pomme de Merveilles.

Germ. Balsamkraut, Balsamapfel.

Habitat in *India* & in hortis apud nos colitur.

Usu. Fructus.

Vires refrigerantes, leniter adstringentes, balsamicæ. Oleum infusum præcipue ad hæmorrhoides laudatur.

Usu. Fructus, & Cortex radicis.

Vires. Fructus refrigerat, humectat, sitim sedat, secretiones humorum auget uti plerique fructus horæi; syrupus inde paratur in angina & ad aphthas utilis. Cortex radicis ceu anthelminticum celebre erat, & credebatur etiam tæniam necare.

Morsus diaboli, Succisa Off.

Succisa glabra C. B. &

Succisa hirsuta EIUDEM.

Morsus diaboli, Succisa

BLACKW. Tab. 142.

Succisa caule trifloro, floribus convexis, foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis HALL. *Hist.* n. 201.

Scabiosa Succisa LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 142.

Gall. Mors du diable, Remors, Succise.

Germ. Teufels Abbiß.

In pratis udis provenit.

Usu. Radix crassa, quasi abrupta, modice acris.

Vires vulnerariæ; ad gargarismata in angina, & ad discutiendos tumores adhibetur; olim & alexipharmaca credebatur, sed odor & sapor tantas vires haud promittunt.

Morus Off.

Morus fructu nigro C. B.

Morus nigra vulgaris BLACKW. Tab. 126.

Morus (nigra) foliis cordatis scabris LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1398.

Gall. Meurier.

Germ. Maulbeerbaum.

Moschata Nux vide Nux moschata.

Moschus Off.

Gall. Musc.

Germ. Moschus, Biesam.

Est substantia granulata, sanguini coagulato haud absimilis, unguinosa, folliculo tenui coriaceo, externe pilis fuscis obfita, ovi columbini magnitudine, inclusa, odoris fragrantissimi, haud quidem ingrati, sed nisi aliis intermixtis debilitatus fuerit, vix diu ferendi, saporis acris & amaricantis. Folliculus iste protuberat infra umbilicum animalis, quod vocatur

Animal moschiferum RAJ.

Synops. Anim. Quadrup. p. 127.

Capreolus Moschi GESN. *Hist.*

Anim. de Quadrup. p. 695.

Moschus (Moschiferus)

LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 91.

Gall. Gazelle.

Germ. Biesamthier.

Habitat in *Tataria* versus *Chinam*.

Optimus habetur Moschus qui ex *India orientali* & ex *Tunquin* ad nos affertur, huic super censetur *Benghalensis*, vi-
lior his *Moscoviticus*.

Vires. Calefaciens est remedium, roborans, nervinum, vires cordis languentes excitans, summe penetrans, ita ut ejus usu

aliquandiu continuato saliva, sudor, urina, moschum redolere observentur. In mania, epilepsia, convulsionibus, etiam iis quæ febribus acutis superveniunt, tussi convulsiva infantum, ad expellendas variolas ceteraque exanthemata sæpe profuit. Ad hydrophobiam in pulvere tunquinenſi laudatur, & certe aliis remediis antilyſſis efficacius videtur. Præſervative variolas arcere creditur; & in morbo hyſterico quibusdam mire laudatur.

Mumia Off.

Gall. Mumie.

Germ. Mumien.

Ita vocantur cadavera humana, aloe, myrrha, asphalto aliisque balsamicis speciebus in *Ægypto* olim condita, & exſiccata, quorum partes in officinis noſtratibus aſſervantur.

Vires olim putabantur vulnerariæ, ſanguinem congruatum reſolventes; hodie minus frequenter, quam olim adhibetur.

Musculus Acaciæ Off.

Musculus arboreus ramosus IOH. BAUH. *Hiſt.* Tom. III. p. 764.

Lichenoides cornutum, bronchiale, molle, ſubtus incanum DILL. *Hiſt. Muſc.* pag. 160. n. 55. Tab. XXI. fig. 55.

Lichen complanatus, utrinque lacunofus, undique farinofus HALL. *Hiſt.* n. 1984.

Lichen (Prunaſtri) foliaceus, erectiusculus, lacunofus, ſubtus tomentofus, albus LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1614. n. 39.

Germ. Schlehenmoos.

Reperitur ubique arboribus & fruticibus innascens.

Vires adſtringentes, in prolapſu uteri, ani procidentia &c.

Musculus apthofus.

Liahenoides digitatum læte virens, verrucis nigris notatum DILL. *Hiſtor. Muſc.* p. 207. Tab. 28. fig. 106.

Lichen fronde obtuſe lobata, ſuperne verrucoſa, inferne villoſa HALL. *Hiſt.* n. 1992.

Lichen apthofus LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1616. n. 46.

Ad arbores, & terram muſcoſam in ſylvis reperitur.

Vires purgantes ſurſum & deorſum, anthelminticæ. Nobis non in uſu.

Musculus arboreus vide Musculus quernus.

Musculus corallinus vide Corallina.

Musculus Islandicus Off.

Pulmonaria CAM. *Epit.* p. 783. n. 2.

Lichenoides rigidum Eryngii folia referens DILL. *Hiſt. Muſc.* p. 209. Tab. 28. f. 111.

Lichen fronde convexa, ciliata, puſtulata, obtuſe ramoſa, utrinque levi, ramis breviffime bicornibus HALL. *Hiſt.* n. 1978.

Lichen Islandicus LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1611. n. 29.

In alpiſibus frequens, ſed & in montibus noſtris reperitur.

Subamarus eſt recens; ſed ſiccatus farinam dat Islandis familiarem, & abunde in cibum recipitur, cum lacte, vel & aqua coctus.

Vires. Ad catarrhos laudatur, tum & ad phthiſin. Viennenſes ad tuſſim infantum & phthiſin laudant. Recens vim purgantem exſerit.

Alpico-

Alpicolæ nostrates ab aliquo tempore curatius hunc muscum colligunt, & vendunt.

Muscus pulmonarius vide Pulmonaria arborea.

Muscus pyxidatus Off.

Coralloides scyphi forme
DILL. *Hist. Musc.* p. 79. Tab. 4. f. A. B.

Lichen scypho infundibuliformi simplici HALL. *Hist.* n. 1912.

Lichen pyxidatus LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1619.

Vulgaris est in terra humida, arborum truncis, in faxis &c.

Vires adstringentes: multum laudatur ad tussim convulsivam infantum. Nostratibus vero haud in usu est.

Muscus quernus, Muscus arboreus Off.

Muscus Quercuum, & aliarum arborum JOH. BAUH. *Hist. plant.* T. I. P. II. p. 88.

Usnea vulgaris loris longis implexis DILL. *Hist. Musc.* p. 99. Tab. 13. f. 13.

Lichen pendulus, teres, exasperatus, scutellis radiatis HALL. *Hist.* n. 1971.

Lichen plicatus LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1622?

Ad annosas arbores crescit, & dependet.

Vires adstringentes; in hæmorrhagiis adhibetur. Laudatur quoque ad tussim.

Myrobalani Off.

Gall. Myrobalans.

Germ. Myrobalanen.

Ita vocantur fructus exotici, exsiccati, inter se diversi, qui ex *Indiis orientalibus* advehuntur, & diversarum arborum, nondum satis cognitarum, fructus esse censentur. Quinque

Pars I.

species in Officinis nostris reperiuntur.

1. Myrobalani citrinæ Off.

Myrobalani teretes, citrinæ bilem purgantes C. B.

Fructus sunt oblongi, turbinati, utrinque obtusi, quinque striis majoribus, totidemque minoribus intermediis ut plurimum distincti, nucleum continent corneum aut candidum.

2. Myrobalani chebulæ Off.

Myrobalani maximi, oblongi, angulosi, pituitam purgantes C. B.

Prioribus similes sunt sed majores, imo omnium maximi; rugosi, coloris obscurioris, ad fuscum accedentis.

3. Myrobalani Indicæ, seu nigræ Off.

Myrobalani nigræ octangulares C. B.

Myrobalani Indæ nigræ, sine nucleis JOH. BAUH. *Hist.* T. I. p. 204.

Citrinis minores sunt, rugosi potius quam striati, foris nigri, intus picis instar splendentes, sulco inani intus excavati, hinc fructus immaturi potius videntur, quam perfecti.

Myrobalani belliricæ Off.

Myrobalani rotundæ belliricæ C. B.

Sunt fructus subrotundi, non nihil angulosi, nucis moschatæ forma & colore.

Arbores, quæ quatuor hosce diversos fructus proferunt, nondum satis cognitæ sunt. LINNÆUS Myrobalani nomine eas indicat, in *Mat. Med.* n. 505-508. & in BLACKW. *Herb.* T. 401. horum fructuum icones extant.

F f

5. Myro-

5. Myrobalani emblicæ Off.

C. B.

Myrobalani emblicæ in segmentis nucleum habentes, angulosæ JOH. BAUH. *Hist.* T. I. p. 206.

Sunt fructus fere sphaerici, sex angulis distincti, e cinereo nigricantes, per maturitatem dehiscunt in sex partes & continent ossiculum albidum, avellanæ magnitudine, angulosum.

Arbor quæ hos fructus producit, est

Myrobalanus emblica C. B. & RUMPH. *Herb. Amboin.* T. VII. p. 1. Tab. I.

Nelli camarum *Hort. Malab.* Tom. I. p. 69. T. 38.

Myrobalanus emblica BLACKW. Tab. 400.

Phyllanthus (Emblica) foliis pinnatis floriferis, caule arborco, fructu baccato LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1393.

Habitat in *India orientali.*

Vires. Ab omnibus referuntur inter purgantia tutissima, quæ simul vi adstringente viscera roborant, hinc præcipue in alvi profluviiis & dysenteria, ubi simul purgatione & adstrictione opus est, commendantur. Rarius hodie in usu sunt, quod nimis debilis vis purgans ipsis inest.

Myrrha Off.

Gall. Myrrhe.

Germ. Myrrhen.

Est succus resinoso-gummosus, in fragiles glebas, avellanæ vel nucis magnitudine concretus, coloris flavi, rufi aut ferruginei; saporis amari, aromatici, sed nauseosi, odoris gravis dum teritur, nec ingrati dum comburitur.

Affertur nobis ex *Arabia & Æthiopia.*

De arbore vero, quæ Myrrham producit, nihil certi hæctenus proferre licet.

Vires balsamicæ, attenuantes, antisepticæ, roborantes, calefacientes, alexipharmacæ hinc in morbis pectoris, ventriculi, uteri, frigidis, mucosis confert: anthelmintica censetur; Externe ulceribus, & ossibus cariosis adhibetur, & fumus ad roborandum uterum & nervos.

Myrtillus Off.

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante C. B.

Vaccinia BLACKW. Tab. 463.

Vaccinium foliis venosis, ovato-lanceolatis, ferratis: caule anguloso HALL. *Hist.* n. 1020.

Vaccinium Myrtillus LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 498.

Gall. Myrtille, Raisin de bois.

Germ. Heidelbeere.

In sylvis abiegnis crescit.

Usu. Baccæ dulces, adstringentes, cum odore non omnibus grato.

Vires valde adstringentes, ad dysenteriam & tabidorum diarrheam commendantur, sed ex eorum usu inflationes, tormina alvique constipatio lethalis, oborta. Ad artem tinctoriam etiam adhibentur.

Myrtus Off.

Myrtus communis italica C. B.

Myrtus Bætica sylvestris BLACKW. Tab. 114.

Myrtus (communis) floribus solitariis: involucro diphylo LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 673.

Crescit in *Europa* calidiori; apud nos in hortis.

Usu.

Ufu. Folia & Baccæ.

Vires adstringentes, ad fluxus ni-

mios cohibendos olim adhibebantur, hodie vix in usu sunt.

N.

Napellus, Aconitum cœruleum Off.

Aconitum cœruleum five Napellus C. B.

Napellus CAMER. *Epit.* pag. 836.

Aconitum magnum five Napellus BLACKW. T. 561.

Aconitum caule simplici, spica densa, petiolis unifloris, casside breviter mucronata HALL. *Histor.* n. 1197.

Aconitum Napellus LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 751.

Et

Aconitum violaceum five Napellus secundus C. B.

Aconitum CL. STOERCK. in *Libell. de Stramon. Aconit. &c.* c. icone, quam ILL. HALLERUS ad hanc speciem refert, licet pedunculos unifloros habeat, & folia præcedentis simillima sint.

Aconitum caule ramoso, paniculato, petiolis multifloris, cassidis mucrone longiori HALL. *Hist.* n. 1198.

Aconitum Cammarum LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 751.

Gall. Cappe de Moine.

Germ. Eisenhütlein.

Ambæ species in *Helvetiæ* montanis & alpinis proveniunt, prior autem multo vulgatiores etiam in nostris montibus occurrunt.

Venenatissima & acerrima stirps in Medicinam hætenus non recepta, donec ILL. STOERCK extractum inde confecerit & in

arthritide, dolore ischiadico, scirrhis glandulosis, tophis veneris &c. cum fructu propinaverit.

Naphæ Flores Off.

Gall. Fleurs d'Oranges.

Germ. Pomeranzen-Blüthe.

Flores sunt albi fragrantissimi Aurantiorum suo loco dictorum.

Vires. Aqua inde destillatur fragrantissima, analeptica, anticolica audiens, & sæpissime aliis medicamentis ad gratiam eis conciliandam additur.

Napus Off.

Napus fativa C. B.

Napus, Napus dulcis BLACK. T. 410.

Brassica Napus LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 931.

Gall. Navet.

Germ. Steckrüben, Stickleuben, nostr. Gewat.

Copiosa passim feritur.

Ufu. Radix & Semen saporis acris, amaricantis.

Vires. Radix dulcis passim in cibum recipitur. Semen incidit, urinam movet & emulsionibus ad expellendas varicellas & morbillos additur. Nobis vix alius usus, quam ad oleum inde eliciendum, sub nomine Gewatohl apud nos usitissimum.

Nardus celtica vide Spica celtica.

Nardus indica vide Spica indica.

Nasturtium aquaticum Off.
Nasturtium aquaticum fupinum C. B.

Nasturtium aquaticum
BLACKW. Tab. 260. non bene.

Sisymbrium aquaticum
TABERN. Ic. p. 455.

Sisymbrium foliis pinnatis,
pinnis subrotundis, brevibus
racemis HALL. *Hist.*
n. 209.

Sisymbrium Nasturtium a-
quaticum LINN. *Sp. plant.*
Tom. II. p. 916.

Gall. Cresson d'eau ou de fon-
taine.

Germ. Brunnenkresse.

Ubique in rivulis purioribus &
juxta scaturiginis crescit.

Usu. Herba recens sive ejus
Succus, odoris & saporis,
valde acris neque tamen ingra-
ti.

Vires antiscorbuticæ summæ, ape-
rientes. In phtisi, etiam con-
summata, sæpius profuit & in
arthritide. In cibum etiam re-
cipitur vel coctum vel in aceta-
riis, gratum, stomacho ami-
cum.

Nasturtium hortense Off.

Nasturtium hortense vulga-
tum & crispum C. B.

Nasturtium hortense BLACKW.
Tab. 23.

Lepidium sativum LINN. *Sp.*
plant. T. II. p. 899.

Gall. Cresson, Cresson de
Jardin.

Germ. Kresse, Gartenkresse.

In hortis ubique colitur.

Usu. Planta recens odoris & sa-
poris acris fere uti præcedens, &
Semen.

Vires. Recens herba acetaria in-
greditur. Semen diureticum est,
hodie fere obsoletum.

Nenuphar vide Nymphæa.

Nepeta, Mentha cataria
Off.

Mentha cataria vulgaris &
major C. B.

Nepeta sive Mentha cataria
BLACKW. Tab. 455.

Cataria foliis cordatis, pe-
tiolatis, verticillis spicatis
HALL. *Hist.* n. 246.

Nepeta Cataria LINN. *Spec.*
pl. T. II. pag. 796.

Gall. Herbe au chat, Cataire,
Germ. Katzenmünz.

Ad vias & in ruderos passim oc-
currit.

Usu. Folia amara, subacria, o-
dore ad pulegium accedente.

Vires antihystericæ, emmenago-
gæ, diureticæ, cephalicæ. Ra-
rius adhibetur.

Nephriticum Lignum Off.

Gall. Bois nephretique.

Germ. Griesholz.

Durum, solidum, fuscum, gra-
ve est, saporis amari, acris.
Aquæ infusum eam cœruleo
sive potius pro diverſo, quo
aspicitur, situ variegato colore
tingit. Arbor, unde desu-
mitur suprà dicta est ad arti-
culum Been.

Vires. Commendatur ad vitia re-
num, vesicæ, ad urinam pel-
lendam & ad scabiem.

Nephriticus Lapis Off.

Gypsum viride, semipel-
lucidum, fissile WALLER.
Mineral. pag. 76.

Talcum (Nephriticus) præ-
poliendum, viride, sub-
diaphanum, particulis sub-
fibrosis LINN. *Syst. Nat. T.*
III. pag. 53.

Gall.

Gall. Pierre nephretique.

Germ. Nierenstein, Griesstein.
In *Hispania*, *Bohemia*, *America* &c.
reperitur.

Est lapis coloris obscure viridis,
variegati, attactu quasi pinguis.

Vires. Contra renum vitia & cal-
culum olim interne & externe
adhibebatur, nunc fere negli-
gitur.

Nicotiana, Petum, Tabacum Off.

Nicotiana major latifolia
C. B.

Petum, Tabaccum BLACKW.
Tab. 146.

Nicotiana (Tabacum) foliis
lanceolato-ovatis, sessili-
bus, decurrentibus, flo-
ribus acutis LINN. *Spec. pl.*
T. I. p. 258.

Et

Nicotiana minor C. B. BLACKW.
Tab. 437.

Nicotiana (rustica) foliis pe-
tiolatis, ovatis, integer-
rimis, floribus obtusis
LINN. *Spec. plant.* T. I. pag.
258.

Gall. Nicotiane, Tabac, Pe-
tun.

Germ. Toback, Taback.

Ambæ species perinde ad medicos
usus recipiuntur & passim co-
luntur.

Usu. Folia singulari, acri, vo-
latili & nonnullis grato aliis
nauseoso sapore & odore præ-
dita.

Vires. Virofa est planta sursum
& deorsum purgans, narcotica
præterea, ut ejus usui haud
assueti plerumque soporosi inde
fiant. Notissimus hodierno tem-
pore & quotidianus in toto fere
terrarum orbe ejus est usus, tam
in pulverem triti naribus intru-
dendi, quam fumi ejus fistula ore

Pars I.

hauriendi. Obstimulantem suam
vim clysmatibus additur in ileo
aliisque pertinacibus alvis ob-
structionibus, comatosis affec-
tibus, apoplexia, tympanitide
&c. nec non in submersis ad
vitam revocandis optimo sæpius
cum effectu. Vulneraria etiam
audit & minor species a rusticis
nostratibus eo fine in hortis co-
litur. Pulvis ob suam vim errhi-
nam in coryza frigidisque capitis
affectibus, conducit. Fumus
salivam copiose elicit, hinc in
odontalgia, lippitudine humi-
da & catarrhalibus affectibus
sæpius utilis, imò hæmoptilin
periodicam plurium annorum
inde curatam esse legimus.

Nigella Off.

Nigella flore minore simp-
lici candido C. B.

Melanthium fativum CAMER.
Epit. p. 551.

Nigella (fativa) pistillis qui-
nis, capsulis muricatis,
subrotundis, foliis subpi-
lofis LINN. *Spec. plant.* T. I.
pag. 753.

Gall. Nielle.

Germ. Schwarzer Kummel,
schwarzer Coriander.

In hortis feritur.

Usu. Semina nigra, rugosa, sa-
poris & odoris acris, aroma-
tici.

Vires ipsis adscribuntur aperien-
tes, urinam, menses, lochia
pellentes, lac augentes, ex-
pectorationem promoventes &c.
Aliis suspecta sunt. Rarius a-
pud nos usu veniunt.

Duæ adhuc Nigellæ species sunt,
quarum semina passim præce-
dentium loco in Officinis pro-
stant, nimirum

Nigella angustifolia, flore
G g majore

maiore simplici, cœruleo

C. B.

Nigella hortensis BLACKW. T. 558.

Nigella (damascena) floribus involucro folioso cinctis LINN. *Spec. plant.* T. I. pag. 753.

In hortis colitur, nostratibus *Schabab* dicta.

Et

Nigella arvensis cornuta C. B.

Nigella arvensis BLACKW. T. 559. bene.

Nigella flore nudo, filiquarum cornubus longissimis HALL. *Hist.* n. 1194.

Nigella (arvensis) pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 753.

In agris lapidosis abunde apud nos reperitur & a nostratibus *Feld Schabab*, *wilder Schabab* vocatur.

Nihilum album, *Pompholyx* Off.

Tutia alba farinacea, levissima WALL. *Mineral.* p. 596.

Gall. *Calamine blanche.*

Germ. *Weisses Nichts.*

Tutia est species alba, levis, farinosa, ex Zinco vel Lapide calaminari in confectione Orichalci in suprema fornacis parte sublimata.

Vires. Siccat, adstringit, refrigerat, varia emplastra ingreditur & perinde ut cinerea *Tutia* ad oculos inflammatos adhibetur.

Datur & aliud *Pompholyx* five *Nihilum album*, quod in fornacibus, ubi Argentum a plumbo separatur, colligitur & revera nihil aliud est quam plumbi condensatus fumus, iis-

dem cum præcedenti instructus viribus.

Ninsi, *Nifi*, *Ninseng*, *Ginseng* Off.

Dux diversæ radices exoticæ sub hoc nomine passim promiscue in Officinis prostant, nimirum *Ninsi*, *Nifi*, *Ginseng* orientalis.

Germ. *Ninsi*, *Japanische Zuckerswurzel.*

Est *Radix petroselinii* radice ut-
cunque similis, fusiformis, ver-
sus extremitatem inferiorem
plerumque bifida, digiti mino-
ris crassitie, extus ex albo fla-
vescens vel pallide fusca, intus
alba, solida, odoris nullius,
saporis grati, dulcis, subaromatici.
Planta hanc radicem lar-
giens vocatur

Sisarum montanum Coræen-
se, radice non tuberosa
KÆMPF. *Amœnit. exot.* p. 818.
c. bona icone p. 819.

Nisji seu *Nindsin* Japonensium
BLACKW. Tab. 514. ead. icon.

Sium (*Ninsi*) foliis ferratis,
pinnatis: rameis ternatis
LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 361.

Crescit in *China*.

Secunda *Radix* priori fatis simi-
lis, paulo tamen crassior & no-
doso, rugoso capite instructa,
perinde ceterum furcata, colo-
ris obscurioris, odoris manifesti,
saporis amaricantis.

Germ. *Nordamericanische Kraft-
wurzel, Ginseng.*

Planta ipsa vocatur

Aureliana canadensis, *Sinen-
bus* *Gin-seng*, *Iroquæis*
Garent-Oguen BREYN. *Dis-
sert. de Rad. Ginsen* &c. p. 49.
seqq. cum icone.

Ginseng *Sinensium* BLACKW.
Tab. 513.

Araliastrum foliis ternis,
quin-

quinquepartitis, Ginseng
sive Ninsin officinarum
TREW. *Ebret.* Tab. 6. fig. I.
Panax (quinquefolium) fo-
liis ternis, quinatis LINN.
Spec. plant. Tom. II. p. 1512.
Provenit in Canada, Virginia &c.
Vires binis hisce radicibus eadem
tribuuntur, analepticæ summæ,
aphrodisiacæ, antispasmodicæ
&c. Nostræ officinæ ob enorme,
quo veneunt, pretium eis ca-
rent.

Nitrum, Sal Petræ Off.

Nitrum WALL. *Mineral.* pag.
216.

Gall. Nitre, Salpêtre.

Germ. Salpeter.

Est sal medium, album, pelluci-
dum, cristallos prismatis hexa-
goni referens, cum inflamma-
bilibus substantiis in igne de-
tonans, saporis falsi & frigidi
sensum in ore relinquentis.
Constat ex acido sui generis &
alkali fixo. Variis modis ex
terris pinguibus &c. elixivatur
& alkali fixi additione in verum
Nitrum crystallifatum excoqui-
tur. Cum vero plerumque,
quod venale prostat, nitro
variæ sordes & sal communis
inhæreant, probe depurandum
prius est, antequam in medicos
usus recipiatur.

Vires refrigerantes, antiphlogisticæ,
antispasmodicæ, diureticæ. San-
guinem fluidiorem & rubicun-
diorem reddit. Cum cautela
tamen adhibendum, cum debi-
litet, ventriculi tonum infir-
met, appetitum minuat vel
plane tollat, & facile alvi flux-
um excitare possit, hinc non-
nulli ejus usum rejiciunt ejus-
que in locum scopo antiphlogi-
stico & temperante acida mi-
neralia substituunt, persuasi,
pravas nitri qualitates unice ab
alkali fixo in eo copiose hæren-
te derivandas esse.

Noli me tangere, Impatiens
Off.

Balsamina lutea sive noli me
tangere c. B.

Balsamita altera, noli me
tangere COLUMNÆ *Ecphras.* I.
p. 149. & 150.

Impatiens caule geniculato,
pedunculis ramosis, foliis
petiolatis, ovatis, crenatis
HALL. *Hist.* n. 557.

Impatiens noli tangere LINN.
Sp. plant. T. II. p. 1329.

In umbrosis humidis & uliginosis
frequens.

Planta succulenta inde nomen suum
obtinet, quod fructus maturus
ad tactum totus diffiliat & se-
mina cum impetu projiciat.

Ufu. Folia.

Vires. Folia recentia externe im-
posita urinam movere dicuntur
etiam ad flagitium, quare ad
nephriticos dolores nonnulli
commendant. Etiam ad ner-
vorum vulnera & hæmorrhoi-
des valere ajunt. Aliis planta su-
specta est.

Nummularia Off.

Nummularia CAMER. *Epit.* p.
755. BLACKW. Tab. 542.

Numularia major lutea c. B.

Lyfimachia caule prostrato,
foliis subrotundis, petio-
lis alaribus, unifloris HALL.
Hist. n. 629.

Lyfimachia Nummularia
LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 211.

Gall. Nummulaire.

Germ. Pfennigkraut, Schlans-
genkraut.

In humidis vulgaris.

Ufu. Herba.

Vires vulnerariæ, adstringentes.

Nux moschata, Nux indica,
Nucista, Myristica Off.

G g 2

Nux

Nux moschata, fructu rotundo c. B. BREYN. *Prodr.* II. pag. 86. PLUKN. *Almag.* p. 265. *Phytogr.* Tab. 209. fig. 1.

Nux moschata BLACKW. Tab. 353.

Myristica LINN. *Mat. Med.* pag. 179. n. 509.

Arbor in insulis *Moluccis* sponte provenit & copiose colitur, hactenus nondum bene nota.

Usu. 1. Fructus integer ovalis, carnosus, magnitudinis nucis juglandis majoris. Hic nonnisi immaturus & saccharo conditus ad nos adfertur & in officinis sub nomine *Nucis indicæ* conditæ prostat.

2. Nucleus ovalis vel subrotundus, avellanæ magnitudine, durus, solidus, ponderosus, extus cinereus vel fuscus, rugosus, intus venis spadiceis undulatis percursus, odoris & saporis aromatici, *Nux moschata*, *Nucista*, *Myristica* dictus.

Gall. Noix muscade.

Germ. Muscaten-Kuß.

3. Involucrum nuclei ramosum, reticulatum sive cancellatum, coloris flavi, vel rufescentis, saporis & odoris aromatici, suavissimi, *Macis* nomine notum.

Gall. Fleur de muscade.

Germ. Muscatenbluthe.

Vires. Noces integræ conditæ calefaciunt, roborant, venerem stimulant, rarioris usus.

Nuclei suavissimum aroma sunt in culina pariter & medicina notissimum. Calefaciunt, ventri-

culum roborant, analeptici sunt, adstringunt.

Involucrum sive *Macis* eisdem viribus præditum est.

Nux Myrepica vide Been.
Nux Vomica Off.

Nux Vomica in Officinis c. B. BLACKW. T. 395.

Strychnos (*Nux vomica*) foliis ovatis, caule inermi LINN. *Sp. plant.* Tom. I. p. 271.

Gall. Noix vomique.

Germ. Kräbaum, Kräbenaug.
In India crescit.

Usu. Semen magnum, orbiculatum, planum, cinereum, corneæ duritiæ, saporis amari, nauseosi.

Vires narcoticæ imo venenatæ, ut unice ad necandos canes, feles, mures &c. adhibeatur.

Nymphæa, *Nenuphar* Off.

Nymphæa alba major c. B.

Nymphæa alba BLACKW. T. 498. a. & b. & 499.

Nymphæa calyce quadrifolio, petalis minori, fructu sphaerico HALL. *Hist.* n. 1067.

Nymphæa alba LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 729.

Gall. Nenuphar, Lys d'Eau.

Germ. Weiße Seeblumen.

Usu. Radix & Flores.

Vires. Radix tanquam adstringens in fluore albo, alvi fluxu, hæmorrhagiis &c. commendatur. Flores refrigerare dicuntur & humectare. Aqua inde destillata cosmetica audit.

O.

Ochra Off.

Ochra lutea vulgaris WALL. *Mineral.* p. 342.

Ochra ferri pulverea lutea LINN. *Syst. Nat.* Tom. III. p. 192.

Gall.

Gall. Ochre jaune.

Germ. Ocher, Ochergelb, Eiseno-
ocher.

Est terra martialis in aquis mar-
tialibus hærens.

Vires ficcantes, adstringentes. Pic-
toribus præcipue inservit.

Ocimum vide Basilicum.

Oculi Cancrorum vide Can-
crorum Oculi.

Oelsnitium vide Olsnitium.

Olea Off.

Olea fativa c. B.

Olea, Olea fativa BLACKW.
Tab. 199.

Olea (Europæa) foliis lanceo-
latis LINN. *Spec. plant.* T. I.
p. 11.

Gall. Olivier.

Germ. Olivenbaum.

In australi *Europa* sponte succres-
cit & copiose colitur.

Usu. Fructus *Gall.* Olives,
Germ. Oliven dicti & expres-
sum ex iis Oleum *Gall.* Hui-
le d'olives, *Germ.* Oliven-
öhl, Baumöhl appellatum.

Vires. Fructus immaturi muria
conditi in cibum recipiuntur,
appetitum excitant, refrigerant
& ebrietatem arcere dicuntur.

Oleum unguinosum, blandissi-
mum, dulce, usus æconomi-
ci & medici eximii. Intus as-
sumtum nutrit, relaxat, lubri-
cat, demulcet, involvit, in ne-
phriticis doloribus, colica, tuf-
si &c. utilissimum. Veneno-
rum mineralium largiter epotum
præsentaneum sæpe antidotum.
Externe emollit, lenit, relaxat
an & a hydropo liberat ventri
per aliquot tempus inunctum?
Mihi quidem experimentum non
fucceffit. Varia præterea em-
plastra & unguenta ingreditur.

Olibanum, Thus mas Off.

Pars I.

Thus five Olibanum Offici-
rum c. B.

Gall. Encens.

Germ. Weyrauch.

Est Gummi-refina pallide flaves-
cens, dura, subpellucida, in gra-
na mastiches similia concreta,
saporis resinosi, amaricantis, a-
romatici, odoris, dum accendi-
tur, fragrantis.

Arbor, unde stillat, communi au-
torum consensu Cedri Tourn.
seu Juniperi LINN. species est,
quænam vero sequentium dua-
rum sit nondum liquet.

1. Cedrus hispanica proce-
rior, fructu maximo nigro
TOURNEF. *I. R. H.* p. 588.

Juniperus (thurifera) foliis
quadrifariam imbricatis a-
cutis LINN. *Spec. plant.* T. II.
pag. 1471.

Crescit in *Hispania*.

2. Cedrus folio cupressi ma-
jor, fructu flavescente c. B.
Juniperus major CLUS. *Hist.* p. 38
Juniperus (phœnicea) foliis
ternis, oblitteratis imbrica-
tis obtusis LINN. *Spec. plant.*
Tom. II. p. 1471.

Provenit in *Europa* australi, *Orien-
te* &c.

Vires roborantes, ficcantes, bal-
samicæ, discutientes, vulnerariæ,
nervinæ, externo plerumque usu.
Interne rarius si unquam apud
nos adhibetur.

Olibanum sylvestre Off.

Gall. Encens sauvage.

Germ. Wilder Weyrauch, nostr.
Waldrauch.

Nihil aliud est quam Resina Pini
vel Abietis. in acervis for-
micarum collecta multisque for-
dibus permixta.

Vires. Ad suffitum sed rarius
adhibetur in odontalgia &c

H h

Olsni-

Olsnitium, Oelsnitium, Oelnizium, Thysselinum Off.
 Apium sylvestre lacteo succo turgens C. B.

Thysselinum Rivin.

Olsnitium, Olsnichium, Thysselinum BLACK. T. 556?

Selinum lactescens, caule aspero, foliis triplicato-pinnatis, lobulis ovato lanceolatis HALL. Hist. n. 800.

Selinum (sylvestre) radice fusiformi, multiplici LINN. Spec. plant. T. I. p. 350? Videtur.

Gall. Thysselinum, Olsnitium.

Germ. Oelsenich, Elsenich, Oelniz.

In paludosis passim per Germaniam & Galliam, rarius in Helvetia occurrit.

Usu. Radix albescens, saporis acris, aromatici, amari, odoris fragrantis.

Vires calefacientes, incidentes, aperientes, alexipharmacæ, rarissimi apud nos usus.

Ononis, Anonis, Resta bovis Off.

Anonis spinosa flore purpureo C. B.

Anonis BLACKW. Tab. 301.

Anonis caule decumbente, ramis senescentibus spinosis HALL. Hist. n. 356.

Ononis spinosa LINN. Spec. pl. T. II. p. 1006.

Gall. Ononis, Bugrande, Arrete bœuf.

Germ. Haubechel, Ochsenbrech.

Abunde in aridioribus provenit.

Usu. Radix.

Vires aperientes, diureticiæ. Inter quinque radices aperientes minores numeratur.

Ophioglossum Off.

Ophioglossum vulgatum C. B.

Ophioglossum BLACKW. Tab. 416.

Ophioglossum folio unico, ovato lanceolato, obtuso HALL. Hist. n. 1685.

Ophioglossum vulgatum LINN. Spec. plant. T. II. pag. 1518.

Gall. Langue de serpent, Herbe sans couture.

Germ. Schlangenzünglein, Natterzünglein.

In pratis montosis passim apud nos frequens.

Usu. Herba saporis glutinosi, subdulcis.

Vires adstringentes, vulnerariæ.

Opium, Opium Thebaicum, Meconium Off.

Est Succus inspissatus capitum Papaveris sativi infra suo loco dicendi. Maturitati nimirum proxima capita ab uno latere inciduntur. Succus ex vulneribus extillans lacteus a sole statim condensatur & scalpello dein abraditur inque concham colligitur. Simili modo postea & alterum latus vulneratur, liquorque inde promans prior jungitur. Opium ita collectum aqua humectatur, spatula probe commiscetur, & in glebas efformatur.

Colligitur plurimum in orientalibus regionibus, Persia, Turcia, Ægypto &c. ubi sativum Papaverem passim 30 & 40 pedum altitudinem attingere legimus, capitibus tunc instructum 35 unciarum capacibus. In frigidis e contra nostris regionibus vix 2 vel 3 pedum altitudinis plantæ capita parum hujus succi largiuntur, ut tamen verum inde & ab orientali vix diversum

sum opium obtinuerint Dillenius, Hallerus aliique.

Quale ad nos advehitur Opium in glebas compactum est, coloris ex nigro rufescentis, odoris nauseosi, narcotici, saporis amari, valde acris.

Vires. Inter narcotica & stupefacientia nervorumque sensibilitatem minuentia medicamenta primum locum obtinet, ut illi non assueti ab unico grano, nonnulli etiam a dimidio somnolenti fiant. Deinde omnes fere evacuationes minuit præter sudorem, quem potius movet. Parcissima dosi exhilarat, & certam voluptatem excitat, qua semel assueti vix amplius carere possunt, cui tamen lætitiæ paucas post horas stupor & inertia succedunt.

Conducit ergo ad nimias evacuationes qualescunque coercendas, nervorum irritabilitatem & sensibilitatem nimias moderandas, dolores sedandos, somnum conciliandum &c. usu tamen ejus, si ullius remedii, summam medici prudentiam requirente.

Cum tam impurum ad nos afferatur opium, utor extracto ejus aquoso cum quadruplo sacchari in pulverem trito ad 3, 4, vel 5 grana, prout circumstantiæ indicant, sperato plerumque cum effectu.

Opobalsamum siccum vide Balsamum indicum siccum.

Opobalsamum verum, Balsamum de Mecca, Balsamum de Gilead, Judaicum Off.

Balsamum ALPIN. de plant. Ægypt. pag. 62. seqq. icon. pag. 78.

Balsamum syriacum rutæ foliis C. B.

Amyris (Opobalsamum) foliis pinnatis, foliolis sessilibus LINN. Mantiss. ad Edit. II. Sp. pl. p. 65. Amtenit. acad. Vol. VII. p. 69.

Gall. Baume vrai, Baume de Judée, Baume de la Mecque.

Germ. Echter Balsambaum.

In Syria & Arabia felice crescit.

Usu. 1. Lignum sive ramuli contorti, nodosi, flavicantes, sapore & odore plerumque carentes, Xylobalsamum Off.

Gall. Bois de Baume, Germ. Balsamholz.

2. Fructus sive Baccæ exsiccatæ, oblongæ, fuscae, ponderosæ, rugosæ, saporis & odoris grati, Carpobalsamum Off. Gall. Fruits de Baume, Germ. Balsamkörner.

3. Resina liquida, albicans, limpida, oleosa, odoris penetrantis, gratissimi, saporis acris, aromatici, amaricantis. Vetusta aureum colorem acquirit & consistentiam tenaciorem Opobalsamum verum &c. Off. Rarius purum & genuinum in officinis nostris prostat, sed plerumque Balsamo Copaivæ adulteratur.

Vires. Lignum hodie vix amplius in usu est, neque, cum odore & sapore destitutum sit, ullas vires promittit.

Fructus roborantes audiunt, traumatici, alexipharmaci, aphrodisiaci. Sed cum rarissime in officinis prostent, cubebæ vel cardamomi substituuntur.

Resina sive Balsamum olim celebratissimum hodie incipit negligi. Refertur inter vulneraria optima, cardiaca, &c. imo pro polychresto remedio deprædicabatur.

Opopanax Gummi Off.

Ex succus condensatus ex infimo caule vel supremâ parte radicis mox dicendæ plantæ incisis exstillans. In magnis plerumque frustis ex granis flavicantibus vel rufescentibus compactis ad nos advehitur. Gummosæ est indolis, in aqua solubilis, eamque, si genuinus est, lacteam reddens, odoris ingrati, saporis amari, acris, nauseosi.

Plantâ huncce succum præbens vocatur

Panax costinum c. B.

Panax herculeum BLACKW.
Tab. 434.

Pastinaca (Opopanax) foliis decompositis pinnatis
LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 376.

Gall. Panacée.

Germ. Panaxkraut, Panaxwurzel, Heilwurzel.

Crescit in *Italia, Sicilia* &c.

Vires aperientes, incidentes, resolventes, discutientes, emmenagogæ. Externe frequenter adhibetur in emplastris &c. interne rarius.

Oreoselinum Off.

Apium montanum folio ampliore c. B.

Oreoselinum RIVIN. T. 8.

Selinum foliis triplicato pinnatis, angulis divisionum obtusis HALL. Hist. n. 803.

Athamanta Oreoselinum
LINN. *Spec. plant.* T. I. pag. 352.

Gall. Persil des montagnes.
Germ. Bergpetersilie, Grundheil.

In montosis apud nos & passim alibi in *Helvetia* provenit.

Usu. Radix, Herba, grati & aromatici saporis, nostris officinis ignotæ.

Vires aperientes, sudoriferæ, diureticæ.

Origanum creticum Off.

Origanum monspeliense pulchrum CAMER. Epit. pag. 468.

Origanum creticum c. B. &

Origanum folio subrotundo EJUSD.

Origanum (creticum) spicis aggregatis, longis, prismaticis, rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus LINN. Spec. plant. T. II. p. 823. HALL. Hist. n. 234.

Gall. Origan de Crete.

Germ. Cretischer Döste, Cretischer Wohlgemuth, Spanischer Sopfen.

In australi *Europa* crescit. Dicitur equidem & apud nos versus patibulum provenire, nunquam tamen ibi reperire potui & vix putaverim veram helveticam civem esse.

Usu. Folia.

Vires. Calefacit, roborat, aperit, menses provocat, etiam in ictero & asthma commendatur.

Origanum vulgare c. B.

Origanum sylvestre c. B.

Origanum BLACKW. Tab. 280.

Origanum foliis ovatis, umbellis coloratis, staminibus exsertis HALL. Hist. n. 233.

Origanum vulgare LINN. Sp. plant. T. II. p. 824.

Gall. Origan, Marjolaine sauvage.

Germ. Dosten, Wohlgemuth, nostr. großer Costez.

Usu: Folia & Summitates.

Vires eadem quæ præcedenti, modo debiliores a nostratibus frequenter ad roborantia balnea & pediluvia adhibetur, & a feri-

serici tinctoribus sub nomine
Orrego ad nigrum colorem
requiritur.

Orleana Off.

Gall. Orlean.

Germ. Orlean.

Sunt grana sive semina in mas-
sam compacta, rubicundam,
odoris radice Ireos florentinæ,
saporis adstringentis. Præfer-
tur, quæ neque nimis sicca,
neque nimis humida est.

Arbor hæc semina proferens
vocatur

Arbor mexiocana fructu
castanæ, coccifera C. B.

Orleana f. Orellana follicu-
lis lappaceis COMMEL. Hort.
Amst. Tom. I. pag. 65. Tab.
33.

Mitella Americana, maxi-
ma, tinctoria TOURNEF.

Bixa Orellana LINN. Spec. pl.
T. I. p. 730.

Crescit in humidis & ad rivulos
Americæ calidioris.

Vires adstringentes, roborantes,
sed vix nisi in arte tinctoria
adhibetur.

Orobus Off.

Ervum CAMER. Epit. p. 215.

RIVIN. HALL. Hist. n. 420.

Orobus filiquis articulatis,
semine majore C. B.

Ervum (Ervilia) germini-
bus undato-plicatis, fo-
liis impari pinnatis LINN.
Sp. pl. T. II. p. 1040.

Gall. Ers.

Germ. Erven.

Passim in agris seritur circa Ber-
nam &c.

Usu. Semina ex rotundis angu-
losa, spadicea, saporis farinosi,
amaricantis.

Pars I.

Vires. In cibum passim recipitur
brutorum & hominum minus
salubrem, ob nimiam, ut non-
nulli autumant, aeris in iis con-
tenti ubertatem, ut ingluviem
distendendo Gallinas occidat,
sed & in hominibus teste VA-
LISNERIO virium motricium ja-
ctura insanabilis ex eorum usu
orta sit. Decoctum feminum
ad nephritidem laudatur. Fari-
na cataplasmata resolventia,
discutientia & maturantia in-
greditur.

Oryza Off.

Oryza Italica C. B.

Oryza CAMER. Epit. p. 192.

Oryza sativa LINN. Sp. plant.
T. I. p. 475.

Gall. Ris.

Germ. Reis,

Vera ejus patria nescitur. Co-
litur abunde in utraque India,
China, Persia, Italia &c. in
agris paludosis.

Usu. Semen decorticatum, ob-
longum, albicans, saporis fa-
rinosi, subdulcis.

Vires Per universum fere terræ
orbem in cibum recipitur, in
panem excoctum vel cum lacte
aut aqua decoctum; saluberri-
mum præbet alimentum valde
nutriens, roborans, incrassans,
subadstringens. Etiam potu-
lenti varia grata & salubria ge-
nera inde conficiuntur.

Osmonda regalis, Filix flo- rida Off.

Filix ramosa non dentata
florida C. B.

Filix florida BLACKW. T. 324.

Osmonda (regalis) frondi-
bus bipinnatis, apice ra-
cemiferis LINN. Sp. plant. T.
II. p. 1521.

Gall. Osmonde, Fougere
fleurie.

Li

Germ.

Germ. Blühend Farrenkraut.
In humidis umbrosis *Germania*,
Alsatiæ inferioris &c. passim
provenit, in *Helvetia* hætenus
nondum lecta.

Usu. Folia sive Frondes.
Vires balsamicæ, adstringentes.
In nostris officinis non prostat.

Osteocolla Off.

Rizolithus radices populi ni-
græ. Osteocolla. Offi-
fragus lapis. Stelechites.
WALLER. *Mineral.* p. 426.

Tophus (Osteocolla) calca-
reus subcylindricus perfo-
ratus LINN. *Syst. Nat.* T. III.
p. 189.

Gall. Osteocole.

Germ. Beinbruch, Bruchstein.

In *Palatinatu*, *Misnia*, *Marchia*
Brandenburgica, *Silesia* &c. re-
peritur.

Est lapis cylindricus e terra calca-
rea congestus, spongiosa, inæ-
quali, albida, effervescente,
fistulosus, foramine lævi.
Nascitur ex materia calcarea, te-
nuissima, fabulo mixta, & va-
riarum arborum, Pini, Fraxi-
ni, Quercus, altius sepultis ra-
dicibus circumnata. Radices hæ
tractu temporis, humi affluxu
cariosæ, putrifactæ, colliquef-
centes, excavatæ, largiuntur lo-
cum osteocollæ, dum cavitates
replentur terra calcarea aquis so-
luta & allata, ut omne cavum
prorsus repleat, &c. Hæc ILL.
LINNÆUS l. c. ex Gleditschiana
epistola excitavit.

Usu. In chirurgia olim sed perpe-
ram adhibebatur ad consoli-
dandas ossium fracturas interne
in pulvere ad drachmam assum-
ta, externe in emplastris &
cataplasmatibus. Hodie tamen
fere negligitur, nisi quod su-
binde ad dentifricios pulveres
adhibeatur.

Ostrutium vide Imperatoria.
Ovum, Ovum gallinaceum
Off.

Gall. Oeuf de Poule.

Germ. Hünerey.

Avis jam supradicta est.

Usu. Vitellum, Albumen,
Testa.

Vires. Vitellum in culinis pa-
riter & medicina notissimum,
usitatissimum, valde nutrit, di-
gestionis tamen difficilioris est,
emollit, lenit, involvit, dige-
rit, maturat &c.

Albumen refrigerat, agglutinat
& ad decocta (vinaque) clari-
ficanda indeque gratiora red-
denda sæpius adhibetur.

Testæ absorbent & ad dentifri-
cios pulveres adhibentur. Cal-
cinatæ veteribus lithontripticæ
audiebant.

Oxalis vide Acetosella.

Oxyacantha, Spina alba Off.

Mespilus apii folio, sylve-
stris spinosa, sive Oxyacan-
tha C. B.

Spina alba BLACKW. Tab. 149.

Mespilus spinosa, foliis gla-
bris, ferratis, retusis, tri-
fidis HALL. *Hist.* n. 1087.

Cratægus Oxyacantha LINN.
Spec. plant. T. I. p. 683.

Gall. Epine blanche.

In sepibus & dumetis abunde.

Usu. Flores nostratibus *Hagen-*
birrlein sive *Hagenbüglein-*
blust dicti. Siccati singularem
ingratum odorem contrahunt.

Vires. Mulierculæ nostrates in-
fusum florum infantibus pro-
pinant in tussi convulsiva aliis-
que pectoris morbis.

Oxylapathum vide Lapa-
thum acutum.

Pal-

P.

Palma oleosa Off.

Palma coccifera ex Guinea

C. B.

Palma foliorum pediculis
spinosis ; fructu pruni-
formi luteo, oleoso SLOANE
Jamaic. T. II. pag. 113. T.
214.

Palma oleosa BLACKW. T. 363.

Arbor in Guinea sponte crescit,
inde in *Jamaicam* & *Barbados*
insulas translata.

Usu. Oleum quod, dum fructus
hujus arboris contusi cum aqua
coquantur, ejus superficiei in-
natare solet. Quale ad nos af-
fertur Oleum Palmæ butyri
vel unguenti fere consistentiam
habet, colorem aurantium,
odorem fortem, haud ingratum,
fere violaceum ; saporem parum
dulcem ; si diutius asservatur,
colorem aureum amittit. & al-
bescit, nulliusque amplius usus
est.

Vires. Incolæ Guineæ hoc oleo
butyri loco ad cibos condiendos
uti dicuntur. In Europa extus
adhibetur partibus dolentibus,
ad debilitatem nervorum, para-
lysin, spasmos, subluxationes,
rhachitidem ; perniones ; injec-
tionibus anatomicis aptissimum
quoque dicitur.

Panis porcinus, vide Artha-
nita.

Papaver album & nigrum
Off.

Papaver hortense semine al-
bo C. B. &

Papaver hortense semine
nigro C. B.

Papaver album BLACKW. T.
483. & nigrum EJUSD. Tab.
482.

Papaver calycibus capitibus-
que glabris, foliis am-
plexicaulibus, incisiss.
HALL. *Hist. n.* 1065.

Papaver somniferum LINN.
Spec. pl. T. I. p. 726.

Gall. Pavot blanc & noir.

Germ. Weisser, und schwarzer
Magsaamen oder Mohnsaa-
men, Gartenmohn.

Exotica planta, in hortis culta
semen facile dispergit, ut hinc
inde ad vias & in ruderosis
sponte proveniat.

Usu. : Capita, & Semen, &
Flores.

Vires lenientes, demulcentes,
anodynæ, parum sopientes in
frigidis nostris regionibus. In-
fufum florum in morbis ca-
tarrhalibus pectoris & faucium
convenit. Semina blanda edu-
lia, ad emulsiones adhibentur ;
ex capitum recente succo syru-
pus fit blandus, demulcens,
anodinus, non calefaciens, in
febris haud inutilis, infantibus
paulo largiori dosi propinatus
somnia conciliat. Capita cum
lacte cocta externo usu refrige-
rant & dolores sopiunt.

Papaver erraticum, Papaver
rhœas, sylvestre Off.

Papaver erraticum majus
C. B.

Papaver erraticum vel rhœas
BLACKW. Tab. 2. & T. 560.

Papaver foliis semipinnatis,
hispidis, fructu ovato
glabro HALL. *Hist. n.* 1064.

Papaver rhœas LINN. *Sp. pl.*
T. I. p. 726.

Gall. Coquelicœ, Pavot rou-
ge.

Germ. Kornrosen, Klapperrosen, Feuerblumen.

In agris copiose crescit exosa planta agricolis.

Usu. Flores insigni colore superbientes.

Vires demulcentes & quibusdam anodynæ censentur. Infusum florum ad expediendos catarrhos exhibetur, ut & syrupus, qui magis ob pulchrum colorem, quam medicam virtutem æstimari debet.

Paradisi grana, Maniguetta, Meleguetta, Cardamomum maximum Off.

Grana Paradisi Officinarum C. B.

Gall. Maniguette, Graine de Paradis.

Germ. Paradyßkörner.

Sunt semina nitida, angulosa, pipere minora, extus rufa seu spadicea, intus candida, gustu acria, fervida & urentia, piperis vel zingiberis ad instar, odoris similis. Continentur hæc semina copiosa in fructu oblongo, ficus magnitudine, in tria loculamenta diviso, & Cardamomi majoris MATTHIOLI nomine insignito. Planta ipsa, quæ hos fructus profert, est

Amomum caule ramoso LINN. *Mat. Med.* p. 2. n. 3.

Amomum (Grana Paradisi) scapo ramoso brevissimo LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 2.

Elettari RHEED. *Hort. Malab.* T. XI. Tab. 6.

Habitat in Madagascar, Guinea.

Vires stimulantés, calefacientes, aromaticæ; ad paralyfin laudantur.

Paralysis vide Primula veris.

Pareira brava, Butua Off. Convolvulus brasiliensis flo-

re octopetalo, monococos. RAJ. *Hist.* p. 1330.

Caapeba MARCGRAF. *Brasil.* p. 24.

Cissampelos (Pareira) foliis peltatis cordatis, emarginatis LINN. *Mat. Med.* p. 162. n. 459. *Spec. plant.* T. II. p. 1473.

Gall. Pareira brava.

Germ. Americanische Griefswurzel.

Crescit in America meridionali.

Usu. Radix lignosa, dura, foris fusca, intus obscure flavescens, variis fibris lignosis quasi intertexta, inodora, subamara, cum quadam dulcedine Glycyrrhizæ simili. Affertur in frustis modo digiti, modo brachii crassitie.

Vires attenuantes, resolventes, diuretici, in cachexia, & rheumatismo utiles; tum & in asthmate humido, fluore albo, ictero. Et tuto absque ullo metu inflammationis inde excitandæ exhibetur.

De vi lithonthriptica olim ei adscripta, nonnulli dubitant.

Parietaria Helxine Off.

Parietaria Officinarum & Dioscoridis C. B.

Parietaria Helxine BLACKW. T. 156. non bene.

Parietaria foliis hirsutis, elliptico lanceolatis HALL. *Hist.* n. 1612.

Parietaria officinalis LINN. *Sp. pl.* T. II. 1496.

Gall. Parietaire.

Germ. Maurkraut, Glasßkraut, Tag und Nachtkraut, St. Peters Kraut.

Ad muros & inter frutices crescit, rarior apud nos planta.

Usu. Herba, succo nitroso, ut ruderosæ plantæ solent, & aqua plena.

Vires

Vires refrigerantes, diureticæ; calculosis prodesse creditur. Refertur quoque inter quinque herbas emollientes.

Hujus loco sæpe in officinas nostras recipitur planta ab hac diversissima, scilicet

Solanifolia *Circæa* dicta major C. B.

Circæa foliis subcordatis, subferratis HALL. *Hist.* n. 813.

Circæa lutetiana LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 12.

Quæ longe frequentius in umbrosis & ad sepes apud nos crescit.

Paris, *Herba Paris* Off.

Solanum quadrifolium bacciferum C. B.

Herba Paris BLACKW. Tab. 286.

Paris HALL. *Hist.* n. 1006.

Paris quadrifolia LINN. *Spec. plant.* p. 527.

Gall. Raisin de Renard.

Germ. Einbeer, Wolfsbeer.

In sylvis umbrosis crescit.

Usu. *Herba* & *Fructus*, odoris virulenti & narcotici.

Vires narcoticæ, stupefacientes. Ex ejus usu cardialgiam & vomitum supervenisse, & Gallinas necatas legimus. Semine ad drachmam exhibito fatuos intra 20. dies sanatos fuisse veteres perhibent. Externo usu ad inflammationes, etiam oculorum commendatur. Radix dicitur LINNÆO dupla dosi vomitum movere, ut *Ipecacuanha*.

Parthenium vide *Matricaria*.
Passulæ majores, *Uvæ* passæ majores Off.

Sunt fructus maturi *Vitis* viniferæ calore solis exsiccati. Harum duæ species in Officinis distingui solent.

1. *Uvæ* passæ maximæ, *Uvæ* damascenæ Off.

Pars I.

Gall. Raisins de Damas.

Germ. Cibeben, grosse Meertrauben.

Sunt uvæ exsiccatæ, rugosæ, pollicem circiter longæ, latæque i fulvæ, carnosæ, sale essential. saccharo simili conspersæ, seminibus paucis, & sapore dulci,

2. *Uvæ* passæ minores seu vulgares, *Massilioticæ* Off.

Gall. Raisins passes, Passerilles, Raisins de Provence.

Germ. Grosse Rosinen, Meertrauben.

Sunt prioribus similes sed minores; sapore dulci, gratiori.

Parantur *Monspeliæ* racemos uvarum lixivio ferventi immergendo, quoad flaccescant, deinceps perticis imponuntur, ut siccescant, tandemque calore solis perficiuntur.

Planta hosce fructus producens est

Vitis vinifera C. B.

Vitis (vinifera) foliis lobatis, sinuatis, nudis LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 293.

Crescit in omnibus climatibus temperatis orbis cogniti.

Vires aperientes, resolventes, abstergentes, lenientes; alvum laxant, in morbis faucium, pulmonum, renum, vesicæ, hepatis utiles.

Passulæ minores, *Passulæ* corinthiacæ, *Uvæ* passæ minimæ Off.

Gall. Raisins de Corinthe.

Germ. Rosinen, kleine Rosinen, Corinthen.

Sunt uvæ exsiccatæ atro-purpurascens, sambuci baccas æquant, gigartis carentes, sapore dulci. *Vitis*, cui innascuntur, est

Vitis corinthiaca seu apyræna

K k

- na IOH. BAUH. *Hist. plant.* T. II. pag. 72.
- Vitis vinifera* LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 283. varietas.
- Colitur præcipue in *Zacyntha*, *Cephalonia*, aliisque *Venetianæ* ditionis insulis.
- Vires* quæ præcedentium.
- Pastinaca** Off.
- Pastinaca sylvestris latifolia* C. B. &
- Pastinaca sativa latifolia* EJUSD.
- Pastinaca* BLACKW. Tab. 379.
- Pastinaca foliis pinnatis* HALL. *Hist.* n. 808.
- Pastinaca sativa* LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 376.
- Gall. Panais.
- Germ. Wilde und Garten Pasteneyer, Mohren.
- Hortensis species apud nos vix colitur, sylvestris in ruderosis, ad vias, agros & in pratis frequens reperitur.
- Usu. Radix & Semen quæ ut tota planta dulce quid, aromaticum, nec tamen gratum, olent.
- Vires.* Radix passim in cibum recipitur & in jusculis resolventibus, abstergentibus, diureticis utiliter exhibetur. Semen ad ulcera vesicæ, calculum, viarum urinariorum dolores laudatur.
- Pentaphyllum, Quinquefolium** Off.
- Quinquefolium majus repens* C. B.
- Pentaphyllum* BLACKW. T. 454.
- Fragaria foliis quinatis, serratis, petiolis unifloris, caule reptante* HALL. *Hist.* n. 1118.
- Potentilla reptans* LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 714.
- Gall. Quintefeuille.
- Germ. Sunffingerkraut.
- Fere ubique ad vias crescit.
- Usu. Radix & Folia, acida, terrea, austera.
- Vires* adstringentes, vulnerariæ, ad laxitatem gingivarum, diarrheas, quin & febres intermittentes laudatur.
- Pepo** Off.
- Pepo oblongus* C. B. &
- Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero* C. B.
- Cucurbita (Pepo) foliis lobatis, pomis levibus* LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1435.
- Gall. Pepon.
- Germ. Pfeben, Deponen.
- In hortis feritur.
- Usu. Semina.
- Vires* refrigerantes, demulcentes, ut semina cucumeris.
- Perfoliata** Off.
- Perfoliata vulgatissima seu arvensis* C. B.
- Perfoliata* BLACKW. Tab. 95.
- Bupleurum caule brachiato, ramosissimo, foliis ovato lanceolatis, amplexicaulibus* HALL. *Hist.* n. 767.
- Bupleurum rotundifolium* LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 340.
- Gall. Percefeuille.
- Germ. Durchwachs.
- In hortis colitur; & sponte passim in agris apud nos reperitur.
- Usu. Herba & Semen.
- Vires* adstringentes vulnerariæ, emplastra & cataplasmata adstringentia ad hernias ingrediuntur.

Perlæ, vide Margaritæ.

Perfica, Perfica Malus Off.

Perfica molli carne & vulgaris, viridis, & alba c. B.

Perfica Malus BLACKW. Tab. 101.

Amygdalus (Perfica) foliorum ferraturis omnibus acutis, floribus sessilibus, solitariis LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 676.

Gall. Pecher.

Germ. Pfersichbaum.

Arbor ob fructus suavitatem ubique in hortis & vineis colitur.

Usu. Folia, Flores, Nuclei.

Vires florum & foliorum leniter laxantes, anthelminticæ, diureticæ, nucleorum diureticæ; emulsiones ingrediuntur, ad calculum renum laudantur & ad cephalalgiam.

Perficaria mitis Off.

Perficaria mitis maculata & non maculata c. B.

Perficaria maculata vel maculosa BLACKW. Tab. 118.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis, spicis ovatis, vaginis ciliatis HALL. *Hist.* n. 1557.

Polygonum Perficaria LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 518.

Gall. Perficaire.

Germ. Glöbkraut, Pfersigkraut. Frequens reperitur in agris, hortis, ad fossas, & vias.

Usu. Folia, sapore acidulo, nitroso, sed miti non acido, prædita.

Vires vulnerariæ, adstringentes: ad ulcera repurganda, quin & gangrænam sistendam externo usu commendatur. Vix tamen officinas ingreditur.

Perficaria urens, Hydropiper Off.

Perficaria urens, seu Hydropiper c. B.

Hydropiper BLACKW. Tab. 119.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis, vaginis calvis, truncatis HALL. *Hist.* n. 1554.

Polygonum Hydropiper LINN. *Sp. plant.* T. I. pag. 517.

Gall. Curate, Poivre d'Eau.

Germ. Wasserpfeffer, brennend flüßkraut.

In fossis udis minime rara est.

Usu. Folia acrimonia satis insigni, & durabili, prædita.

Vires diureticæ, ad hydropem & icterum laudatæ, & ad nephritidem calculosam. Externe ad oedemata adhibetur, carnem putridam destruit, & ulcera fistulosa mundat.

Pervinca vide Vinca per Vinca.

Pes Cati, Gnaphalium montanum, Hispidula Off.

Gnaphalium montanum, flore rotundiore, s. mas c. B. &

Gnaphalium montanum, longiore folio & flore, seu femina c. B.

Filago flagellis reptans, sexu distincta, flosculis omnibus androgynis, HALL. *Hist.* n. 157.

Gnaphalium dioicum LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1199.

Gall. Pied de Chat.

Germ. Saasenspötlein, Mausohrlein.

In montosis sterilibus & ficcis reperitur.

Usu. Herba integra, & Flores.

Vires subadstringentes, vulnerariæ; commendantur ad ficcandas defluxiones in pulmones, & ad tussim puerorum.

Petasites Off.

Petasites major & vulgaris
C. B.

Petasites BLACKW. Tab. 222.

Petasites floribus dense spicatis, flosculis androgynis HALL. *Hist.* n. 138.

Tussilago Petasites LINN. *Sp. plant.* T. II. pag. 1215.

Gall. Petasite, Herbe aux tigneux.

Germ. Pestilenzwurzel.

Locis humidis aquosis primo vere provenit.

Usu. Radix acris, aromatica, sapore non ingrato.

Vires attenuantes, sudoriferæ, alexipharmacæ, laudatur in asthmate, vix tamen in usu.

Petræ oleum, Petroleum Off.

Bitumen crassius fluidum obscure brunum WALLER. *Mineral.* p. 252.

Bitumen (Petroleum) liquidiusculum, fusco-rufescens LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 109.

Gall. Petrole.

Germ. Steinöhl.

Est oleum minerale, inflammabile, aquæ innatans, odore fragrante, bituminoso, sponte ex terra vel & fissuris rupium promanans, vel purum, vel aqua, vel terra mixtum. Hujus tres species recensentur.

1. Album, Naphtha dictum.

Hoc omnium subtilissimum, aquæ instar pellucidum, odoris penetrantis, non ingrati, facile in-

flammabile. Tale fuisse videtur Naphtha Veterum ex fontibus quibusdam juxta *Babyloniæ* scaturiens, cui vis ignem attrahens tribuebatur. Hæc vix unquam in officinis reperitur.

2. Flavum, & rubicans, Petroleum, & Oleum petræ rubrum.

Hoc priori spissius, minus pellucidum, odore minus gratum, cum sequenti mixtum esse videtur.

3. Obscure brunnum, nigricans, Oleum Petræ nigrum, Maltha, Oleum vel Axungia terræ dictum.

Hoc minus fluidum, impurum, odore magis ingratum.

In *Agro Mutinensi* circa castellum montis *Baranzonis* putei effodiuntur, qui in collis parte superiore suppeditant Petroleum album, sed parca copia, in infima parte oleum rufum uberri- mum. In eodem *Agro Mutinensi* prope montem *Gibbeum* seu *Cibinium* perpetuus fons scaturit, cui oleum flavum innatat. In *Aquitania Gallie* prope vicum *Gabianum*, oleum rufum cum aqua ex saxorum rimis effluit, porro variis in locis *Gallie*, *Germanie*, *Helvetie*, *Alsatie*, *Indiarum* &c. tales bituminosi succi promanant.

Sed & ex variis mineris, & lithanthracibus destillationis ope elicetur oleum, Petroleo simillimum, primo album, dein rubrum, & ultimo tandem ignis gradu nigrum, empyreumaticum, foetidum.

Vires Petrolei rubri calefacientes, roborantes, nervinæ. Externo usu laudatur ad paralyfin, perniones, exusta gelu membra. Interno usu ceu specificum contra tæniam laudatur cum

cum oleo terebinthinæ, sed idem satis larga & repetita dosi a me frustra fuit exhibitum. Oleum Petræ nigrum nonnisi a Veterinariis adhibetur.

Petroselinum Off.

Apium hortense, seu Petroselinum vulgo C. B.

Apium hortense, Petroselinum BLACKW. T. 172.

Apium (Petroselinum) foliolis caulinis linearibus, involucellis minimis LINN. *Spec. pl. T. I. p. 379.*

Gall. Persil.

Germ. Petersilien, Peterlin.

In hortis colitur.

Usu. Radix, Herba, & Semina.

Vires incidentes, aperientes, diureticæ. Radix inter quinque radices aperientes majores recensetur, & in cibum etiam accipitur.

Petroselinum Macedonicum Off.

Apium macedonicum C. B.

Petroselinum macedonicum BLACKW. T. 382.

Bubon (macedonicum) foliolis rhombeo-ovatis cre-natis, umbellis numerosissimis LINN. *Sp. plant. T. I. p. 364.*

Gall. Persil de Macedoine.

Germ. Macedonische Petersilien.

Sponte crescit in *Macedonia, Mauritania.*

Usu. Semina aromatica.

Vires carminativæ, diureticæ.

Petum vide Nicotiana.

Peucedanum, Fœniculum porcinum Off.

Pars I.

Peucedanum germanicum C. B.

Peucedanum (officinale) foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus.

LINN. *Spec. plant. T. I. p. 353.*

Gall. Queue de Pourceau.

Germ. Saufenchel, Saarstrang, Schwefelwurz.

In *Germania, Alsatia, Gallia* &c. pratis nascitur.

Usu. Radix sapore acris, amara, odore gravis, solutioni sulphuris haud absimilis.

Vires attenuantes, resolventes, diureticæ, sputorum & urinæ excretionem promovet. Vix in usum trahitur.

Phu vide Valeriana.

Pila marina Off.

Alcyonium subglobosum pulposum viride LINN. *Syst. Nat. T. III. p. 1295.*

Pila seu sphæra marina JOH. BAUH. *Hist. T. III. p. 795.*

Bourfa marina C. B.

Gall. Pelotte de Mer.

Germ. Meerballen.

Animal Zoophytum in mari mediterraneo habitans, quod olim credebatur esse compositum quid ex pilis, algis, paleis ope spumæ maris inter se conglutinat.

Vires dicebantur esse calefacientes. Combustæ ad pulverem strumalem passim sumuntur.

Pimpinella alba, Pimpinella saxifraga, Tragoselinum Off.

Pimpinella saxifraga major, umbella candida C. B.

Tragoselinum foliis pinnatis, pinnis lanceolatis, serratis, extermis trilobatis HALL. *Hist. n. 785.*

Pimpinella saxifraga LINN. *Spec.*

L1

- Sp. plant.* T. I. p. 378. var. γ. *major*.
Gall. Pimpernelle blanche, Boucage, Bouquetine.
Germ. Weiße Bibernell, Steinpeterlin, Pfefferwurz.
 In sylvis, & pratis frequens crescit.
Usu. Radix acerrima, aromatica apud Stahlianos celebris.
Vires stomachicæ, resolventes, diureticæ, alexipharmacæ, vulnerariæ, antifebriles, anticatarrhales prædicantur. Ad asthma & hydropem laudatur, ad menses & lochia pellenda. Lac nutricibus augere dicitur, vel extus saltem mammis adhibita. Huic radici hic & alibi, imo approbante Collegio Medico londinensi substituuntur radices plantarum sequentium, quæ viribus plane iisdem scatent, scilicet
- Pimpinella saxifraga major altera C. B.
 Tragoselinum foliis pinnatis, pinnis ovatis *HALL. Hist.* n. 786.
 &
 Pimpinella saxifraga minor C. B.
 Pimpinella saxifraga *BLACKW.* Tab. 472.
 Tragoselinum folii duplicato-pinnatis, pinnis profundissime lobatis *HALL. Hist.* n. 787.
 Quæ in collibus locisque aridis & ad vias apud nos abundant & juxta *LINNÆUM* nonnisi varietates sunt Pimpinellæ saxifragæ *Spec. pl.* T. I. p. 378.
 Pimpinella rubra, seu Sanguisorba, Pimpinella Italica *Off.*
 Pimpinella sanguisorba minor hirsuta C. B.
- Pimpinella *BLACKW.* Tab. 413.
 Pimpinella polystemon *HALL. Hist.* n. 706.
 Poterium sanguisorba *LINN. Spec. plant.* T. II. p. 1411.
Gall. Pimpernelle.
Germ. Pimpernellen, Bibernell, Blutkraut.
 In locis aridis & ficcis frequens apud nos crescit.
Usu: Herba & Radix.
Vires vulnerariæ, leniter adstringentes; ad hæmorrhagias, mictum cruentum exhibetur; sed præcipue infusa verna vinosa ingreditur. Olim credebatur ad rabiem caninam valere. Hujus loco alibi passim in officinas recipi solet
- Pimpinella sanguisorba major C. B.
 Pimpinella tetrastemon, spica brevi *HALL. Hist.* n. 705.
 Sanguisorba officinalis *LINN. Spec. pl.* T. I. p. 169.
 Hæc priori apud nos rarior, licet copiose crescat in pratis udis infra *Neubaus*.
 Pinus fativa *Off.* & C. B.
 Pinus officulis duris, foliis longis *IOH. BAUH. T. I.* p. 248.
 Pinus *CAMER. Epit.* pag. 39.
 Pinus (Pinea) foliis geminis: primordialibus solitariis ciliatis *LINN. Spec. plant.* T. II. p. 1419.
Gall. Pin.
Germ. Pinienbaum, Piniolbaum.
 Arbor frigoris impatiens habitat in Italia, Hispania.
Usu. Nuclei inter duras & lignosas fructuum seu conorum squamas delitescentes, qui dicuntur
 Pini nucleï, Pineoli, Pini nuces *Off.*

Gall. Pignons, Pignons doux.

Germ. Pinien Nüßlein, Sirbel-
nüßlein, Pignolen.

Vires. Ob insignem, quod continent, olei blandi copiam egregie nutriunt, demulcent, urinam movent, venerem stimulant; hinc in phthisi, nephritide, ad ulcera renum & vesicæ, urinæ ardorem exhibentur in emulsionibus.

Pinus sylvestris Off.

Pinus sylvestris C. B. BLACKW.
Tab. 190.

Pinus foliis binis, convexo concavis, julis masculis solitariis, alaribus HALL.
Hist. n. 1661.

Pinus sylvestris LINN. *Spec. pl.*
T. II. p. 1418.

Gall. Pin sauvage, Pin des bois.

Germ. Kienbaum, Kiefer, Fiechtenbaum, Fohre.

Arbor resina odorifera & aromatica turgens hinc inde in sylvis apud nos crescit.

Usu. Turiones seu tenellæ Summitates odore & sapore resinoso, & amaricante præditæ, & Resina sponte lacrymarum instar ex arbore exstillans & in grana olibani similia ex flavo rufescentia coeuns.

Vires. Infusum Summitatum sudores & urinam movet, sanguinem corrigit; in scorbuto, febre hectica, doloribus rheumaticis, scabie laudatur. Resinæ infusum sive decoctum aquosum tanquam balsamicum in hectica febre, phthisi pulmonali, scorbuto, arthritide &c. plurimum commendatur & ad hunc scopum picis liquidæ apud nos vix prostantis vices supplet.

Piper album & nigrum
Off.

Piper rotundum album
C. B. &

Piper rotundum nigrum
EJUSD.

Piper nigrum BLACKW. T. 348.

Piper (nigrum) foliis ovatis, subseptemnerviis glabris, petiolis simplicissimis LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 40.

Gall. Poivre blanc & noir.

Germ. Weiß und schwarzer Pfeffer.

Planta lupuli instar humi procumbens crescit in *India orientali*.

Usu. Fructus seu Grana omnibus notissima, quæ recentia rubra, æquali superficie sunt; dum vero exsiccantur cortex illarum nigrescit & corrugatur; sapore sunt acri, fervido, os & fauces adurente. Si *Piper nigrum* in aqua marina maceratur, cortex exterior tumescendo dehiscit, quo detracto evadit *Piper album* quod nobis affertur. Dicitur quidem dari & *Piper album* nativum ex simillima planta proveniens, uti apud nos vitis simillima fert uvam nigram & candidam.

Vires calefacientes, incidentes, resolventes, stimulant.

Piper hispanicum, Piper indicum, Capsicum Off.

Piper indicum vulgatissimum C. B.

Piper indicum BLACKW. Tab. 129.

Capsicum (annuum) caule herbaceo, pedunculis solitariis LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 270.

Gall. Poivre d'Inde, ou de Guinée, Poivre d'Espagne.

Germ. Indianischer, und Spanischer Pfeffer.

Habitat in *America meridionali*, apud nos in hortis.

Usu. Fructus saporis ferventissimi & urentis.

Vires videntur eadem ac piperis; a rusticis nostratibus ad ciborum condimentum & a veterinariis plurimum expetitur.

Piper longum Off.

Piper longum orientale
C. B.

Piper longum BLACKW. Tab. 356.

Piper (longum) foliis cordatis, petiolatis, sessilibusque LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 41.

Gall. Poivre long.

Germ. Langer Pfeffer.

Habitat in *India orientali*.

Usu. Fructus, qui immaturus est, cylindricus, unciam vel fescunciam longus, & quasi spiratim oblique striatus, cum tuberculis veluti reticulatim positus.

Vires quæ Piperis nigri, in majori gradu; hinc usibus medicis præcipue adhibetur, cum illud rei culinariæ potissimum interviat.

Pistacia & Nuces Pistaciæ Off.

Gall. Pistaches.

Germ. Pistacien, Syrische Pimpernüsslein.

Sunt Fructus seu Nuculæ avelanæ magnitudine & forma, angulosæ, duplici putamine donatæ: exteriori membranaceo, arido, altero lignoso, lento, lævi; intus est nucleus pallide virescens, pinguis, saporis oleosi, subamari, dulcis, rubra pellicula tectus.

Arbor, quæ hos fructus profert, dicitur

Pistacia peregrina, fructu racemoso, sive Terebinthus indica Theophrasti

C. B.

Pistachia BLACKW. Tab. 461.

Pistacia (vera) foliis imparipinnatis, foliolis subovatis recurvis LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1454.

Sponte crescit in *Persia*, *Arabia*, *Syria* coliturque in *Italia*, *Sicilia*. **Vires** nutrientes, analepticiæ, lac semenque augentes.

Pix, **Pix nigra vulgaris** Off.
Gall. Tare, Goudron, Brayliquide.

Germ. Pech, Theer.

Pini sylvestris truncus, & præcipue radices in bacillos concisæ, in furnos ovum referentes fasciculatim demissæ, & accensæ; fundunt liquorem resinoso-oleosum, nigrum, qui **Pix liquida** audit. Si crassior hujus picis pars ad ficcitatem usque coquitur, fit inde substantia resinosa, nigricans, splendens, odoris gravis, balsamici, saporis amaricantis, estque **Pix arida**, **Palimpissa**. Quod si ex resina Pini per destillationem spiritus & oleum extrahitur, remanet in vasis fundo, similis **Pix arida**, **Gallis Arcancon**, **Bray sec** dicta.

Vires. Picis liquidæ (quæ vix in nostris officinis reperitur) infusum aquosum ante non multos annos maxime celebratum ceu præstantissimum balsami genus, ad phthisin, viscerum obstructions & ulcera, arthritidem, calculum, variolas expellendas &c. hodie paulo minus frequens ejus est usus, & resinam Pini granulofam Pici liquidæ apud nos ad hunc scopum substitui supra jam dictum est. **Pix arida** varia emplastra ingreditur.

Pix

Pix navalis Off.

Gall. Poix noire, Poix navale, Goudron.

Germ. Schiffspech.

Est vel pix illa prior valida coccione in ficcā fuscā substantiam redacta; vel juxta Cl. GEOFFROY ex pice liquida, & arida, & sevo bovino igne simul liquatis præparatur.

Inservit obducendo navium ligno, ipsisque funibus navalibus.

Plantago angustifolia Off.

Plantago angustifolia major, & minor C. B.

Plantago angustifolia quinquenervia BLACKW. T. 14.

Plantago foliis lanceolatis quinquenerviis, scapo nudo, spica ovata. HALL. Hist. n. 656.

Plantago lanceolata LINN. Sp. plant. T. I. p. 164.

Gall. Plantain à feuille étroite.

Germ. Spitzwegerich.

Ubique ad vias & in pratis crescit.

Usu. Folia, & Semen.

Vires adstringentes, ficcantes, vulnerariæ; ad fluxum sanguinis, diarrheam, lenteriam, phthisin laudatur.

Plantago latifolia Off.

Plantago latifolia major & sinuata C. B.

Plantago septinervia BLACKW. T. 35.

Plantago foliis petiolatis, ovatis, glabris, spica cylindrica HALL. Hist. n. 660.

Plantago major LINN. Spec. plant. T. I. p. 163.

In agrorum marginibus, ad vias & in pratis reperitur.

Ufus & Vires quæ prioris.

Plumbum, Saturnus, Plum-

Pars I.

bum nigrum Off. &

WALLER. Miner. p. 372.

Plumbum LINN. Syst. Nat. T. III. p. 132.

Gall. Plomb.

Germ. Bley.

Metallum est vilissimum, molle, ponderosum, lividum, manus nigredine inficiens, in igne cito liquefcens, priusquam cande fiat, ex variis mineris passim obviis excoctum.

Vires adstringentes, repellentes, humorum acrimoniam demulcentes, sed nervis plane inimicæ & noxiæ, cum inde tormina, alvi obstructio, membrorum tremor, respirandi difficultas, & suffocatio sequi observentur. Hinc Plumbum ejusque varia præparata usui potius externo quam interno destinari debent.

Poeonia Off.

Poeonia communis vel femina C. B. &

Poeonia folio nigricante splendido, quæ mas EJUSD.

Poeonia foemina BLACKW. Tab. 65. flore pleno, &

Poeonia mas BLACKW. Tab. 245.

Poeonia radice glandulosa, foliis duplicato pinnatis, pinnis ellipticis & trilobis HALL. Hist. n. 1187.

Poeonia officinalis LINN. Spec. plant. T. I. pag. 746.

Gall. Pivoine.

Germ. Pöonien, Gichtrosen, Gichtwurz; nostr. Paninienrosen.

In monte Ida & Alpibus sponte crescit, apud nos in hortis colitur.

Usu. Radix subacris, subdulcis cum amaritie, nauseosa, foetida dum recens est, ut tota planta. Flores & Semina.

M m

Vi-

Vires olim ipsi attribuebantur magnæ in apoplexia, epilepsia, imo appensi flores vel semina subfultus infantum in somno molestos aut convulsiva tormina sedare dicebantur; sed a plerisque hodie negantur, & nonnullis ob affinitatem cum Veratro albo & odoris virulentiam, planta tota suspecta redditur; sed nonne is ipse vehemens odor etiam in ficcata radice diu adhuc vigens vires haud exiguas promittit? Flores unice ad syrumpum adhibentur.

Polium Creticum Off.

Polium angustifolium creticum C. B.

Teucrium (creticum) foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, racemo subspicato, floribus ternis LINN.
Spec. plant. T. II. p. 788.

Gall. Polium.

Germ. Cretische Berg-Poley.

Habitat in *Creta*, *Aegypto*.

Usu. Summitates odoris grati, aromatici, saporis amari.

Vires calefacientes, roborantes, uterinæ. Hodie vix usuales nisi ad confectionem Theriacæ Andromachi & Mithridatii.

Huic, si deficit, substituitur planta, quæ viribus suppar censetur & dicitur

Polium montanum Off.

Polium maritimum erectum monspeliacum C. B.

Polium montanum BLACKW.
Tab. 456.

Teucrium capitatum LINN.
Spec. plant. T. II. pag. 792.

Gall. Polium des montagnes.

Germ. Berg-Poley mit gelben Blumen.

Crescit in *Hispania*, & in hortis colitur.

Polygala Off.

Polygala foliolis circa radicem rotundioribus, flore coeruleo, sapore admodum amaro, qui in cæteris non ita insignis animadvertitur THAL. C. B. Pin. p. 215.

Polygala Buxi minoris folio VAILL. *Bot. Paris.* p. 161. Tab. 32. f. 2.

Polygala procumbens, foliis imis subrotundis, supremis linearibus HALL.
Hist. n. 343.

Polygala amara LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 987.

Gall. Polygala Seneka.

Germ. Kleine Kreuzblume.

Crescit in pratis, inprimis elevationibus.

Usu. Tota planta cum floribus, herba & radice, amaritie insigni prædita.

Vires purgantes absque incommodo. Infusum in pleuritide exhibitum, uti *Polygala virginiana* febrem minuisse, symptomata mitigasse, sputa promovisse dicitur, tum & alvum, urinam, & vomitum ciet, etiam in hydrope & anasarca utilis.

Polygonatum, vide **Sigillum Salomonis**.

Polygonum, Centumnodia Off.

Polygonum latifolium C. B.

Polygonum BLACK. Tab. 315.

Polygonum procumbens, foliis linearibus, acutis, floribus solitariis HALL.
Hist. n. 1560.

Polygonum aviculare LINN.
Spec. plant. T. I. pag. 519.

Gall. Renouée, Centinode.

Germ.

Germ. Wegtritt, Weggras, Blutkraut.

Ad vias & in agris frequens provenit.

Usu. Herba.

Vires adstringentes, siccantés, vulnerariæ, vix in usu est.

Polypodium Off.

Polypodium vulgare c. B.

Polypodium quercinum
BLACKW. Tab. 215.

Polypodium foliis pinnatis lanceolatis radice squamata HALL. *Hist.* n. 1696.

Polypodium vulgare LINN.
Sp. Plant. T. II. p. 1544.

Crescit ad muros antiquos, saxa & arbores.

Usu. Radix nauseose dulcis, intus viridescens.

Vires purgantes, bilemque potissimum educentes, ipsi vulgo tribuuntur. Hanc virtutem ILL. HALLERUS aliique negant, eamque potius adstringere afferunt, neque nostri est hancce litem heic componere. Commendatur etiam ceu saponaceum in ptisanis ad hepatis mala, tussim fallam, arthritidem, podagram &c.

Polytrichum, vide Adiantum aureum.

Pompholyx vid. Nihilum album.

Populus nigra. Off. c. B.

Populus nigra BLACKW. Tab. 248. *Edit. germ.* non placet & cum Populo tremula, cujus ramus fig. 2. exhibetur male confunditur.

Populus alba femina BLACKW. *Ed. germ.* Tab. 548. melior figura cum malo nomine.

Populus foliis glabris, cordato rhomboideis, ferratis HALL. *Hist.* n. 1632.

Populus nigra LINN. *Spec. plant.* p. 1469.

Locis aquosis provenit.

Usu.: Gemmæ verno tempore balsamo flavicante validi odoris obductæ, quæ fundamentum præbent unguento populeo, quod demulcens atque emolliens est.

Porcus Off.

Sus, seu Porcus domesticus RAJ. *Quadrup.* p. 92.

Sus (scrofa) dorso antice festoso, cauda pilosa LINN.
Syst. Nat. T. I. p. 102.

Gall. Porc, Cochon.

Germ. Schwein, Sau.

Animal ubique ab oeconomis ob carnes sapidas & multum nutrientes alitur.

Usu. Axungia.

Vires. Emollit relaxat, lenit, & basin constituit plurium unguentorum.

Porrum Off.

Porrum commune capitatum c. B.

Porrum BLACKW. Tab. 421.

Allium radice ambeunte, tunicata, foliis gramineis, spica sphaerica, staminibus alterne trifidis HALL. *Hist.* 1217.

Allium Porrum LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 427.

Gall. Poireau, Porreau.

Germ. Lauch.

Culinaris planta ubique colitur, & fatuo juscule ad saporem additur.

Usu. Radix seu potius Bulbus & Folia.

Vires resolventes, diuretici; ad pectoris vitia, & ad calculum vesicæ dissolvendum efficax creditur.

M m 2

Portu-

Portulaca Off.

Portulaca latifolia seu fativa
C. B.

Portulaca BLACKW. Tab. 278.

Portulaca foliis dilatatis, levibus, sessilibus, confertis
HALL. Hist. n. 968.

Portulaca oleracea LINN.
Spec. pl. T. I. p. 638.

Gall. Pourpier.

Germ. Portulac, Purzellkraut.
In hortis colitur.

Usu. Herba succulenta, & Semina.

Vires refrigerantes. Folia in acetaria passim recipiuntur, Semina quatuor minoribus frigidis adnumerantur.

Potentilla vide Anserina.

Prassium vide Marrubium album.

Primula veris, Paralyfis Off.

Verbasculum pratense odoratum C. B.

Paralyfis BLACKW. T. 226.

Primula foliis rugosis, dentatis, hirsutis, scapis multifloris, floribus omnibus nutantibus HALL. Hist. n. 610.

Primula veris LINN. Sp. pl. T. I. p. 204. variet. a.

Gall. Prime vere.

Germ. Schlüsselblumen, Him-melschlüsselchen.

In pratis apricis apud nos abundat.

Usu. Flores grato odore præditi, & Radix.

Vires tribuuntur cephalicæ, nervinæ, nec tamen ad paralyfin valde efficaces videntur. Infusum florum leviter anodynum,

cephalalgiam, vertiginem in male menstruatis compescit. Radix acris est, sternutationem ciet.

Propolis Off.

Gall. Propolis.

Germ. Bienenharz, Bienenkütt, Stopfwachs, Vorstoß.

Est crassa illa materies ceracea, qua apes favos suos agglutinare, rimas atque latera alveorum obducere solent, & quam ex resina flava gemmarum Populi præcipue colligunt.

Vires eadem quæ ceræ, balsamicæ, digerentes, emollientes, nervinæ.

Pruna damascena, Pruna domestica, gallica, brignolensia &c. Off.

Pruna magna & parva, dulcia, atro-cærulea &c. C. B.

Gall. Pruneaux doux, Pruneaux noires de Damas.

Germ. Pflaumen, Zwetschen. Sunt fructus notissimi, pro diversitate regionum, atque culturæ, varii, multiplices, qui sponte apud nos crescunt acidi, per artem vero dulcissimi evadunt. Arbor, quæ hos fructus producit, est.

Prunus C. B.

Prunus damascena BLACKW. Tab. 305.

Prunus foliis ferratis, hirsutis, ovato-lanceolatis, floribus longe petiolatis HALL. Hist. n. 1079.

Prunus domestica LINN. Spec. pl. T. I. p. 680.

Ubique in hortis & pomariis colitur.

Vires humectantes, lubricantes, cocta alvum laxantes &c.

Pru-

Prunella, Consolida minor
Off.

Prunella major foliis non dis-
sectis C. B.

Prunella sive Brunella BLACKW.
Tab. 24.

Brunella foliis ovatis, oblon-
gis, calycibus superne
truncatis HALL. *Hist.* n. 277.

Brunella vulgaris LINN. *Spec.*
plant. T. II. p. 837.

Gall. Brunelle, Bonette.

Germ. Prunellen, Gottheil.

Crescit ubique in pratis humidis
&c.

Usu. Folia saporis herbacei, sub-
amari, glutinosi, parum styptici.

Vires adstringentes, vulnerariæ,
detergentes; ad vulnera conso-
lidanda, hæmoptoen, aphthas,
dentes confirmandos & angina
laudatur.

Pseudo Acorus, vide Aco-
rus vulgaris.

Psyllium, Pulicaria Off.

Psyllium majus erectum C. B.

Psyllium BLACKW. T. 412.

Plantago caulibus erectis,
herbaceis, foliis linearibus,
patulis, capitulis ovatis,
hirsutis HALL. *Hist.* n. 661.

Plantago Psyllium LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 167.

Et

Psyllium majus supinum C. B.

Psyllium perenne BLACKW.
Tab. 543.

Plantago caule lignoso, pro-
strato, foliis linearibus, e-
rectis, capitulis subhirsutis
HALL. *Hist.* n. 662.

Plantago Cynops LINN. *Spec.*
plant. T. I. p. 167.

Gall. Herbe aux puces.

Germ. Flohsaamenkraut.

Pars I.

In calidiori *Europa* etiam *Geneve*
utraque species provenit.

Usu. Semina, pulicis similia, fusca.
Vires credebantur veteribus alvum
laxantes; sed mucilago, quæ
ex semine copiosa obtinetur,
potius adstringit, lenit, demulcet,
ad fissuras papillarum, inflamma-
tiones oculorum, & in cly-
steribus ad dysenteriam, ardorem
urinæ, adhiberi solet. Ad ni-
grum colorem a tinctoribus ad-
hibentur.

Ptarmica, Off.

Dracunculus pratensis, folio
ferrato C. B.

Ptarmica BLACKW. Tab. 276.

Achillea foliis lineari-
bus, lanceolatis, acutissi-
me ferratis HALL. *Hist.* n. 117.

Achillea Ptarmica LINN. *Spec.*
pl. T. II. p. 1266.

Gall. Herbe a eternuer.

Germ. Weisser Bertram, weißer
spitziger Rheinfarn.

In pratis subhumidis apud nos pro-
venit.

Usu. Herba & Radix, odo-
ris & saporis, acris, aromatici.
Vires sialogogæ, & sternutatoriæ;
ad mucosas faucium obstructio-
nes commendatur.

Pulegium Off.

Pulegium latifolium C. B.

Pulegium BLACKW. Tab. 302. &

Pulegium erectum EJUSD.
Tab. 303. variet.

Mentha caule prostrato,
foliis subrotundis, obiter
dentatis, staminibus ex-
sertis HALL. *Hist.* n. 221.

Mentha Pulegium LINN. *Sp.*
plant. T. II. p. 807.

Gall. Pouliot, ou Menthe
d'Eau.

Germ. Poley. nostr. Herzen-
gleich.

Nn

In-

In gramineis humidis, apud nos *Michelfeldæ* crescit, & abunde in rusticorum hortis colitur.

Usu. Herba amara, acris, odore penetrabili aromatico.

Vires aperientes, attenuantes, emmenagogæ calidæ, admenstrua suppressa, & pectoris morbos efficaces.

Pulmonaria arborea, Muscus pulmonarius Off.

Muscus pulmonarius C. B. BLACKW. T. 335.

Lichen lacunatus, inferne gibbosus, reticulo farinoso, scutellis lateralibus HALL. *Hist.* n. 1986.

Lichen pulmonarius LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1612.

Gall. Pulmonaire de Chêne.

Germ. Lungenkraut, gemein Lungenkraut.

Reperitur in sylvis ad arbores antiquas.

Vires sicchantes, adstringentes; ad vulnera consolidanda, menses nimias & alvi fluxus sistendos commendatur, tum & ad debilitatem pectoris in tussi. Nostratibus vix in usu.

Pulmonaria maculosa Off. Symphytum maculosum, seu Pulmonaria latifolia C. B.

Pulmonaria maculosa BLACKW. Tab. 376.

Pulmonaria foliis radicalibus cordatis, scabris HALL. *Hist.* n. 597.

Pulmonaria officinalis LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 194.

Gall. Pulmonaire.

Germ. Flecken-Lungenkraut, gesprengtes Lungenkraut.

In sylvis & sepibus umbrosis planta apud nos haud rara crescit.

Usu. Folia, saporis visceri, herbacei.

Vires. Faucium asperitates lenire potest, leniter vulneraria. In hæmoptoe, tussi, phthisi commendatur quidem, sed parum efficax videtur.

Sub hoc nomine sæpe reperitur in Officinis, etiam nostratibus, planta plane diversa, sed frequentius nascens, quæ est

Pulmonaria gallica Herbariorum.

Hieracium murorum laciniatum, minus pilosum C. B.

Pulmonaria gallica mas, & femina TABERNÆM. *Hist.* p. 504.

Pulmonaria Gallorum, Auricula muris major BLACKW. T. 538.

Hieracium caule subnudo paucifloro, foliis ovato-lanceolatis, circa petiolum dentatis HALL. *Hist.* n. 46.

Hieracium murorum LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1128.

Ad muros & maceries frequens apud nos crescit.

Pumex Off.

Porus igneus, lapidis Lithanthracis WALL. *Mineral.* p. 417.

Pumex(vulcani)Schisti niger LINN. *Syst. Nat.* Tom. III. p. 181.

Gall. Pierre ponce.

Germ. Bimsstein.

Est lapis erosus, porosus, spongiosus, aquæ innatans, qui juxta montes ignivomos copiose reperitur, & variis in locis etiam ex terra effoditur. Primo niger est & deinde aeri aliquandiu expositus cinereus evadit. Quomodo vero oriatur, multum adhuc hodie controversatur.

Vires medicæ vix ullæ, quam quæ terrestribus particulis propriæ; ad

Ad pulveres dentifricos adhibetur.

Punicæ Flores, vide Balauftia.

Pyrethrum Off.

Pyrethrum flore Bellidis
C. B.

Pyrethrum BLACKW. Tab. 390.

Anthemis (Pyrethrum) caulibus simplicibus, unifloris, decumbentibus, foliis pinnato-multifidis
LINN. *Spec. plant.* T. II. pag. 1262.

Gall. Pyrethre, Racine falivaire.

Germ. Bertram, Speichelwurz, Zahnwurz.

Hujus radix exsiccata, digitum longa & crassa, foris ex subrufo nigricans, intus alba, sapore acerrimo & urente, odoris expers, ex Arabia, Syria, Apenninis montibus & Tunnetensi regno olim afferebatur.

Hodie vero copiose colitur in Thuringia, Vogtlandia, Bohemia indeque omnes fere officinæ germanicæ eam trahunt.

Vires fialagogæ; hinc in odontalgia, morbis soporosis & linguæ paralyfi in usum trahi solet.

Pyrola Off.

Pyrola rotundifolia major.
C. B.

Pyrola foliis subrotundis, tubis recurvis HALL. *Hist.* n. 1010.

Pyrola rotundifolia LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 567.

Gall. Pyrole.

Germ. Wintergrün, Holz oder Wald Mangold.

In sylvis montosis crescit.

Usu. Folia.

Vires adstringentes, vulnerariæ; ad pectoris ulcera, & tubercula chronica laudantur.

Q.

Quassia Off.

Quassia amara LINN. *Amœnit. Acad.* Vol. VI. p. 416. seqq. c. icone pag. 429. *Spec. pl.* T. I. p. 553. & T. II. p. 1679.

Gall. Bois de Surinam.

Germ. Surinamischer Bitterholz-Baum, Quassia.

In Surinamo crescit.

Usu. Lignum sive potius Radix variæ crassitie, albicans, cinereo cortice tecta, levis, odoris nullius, saporis amarissimi, ut amaritie Gentianam, Colycinthidem &c. longe præcellat.

Vires tonicæ, roborantes, stomachicæ, antisepticæ, & ad intermittentes febres ab ILL. LINNEO Cortici peruviano præfertur. Sed hoc ultimum ma-

nifesto nimium esse in nostris regionibus capta experimenta evincunt. Propinatur plerumque in infuso aquoso vel vinoso, in pulverem tritum vel raspatum ad drachmam unam & duas in libra una aquæ vel vini.

Cum vino decoctum copiosissimum largitur extractum ad unciam unam cum dimidia ex quatuor unciis, aquosi vero extracti ex eodem ligni pondere vix quatuor scrupulos obtinui. Ambo extracta omnia, quæ hætenus nota fuere, amara longissime superant & vel quarta saltem grani pars totum os tanto & tam durabili amarore inficit, ut vix iterum elui possit.

Quercus Off.

Quercus cum longis pediculis

lis c. B. & cum brevibus
pediculis EJUSD.

Quercus BLACKW. Tab. 487.

Quercus foliis glabris, semi-
pinnatis, pinnis obtusis,
superioribus majoribus
HALL. *Hist.* n. 1626.

Quercus Robur LINN. *Sp. pl.*
T. II. p. 1414.

In sylvis frequens.

Usu. Gemmæ, Cortex, Fo-
lia, Glandes, & Cupulæ
glandium.

Vires valide adstringentes, five in-
terne exhibeantur, five extus
admoveantur.

Quinquefolium, vide Pen-
taphyllum.

Quinquina, vide Chinchina.

R.

Rana Off.

Rana aquatica innoxia GESN.
Hist. Animal. ovipar. p. 46.

Rana (temporaria) dorso
planiusculo subangulato
LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 357.

Gall. Grenouille.

Germ. Frosch.

Animal amphibium, paludes &
limosas stagnantes aquas inha-
bitans, notissimum.

Usu. *Rana* ipsa ejusque Sper-
ma.

Vires. Coxendices vario modo
præparatæ in cibum passim re-
cipiuntur, minime insalubrem,
tabidis inprimis commendatum.
Rana combusta & in pulverem
trita hæmorrhagias sistere, go-
norrhoeam & pollutiones noc-
turnas cohibere dicitur, five
externe applicata fuerit five in-
terne ad drachmam unam as-
sumta. Sperma refrigerans audit,
incrassans, repellens, adstrin-
gens, cosmeticum.

Rapa Off.

Rapum CAMER. *Epit.* p. 218.

Rapa fativa rotunda c. B.

Brassica (*Rapa*) radice cau-
lescente, orbiculari, de-
pressa, carnosa LINN. *Sp.*
plant. T. II. p. 931.

Gall. Rave.

Germ. Rübe, weisse Rübe.

Ubique in agris colitur.

Usu. Radix rotunda, carnosa,
succulenta, alba, saporis sub-
dulcis cum aliqua acrimonia,
odoris nasturcini.

Vires. A longo jam tempore ho-
minibus & brutis pro cibo in-
servit satis bono & grato, ut
tamen non raro inflationes &
cruditates in primis viis gene-
ret. In medicina succus ex
recente radice expressus non-
nunquam utiliter præscribitur
in asthmate, hydropè &c. Idem
ad aphthas & pustulas in pedi-
bus manibusque a frigore ortas
commendatur.

Raphanus Off.

Raphanus minor oblongus
c. B. &

Raphanus major orbicularis
five rotundus EJUSD. &

Raphanus niger EJUSD. &c.

Raphanus hortensis BLACKW.
Tab. 81.

Raphanus (fativus) filiquis
teretibus, torulosis, bilo-
cularibus LINN. *Sp. pl.* T. II.
p. 935.

Gall. Raifort.

Germ. Rettig, Rettich.

In

In hortis abunde colitur.

Usu. Radix variæ formæ, subrotunda, oblonga, magnitudinis & crassitiei etiam diversissimæ, intus alba, extus alba, purpurascens, fusca, nigra, succulenta, carnosæ. Saporis valde acris, non tamen ingrati, odoris suæ classis.

Vires. Crude comeditur cum sale & pro carnis bubulæ condimento imprimis inservit. Acetaria etiam ingreditur, succusque ejus vulgo pro carminativo, aperiente, abstergente, diuretico & antiscorbutico habetur.

Raphanus rusticanus, Armoracia Off.

Raphanus rusticanus C. B.

Raphanus sylvestris BLACKW. Tab. 415.

Nasturtium foliis radicalibus lanceolatis, crenatis, caulinis incisissimis HALL. *Hist.* n. 504.

Cochlearia Armoracia LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 904.

Gall. Grand Raifort sauvage, Cram.

Germ. Meerrettig.

In hortis colitur, cum in Helvetia spontaneus rarissimus sit.

Usu. Radix longa, ramosa, extus flavescens, intus alba, saporis & odoris acerrimi, grati.

Vires. Perinde ut præcedens in cibum recipitur, cocta tamen, cum cruda ob summam acrimoniam vix edulis sit. Antiscorbutica est, mucosos humores dissolvit, urinam movet, hinc in hydropè & calculosis affectibus laudatur. Stomachica etiam audit & appetitum excitat.

Rapunculus Off.

Rapunculus esculentus C. B.

Rapum sylvestre FUCHS. pag. 214.

Pars I.

Campanula foliis ellipticis, ferratis, subhirsutis, caule aspero, floribus paniculatis HALL. *Hist.* n. 699.

Campanula Rapunculus LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 232.

Gall. Reponçe.

Germ. Rapunzel.

Ad vias, sepes, agrorum margines &c. vulgaris.

Usu. Radix alba, edulis, dulcis, grata.

Vires. In acetaria recipitur & dicitur lac augere. Succus adversus asthma & hydropem laudatur.

Regina prati vide Barba capræ.

Resina vulgaris, communis, alba Off.

Gall. Poix refine.

Germ. Gelb oder weiß Harz.

Ex Abietibus imprimis rubra colligitur & liquatione & colatione a fordibus liberatur, albida tum vel flavescens, odorata.

Vires. Emolliens audit, digerens, discutiens. Plurimorum emplastrorum basin constituit.

Restia Bovis vide Ononis.

Rhabarbarum Monachorum Off. nostrar.

Lapathum hortense rotundifolium five montanum C. B.

Lapathum folio rotundo alpinum IOH. BAUH. *Hist. pl.* Tom. II. p. 987.

Rhaponticum BLACKW. T. 262.

Hippolapathum DALE *Pharmacol.* pag. 78.

Lapathum foliis obtusis, circa petiolum emarginatis, paniculis dense spicatis,

O o

catis, vaginis maximis
HALL. *Hist.* n. 1587.

Rumex (alpinus) floribus
hermaphroditis, sterili-
bus femineisque, valvu-
lis integerrimis, nudis,
foliis cordatis, obtusis,
rugosis LINN. *Spec. pl.* Tom.
I. p. 480.

Gall. Rhubarbe des Moines.

Germ. München Rhabarber.

In alpinis circa casas & stabula
provenit.

Ufu. Radix crassa, odorata, ex-
tus fusca, intus flavicans sive
rubicunda, saporis amaricantis,
resinosi.

Vires laxantes, roborantes, vix
tamen nisi a veterinariis in u-
sum trahitur.

Alibi passim sub hoc nomine ve-
nalis prostat radix alius Lapa-
thi speciei, quæ vocatur

Lapathum hortense folio
oblongo C. B.

Lapathum fativum & Pati-
entia BLACKW. Tab. 489.

Rhabarbarum Monachorum
DALE *Pharmacol.* p. 78.

Rumex (Patientia) floribus
hermaphroditis: valvu-
lis integerrimis, unica
granifera, foliis cordatis
LINN. *Sp. pl.* T. I. pag. 476.

In hortis passim colitur & viribus
cum præcedente convenire di-
citur.

Rhabarbarum verum Off.

Rhabarbarum officinarum
C. B.

Rheum (palmatum) foliis
palmatis, acuminatis
LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 531.
Syst. Nat. Edit. XII. Tom. II.
p. 281.

Gall. Rhubarbe.

Germ. Rhabarber, Edle Rha-
barber.

In China neque alibi provenit, in-
deque per varias vias ad nos
adfertur.

Ufu. Radix crassa, extus flava
vel ex flavo rufescens, intus
albicans, purpureis striis ele-
ganter picta, odoris balsamici,
paucis grati, saporis amari,
glutinosi, subadstringentis,
nauseosi. In frusta cylindrica
vel taleas latas concisa adfertur.
Præferebatur olim, quæ terre-
stri viâ ex China per Russiam ad-
vehebatur, Moscovitica in-
de dicta, cujus præferentiæ cau-
sas CL. VOGEL in sua *Historia
Materiae medicæ* recenset. Sed per
quancumque demum viam illa
adferatur, parum interest, dum-
modo sit pulchre e flavo sub-
rufescens, intus ex albo &
purpureo varia, sicca, ponde-
rosa, non cariota neque mucosa,
salivam masticata croceo
colore tingens &c.

Vires. Tutum est medicamentum
purgans omni fere ætati & sexui
conveniens. Præter vim la-
xantem etiam tonicum est, ven-
triculum roborans, bilis defec-
tum supplens, in atonia
ventriculi & primarum viarum,
obstructionibus imi ventris,
ictero, cacochymia, fluore al-
bo, arthritide, podagra, malo
hyponchondriaco, hydrope sæpe
cum fructu adhibetur. Cum
vero calefaciat &, postquam
vim suam laxantem exseruerit,
adstringat, non absque cautela
adhibenda est.

Rhamnus catharticus vide
Spina cervina.

Rhaponticum verum, Mos-
coviticum Off.

Rhaponticum folio Lapathi
majoris glabro, Rha &

Rheum

Rheum Dioscoridis C. B.

Rhaponticum ALPIN.

Rha verum antiquorum
GERARD. p. 393.

Rheum (Rhaponticum) fo-
liis glabris, petiolis sub-
fulcatis LINN. *Sp. plant.* T. I.
p. 531.

Gall. Rhapontic.

Germ. *Echte Rhapontic.*

In *Thracia, Scythia* &c. provenit &
per *Russiam* ad nos affertur.

Ufu. Radix in frusta oblonga
concisa, ex albo flavicans, striis-
que purpureis insignita, odoris
debilis, saporis amari, acris.

Viribus ad Rhabarbarum verum
accedit, debilius tamen eo &
magis adstringens. Rarius in
usum vocatur.

Rhaponticum vulgare Off.
Diversæ sub hoc nomine in Offi-
cinis prostant & a diversis plan-
tis desuntæ radices.

1. Rhabarbarum monacho-
rum superius primo loco dictum
passim etiam hoc nomine venit.

2. Centaurium majus folio
in lacinias plures diviso C. B.

Rhaponticum vulgare, Cen-
taureum majus vel mag-
num BLACKW. Tab. 93.

Centaurium majus DALE *Phar-
macol.* p. 118.

Centaurea (Centaurium) ca-
lycibus inermibus, squa-
mis ovatis, foliis pinnatis,
foliolis decurrentibus fer-
ratis LINN. *Spec. plant.* T. II.
p. 1287.

Gall. Rhapontic vulgaire,
grande Centaurée.

Germ. *Gemeine Rhapontic,
Groß Tausendguldenkraut.*

In alpinis *Italicis, Tataria* cres-
cit & passim in hortis curiosorum
occurrit.

Radix longa, recta, extus ru-

bra, intus ex albo rufescens,
amara.

3. Rhaponticum folio Hele-
nii incano C. B. &

Rhaponticum angustifolium
incanum EJUSD.

Rhaponticum capitatum
inulæ five centaurei ma-
joris facie LOBEL. *Ik.* p. 188. &

Rhaponticum alterum angu-
stiori folio EJUD. *ibid.*

Rhaponticum DALE *Pharmacol.*
p. 118.

Centaurium foliis petiolatis,
lanceolatis, ad pediculum
emarginatis HALL. *Hist.* n. 160.

Centaurea Rhaponticum
LINN. *Spec. plant.* T. II. p.
1294.

In Alpibus *Helveticis* passim reperi-
tur.

Radix oblonga, crassa, aromati-
ca, extus fusca, intus flavicans
seu crocea, saporis amari, su-
bacris, odoris haud ingrati.

Rhodia radix Off.

Rhodia radix C. B. CAMER.
Epit. p. 769.

Anacampteros radice rosam
spirante major TOURNEF. I.
R. H. p. 264.

Sedum sexu distinctum, fo-
liis serratis, floribus den-
sissime umbellatis HALL.
Hist. n. 953.

Rhodiola rosea LINN. *Spec.
plant.* T. II. p. 1465.

Gall. Racine de Rhodus ou
sentant les Roses.

Germ. *Rosenwurzel.*

In Alpibus *Helveticis* & in sum-
mo septentrione crescit.

Ufu. Radix alba, succulenta,
carnosa, quando ficcata est ro-
sam redolens.

Vires adstringentes, antiscorbuti-
cæ. In cataplasmate fronti ap-
plicæ.

plicata capitis dolores mitigare & vetustis ulceribus mederi dicitur. Nostris officinis ignota est.

Rhodium Lignum Off.

Gall. Bois de Roses.

Germ. Rosenholz, Rhodieserholz.

Est Radix lignosa, nodosa, varie contorta, solida, ponderosa, dura, coloris albicantis, flavescentis vel fusci, odoris gratissimi Rosæ, saporis balsamici, amaricantis.

Adfertur ex insulis *Canariensibus*, *Rhodo*, &c. & Arbor seu Frutex, unde desumitur hactenus incognita latet.

Vires roborantes, calefacientes, nervinæ, sudoriferæ, diureticiæ, frequentior tamen ejus usus externus ad suffimigia & odora-menta.

Rhus Obsoniorum vide Sumach.

Ribes nigra Off.

Grossularia non spinosa, fructu nigro C. B.

Ribes nigra TABERN. *Ic. pag.* 1083.

Ribes inerme, olidum, calyce oblongo, petalis ovatis
HALL. Hist. n. 819.

Ribes nigrum LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 291.

Gall. Groseiller noir, Poirvri-er, Cassis.

Germ. Schwarze St. Johannisbeeren, oder Trauben.

In paludosis *Helvetiæ* passim sponte crescit & in hortis colitur.

Tota planta tetrum cimum odorem spargit.

Usu. Baccæ, Folia, Cortex interior.

Vires Baccæ diureticiæ audiunt, sic etiam interior cortex

Gallis Cassis dictus. Folia adversus hydrophobiam & calculum laudantur. Mulierculæ nostrates ramulos hujus fruticis recentes lectis infantum substernunt in convulsionibus & epilepsia.

Ribes rubra, Ribesia Off.

Grossularia multiplici acino s. non spinosa hortensis rubra s. *Ribes* Officinarum C. B.

Ribes BLACKW. Tab. 285.

Ribes inerme, floribus planiusculis, stipulis minimis
HALL. Hist. n. 818.

Ribes rubrum LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 290.

Gall. Groseilles ordinaires.

Germ. St. Johannisbeere oder Trauben.

In sylvosis umbrosis *Helvetiæ* etiam *Basiliensis* agri passim spontaneus frutex ubique in hortus colitur.

Usu. Baccæ acidæ, gratæ.

Vires Refrigerant, temperant, sitim extinguunt, in acutis morbis & putridis febribus utiles.

Rorella, Ros Solis Off.

Ros Solis folio rotundo
C. B.

Ros Solis BLACKW. Tab. 432.

Rorella caula nudo, pauciflora, foliis petiolatis, subrotundis *HALL. Hist. n.* 834.

Drosera rotundifolia LINN.
Spec. plant. T. I. p. 402.

Gall. Rossolis, Herbe de la Goutte.

Germ. Sonnentbau.

In paludosis, turfosis *Helvetiæ* passim occurrit.

Usu. Herba acris, cutem exulcerans.

Vires. Mucosos humores dicitur
 resolvere; in phthisi, catarrhis,
 ad oculorum inflammationem,
 sterilitatem &c. commendatur,
 nostris officinis ignota.

Rosa alba Off.

Rosa alba vulgaris major
 C. B.

Rosa candida plena & semi-
 plena JOH. BAUH. *Hist. plant.*
 T. II. p. 44.

Rosa alba BLACKW. Tab. 73.

Rosa (alba) germinibus o-
 vatis, glabris, peduncu-
 lis hispidis, caule petio-
 lisque aculeatis LINN. *Spec.*
plant. T. I. p. 705.

Gall. Rose blanche.

Germ. Weiße Rose.

In hortis colitur.

Usu. Flores albi pleni, odoris
 debilioris.

Vires Aqua inde destillata ad o-
 culorum vitia inprimis lauda-
 tur.

Rosa pallida Off.

Rosa purpurea C. B.

Rosa rubello flore multipli-
 cato f. pleno, incarnata
 vulgo JOH. BAUH. *Hist.* T.
 II. p. 36.

Rosa (Centifolia) germini-
 bus ovatis, pedunculis-
 que hispidis, caule hispi-
 do aculeato, petiolis iner-
 mibus LINN. *Sp. pl.* T. I.
 p. 704.

Gall. Roses pâles.

Germ. Bleiche Rosen, Ulmer-
 Rosen, Provinz-Rosen.

Abunde in hortis colitur.

Usu. Flores pleni, pallide rubri
 f. purpurascens, gratissime o-
 dorati, usitatissimi.

Vires laxantes, analepticae &c.

Part I.

Rosa rubra, finissima Off.

Rosa rubra C. B.

Rosa rubra pallidior EJUSD.
 &

Rosa saturatius rubens EJUSD.

Rosa rubra flore semipieno
 JOH. BAUH. T. II. p. 34.

Rosa rubra BLACKW. Tab. 78.

Rosa (gallica) germinibus
 ovatis, pedunculisque
 hispidis, caule petiolisque
 hispidis, aculeatis LINN.
Spec. plant. T. I. p. 704.

Gall. Rose rouge.

Germ. Esig-Rose, Zucker-Rose,
 rothe Rose, nostratibus Sam-
 met-Rose.

In hortis occurrit.

Usu. Flores nondum aperti.

Vires tonicae, roborantes, ad-
 stringentes, cardiacae.

Rosmarinus vide Anthos.

Rosmarinus sylvestris Off.

Cistus Ledon foliis Rosma-
 rini ferrugineis C. B.

Rosmarinum sylvestre CA-
 MER. *Epit.* p. 546.

Ledum palustre LINN. *Spec.*
pl. T. I. p. 561.

Gall. Rosmarin de Boheme.

Germ. Post, Wanzenkraut,
 Mottenkraut.

In septentrionalis *Europæ* paludosis
 reperitur.

Usu. Herba insigniter foetens
 & amara.

Vires In exanthematicis febribus
 & ad scabiem a nonnullis lau-
 datur, minus tutum remedium,
 cum cerevisiæ incocta valde in-
 ebriet, quod in Saxonia & alibi
 lucri causa passim fieri ilego. Infec-
 ta etiam a vestibus & linteis fu-
 gare certum est. Nobis nullo
 in usu est.

P p

Ru-

Rubia tinctorum Off.

Rubia sylvestris aspera c. B.
&

Rubia tinctorum fativa
EJUSD.

Rubia tinctorum BLACKW. T.
326.

Rubia foliis ellipticis, aspe-
ris, quinis senisque HALL.
Hist. n. 708.

Rubia (tinctorum) foliis sub-
senis LINN. Spec. pl. T. I. p.
158.

Specie enim fativam a sylvestri
non differre ex collatis utrius-
que speciminibus mihi visum
est.

Gall. Garance.

Germ. Färberröthe.

Sylvestris in *Valesia* passim & vi-
cinis locis spontanea. Sati-
va in *Zeelandia*, *Silesia*, *Al-
satia* etiam *Helvetia* passim co-
litur.

Usu. Radix rubra, succulenta,
saporis subacidi, adstringentis.

Vires. aperientes, detergentes,
diureticae, emmenagogae, anti-
ictericae, vulnerariae. Inter
quinque radices aperientes mi-
nores numeratur. Notissima
alias in tinctoria arte radix.

Rubinus Off.

Gemma pellucidissima, du-
ritie secunda, colore ru-
bro in igne permanente
WALLER. Mineral. p. 153.

Alumen (Gemma pretiosa)
lapidosum, pellucidissi-
mum, solidissimum LINN.
Syst. Nat. T. III. p. 102. n. 6.
variet. β.

Gall. Rubi.

Germ. Rubin.

Notissima Gemma ex *Orientalibus*
regionibus inprimis adfertur,
pulcherrima ex insula *Zeylon*.

Vires. Gestatus & intus assumtus
alexipharmacus audit & a peste
præservare creditur. Hodie ta-
men cum ceteris lapidibus pe-
tiosis merito fere negligitur.

Rubrica fabrilis Off.

Ochra rubra cretacea WAL-
LER. Mineral. p. 343.

Talcum (Rubrica) subfissi-
le rubrum inquinans
LINN. Syst. Nat. T. III. pag.
51.

Gall. Craye rouge.

Germ. Röthel, Röthelstein,
Röthelkreide.

Ex Episcopatu *Salisburgensi* & ali-
unde copiose advehitur.

Vires Valde ficcatur & adstringit,
unde a nonnullis perperam in
dysenteria & nimis hæmorrha-
giis commendatur. Frequen-
ter a nostratibus cum melle ro-
sarum permixta ad aphthas ad-
hibetur.

Rubus Idæus Off.

Rubus Idæus spinosus c. B.

Rubus Idæus BLACKW. T. 289.

Rubus caule spinoso, sub-
recto, foliis quinatis &
ternatis, subtus tomen-
tosis, fructibus hirsutis
HALL. Hist. n. 1108.

Rubus Idæus LINN. Spec. plant.
T. I. p. 706.

Gall. Framboises.

Germ. Himbeer.

In sylvis frequens.

Usu. Baccæ rubrae, odoratae,
gratissimæ.

Vires In cibum recipiuntur & re-
frigerante, acida virtute in mor-
bis acutis & putridis præstan-
tissimæ sunt.

Rubus vulgaris, niger Off.

Rubus vulgaris f. Rubus
fructu nigro c. B.

Ru-

Rubus BLACKW. Tab. 45.

Rubus caule spinoso, serpente, foliis quinatis & ternatis, fructu levi
HALL. *Hist.* n. 1109.

Rubus fruticosus LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 707.

Gall. Ronçe.

Germ. Brombeerstrauch.

In sylvis & dumetis abunde.

Ufu. Fructus s. Baccæ nigræ, subdulces, edules Folia & Radix.

Vires Baccæ refrigerant, temperant. Folia ficcant, adstringunt. Radix inter aperientes recensetur, in hydropè morbisque chronicis ab obstructionibus ortis laudata. Apud nos vix ullius usus.

Ruscus vide **Bruscus**.

Ruta capraria vide **Galega**.

Ruta, **Ruta hortensis** Off.

Ruta hortensis latifolia C. B. &

Ruta sylvestris major EJUSD.

Ruta BLACKW. Tab. 7.

Ruta foliis duplicato-pinnatis, lobulis ovatis HALL. *Hist.* n. 1003.

Ruta graveolens LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 548.

Gall. Ruë.

Germ. Raute.

In hortis ubique colitur juxta **Salviam**, a qua serpentes eam a-

mantes odore suo arcere creditur.

Ufu. Folia & Semina, odoris gravis, ingrati, saporis acris, amari.

Vires multifariæ huic plantæ adscribuntur, alexipharmacæ, sudoriferæ, antihystericæ, antepilepticæ, carminativæ, anthelminticæ, diureticæ, emmenagogæ &c. Succus plantæ recentis maculas oculorum delere dicitur.

Ruta muraria, **Adiantum album** Off.

Ruta muraria C. B.

Paronichia CAMER. *Epit.* pag. 785.

Adiantum album BLACKW. T. 219.

Asplenium foliis laxè ramosis, ramis secundis trifoliis, superioribus semitri-lobis, lobis rhomboideis, circumferratis HALL. *Hist.* n. 1691.

Asplenium Ruta muraria LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1541.

Gall. Sauvevie,

Germ. Mauerkraute.

Ad muros abunde apud nos provenit.

Ufu. Herba tota.

Vires Inter herbas quinque capillares refertur, eademque ipsi, quæ cæteris, tribuuntur virtutes.

S.

Sabadilli semen Off.

Gall. Semence de Cevadille.

Germ. Mexicanischer Lauff-Samen.

Figura & colore muscerdam refert; saporis est fervidi & amari fauces adurentis & nauseam aliquot horas durantem excitantis; odoris nullius.

Adfertur ex regno *Mexicano* in capsulis oblongis, quasi corniculatis, ac trilocularibus; Planta ipsa vero, quæ hos fructus producit, hætenus ignoratur.

Vires ad pediculos capitis & inguinum necandos, vel pulvere inspersum, vel axungia subactum maxime celebrantur.

Sabina Off. BLACKW. T. 214.

Sabina folio cupressi C. B.

Juniperus foliis cauli appressis, lanceolatis, alterne conjugatis HALL. Hist. n. 1663.

Juniperus Sabina LINN. Sp. pl. T. II. p. 1472.

Gall. Sabine.

Germ. Sevenbaum, Sadelbaum. In Italia, Sibiria, alpibus Helveticis sponte, apud nos in hortis crescit.

Usu. Folia graviter odorata, & acria.

Vires calefacientes, stimulant, aperientes, sudorem, urinam, & menses potenter cient; ab impiis mulieribus ad abortum procurandum, licet sæpe frustra adhibentur; pectori nocent, & ex eorum usu hæmoptysis fuit excitata. Allio juncta ad vermes laudantur.

Saccharum Off.

Gall. Sucre.

Germ. Zucker.

Arte produci potest ex succis variarum plantarum, præcipue tamen conficitur in utraque India ex planta, quæ est

Arundo Saccharifera C. B. RUMPH. Herb. Amboin. T. V. p. 186. T. 74. f. 1.

Saccharum (officinale) floribus paniculatis LINN. Sp. plant. T. I. p. 79.

Arundines sacchariferae, debitam maturitatem nactæ, molendinarum ope conquassantur, & succus inde profluens statim in ahenos æneos derivatur, ubi varia & repetita coctione & despumatione, additoque lixivio eousque evaporatur, donec in granula concrefcere incipiat; tunc statim effunditur in vasa figulina infundibuliformia, (formas dicunt) in apice foramine angusto prædita, quæ mox in amplissimas ædes transferuntur, & aliis fictilibus superimposita, ordine disponuntur. Stillat inde in vas subjectum

Saccharum liquidum, Mel saccharinum, Mellago; Gall. Melasse & Doucette: Germ. Syrupzucker.

Quod est humor crassus, pinguis, rufus, qui inspissari recusat nisi ad mellis consistentiam.

Quod vero in formis remanet saccharum jam exsiccatum, inde excutitur, & in frustra scinditur rufa, cinerea, vel ex cinereo albicantia, dicitur tunc

Saccharum crudum, seu Moscovatum.

Gall. Sucre crud, Moscovade.

Germ. Thomaszucker.

Hoc saccharum non frequenter in usum trahitur, sed materies est ex qua vel in Indiis vel in Europam transvecta cæteræ sacchari species præparantur, scilicet Saccharum miscellaneum & purgatum vel pyramidale.

Saccharum miscellaneum, Cassonatum, vel Castonatum.

Gall. Cassonade.

Germ. Cassonade.

Est saccharum in frustra vel micæ confectum, candidum, nonnihil

hil pingue, odoris mellei non ingrati; paratur ex saccharo crudo cum lixivio forti, & albuminibus ovorum cocto, depumato, colato, in formas effuso (superaddito luto) exsiccat, a syrupo liberato, & tandem e formis extracto, quod dein in partes tres, colore diversas dividunt, & unamquamque super linteis dispersam, in aere ficcant, & dein cistis includunt.

Saccharum purgatum pyramidale.

Gall. Sucre en pains.

Germ. Sutzucker.

Unicuique notissimum paratur ex Saccharo Castonato, bis vel ter aqua fontana liquefacto, cocto, rursusque in metas effuso, & referato subtus foramine, luto superaddito, a syrupo purgato, & exsiccat. Saccharum hoc pro diversa puritate & candore diversas species constituit, *Melis*, *Refinatum*, *Canariense*, *Finissimum dictas*

Vires resolventes, relaxantes, abstergentes, saponaceæ, antisepticæ, olea aquæ miscibilia reddit, hinc in febribus utile, & expectorationem adjuvat, externe ulcera mundat, fordes abstergit, oculorum pannos absumit, a corruptione plantas earumque succos conservat in conservis, syrups &c.

Saccharum candum, cantum, vel cantium Off.

Gall. Sucre Candi.

Germ. Candit-Zucker, Zucker-Candel.

Est Saccharum durum, pellucidum, angulosum, paratur vel ex Saccharo optimæ notæ, vel & ex castonato, in aqua soluto, & ad syrapi consistentiam cocto, qui in ollam fictilem, in qua bacilli lignei vel funiculi cancellatim decussatimque aptati

Pars I.

fuerunt, injicitur, & per dies 15. vel 20. ad crystallisationem reponitur. Ex saccharo optimæ notæ obtinetur *Crystallinum* ac *pellucidum*, ex castonato vero *subrufum*.

Viribus cum saccharo pyramidalis convenit.

Sagapenum Gummi, & Serapinum Off.

Gall. Sagapenon.

Germ. Sagapen, Serapinsaft.

Est Gummi. resina modo guttis magnis constans, modo in glebas compacta, extus rufescens, intus cornei coloris, mordaci & acri sapore, odore viroso & gravi, inter Assam foetidam & Galbanum medio.

Ex *Persia* & *Oriente* nobis affertur, sed planta ex qua stillat hactenus incognita est.

Vires aperientes, attenuantes, abstergentes, emmenagogæ; in affectibus thoracis mucosis, obstructionibus viscerum, morbis nervorum, spasmo, tremore, paralyfi, malo hysterico &c. commendatur.

Sago, Sego, Sagou Off.

Ita vocantur grana variæ magnitudinis, simillima illis, quæ ex hordeo molendinæ ope apud nos efformantur, extus flavicantia, intus medulla alba constantia, solida, sub dentibus tenacia, saporis farinosi. Parantur in *Indiis* ex medulla arboris in scobem redacta, varia arte in placentas formata, quibus instar panis Indi utuntur, vel & ad pultis formam aquæ ope parata, quam bacillis agitant, & adhærentes grumulos in modum panis coquunt, & *Europæis* vendunt. Arbor ex qua Sago paratur Palmæ species est & vocatur

Olus calappoides RUMPH.

Amboin. T. I. p. 86. Tab. 22. 23.

Q q

Cycas

Cycas frondibus pinnatis circinalibus: foliolis linearibus planis LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1658.

Habitat in *India orientali*.

Vires nutrientes, refrigerantes, demulcentes; phthificis, hecticis, morbo emaciatibus cum lacte, jussulo carniū, vel & vino cocta exhibentur.

Sal amarus catharticus Off.

Gall. Sel purgatif amer.

Germ. Bitter Purgiersalz, Bittersalz.

Est Sal saporis valde amari, constans crystallis niveis, exiguis, prismaticis, in exigua quantitate aquæ facile solubilis. Paratur singulari artificio ex lixivio, quod post marini salis crystallisationem remanet, addito acido vitrioli.

Vires blande alvum laxantes, notissimæ; minori dosi exhibitus & sudores & urinas movet.

Sal anglicus, seu Ebsomensis Off.

Gall. Sel d'Epsom, Sel d'Angleterre.

Germ. Englisch Sarsiersalz.

Paratur ex fonte medicato *Ebsomensi* in *Anglia* per evaporationem, & crystallisationem. Sed hujus loco obtinetur fere unice sal catharticus amarus ceu vilioris pretii, nec tamen viribus multum impar.

Sal Ammoniacus, vide Armoniacus sal.

Sal communis, Sal cibarius, Sal culinaris Off.

Gall. Sel commun, Sel de Cuisine.

Germ. Gemein oder Esssalz, Küchensalz.

Est Sal medius, qui dum in cristallōs reducitur, constanter cubicam figuram effingit eamque etiam in

minimis fervat; in igne diffilit, & crepitat, & deglutitus ficitatem excitat. Triplex est

Sal fossilis, Sal fontium, & Sal marinus.

1. Sal fossilis, Sal Gemmæ Off.

Muria fossilis pura WALLER. *Mineral.* p. 220.

Muria (montana) nuda, fossilis LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 98.

Gall. Sel Gemme.

Germ. Bergsalz, Steinsalz.

Est Sal octogonus, cubicus, saporis acris & falsi, gemmæ instar pellucidus, cristallum sæpe nitore & colore imitatur, alias & griseus, rubicans, flavicans, cæruleus reperitur, a particulis metallinis admixtis.

Ex variis montibus *Angliæ, Galliæ*, præcipue ex profundioribus *Polloniæ* fodinis moles hujus salis prægrandes saxorum instar ferro excinduntur.

Sal Gemmæ pellucidus, quasi cæterorum purissimus, quibusdam ad usum medicum præferri solet.

2. Sal fontium Off.

Muria fontana WALL. *Mineral.* p. 224.

Muria (fontana) nuda fontana LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 98.

Gall. Sel de fontaine.

Germ. Brunnensalz.

Ex aqua fontium falsorum, quales complures in variis regionibus scaturiunt, & ex lacubus falsis, quales in *Sibiria* existunt, humoris aquei evaporatione conficitur, dum aqua falsa decoquitur, fellis vel sanguinis bubuli nonnihil permiscetur, quo sal in majora granula facilius concreascit.

Hic sal nobis præcipue, & fere in tota *Germania* usualis est.

3. Sal marinus Off.

Muria

Muria marina WALLER. *Mineral.* p. 222.

Muria marina particulis nitrifis mixta CARTHEUS. *Mineral. Elem.* p. 37.

Muria (marina) nuda marina LINN. *Syst. Nat.* T. III. pag. 98.

Gall. Sel marin.

Germ. Meer-Salz.

Ex aqua marina solis ardore, vel igne evaporata obtinetur.

Vires in tribus hisce speciebus fere eadem; sc. calefacientes, abstergentes resolventes, antisepticae; ciborum appetentiam provocant, alvum & urinam promoven. Abusus salis acriores reddit humores, pruritum, scabiem, scorbutum, producit.

Sal Sedlizenfis Off. &

Sal Seidschytzensis Off.

Ex aquis mineralibus amaris Sedlizenfis & Seidschytzensis, in Bohemia eodem modo parantur ac Sal Anglicus seu Ebsfomensis.

Vires eadem ac salis cathartici amari, & frequentissime apud nos in usum trahuntur.

Salab Off.

Ita vocatur substantia dura fere cornu ad instar pellucida, pallide lutea, figuræ ovatæ vel cordiformis, odoris nullius, saporis mucilaginosi, gummi tragacanthæ æmuli, quæ masticatione fere tota dissolvitur, & ori agglutinatur, atque in aqua macerata leni calore tota in gelatinam mucilaginosam abit. Creditur esse radix Orchidis persicæ (licet. Cl. DU BUISSON affirmet fructum esse de ficuum familia, qui in Palestina proveniat,) quoniam bulbus *Orchidis mascul.* LINN. *Spec. plant.*

T. II. p. 1233. ablato prius cortice in aqua maceratus, deinde exsiccat, huic simillimus plane evadit consistentia, colore, sapore, viribus & resolutione in mucilaginem.

Ex Turcia, Persia, ad nos affertur.

Vires tribuuntur reficientes, roborantes, in agris morbo fractis, & debilitatis, tum in phthisi, arthritide, epilepsia; præcipue vero commendatur in dysenteria, ad acrimoniam biliosam temperandam & dolores leniendos, tum & in colica, affectibus catarrhalibus, ac renum morbis. Vitium habet in dysenteria, quod siccet & adstringat, quodque nostratium palato minus arrideat.

Salicaria, vide *Lyfimachia*.
Salsaparilla, vide *Sassaparilla*.

Salvia latifolia Off.

Salvia major an Sphacelus Theophrasti c. B.

Salvia hortensis major BLACKW. T. 10.

Gall. grande Sauge.

Germ. gemeine Salbey.

Et

Salvia nobilis Off.

Salvia minor aurita & non aurita c. B.

Salvia minor, Salvia virtutis BLACKW. T. 71.

Salvia (officinalis) foliis lanceolato-ovatis, integris, crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis LINN. *Spec. plant.* T. I. pag. 34.

Gall. petite Sauge.

Germ. Kleine Kräftige Salbey, Edel-Salbey.

Ambæ plantæ, quæ juxta LINNEUM varietates sunt, abunde in hortis nostratibus coluntur.

Ufu. Folia amara, odoris fragrantis.

Vires adstringentes, tonicæ, nervinæ, stomachicæ, ad tremorem senilem, paralyfin, fluxum album, sudores nocturnos post morbos ex solidorum laxitate ortos, commendatur. Externe in gargarismate, fomento, balneo, sacculis ubi discutendum & roborandum adhibetur.

Salvia sylvestris, Scorodonia Off.

Scordium alterum, seu Salvia sylvestris c. B.

Salvia agrestis seu Scorodonia BLACKW. Tab. 9.

Chamædrys foliis cordatis, productis, spicis longissimis nudis, heteromallis HALL. Hist. n. 287.

Teucrium Scorodonia LINN. Spec. pl. T. I. p. 789.

Gall. Sauge sauvage.

Germ. Wilde Salbey.

In sylvis, & montibus apud nos crescit.

Ufu. Folia amara, odoris ad scordium accedentis.

Vires vulnerariæ, adstringentes. Infusum ad hydropem laudatur.

Sambucus Off.

Sambucus fructu in umbella nigro c. B.

Sambucus BLACKW. Tab. 151.

Sambucus arborea, floribus umbellatis HALL. Hist. n. 670.

Sambucus nigra LINN. Spec. pl. T. I. p. 385.

In sepibus abunde provenit.

Ufu. Turiones, Folia, Cortex, Flores, & Baccæ.

Vires Turiones & Cortex

interior succum habent valide purgantem, & emeticum. Folia ad erysypelas adhibentur & recentia in cataplasmate ad tumores oedematofos laudantur. Flores vi emolliente & discutiente præditi in febribus ad sudores sustinendos & excitandos proficui, extus ad erysypelas, tumores varios & inflammationes profunt. Baccæ alvum laxant, & in roob redactæ vires saponaceas, resolventes in morbis chronicis & pectoralibus efficaces exierunt.

Sanctum Lignum vide, Guaiacum Lignum.

Sandaraca, Arabum Vernix, Gummi Juniperi Off.

Gall. Sandarac, Vernis, Gomme ou Resine de Genevrier.

Germ. Wachholderharz, Sandarach.

Est substantia resinosa, arida, pellucida, pallide flavescens vel citrina, in guttas mastichi similes concreta; saporis resinosi, odoris, dum accenditur, fragrantis & suavis. Calidis in regionibus sponte, vel per corticis incisiones stillat, ex Junipero vulgari suo loco jam dicto.

Ex *Africanis* oris per *Massiliam* ad nos affertur.

Vires vulnerariæ. Extus adhibetur ad vulnera consolidanda, suffitus ad catarrhos laudatur, & ad albos vernices parandos infervit.

Sanguis Draconis, Off.

Gall. Sang de Dragon.

Germ. Drachenblut.

Est substantia resinosa, sicca, friabilis, igne facile liquefscens, obscure rubra, quæ trita elegantem dat colorem rubrum, sapo-

saporis & odoris expers nisi cum incenditur, tum enim odorem fere ut Storax liquida exhalat. Affertur vel durus in grumos seu massulas concretus, foliis longis & angustis, quasi junceis vel palmeis involutus, vel in massas seu panes compactus, qui impurus, variisque heterogeneis permixtus esse solet. Est succus ex Arbore stillans, quæ perhibetur esse

Draco arbor indica filiquosa, populi folio COMMELIN. *Hort. Amst. T. I. p. 213. Tab. 109.*

Lingoum RUMPH. *Amboin. T. II. p. 205. T. 70.*

Pterocarpus officinalis JACQUIN. *Hist. stirp. amer. p. 383. T. 183. fig. 92.*

Pterocarpus (Draco) LINN. *Mat. Med. p. 184. n. 522. Sp. plant. T. II. p. 1662. Syst. Nat. Ed. XII. Tom. II. p. 473.*

Habitat in *Indiis*

Vires adstringentes, exsiccantes, inspissantes, ad dentifricios pulveres inprimis sumitur & pictoribus inservit.

Datur vero & alia species Sanguinis Draconis nuperrime ab Anglis descripta, quæ dici posset

Gummi rubrum adstringens Gambiense.

Est gummi fragile, coloris rubri, nigricantis & obscuri, fragmenta vero granati lapidis ad instar rubent & pellucet. Odoris expers est, saporem vero linguæ imprimit mucilaginoso - dulcem stipticum; maxima pars in aqua dissolvitur, eamque rubro colore tingit. Stillat ex inciso cortice arboris Africanæ, quæ incolis dicitur Pau de Sangue & juxta fluvium Gambiensem crescit.

Pars I.

Vires prædicantur egregiæ in diarrhea habituali, fluore albo, fluxu menstruo nimio, & in genere in morbis a nimia fibrarum laxitate & humorum acrimonia oriundis.

Sed hæc species officinis nostratibus hæctenus incognita est.

Sanguisorba vide Pimpinella rubra.

Sanguifuga, vide Hirudo.

Sanicula Off. C. B.

Sanicula, Diapensia BLACKW. *Tab. 63.*

Sanicula foliis radicalibus trilobatis, lateralibus lobis tripartitis, umbellis globosis HALL. *Hist. n. 737.*

Sanicula europæa LINN. *Spec. pl. T. I. p. 339.*

Gall. Sanicle.

Germ. Sanickel, Bruchkraut.

In sylvis frequens.

Usu. Folia amara.

Vires vulnerariæ, adstringentes, ab omni tempore celebres sunt tam externo usu, quam interno ad sanguinem effusum dissolvendum.

Santalum album Off.

Gall. Santal blanc.

Germ. Weiß Sandelholz, Weißer Sandel.

Ex *India orientali* ad nos affertur in frustis magnis femoris crassitie, coloris pallidi, odoris & saporis fere nullius, hinc & rarus ipsius usus est.

Santalum citrinum, Santalum flavum Off.

Gall. Santal citrin.

Germ. Gelber Sandel, gelb Sandelholz.

Lignum est ponderosum, solidum, pectinibus rectis, colore ex pallido-rufescente aut flavescente;

R r

sapore

sapore aromatico, amaricante; odore fragrante, moschum & rofas aliquantisper æmulante.

Una eademque arbor hæc duo ligna producere perhibetur; ita ut pars corticalis seu alburnum dicatur *Santalum album*, medullium vero seu interior substantia a cortice & alburno separata *citrinum* constituat. Arbor ipsa est

Santalum album c. B.
RUMPH. *Amboin.* T. II. p. 42.

T. II. LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 497.

Santalum verum BREYN.
Cent. p. 94. T. 5. fig. I.

Crescit in *India*.

Vires incidentes, attenuantes, adstringentes simul & roborantes; sed hodie rarius in usum vocantur. Ex Santalo citrino resina fragrans & oleum æthereum ad ambrae odorem accedens obtineri potest, quod ceu summe confortans prædicat Cel. HOFMANNUS.

Pro Santalo citrino sæpe substitui dicitur lignum densum ponderosum, resinosum, colore citrino, odore fragrante, quod *Gallis* Bois de citron, Bois de Jarmin, Bois de Chandelle audit, & à Santalo differt tum odore, tum pectinibus brevibus & inæqualibus, tum resinosa qua turget substantia, cujus ope cito flammam concipit, nec facile extinguitur. Arbor unde educitur est

Apocynum americanum frutescens, longissimo folio, flore albo odoratissimo
COMMEL. *H. Amst.* T. II. p. 47.
Tab. 24.

Plumeria alba LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 306.

Habitat in *Jamaica*.

Santalum rubrum Off.

Gall. Santal rouge.

Germ. Roht Sandelholz.

Solidum, densum, grave est, pectinibus modo rectis, modo crispis, extus obscure rubens & quasi nigricans, intus intense rubrum; odorem nullum habet; saporem vero leviter adstringentem & austerum. Arbor hætenus nondum innotuit.

Ex *Coromandel* Indiæ orientalis affertur.

Vires tribuuntur adstringentes, & roborantes, quæ tamen unice citrino conveniunt. Sanguinem & lympham etiam depurare nonnulli autumant, ut inter species pro decocto lignorum receptum sit. Inservit præterea ad spiritum vini colore rubro imbuendum; color ab aqua haud extrahitur.

Hujus loco sæpe in officinis reperiuntur alia ligna rubentia, ut brasilianum &c. a quibus tamen & colore & sapore distinguere potest.

Santolina vide Abrotanum femina.

Santonium vide Cina.

Sapo venetus, Sapo albus hispanicus, Sapo durus Off.

Gall. Savon de Venise, ou d'Alicante.

Germ. Venetianische Seife.

Est substantia sicca, lubrica, rafilis, quæ aeri exposita non madescit, in aqua tota dissolvitur, & efficit ut oleosa & resinosa cum aqua intime misceri queant. Arte paratur ex oleo Olivarum recenti, & lixivio salis cujusdam alcalini fixi puri, plerumque Sodæ hispanicæ. Hic sapo ceu reliquis purior, præcipue ad usum internum adhibetur.

Vires resolventes, emollientes, discutientes, abstergentes, in glutinoso sponaneo primarum viarum, in infarctu & obstructione

ctione viscerum, in morbis ab acido ortis, plane egregiæ quin & ad calculum vesicæ dissolvendum, largo & continuato usu efficaces.

**Sapo communis, Sapo mol-
lis Off.**

Gall. Savon ordinaire.

Germ. Gemeine Seife.

Substantia minus pura est ac præcedens, magis unguinosa & mollior; paratur ex quocunque oleo presso vegetabili, quin & sebo & pinguedine animalium, & lixivio cinerum clavellatorum. Alii habetur quoque *Sapo niger* ex pinguedine balænarum, ut dicitur, simili artificio paratus.

Vires conveniunt cum præcedente, sed ob impuritatem unice usibus externis in lotionibus, balneis destinatur, & præcipue ad usus mechanicos adhibetur.

Saponaria Off.

Saponaria major lævis C. B.

Saponaria vulgaris BLACKW.
Tab. 113.

Saponaria foliis ovato-lanceolatis, trinerviis, floribus tubulosis, umbellatis
HALL. *Hist.* n. 908.

Saponaria officinalis LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 584.

Gall. Saponaire.

Germ. Seifenkraut, Seifenwurz.

Ad vias & locis arenosis abunde reperitur.

Usu. Radix, & Folia, amara, cum aqua trita spumam agunt, ut Sapo.

Vires detergentes, saponacæ; ad morbos chronicos & viscerum obstructions commendantur; tum & ad cachexiam, ipsamque luem veneream.

Sapphirus, Off.

Gemma pellucidissima, duritie tertia, colore cæ-

ruleo, igne fugaci WAL-
LER. *Mineral.* p. 154.

Alumen Gemma pretiosa
LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 102.
n. 6. Variet. γ. cœruleum.

Gall. Saphir.

Germ. Saphyr.

Est Gemma dura, colore cæruleo cælum serenum referente, splendoris & perspicuitatis summæ.

Ex variis *Indiæ* regionibus affertur; orientalis dictus; & ex *Bohemia*, *Silesia* &c. qui occidentalis est.

Vires olim tribuebantur cor recreantes, spiritus animales excitantes, venenis resistentes, intestinorum ulcera sanantes: hodie usus ejus medicus obsolevit.

Sarcocolla Off.

Gall. Sarcocolle, Colle de chair.

Germ. Fleischschleim.

Est substantia gummeo resinosa, ex minutis & veluti contritis grumis albicantibus, aut ex albo rufescentibus, spongiosis, friabilibus, & micis lucentibus subinde permixtis constans; saporis est subacris, amari cum nauseosa quadam dulcedine. Ex *Persia* ad nos affertur, & stillat ex Arbore, quæ dicitur

Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica, subrotundis foliis, stœchadis arabicæ capitulo duro, lacrymam fundens PLUK.
Mantiss. p. 183. Tab. 44.

Penæa (Sarcocolla) foliis ovatis planis LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 162.

Habitat in *Æthiopia*.

Vires vulnerariæ, purgantes; extus adhibetur ad vulnera consolidanda, & ossium fracturas; & in lacte muliebri vel albumine ovi soluta ad oculorum vitia.

Sarsaparilla, vide Saffaparilla.

Sassafras Lignum Off.

Gall. Bois de Sassafras.

Germ. Sassafras, Fenchelholz.

Est lignum ex rufo albicans, rarum, & leve, cortice fungoso foris cinereo, intus ferrugineo, sapore acri, subdulci, aromatico, odore fragrante; ad foeniculi odorem accedente, odor in cortice & minoribus ramis flagrantior, quam in crassiori ligno est. Abscinditur hoc lignum ex Arbore Pini magnitudine, quæ est

Sassafras arbor ex Florida, ficulneo folio C. B.

Sassafras BLACKW. Tab. 267.

Laurus (Sassafras) foliis integris trilobisque LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 530.

Crescit in America.

Vires diaphoreticæ, sudoriferæ, pellentes, mundificantes, ad humores lentos incidendos, viscerum obstructions. Ad cachexiam, chlorosin, hydropem, luem venereum laudatur.

Sappaparilla, Salsaparilla, Sarsaparilla, Zarzaparilla Off.

Ita vocantur radices, vel potius flagella radices longissima plurimum ulnarum pennæ anserinæ crassitie, lenta, flexilia, striis per longitudinem decurrentibus, cortice tenui, colore extus rufescente seu cinereo, cui candida, farinacea substantia subest, friabilis, sapore glutinoso, subamaricante. Pendent vero hæc flagella quam plurima ex uno capite vel radice transversa pollicem crassa, squamosa. Planta quæ hanc radicem profert, est

Smilax aspera Peruviana, seu Sappaparilla C. B.

Smilax aspera Peruviana

BLACKW. Tab. 393.

Smilax (Sarsaparilla) LINN.

Sp. plant. T. II. p. 1459.

Crescit in Hispania nova, Peruvia, & Brasilia.

Vires abstergentes, resolventes, sudoriferæ, in arthritide, rheumatismo utilis, ubi acriora nocere possent. Innotuit in Europa ceu specificum ad luem venereum, quæ virtus quidem in dubium vocabatur, sed ex recentissimis experimentis in Anglia institutis patet hancce radicem ad dolores capitis venereos, scabiem & emaciationem venereum, imo ad luem ipsam, mercurio aliisque frustra adhibitis, sanandam præstantissimam esse.

Satureja Off.

Satureja hortensis, five Cunila fativa Plinii C. B.

Satureja BLACKW. Tab. 419.

Satureja (hortensis) pedunculis bifloris LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 798.

Gall. Sariette.

Germ. Saturey, Garten-Ysop, Kirchen-Ysop, nostr. Kirchenseplein.

In calidiori Europa sponte, apud nos in hortis crescit.

Usu. Folia, odoris fragrantis, aromati.

Vires calefacientes, stimulant, carminativæ, uterinæ. Rei culinariæ quoque inservit.

Satyrion, Satyrion mas Off.

Orchis morio mas, foliis maculatis C. B.

Satyrion mas BLACKW. Tab. 53.

Orchis radicibus subrotundis, petalis lateralibus reflexis

reflexis, labello trifido, segmento medio longiori bifido HALL. *Hist.* n. 1283.

Tab. 33.

Orchis mascula LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1333.

Gall. Satyrion.

Germ. Knabenkraut, Stendelmurz.

Crescit apud nos in pratis montosis & sylvis.

Ufu. Bulbus seu Radix.

Vires olim habebantur aphrodisiacæ, hodie aliam adhuc utilitatem præbent. Radices nempe hujus, & aliarum Orchidum, epidermide detracta, per minuta 30. in aqua coctæ, & in umbra siccatæ, in gummi speciem abeunt, & simillimæ & figura & viribus sunt *Salab persici*, de quo suo loco jam dictum est.

Saxifraga alba Off. & BLACKW. Tab. 56.

Saxifraga rotundifolia alba C. B.

Saxifraga foliis radicalibus reniformibus, obtuse dentatis, caulinis palmatis HALL. *Hist.* n. 976.

Saxifraga granulata LINN. *Spec. plant* T. I. p. 576.

Gall. Saxifrage.

Germ. weisser Steinbrech.

Crescit apud nos circa *Gundeldingen* & *St. Margrethen*, versus *Crenzach* &c.

Ufu. Folia, & Radix bulbillis constans, qui improprie *Semina Saxifragæ* in officinis nominantur. Sæpissime etiam sub nomine radicis *Saxifragæ albæ*, *Dentariæ minoris* radices prostant.

Vires lithontripticæ dicuntur, sed mitis est planta, subacida, Sedis affinis.

Pars I.

Saxifraga rubra vide *Filipendula*.

Scabiosa Off.

Scabiosa pratensis hirsuta C. B.

Scabiosa sylvestris BLACKW. Tab. 185.

Scabiosa foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, dentatis, superioribus semipinnatis HALL. *Hist.* n. 206.

Scabiosa arvensis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 143.

Gall. Scabieuse.

Germ. Scabiosen, Apostemenkraut.

In pratis & ad vias frequens.

Ufu. Herba & Flores amari, sapore ingrato.

Viris sudoriferæ, vulnerariæ, saponaceæ, ad morbos pectoris commendatur.

Scammoneum, Scammonia Off.

Gall. Scammonée.

Germ. Scammoneum, purgierender Windensaft.

Est succus concretus, resinofus, & gummosus, purgans, cujus duo genera in officinis reperiuntur.

1. *Aleppense* est succus concretus, levis, rarus, fungosus, e cinereo nigricans, & splendens dum frangitur, in pulverem albidum aut cinereum abiens, saporis amaricantis, & odoris virulenti; ex *Aleppo* affertur.

2. *Smyrnicum nigrum* est, magis densum ac penderosum; ex *Smyrna* apportatur.

Aleppense Smyrnico antepontur. Sincerum judicatur, si cito in aqua solvitur eamque lactescere facit cum virore. Paratur hic succus & colligitur ex radice incisa *Herbæ*, quæ est

Ss

Scam-

Scammonia fyriaca C. B.

Convolvulus fyriacus seu
Scammonia fyriaca MORIS.
Hist. T. II. p. 12. Sect. 1. Tab. 3.
fig. 5.

Convolvulus (Scammonea)
foliis sagittatis, postice
truncatis, pedunculis tere-
tibus subtrifloris LINN. *Spec.*
plant. T. I. p. 218.

Crescit in Syria.

Vires valide purgantes, catholicæ,
hinc unice robustis phlegmati-
cis exhibeatur; foetidissima red-
dit excrementa, quoniam celer-
rime sanguinem dissolvit & in
serum mutat. Si mucus in-
testinorum deficit, ab exigua
ejus dosi hypercatharsis & in-
flammatiæ intestinorum oriri
potest, si vero mucus ibidem
abundat, etiam largior dosis
vix alvum movet.

Scariola vide Endivia.

Schoenanthus, Squinanthum,
Juncus odoratus Off.

Juncus odoratus aromati-
cus C. B.

Gramen dactylon aromati-
cum multiplici panicula,
spicis brevibus tomento
candicantibus, ex eodem
pediculo binis PLUKN.
Almagest. p. 175. Phytogr. T. 190.
fig. 1.

Andropogon Schoenanthus
LINN. *Spec. pl. T. II. p. 1481.*

Gall. Schoenanthæ, Junc o-
dorant.

Germ. Süßes Rohr, oder Ca-
meelstroh.

Crescit in Arabia & India.

Usu. Culmus, qualis affertur
cum foliis & floribus, aridus,
rigidus, teres nitidus, genicula-
tus, pedem longus, medulla
fungosa farctus, saporis fervidi,
aromatici, odoris fragrantissimi.

Vires carminativæ emmenagogæ,
calefacientes, hodiè vix in usu,
nisi quod Theriacam Androma-
chis & Mithridatium Damocra-
tis ingrediatur.

Scilla vide Squilla.

Scincus marinus, Stincus
marinus Off.

Scincus SEB. *Thes. T. II. p. 112.*
Tab. 105. f. 3.

Lacerta (Scincus) cauda te-
reti mediocri, apice com-
pressa, digitis anticis,
marginatis LINN. *Syst. Nat.*
T. I. p. 365.

Gall. Scinc marin.

Germ. Erd Crocodill.

Habitat in montosis *Lybiæ, Ae-*
gypti, Arabiæ petraeæ, indeque
herbis aromaticis conditus no-
bis affertur.

Vires creduntur diureticæ, &
aphrodisiacæ, de quibus tamen
merito dubitare licet. Ceu a-
lexipharmacum Theriacam in-
greditur.

Sclarea, Horminum, Galli-
trichum Off.

Horminum Sclarea dictum
C. B.

Horminum hortense, Sclarea
BLACKW. Tab. 122.

Salvia (Sclarea) foliis rugo-
sis, cordatis, oblongis,
villosis, ferratis, bracteis
floralibus calyce longio-
ribus, concavis, acuminatis
LINN. *Spec. pl. T. I. p. 38.*

Gall. Orvale, Toute bonne.

Germ. Scharlachkraut, Musca-
tellerkraut.

Sponte crescit in Syria, Italia,
apud nos in hortis colitur.

Usu. Herba integra, odoris for-
tis & gravis, saporis amari.

Vi-

Vires stimulantés, resolventes; laudatur ad fluorem album, colicam, suffocationem hysterica. Semen vero oculis inditum ad educenda corpuscula in eos illapsa, & mucilago ex eo parata lymphæ lacrymalis acrimoniam demulcere dicitur. Folia recentia vino super affuso odorem & saporem moschatum conciliant.

Hujus loco in officinas recipi quandoque solent.

Horminum fativum C. B.

Salvia Horminum LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 34.

Gall. Ormin.

Germ.

&

Horminum pratense, foliis ferratis C. B.

Salvia foliis imis cordatis, superioribus longe lanceolatis, verticillis nudis in spicam continuatis HALL. *Hist.* n. 253.

Salvia pratensis LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 35.

Gall. Ormin des prés.

Germ. Wiesensalbey.

Quarum prior in hortis nostris, altera ubique in pratis & ad vias occurrit.

Scolopendrium verum vide Ceterach.

Scolopendrium vulgare vide Lingua cervina.

Scordium C. B. BLACKW. T. 475.

Chamædrys foliis mollibus, hirsutis, ellipticis, crenatis, verticillis paucifloris HALL. *Hist.* n. 288.

Teucrium Scordium LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 790.

Gall. Scordium, Germandrée d'eau, Chamarras.

Germ. Wasserbathenig, Lachenknoblauch.

Locis paludosis in *Helvetia* & alibi passim crescit, apud nos in hortis.

Ufu. Folia odoris gravis, aromatici, ad allium accedentis, saporis amari.

Vires calefacientes, resolventes, sudoriferæ, alexipharmacæ, antisepticæ. Ad morbos pectoris & asthma laudatur, ut & ad cachexiam, & amasarcam. Externo usu ad gangrænam utiliter admovetur.

Scorodonia vide Salvia sylvestris.

Scorpio Off.

Scorpius terrestris MATTHIOL. pag. 253.

Scorpio (europæus) pectinibus octodecim dentatis, manibus angulatis LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 1038.

Gall. Scorpion.

Germ. Scorpion.

Insectum fatis notum, calidiorum regionum incola etiam *transalpina Helvetia* in caudæ extremo gerit aculeum recurvum & cavum, per quem venenum suum vulnere infert. *Vires.* Ab omni tempore creditur Scorpio sibi ipse præstantissimum medicamentum præbere, dum contritus, vel oleum, in quo extinctus vel coctus fuerit, vulnere imponatur, vel & intus assumatur. Cæterum vis diuretica ipsi tribuitur.

Scorzonera Off.

Scorzonera latifolia sinuata C. B.

Scorzonera & Viperaria BLACKW. T. 406.

Scorzonera (hispanica) caulo ramoso, foliis amplexicaulibus integris, ferrulatis LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1112.

Gall. Scorzonere.

Germ. Scorzonere , Schlangentraut.

In hortis frequens colitur , *Hispaniæ & Sibiria* incola.

Usu. Radix saporis dulcis , lactescens.

Vires leniter nutrientes , abstergentes , resolventes ; in decoctis frequens adhibetur pro potu ordinario in febribus acutis & lentis , & in cibum ægrotis salubrem frequentissime recipitur. Olim credebatur sudorifera & alexipharmaca esse.

Hujus loco passim sequens in officinis præsertim germanicis profertur.

Scorzonera latifolia, humilis nervosa C. B.

Scorzonera humilis latifolia CLUS. *Hist. Part. II.* p. 138.

Scorzonera caule nudo, unifloro , foliis lanceolatis HALL. *Hist.* n. 10.

Scorzonera (humilis) caule subnudo , unifloro , foliis lato-lanceolatis , nervosis , planis LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1112.

In *Germania* passim, etiam *Helvetia calidiori* sponte occurrit , & iidem cum præcedenti viribus gaudet.

Scrophularia Off.

Scrophularia C. B.

Scrophularia major BLACKW. T. 87.

Scrophularia caule quadrangulo, paniculato, foliis cordatis, oblongis HALL. *Hist.* n. 326.

Scrophularia nodosa LINN. *Sp. plant.* T. H. p. 863.

Gall. Scrophulaire.

Germ. Braunwurz, Feigwarzenkraut.

Ad vias & fossas non aquosas reperitur.

Usu. Radix tuberosa , multiformis , & Folia, utraque amara, & foetida.

Vires. Ad scrophulas & hæmorrhoides Radix laudabatur, forte ob figuram, Folia vulneraria sunt. Sed tota planta ob acrimoniam suspecta.

Datur vero & alia species, quæ est

Scrophularia aquatica major Off. & C. B.

Scrophularia aquatica BLACK. T. 86.

Scrophularia caule quadrangulo, alato , paniculato , foliis ovato lanceolatis HALL. *Hist.* n. 325.

Scrophularia aquatica LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 864.

Gall. Scrophulaire aquatique, Herbe du siege.

Germ. Wasser-Betonien , groß Feigwarzenkraut.

Hæc dicitur esse *Liquitaya Brasiliensium*, qua addita sapor nauseosus Sennæ corrigatur ; sed alii regerunt saporem quidam emendari, sed ipsam scrophulariam nocere, flatum facere & hysterica mala.

In officinas nostras hætenus non recipitur.

Scutellaria vide *Tertianaria*.

Sebesten, *Sebestenæ*, *Myxæ* Off.

Gall. Sebestes.

Germ. Schwarze Brustbeerlein.

Sunt fructus parvi prunis similes, nigricantes, turbinati, rugosi, semiexsiccati, constant ex pulpa fusca, viscida , saporis dulcis, quæ pertinaciter officulo adhæret.

Arbor

Arbor, quæ hos fructus producit, dicitur

Sebestena domestica C. B.

Sebesten & Myxa BLACKW. T. 398.

Cordia (Myxa) foliis ovatis tomentosis, corymbis lateralibus, calycibus decemstriatis LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 273.

Habitat in *Ægypto* & *Malabaria*. Vires pectorales, demulcentes; in tussi, dyspnœa, vocis raucedine, urinæ ardore commendantur; alvum simul emolliunt. Rarius recentes in Officinis prostant.

Secale Off.

Secale hybernum vel majus C. B.

Secale glumarum ciliis scabris HALL. *Hist.* n. 1421.

Secale cereale LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 124.

Gall. Seigle.

Germ. *Rothen, Korn.*

In agris feritur.

Ufu. Semen farina, quæ citius acefcit, ac aliorum cerealium farina, hinc panis inde confectus haud assuetis alvum movere, & sodam excitare solet; & Flores.

Vires emollientes, discutientes, putredinem arcentes, in cataplasmate ad gangrænam præcavendam. Flores quibusdam ad menses pellendos, & convulsiones infantum laudantur. Farina paululum tosta erefypelati inspergitur.

Ex Secale bonus potus Coffeæ similis paratur.

Frequens in Secale vitium est, quod ejus grana tempestate humida in longa cornicula excrescant, Secale cornutum dicunt, cujus farina vere venenata dolores

Pars I.

subcutaneos, motus convulsivos, sphacelum artuum spontaneum producere solet.

Sedum majus, vide Sempervivum.

Sedum minus acre Off.

Sempervivum minus vermiculatum acre C. B.

Sedum parvum acre flore luteo JOH. BAUH. T. III. pag. 844.

Sedum minimum BLACKW. Tab. 232.

Sedum foliis conicis, confertis, caulibus ramosis, supremis trifidis HALL. *Hist.* n. 966.

Sedum acre LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 619.

Gall. Petit Sedum, Vermiculaire brûlante.

Germ. *Mauer-Pfeffer, kleine Hauswurz.*

Ad vias & aggeres, in pratis macilentis & agris frequens.

Ufu. Herba integra, saporis acerrimi, & exurentis.

Vires. Vomitus & alvum movet valide, in hydrope & scorbuto efficax. Extus verrucas & clavos lamellatim erodit, & in cancro exulcerato insigniter profuit; tum & in gangræna sicca hydropica.

Selago Off.

Muscus erectus ramosus faturate viridis C. B.

Selago vulgaris abietis rubræ facie DILL. *Hist. Musc.* p. 435. Tab. 36. f. 1.

Lycopodium spica sessili, foliis lateralibus lanceolatis, confertis HALL. *Hist.* n. 1716.

Lycopodium Selago LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1565.

T t

In

In sylvis & pascuis alpinis reperitur.

Vires emeticæ, & purgantes. Nobis haud in usu.

Sempervivum, Sedum majus Off.

Sedum majus vulgare C. B.
Sedum majus BLACKW. Tab. 366.

Sedum rosulis glabris, ciliatis, petalis quatuordecim conglutinatis, lanceolatis, hirsutis HALL. *Hist.* n. 949.

Sempervivum tectorum LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 664.
Gall. Joubarbe.

Germ. großer Hauslob, Hauswurz.

In alpium rupibus sponte provenit, & copiose in tectis colitur.

Usus Folia & eorum Succus aqueus, nitrosus, subacris.

Vires refrigerantes, abstergentes, adstringentes, ad ulcera serpentina & cavernosa, igne ambusta, ad cancrum, fissuras linguæ, aphthas adhibetur.

Senecio, Erigeron Off.

Senecio minor vulgaris C. B.
Erigeron Senecio BLACKW. T. 132.

Senecio corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis, amplexicaulibus, floribus sparsis HALL. *Hist.* n. 58.

Senecio vulgaris LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1216.
Gall. Senecion.

Germ. Creutzwurz, Vögelein-krout.

In hortis & agris ubique frequens.

Usu. Folia succulenta, sapore herbaceo, subsalfo.

Vires refrigerantes; ad inflamma-

tionem & scirrhum mammarum & testium imponitur, ad anginam quoque adhibetur, & in obstructionibus mesenterii infantibus non absque effectu propinatur. Vix tamen apud nos in usu est.

Senegal Gummi, Senega vel Seneca Gummi Off.

Gall. Gomme de Senegal.

Germ. Senegal Gummi.

Est Gummi genus Arabico prorsus simile, unice in majoribus globis in officinis prostat, candida hujus gummi frustula a genuino gummi arabico nullo modo discerni possunt. Arbor, unde emanat, est

Acacia C. B.

Acacia, Sant, & Kakia ALPIN. *Aegypt.* p. 4. icon p. 6. b.

Arbor foliis pinnatis spica pendula sericea CATESB. *Carol.* T. II. p. 44. Tab. 44.

Mimosa Senegal LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1506.

Affertur ex provincia *Nigritarum* juxta fluvium *Senega* dictum.

Vires eadem, ac gummi arabici, magis vero ad usus mechanicos adhiberi solet.

Seneka, Senega radix, Senegar Off.

Gall. Seneka, ou Racine contre la morsure du Serpent à Sonnette.

Germ. Seneka, Klapperschlangen-Wurzel.

Radix est ad spithamam fere longa, pollicem crassa, varie contorta, in ramos divaricata, foris sublutea, intus alba, saporis acri-amaricantis, aromatici. Planta, unde desumitur hæcce radix, vocatur

Plan-

Plantula marilandica, caule non ramoso, spica in fastigio singulari, e flosculis albis composita RAJI *Hist. plant. suppl.* p. 640.

Polygala (*Senega*) floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-lanceolatis LINN. *Amoenit. acad.* Vol. II. p. 139. Tab. 2. *Sp. pl.* T. II. p. 990.

Crescit in *Virginia*, *Marylandia*.

Vires diaphoreticæ, alexipharmacæ, sanguinem viscidum inflammatorium dissolventes, catharsin & vomitum quandoque excitantes; specificum habetur adversus ictum serpentis caudifoni; in peripneumonia & pleuritide mirifice prodesse dicitur, tum & in hydrope, cum excretionem alvi, urinæ, & sudoris potenter promoveat.

Senna, *Sena*, & *Folium orientale* Off.

Senna alexandrina, seu foliis acutis C. B. &

Senna italica seu foliis obtusis EJUSD.

Senna DODON. *Pempt.* p. 361.

Cassia (*Senna*) foliis trijugis quadrijugisve subovatis LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 539.

Gall. Senné.

Germ. Sennetblåter-Baum.

Arbor in *Persia*, *Syria* & *Arabia*, colitur, unde in *Ægyptum* & *Alexandriam*, indeque ad nos deportatur; nam *Italica* folia prioribus longe minus efficacia censentur.

Usu. Folia parva, sicca, firma, acuta, & veluti lanceolata, ex viridi flavescencia, odore te-

nui, sapore subacri, amaricante nauseoso; & *Fructus*, qui *Folliculi Sennæ* dicuntur, suntque siliquæ membranosæ, oblongæ, incurvæ, planæ, compressæ, colore ex viridi rufescente, in quibus continentur semina compressa, pallentia, aut nigricantia.

Vires purgantes, notissimæ, usitatissimæ; in morbis diuturnis, ulcerosis cutis affectibus, viscerumque obstructionibus efficaces, quod inde corrupti & crassi humores ex corpore proliciantur. Nocent in calidioribus vel ubi inflammationis metus est. Tormina excitare dicitur parca aquæ copia si fuerit infusa, non vero si satis sit diluta. Cum lacte infusa blande operatur, & sacharo edulcorata tutum nec ingratum laxans præbere dicitur ipsis infantulis. *Stipites* quibusdam inutiles censentur, ob tormina inde oriunda male audiunt, nec tamen foliis minus efficaces nec magis torminosi sunt. *Folliculi* debilius purgare dicuntur ipsis foliis.

Sepiæ os Off.

Gall. Os de Seiche.

Germ. Black, oder Kuttelfischbein, weiß Fischbein.

Est substantia testacea, candida, levis, utrinque convexa, parte supina duriuscula, lævi, inferne fungosa, molliori, friabili, saporis terreo-falsi. Inhæret scuti ad instar dorso Piscis, vel potius Vermis, qui dicitur

Polypus octopus RONDELET. *pisc.* p. 513.

Sepia (officinalis) corpore e-caudato marginato, tentaculis duobus LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 1095.

Degit in *Mari Mediterraneo*, & *Oceano*,

Oceano, osque ad littora copiose reperitur.

Vires absorbentes, siccantes, adstringentes. Ad gonorrhœam olim laudabatur, sed absque effectu est.

Sericum & Folliculi Bombycis Off.

Gall. Soye & Coccons de Soye.

Germ. Seide, und Seiden-Pyzer, oder eingesponnene Bälge von Seidenwürmern.

Productum notissimum Insecti, quod dicitur

Papilio Bombyx JONSTON. *Insect.* Tab. 22.

Phalæna Bombyx (Mori) elinguis, alis reversis, pallidis, strigis tribus obsoletis fuscis maculaque lunari LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 817.

Habitat in Moro *Chinensium*, hodie fere ubique nutritur.

Vires serici crudi vix ullæ, licet ad epilepsiam & hæmorrhagias quibusdam commendetur. Sericum ustum vero multum salis alcalini volatilis continet, multarum virium; vix tamen in usu.

Serpentaria virginiana Off.

Aristolochia Pistoria, seu Serpentaria virginiana, caule nodoso PLUKNET. *Almag.* p. 50. *Phytogr.* T. 148. fig. 5.

Aristolochia (Serpentaria) foliis cordato-oblongis, planis, caulibus infirmis superne flexuosis teretibus, floribus solitariis LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1363.

Gall. Viperine, ou Serpentaire Virginienne.

Germ. Virginische Schlangenzurz.

Crescit in *Virginia* & *Carolina*.

Usu. Radix fibrosa, tenuis, levis, foris fusca, intus flavescens, odore fragrante, aromatico; sapore subacri, amaricante.

Vires diureticæ, diaphoreticæ, alexipharmacæ; humorum putredini in febribus malignis resistit, & adversus Boiciningæ serpentis morsus commendatur.

Serpentaria vulgaris, vide Bistorta.

Serpentes Off.

Anguis GESN. *Serpent.* p. 43.

Anguis vulgaris fuscus, collo flavescente, ventre albis maculis distincto. PETIV. *Mus.* 17. n. 101.

Coluber (Natrix) scutis abdominalibus CLXX, squamis subcaudalibus LX. LINN. *Syst. Nat.* T. I. pag. 380.

Gall. Serpent.

Germ. Schlang.

Degit in locis umbrosis, humidis.

Usu. Adeps, Exuvix, & Lapis.

Vires. Adeps olim ad oculorum rubedinem, & maculas; Exuvix ad partum facilitandum extus adhibebantur.

Serpentum lapis plerumque arte factus est, ex terris quibusdam indicis compaginatus, vel & ex cornibus boum calcinatis. Specificum dicitur pro veneno serpentum, satis superstitiose.

Serpillum Off.

Serpillum vulgare minus C. B.

Serpillum BLACKW. Tab. 418. Thy-

- Thymus foliis ovatis, basi ciliatis HALL. *Hist.* n. 235.
- Thymus Serpillum LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 885.
- Gall. Serpolet.
- Germ. Quendel, Seldkummel.
- Nostratibus Fleiner Costeg.
- Ubique locis aridis ad vias &c.
- Usu. Herba integra odore aromatico grato prædita.
- Vires cephalicæ, nervinæ, resolventes; in catarrhis, colica, paralyfi laudatur; externe potissimum exhibetur in fotu, & balneo.
- Sesamum Off.
- Sesamum veterum C. B.
- Digitalis orientalis Sesamum dicta. TOURNEF. I.R.H. p. 165.
- BURMANN. *Zeylan.* p. 87. T. 38. f. 1.
- Sesamum (orientale) foliis ovato-oblongis integris LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 883.
- Gall. Sefame, Jugeoline.
- Germ. Sesamkraut, Alexandrinisches Selsamenkraut.
- Cræscit in Zeylona, Malabaria.
- Usu. Semina ovata, albicantia, oleosa, dulcia, quæ pressa multum olei largiuntur.
- Vires emollientes, resolventes; in clysteribus adhibetur sed raro.
- Seseli creticum Off.
- Seseli creticum minus C. B.
- Tordylium (officinale) involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 345.
- Gall. Seseli de Candie.
- Germ. Sesel, Cretischer Bergkummel.
- In Italia, Sicilia, sponte nascitur.
- Usu. Semina, saporis acris, aromatici.
- Vires diureticæ, carminativæ, hystericae.
- Pars I.
- Seseli Massiliense vide Siler montanum.
- Sideritis Off.
- Sideritis vulgaris hirsuta C. B.
- Sideritis flore luteolo RIVIN. Tab. 70.
- Herba della strege Italorum BOCCON. *Mus. di plant.* p. 36.
- Betonica foliis hirsutis ovatis, rotunde crenatis, bracteis ovato lanceolatis, aristatis, integerrimis HALL. *Hist.* n. 262.
- Stachys recta LINN. *Mantiss.* p. 82. n. 13. *Syst. Nat.* Ed. XII. T. II. p. 395.
- Gall. Crapaudine.
- Germ. Gliedkraut, Beruf oder Beschreykraut.
- Ubique ad vias.
- Usu. Herba.
- Vires. Adhibetur ad contractiones artuum, quæ cum dolore conjunguntur, & fascino vulgo tribuuntur; balnea ad rhachitidem puerorum etiam ingreditur. Videtur cum Betonica viribus convenire.
- Sigillum Salomonis, Polygonatum Off.
- Polygonatum latifolium vulgare C. B.
- Polygonatum & Sigillum Salomonis BLACKW. Tab. 251.
- Polygonatum caule simplici, cernuo, foliis ovato-lanceolatis, petiolis multifloris HALL. *Hist.* n. 1243.
- Convallaria multiflora LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 452.
- Gall. Seau de Salomon.
- Germ. Weisswurz, Schminke-wurz.
- In sepibus, & sylvis crescit.
- Usu. Radix dulcis, subacris, viscida.
- Vires resolventes; externe in cataplas-
- U u

aplasmate ad loca inflammata, hernias, dolores ischiadicos. Interne ad fluorem album & tussim commendatur & inter cosmetica refertur.

Siler montanum, Sefeli Masiliense Off.

Ligusticum quod Sefeli officinarum C. B.

Sefeli BLACKW. Tab. 426.

LasERPitium foliis duplicatopinnatis, pinnulis integerimis, lanceolatis, simplicibus & ternatis HALL. Hist. n. 794.

LasERPitium Siler LINN. Sp. pl. T. I. p. 357.

Gall. Sefeli de Marseille.

Germ. Bärwurz, Bergkummel.
In rupibus montium altiorum etiam *Helvetiæ* frequens.

Usu. Radix aromatica & Semina.
Vires carminativæ, diureticæ, alexipharmacæ; Radix alpicolis inservit pro apophlegmatismo in odontalgia.

Siliqua dulcis, Ceratonia, Caroba Off.

Siliqua edulis C. B.

Carobe, Siliqua BLACKW. T. 209.

Ceratonia Siliqua LINN. Sp. plant. T. II. p. 1513.

Gall. Carouge.

Germ. Johannisbrodt, Soodtbrot, Bockshörnlin.

Habitat in *Sicilia* & *toto Oriente*.

Usu. Siliquæ seu fructus compressi, paulum intorti, digito longiores, pollice latiores, fusci, splendentes; constant pulpa carnosa, rufa, dulci, sub qua latitant in loculis membranaceis nuclei plani, compressi, orbiculati, lucidi, fusci.

Vires demulcentes, incrassantes, edulcorantes; hinc ad tussim, so-

dam, morbos pectoris adhibentur.

Simaruba Off.

Cortex est ex albo flavescent, odoris nullius, saporis amari, ingrati, constat ex fibris lentescentibus, adhærentibus ligno candido levissimo, insipido radicum, stipitum, & trunci, a quo facile separatur. Arbor quæ hunc corticem producit, creditur esse

Terebinthus major, betulæ cortice, fructu triangulari SLOAN. Jamaic. T. II. p. 89. T. 199. CATESB. Carol. T. I. p. 30. T. 30.

Bursera gummifera LINN. Sp. plant. T. I. p. 471.

Crescit in *America* calidiore.

Vires adstringentes, roborantes, quam maxime celebres in dysenteria, alvique fluxu pertinaci, post evacuantia rite præmissa.

Sinapi album Off.

Sinapi Apii folio C. B.

Sinapi album siliqua hirsuta semine albo & rubro IOH. BAUH. T. II. p. 856.

Sinapi album BLACKW. T. 29.

Sinapi filiquis hispidis, rostro obliquo longissimo HALL. Hist. n. 466.

Siuapis alba LINN. Spec. plant. T. II. p. 933.

Gall. Moutarde blanche.

Germ. Weisser Senf.

In ruderosis sponte crescit in *Germania*, rarius adpud nos.

&

Sinapi rufum Off.

Sinapi rapi folio C. B.

Sinapi filiqua latiuscula glabra, semine rufo seu vulgare IOH. BAUH. T. II. p. 855.

Sina-

Sinapi BLACKW. Tab. 446.

Sinapi Siliquis tetragonis
glabris HALL. *Hist.* n. 465.

Sinapis nigra LINN. *Spec. plant.*
T. II. p. 933.

Gall. Moutarde rouge.

Germ. rother Senf.

Passim apud nos sponte crescit.

Ufu. Utriusque Semina, saporis
ignei, exurentis.

Vires stimulantæ, attenuantes,
diuretici; ad chlorosin, mor-
bum hypochondriacum, ca-
chexiam aquosam, hydropem,
paralysin commendantur, ut &
ad scorbutum; extus ad sina-
pismos adhibentur; & cum mu-
sto in electarium diæticum pa-
rantur.

Sifon vide Amomum vul-
gare.

Smaragdus Off.

Gemma pellucidissima, du-
ritie quinta, colore viridi
in igne permanente WALL.
Mineral. p. 156.

Borax (Gemma nobilis) la-
pidosus, prismaticus, pel-
lucidus; pyramidibus
truncatis LINN. *Syst. Nat.*
T. III. p. 94. Variet δ , five
viridis.

Gall. Emeraude.

Germ. Smaragd.

Ex India orientali & occidentali af-
fertur, quorum ille præstantior
est, durior, grata viriditate splen-
dens; sed & in variis montibus
Helvetiæ reperitur species palli-
de virens, quæ Smaragdus mon-
tanus spurius dici potest.

Vires olim ex superstitione tribue-
bantur mirabiles, præsertim hæ-
morrhagias, hæmorrhoides, &
dysenteriam sistentes.

Smiris, Smyris, Smeryllus
Off.

Ferrum mineralisatum, mi-
nera durissima, rapaci, so-
lida, magneti refractaria,
colore fusco vel ferreo
WALLER. *Mineral.* p. 344.

Ferrum (Smiris) retracto-
rium, rubricosum, vi-
trum arans LINN. *Syst. Nat.*
T. III. p. 139.

Gall. Emeri.

Germ. Smirgel.

Est substantia metallica, ferruginea,
ponderosa, colore ad nigredinem
tendente, adeo dura, ut ea Gem-
marii ad gemmas scalpendas,
& fabriferrarii ad chalybea ope-
ra expolienda utantur.

In mineris ferri reperitur.

Vires. Ad dentifricia olim com-
mendabatur, sed dentes nimis
deterit.

Soda, Soda hispanica Off.

Gall. Soude, Soude en pierre,
Soude d'Alicante.

Germ. Spanisches Aschensalz.

Est substantia salina cæruleo-cine-
rea, spongiæ ad instar intus & ex-
tus porosa, sicca, atque tinniens,
vix unquam pura; paratur sola
calcinatione ex plantis variis sal-
fis in locis maritimis crescenti-
bus, præcipue ex Salicornia
herbacea LINN. *Spec. pl.* p. 5.
& Salsola Soda EJUSD. pag.
323.

Vires, quæ salium alcalinorum fi-
xorum, acidum domantes, glu-
tinosa dividentes, urinam pel-
lentes; ad usus mechanicos e-
tiam adhibetur.

Solanum furiosum vide Bel-
ladonna.

Solanum scandens vide Dul-
camara.

Solanum vulgare Off.

Solanum officinarum C. B.

U u 2

So-

Solanum hortense BLACKW.
Tab. 107.

Solanum caule inermi, herbaceo, foliis dentato angulatis, umbellis nutantibus HALL. *Hist.* n. 576.

Solanum nigrum LINN. *Spec.* p. 266.

Gall. Morelle.

Germ. Nachtschatten, Saukraut.
Ubique ad vias.

Usu. Folia.

Vires narcoticæ, venenatæ; ex ejus usu gallinæ pereunt, & in pueris deliria & nervorum distentiones fuerunt exortæ. Externe vi anodyna gaudet, & inflammationibus adhibetur.

Soldanella, *Brassica marina* Off.

Soldanella marina minor C. B.

Brassica marina CAMER. *Epit.* p. 253.

Convolvulus (*Soldanella*) foliis reniformibus, pedunculis unifloris LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 226.

Gall. Soldanelle, Chou marin.

Germ. Meerwinde, Meerkohl, Schottisch Löfelkraut.

Crescit ad littora maris mediterranei.

Usu. Folia succo lacteo acri turgentia.

Vires purgantes, drastrictæ, hinc rarius in usu.

Sonchus Off.

Sonchus lævis laciniatus latifolius C. B.

Sonchus lævis BLACKW. Tab. 130.

Sonchus foliis amplexicaulibus, dentatis, integris,

& semipinnatis, calycibus levibus HALL. *Hist.* n. 21.

Gall. Laitron doux, Palais de Lievre.

Germ. Gansenkohl.

&

Sonchus asper BLACKW. Tab. 30.

Sonchus asper laciniatus & non laciniatus C. B.

Sonchus foliis amplexicaulibus, rigidis, integris & semipinnatis, calicibus levibus HALL. *Hist.* n. 21.

Gall. Laitron epineux.

Germ. Gänsedistel.

Conjungit ambas species LINNÆUS sub sequenti nomine

Sonchus oleraceus LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 116.

Utraque planta locis ruderosis, in hortis, agris & vineis frequens.

Usu. Folia succo lacteo, amaro, saponaceo referta.

Vires saponacæ, aperientes, solventes, æque ac Cichorei, licet minus in usum recipi solent. Succus juscula medicata quandoque ingreditur.

Sophia Chirurgorum Off.
Nasturtium sylvestre tenuifolium divisum C. B.

Sophia chirurgorum BLACKW. T. 440.

Sisymbrium pinnis & pinnulis pinnatis, laciniis linearibus subhirsutis HALL. *Hist.* n. 484.

Sisymbrium Sophia LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 920.

Gall. Talitron.

Germ. Wallsaamen, Sophienkraut.

Crescit apud nos ad limites agrorum v. g. versus *St. Louis*.

Usu. Herba & Semina.

Vi-

Vires habentur vulnerariæ, adstringentes & abstergentes. *Semina* diuretica audiunt. Sed apud nos nullo in usu est.

Sorbus acuuparia Off.

Sorbus sylvestris foliis domesticæ similis C. B.

Sorbus torminalis BLACKW. Tab. 173.

Mespilus foliis pinnatis, utrinque glabris HALL. *Hist.* n. 1091.

Sorbus aucuparia LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 684.

Gall. Sorbier sauvage.

Germ. Vogelbeeren, Quirtschbeeren.

In sylvis non rara.

Usu. Baccæ farinosæ, austeræ. *Vires* adstringentes. Roob inde passim paratur acre, fudoriferum.

Sphondylium vide *Branca ursina vulgaris*.

Spica, vide *Lavandula*.

Spica celtica, *Nardus celtica* Off.

Nardus celtica Dioscoridis C. B.

Valeriana foliis integerrimis, radicalibus ovatis, caulinis linearibus obtusis, HALL. *Hist.* n. 109.

Valeriana celtica LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 46.

Gall. Nard celtique.

Germ. Celtische Narden, Maria Magdalena-Kraut.

In *Alpibus Helveticis* nascitur.

Usu. Radix fibrosa, capillaris, rufescens cum squamis parvis ex viridi flavescentibus; sapore acri, aromatico; odore fragrante.

Vires alexipharmacæ, stomachicæ, carminativæ, diureticæ; ad mor-

Pars I.

bos convulsivos videtur æque efficax vel & præstantior fore, ac *Valeriana sylvestris*; sed rarius in usu est.

Spica indica, *Nardus indica*, *Spica nardi* Off.

Gall. *Spica nard.*

Germ. Indranische Narden, Spick-Narden.

Ita vocatur congeries capillamentorum tenuium, convolutorum, capiti radices inhærentium, qui sunt filamenta foliorum marcidorum, & caulis, congesta in fasciculum digiti crassitie & longitudine, colore ferrugineo, sapore amaro, acri, aromatico, odore grato ad cyperum accedente. Planta ipsa, nondum rite cognita, putatur esse

Calamus odoratus Matthioli C. B.

Gramen cyperoides, aromaticum, indicum BREYN.

Prodr. II. p. 69.

Lagurus paniculæ racemis supradecompositis proliferis LINN. *Mat. Med.* p. 11. n. 32.

Andropogon Schoenanthus LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1481.

Provenit in *India orientali*.

Vires stomachicæ, cordiales, alexipharmacæ, anthelminticæ. Theriacam ingreditur.

Spina cervina, *Spina infectoria*, *Rhamnus catharticus* Off.

Rhamnus catharticus C. B.

Rhamnus catharticus, *Spina cervina* BLACKW. T. 135.

Rhamnus ramis spinosis, foliis ovato-lanceolatis, serratis HALL. *Hist.* n. 824.

Rhamnus catharticus LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 281.

Gall. Nerprun, Bourge Epine.

Germ. Creüzbeer, Wegdornbeer.

X x

Ad

Ad sepes & in dumetis passim crescit.

Usu. Baccæ saporis amaricantis & nauseosi.

Vires purgantes, in hydrope, rheumatismo celebratæ; revera autem præ aliis nil eximium habent, potius tormina ficcitatem & sitim procreare solent. In arte tinctoria etiam adhibentur & pigmentum Succus viridis, *Germ.* Saftgrün dictum inde paratur.

Spongia Off.

Spongia globosa C. B.

Spongia ad usum præstantissima, foraminibus exiguis pervia TOURNEF. I. R. H. p. 575.

Spongia officinalis LINN. *Sp. pl. Ed. I.* p. 1169.

Spongia (officinalis) foraminulata, subramosa, difformis, tenax, tomentosa LINN. *Syst. Nat. T. I.* p. 1298.

Spongia polymorpha compressa sublobata, tomentosa, porulenta PALLAS. *Elench. Zoophyt.* p. 387.

Gall. Eponge, Fragments d'Eponge.

Germ. Schwamm, Bad-Schwamm, minora frusta s. fragmenta Kropf-Schwammlein dicuntur.

Reperitur in mari Mediterraneo, Rubro, forte & Indico.

Substantia mollis ex tomento quodam facta, panno laneo, seu agarico mollito natura subfimilis, inæqualiter cavernosa, fulvo-grisea, odoris combusti animalis. Est Zoophyton cui simplices in superficie pori polyporum loco sunt, cuique inhabitat animal ambiguum, crescens, torpidissimum, hinc magis ac reliqua Zoophyta ad vegetabilia accedit.

Vires. Magis inservit usui œconómico & chirurgico, quam medico; ad strumas tamen frequentissime nostris in oris adhibetur in decocto, aut combusta in pulverem redacta vel aquæ infusa.

Spongiæ lapis Off. & BESLER. *Mus.* Tab. 28.

Eschara lapidea membranacea, lamellis simplicibus, undulato-turbinatis, cumulatis, cellulis feriatis PALLAS *Elench. Zooph.* p. 45. n. 11.

Cellepora (Spongites) lamellis simplicibus, undulato-turbinatis, cumulatis, cellulis feriatis, osculo marginato LINN. *Syst. Nat. T. I.* p. 1286.

Gall. Pierre d'Eponge.

Germ. Schwammstein, nostrat. Kropfstein.

In Mari Mediterraneo & Americano testis & rupibus adhæret in massulis informibus.

Est substantia fragilissima tenera, griseo-alba, constans membranis lapideis expansis, turbinatis, formantibus cellulas per series longitudinales dispositas, osculo ad alterum latus declinato instructas, quas inhabitat animalculum seu Polypus Hydræ similis, cirrhis numerosis circa caput dispositis instructum.

Vires diureticiæ, absorbentes, ad strumas sanandas efficaces.

Squilla, Scilla Off.

Scilla vulgaris, radice rubra C. B.

Scilla hispanica CLUS. *Hist. pl.* p. 171.

Scilla (maritima) nudiflora, bract.

bracteis refractis LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 442.

Gall. Scille, Oignon marin.

Germ. Meerzwiebel, Mauszwiebel.

Crescit in littoribus arenosis *Hispania*, *Sicilia*, insularum *Archipelagi*.

Usu. Radix acris, amara, nauseosa, cutim diutius tractata exulcerans.

Vires stimulantés, incidentes, attenuantes, diuretici, sudoriferæ, imo emeticæ, & purgantes, ad mucum viscidum primas vias vel & pulmones obsidentem resolvendum summe efficaces; hinc in asthma, hydrope, ictero merito commendatur.

Stannum, Jupiter, Plumbum album Off. WALLER.
Miner. p. 383.

Gall. Etain.

Germ. Zinn.

Est metallum molle imperfectum, candidum, splendens cum livore quodam, fragile, & cum varie complicatur stridens, omnium levissimum, cito ad ignem fluens.

Mineræ Stanni passim in *Anglia*, *Germania*, *Bohemia*, &c. occurrunt. Optimum censetur Anglicum.

Vires. Olim specifica virtute præditum esse credebatur ad morbos uteri & pulmonum, sed hæ vires ipsi hodie plenarie denegantur. Ad tæniam expellendam valere varia experimenta prostant, nec tamen semper cum successu datur.

Staphisagria, Herba pedicularis Off.

Staphisagria C. B. & BLACKW.
Tab. 265.

Delphinium (*Staphisagria*) nectariis diphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis, lobis obtusis LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 750.

Gall. Staphisaigre, Herbe aux poux.

Germ. Lauskraut, Speichelkraut, nostr. Stephe-Saamen.

Habitat in *Italia* & *Creta*.

Usu. Semina nigra magna, saporis nauseosi, amari, urentis.

Vires purgantes sursum & deorsum, drasticæ, hinc non in usu. Ad pediculos vero necandos vel in pulvere vel in linimento cum fructu adhibentur.

Stibium vide Antimonium.

Stincus marinus vide Scincus marinus.

Stœchas arabica Off.

Stœchas purpurea C. B.

Stœchas arabica vel purpurea BLACKW. Tab. 241.

Lavandula (Stœchas) foliis lanceolato-linearibus, spica comosa LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 800.

Gall. Stœchas arabique.

Germ. Arabischer Stœchas, welscher Lavandel.

In *Hispania*, *Lusitania*, *Gallia* calidiori crescit.

Usu. Summitates floridæ, oblongæ, squamatae purpurascentes, saporis subacris, amaricantis, odoris fragrantis, grati.

Vires nervinæ, stimulantés, roborantes, incidentes.

Stœchas citrina Off.

Elichrysum seu Stœchas citrina latifolia C. B.

Stœchas citrina BLACKW. Tab. 524.

Guaphalium (arenarium) herbaceum, foliis lanceolatis, inferioribus obtusis, caule simplicissimo, corymbo composito LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1195.

Gall. Stœchas citrin.

Germ. Mottenkraut, Reinblumen, Winterblumen.

In *Germania* ubique in arenosis frequens, in *Helvetia* haud sponte nascitur.

Usu. Flores leniter amaricantes. *Vires* adstringentes, exsiccantes, aperientes, sudoriferæ, diureticæ; suffitus laudatur ad rheumatismum.

Storax, Styrax Off.

Styrax CAMER. *Epit.* p. 38.

Styrax folio mali cotonei C. B.

Styrax officinale LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 635.

Gall. Storax.

Germ. Storaxbaum.

Provenit in Orientalibus regionibus *Syria*, *Judæa* &c.

Usu. Resina ex vulnerato arbore stillans, cujus variæ species in officinas receptæ sunt, nempe

I. Storax calamita verus, Storax vel Styrax in granis Off.

Gall. Storax en larmes.

Germ. Storax in Röhren, feiner Körnichter Storax.

Est substantia resinosa, nitens, solida, nonnihil pinguis, ex candicantibus & rufescentibus granis concreta, sapore subacri, resinoso, odore fragrantissimo; olim in arundinibus afferebatur, *calamita* inde dicta. Hæc vera est Styracis arboris resina ex incisuris stillans & ad ipsam arborem exsiccata, ob carita-

tem vero vix in officinis nostris reperiunda.

2. Storax calamita vulgaris, seu in glebas compactus, ruber Off.

Gall. Resine de Storax, Storax calamite ordinaire.

Germ. Storax in Klumpen, rother Storax.

Est massa rubra vel ex fusco-rufescens, levis, fragilis, parum resinosa, interspersis passim albis & rufescentibus granis; multis plerumque sordibus inquinata, odoris & saporis ejusdem cum priore, modo debilioris. Hæc, cum lignosa scobe aliisque quisquiliis permixta sit, videtur coctione obtineri.

3. Scobs Styracina Off.

Gall. Sarrilles de Storax.

Germ. gemeiner Storax.

Scobs lignea, nonnihil resinosa, odore Styracis perfusa, ad usum medicum inutilis.

4. Storax vel Styrax liquida vera Off.

Gall. Storax liquide vrai.

Germ. Echter flüssiger Storax.

Est balsamus pinguis, tenax, melles, fuscus vel rufescens, odoris validi, saporis subacris, aromatici, oleosi.

Vera est Styracis resina, fluida adhuc, qualis sponte vel ex tenerioribus incisuris stillat, & rarissime, si unquam in officinis reperitur.

5. Storax s. Styrax liquida vulgaris Off.

Gall. Storax liquide commun.

Germ. Gemeiner flüssiger Storax.

Est substantia semifluida Terebinthinæ vel mellis consistentia, impura, fusca vel cinerea, odoris fortis, saporis acris, aromatici.

Arte

Arte factum est crediturque esse compositum quid ex Storace vino vel oleo soluto & Terebinthina veneta permixto.

A nonnullis etiam Styracis fluidæ nomine insignitur Ambra liquida suo loco jam dicta.

Vires omnibus Styracis speciebus eadem, balsamicæ, ad renum & vesicæ ulcera, asthma, tussim, raucedinem &c. sed rarius interno dantur. Externe cucuphas, balsama, unguenta, emplastra ingrediuntur & ad suffimenta etiam frequentissime adhibentur.

Stramonium, Datura Off.

Solanum pomo spinoso oblongo, flore albo c. B.

Stramonium BLACKW. Tab. 313.

STOERCK. in *Libello de Stramon.* &c. p. 1. seqq. Tab. 1.

Stramonium foliis angulosis, fructu erecto, muricato, calyce pentagono HALL. *Hist.* n. 586.

Datura Stramonium LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 255.

Gall. Pomme epineuse, Stramonium.

Germ. Stechapfel.

Ad vias, juxta fimeta haud infrequens.

Usu. Semina.

Vires narcoticæ, stupefacientes, venenatæ, deliria convulsionesque excitat; extus scopo anodyno ad hæmorrhoides dolentes & ulcera cancrofa commendatur. Sed ILL. STOERKIUS succum expressum & inspissatum efficacem expertus est in mania, epilepsia & convulsionibus.

Suber Off.

Suber latifolium semper virens c. B.

Suber BLACKW. Tab. 193.

Pars I.

Quercus (Suber) foliis ovato-oblongis, indivisis, ferratis, subtus tomentosis; cortice rimoso, fungoso LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1413.

Gall. Liege.

Germ. Kord, Pantoffelholz.

Crescit in *Europa* calidiori.

Usu. Cortex.

Vires dicuntur adstringentes; olim ad diarrheam, aliosque fluxus compescendos adhibebatur.

Succinum, Carabe, Electrum

Ambarum citrinum Off.

Gall. Ambre jaune, Succin.

Germ. Agtstein, Bernstein.

Est substantia bituminosa, ficca, fragilis, pellucida, in terræ visceribus nata, flava, vel citrina, albicans, & fusca, saporis subacris, bituminosi, odoris dum accenditur fragrantis; attritu calefacta paleas & festucas attrahit.

Reperitur ad littora maris, præsertim Baltici, & ex montibus effoditur, & quidem præstantissimum in Borussia.

Usu. Succinum citrinum, quod plus olei continet, & album, quod minus olei, sed plus salis volatilis largitur.

Vires roborantes, nervinæ, in catarrhis, hysterica passione, fluore albo multum laudatæ, sed solum longe plus præstat, cum merito dubitare liceat, an a succis nostratibus satis dissolvi, sicque humorum massam ingredi queat; in suffitu adhibetur ad morbos uvulæ, uteri, ad catarrhos. Ad vernices etiam adhibetur.

Succisa, vide Morfus Diaboli.

Sulphur Off.

Y y

Gall.

Gall. Soufre.

Germ. Schwefel.

Est succus mineralis concretus, solidus, ficcus, friabilis, qui igne liquefit, facile flammam concipit, cæruleam, emittitque odorem gravem, subtilem & acidum, pulmonibus & naribus infestum. Variæ dantur sulphuris species, ratione originis, coloris, atque substantiæ.

1. Sulphur vivum, nativum & virgineum Offic. quod ignem non expertum est.

Sulphur nativum parum flavum WALL. *Mineral.* p. 270. n. 1.

Gall. Soufre vis.

Germ. Lebendiger, oder gediegener Schwefel.

Tale duplex reperitur sc. pellucidum quod vel in massulis duris, citrinis aut subviridibus, splendentibus, vel sub glebarum argillacearum specie coloris cinerei albicantis vel flavi effoditur, in *Helvetia*, *Italia*, variisque *Europæ* atque *Americæ* regionibus.

2. Sulphur citrinum, Sulphur vulgare Off.

Gall. Soufre jaune.

Germ. Gelber Schwefel.

Hoc factitium ignis ope varia arte elaboratur. Quibusdam in locis ex aquis decoquitur, alibi ex terra argillosa extrahitur, sæpissime vero ex Pyritis quibusdam tostione, & aliis operationibus educitur. Si ex minera extractum sulphur nondum rite fuerit purgatum, denuo funditur in vasis ferreis, & adjecto olei lini aliquantulum, decoquitur, dein vel in massas grandiores coagulatur (Souffre en masse) vel in tubos ferreos oleo illitos infunditur, unde formam baculorum obtinet diciturque Soufre en canons.

Stöcklein Schwefel. Sulphur sic purgatum est vel flavum, vel subviride.

3. Sulphur caballinum Off.

Gall. Soufre grossier.

Germ. Roßschwefel.

Hoc reliquis minus purum, grisei coloris, secum ad instar post sulphuris citrini purificationem remanere solet; a veterinariis in usum trahitur.

Ad usum medicum, præcipue internum, eligitur sulphur arte factum, citrinum, aurei coloris, quod facile frangitur, & digitorum attritu, quasi crepitando friabile est; repudiatur, quod fordide flavescit.

Vires resolventes, demulcentes, diaphoreticæ; laudatur in tussi, asthmate, morbis cutis; a sulphure assumpto perspiratio foetida est; ab ejus continuato usu alvus laxatur; externe in intertrigine, ulceribus ichorosis & scabie exsiccat & repellit.

Sumach Off.

Rhus folio ulmi C. B.

Rhus obsoniorum BLACKW. Tab. 486.

Rhus (coriaria) foliis pinnatis, obtusiuscule ferratis, ovalibus, subtus villosis LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 379.

Gall. Sumach.

Germ. Gerberbaum, Färberbaum.

Provenit in *Europa* calidiori, *Syria*, *Palæstina*, apud nos quandoque in hortis colitur.

Usu. Semina vel Baccæ, coloris rubri, orbiculatæ.

Vires adstringentes, validæ, sed magis ad usus mechanicos quam medicos adhibentur.

Symphytum vide Consolida major.

Taba-

T.

T Abacum vide Nicotiana.

Tacamahaca Gummi Off.

Est resina ficca, fragilis, ex albo, flavicante, fusco & rubro varia, odore fragranti, sapore balsamico, resinoso. Advehitur in magnis frustis ex *America*, & *Arbor*, ex qua vulnerata balsami liquidi instar promanat, vel ex tenellis summitatibus sponte exsudat, vel & decoctione corticis, ramusculorum & foliorum obtinetur, putatur esse

Populus foliis ovatis, acutis, ferratis *GMELIN. Flor. Sibir. Tom. I. p. 152. Tab. 33.*

Populus nigra, folio maximo, gemmis balsamum odoratissimum fundentibus *CATESB. Carolin. T. I. p. 34. T. 34. DU HAMEL. Trait. des Arbr. T. II. p. 178. ic. p. 182.** f. 6.*

Populus (balsamifera) foliis subcordatis, denticulatis *LINN. Spec. pl. T. II. p. 1464.*

Crescit in *Sibiria* & *America* septentrionali.

Vires roborantes, discutientes, anodinæ. Adhibetur in suffitu ad odontalgiam, aurium dolores, rheumatismum &c. in emplastro ad cephalalgiam, vertiginem, vomitum, cardialgiam, colicam &c.

Datur & alia *Tacamahacæ* species liquidior, quæ olim in parvis cucurbitis adferebatur & a *Gallis* *Tacamahac* en coque vocabatur. Hodie vix amplius in officinis reperitur. *Arbor*, unde obtinetur, vocatur

Arbor populo similis resinosa altera c. B.

Tacamahaca Populo similis, fructu colore similis *Poeoniæ* *JOH. BAUH. T. I. p. 147.*

Elaphrium foliis tomentosis *JACQUIN. Stirp. Americ. p. 105. Tab. 71. fig. 1. 2. 3.*

Fagara (octandra) foliolis tomentosis *LINN. Mantiss. ad Edit. II. Spec. plant. p. 40.*

In *America* meridionali, *Curacao* &c. provenit.

Tamarindus Off.

Tamarindus *RUMPH. Herb. Amb. T. II. pag. 90. Tab. 23.*

Tamarindus *Derelside* vocata *ALPIN. pl. Aegypt. p. 15. c. icone pag. 156.*

Siliqua arabica, quæ *Tamarindus* c. B.

Balam-pulli seu *Maderam-pulli* *RHEED. Hort. Malab. pag. 39. fig. 23.*

Tamarindus indica orientalis *BLACKW. Tab. 221.*

&

Tamarindus *EJUSD. Tab. 201.* occidentalisquæ nonnisi fructus figura aliquantisper recedit.

Tamarindus indica *LINN. Spec. plant. T. I. p. 48.*

Gall. Tamarin.

Germ. Tamarindenbaum.

Crescit hæc arbor in *Arabia*, *Aegyptio*, *India orientali* &c.

Usu. Fructus maturi s. filiquæ longæ, rectæ vel incurvæ, pulpa farctæ nigricante, glutinosa, saporis acidi, subadstringentis. Doliis quam arctissime impactæ & in massam nigram, pulpa, seminibus, & lignosis filiquæ corticis frustulis inter se permixtis constantem, redactæ ad nos afferuntur.

Vires laxantes, refrigerantes, ob acidam naturam in biliosis morbis, nidorosis primarum viarum cruditatibus, morbis putridis, acutis egregii usus.

Tamariscus Off.

Tamarix altera folio tenuiore f. *Gallica* C. B.

Tamariscus narbonensis LOBEL. *Icon.* p. 218.

Tamariscus BLACKW. Tab. 331.

Tamarix (gallica) floribus pentandris LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 386.

Gall. *Tamaris*.

Germ. *Tamariske, französischer Tamariskenbaum.*

In calidiori *Europa, Gallia, Hispania*, &c. provenit.

Et

Tamarix fruticosa folio crassiflore f. *Germanica* C. B.

Tamariscus germanica LOBEL. *Icon.* p. 218.

Tamariscus spicis foliosis HALL. *Hist.* n. 948.

Tamarix (germanica) floribus decandris LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 387.

Gall.

Germ. *Deutscher Tamariskenstrauch.*

Abunde hæc species apud nos in arenosis litoribus *Birsæ & Rheni* occurrit.

Ambæ species indiscriminatim officinales sunt.

Usu. Folia, Cortex, ambo amara.

Vires adstringentes, tonicæ, aperientes, diureticæ. Rarius apud nos in usum venit.

Tanacetum Off.

Tanacetum vulgare luteum C. B.

Tanacetum BLACKW. T. 464.

Tanacetum foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, acute dentatis HALL. *Hist.* n. 132.

Tanacetum vulgare LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1184.

Gall. *Tanésie.*

Germ. *Rheinfarn.*

In arenosis fluviorum litoribus & ad viarum aggeres passim occurrit.

Usu. Folia, Flores & Semen, omnia amarissima.

Vires calefacientes, roborantes, stomachicæ, sudoriferæ, diureticæ, emmenagogæ, anthelminticæ.

Taraxacum, Dens Leonis Off.

Dens Leonis latiore folio C. B.

Dens Leonis BLACKW. T. I. & Tab. 501. hic melius.

Taraxacum calycibus glabris, squamis imis reflexis HALL. *Hist.* n. 56.

Leontodon Taraxacum LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1122.

Gall. *Pissenlit, Dent de Lion.*

Germ. *Pfaffenröhrlin, Butterblume, nostraribus etiam Seichblume.*

Vulgatissima planta in pratis & ad vias.

Usu. Folia & Radix lacteo & amaro succo turgentia.

Vires saponacæ, diluentes, temperantes, resolventes, diureticæ, hinc in obstructionibus pulmonum, ictero, nephritide, scabie, febribus intermittentibus &c. efficaces. Sed omnino præstat totam plantam recentem vel ejus succum adhibere.

Tartarus crudus albus & ruber Off.

Gall. *Tartre blanc & rouge.*

Germ.

Germ. Weisser und rother Weins-
stein.

Est sal essentialiale vini acidum cum
terrestribus & oleosis particulis
permixtum. Pro vini indole
plus minus copiose ad latera
doli deponitur.

Vires. Cum acidæ sit indolis, in
alcalina acrimonia, biliosa & pu-
trida primarum viarum saburra
convenit. Sed rarius crudus
adhibetur. Multifaria inde pro-
ducta & composita in altera par-
te occurrent.

Taxi Axungia Off.

Gall. Graisse de Blaireau.

Germ. Dachschmalz.

Animal ipsum vocatur

Meles GESNER. *de Quadruped.*

Taxus JONSTON. *Quadruped.* T.
64.

Ursus (Meles) cauda conco-
lore, corpore supra cine-
reo, subtus nigro, fas-
cia longitudinali per o-
culos auresque nigra
LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 70.

Gall. Blaireau.

Germ. Dachs.

Habitat in sylvis inter lapides &
rupium rimis & cavernis.

Vires. Vix videtur alias habere
ac reliquæ pinguedines.

Taurus, Bos Off.

BOS GESN. ALDROVAND. & omn.
fere autor.

Bos (Taurus) cornibus te-
retibus extrorsum cur-
vatis, pallearibus laxis
LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 98.

Gall. Bœuf, Taureau.

Germ. Och, Stier.

Usu. Fel inspissatum & Pria-
pus.

Vires. Bilis inspissata, amara,
saponacea, stimulat, abstergit,
Pars I.

resolvit, hinc in morbis pi-
tuitosis, a bilis defectu five
inertia ortis, ictero, hydrope
&c. prodest. Ventriculum eti-
am roborat, alvum solvit &
vermes pellit. Priapus tan-
quam adstringens ad diarrhœam
& dysenteriam laudatur in pul-
vere datus. Utrumque tamen
rarius nostris in oris adhibe-
tur.

Telephium, Crassula, Fa-
baria, Anacampseros Off.

Telephium vulgare C. B.
&

Telephium purpureum ma-
jus & minus EJUSD.

Telephium album FUCHS. *Hist.*
p. 800.

Crassula, Fabaria BLACKW.
Tab. 191. fig. 2.

Sedum androgynum foliis
confertis, ferratis, flori-
bus dense umbellatis
HALL. *Hist.* n. 954.

Sedum Telephium LINN. *Sp.*
pl. T. I. p. 616.

Et

Telephium latifolium pere-
grinum C. B.

Crassula, Fabaria BLACKW.
Tab. 191. fig. 1.

Sedum foliis ovatis, denta-
tis, conjugatis, ramis um-
bellatis HALL. *Hist.* n. 955.

Juxta LINNÆUM varietas est præ-
dentis, quo tamen manifestissi-
me & vere differt.

Gall. Orpin, Reprise.

Germ. Fette Henne, Wund-
kraut, Knabentrout, Don-
nerbart.

Prior species apud nos in agris,
vinearum semitis, ad vias &
in sylvis passim occurrit, poste-
rior in muris & rupibus cali-
dioris Helvetiæ provenit.

Z z

Usu.

Usu. Folia crassa, succulenta, five eorum Succus.

Viribus cum sedo convenit; laudatur tanquam refrigerans, adstringens, vulnerarium, ad falsos pectoris morbos, dysenteriam, hæmorrhoides, urinæ ardorem, vulnera.

Terebinthina Off.

Hoc nomine variæ veniunt Resinæ liquidæ, vel Balsami species sponte vel ex incisis diversis arboribus stillantes. Sequentes vulgo in officinis notæ sunt.

1. Terebinthina de Cypro five Chia Off.

Gall. Terebenthine de Chio.

Germ. Cyprischer Terpentın.

Est Balsamus resinoso-oleosus consistentiæ melleæ, coloris ex albo-flavicantis, viridescens vel cœruleo-fulvus, odoris balsamici, grati, saporis acris, amari, resinosi. Arbor, unde stillat, vocatur.

Therebinthus vulgaris C. B.

Terebinthus BLACKW. T. 478.

Pistacia (*Terebinthus*) foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1455.

Crescit in *Hispania*, *Italia*, *Gallia*, insulis *Archipelagi* aliisque orientalibus regionibus.

Vix hodie amplius in officinis nostris reperitur genuina Terebinthina cypria, cum in ipsis, ubi colligitur, locis cara sit & ad adulteranda balsama adhibeatur.

2. Terebinthina veneta Off.

Gall. Terebinthine de Venise.

Germ. Venetianischer Terpentın.

Fluidior est reliquis, magis oleosa & pellucida, flavescentis, & præcedenti substituitur.

Arbor, unde colligitur creditur esse.

Larix C. B. BLACKW. Tab. 477.

Pinus foliis fasciculatis, deciduis HALL. *Hist.* n. 1658.

Pinus (*Larix*) foliis fasciculatis, obtusis LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1420.

Gall. Melese.

Germ. Lerchenbaum.

In *alpinis*, *helveticis* aliisque provenit.

3. Terebinthina Argentoratensis Off.

Gall. Terebinthine de Strasbourg.

Germ. Straßburger Terpentın.

Hæc liquida est & reliquis ab

ILL. HALLERO & aliis præfertur. Colligitur ex vesicis, quæ sponte per corticem *Abietis* albæ efflorescunt.

4. Terebinthina vulgaris, communis Off.

Gall. Terebentine commune.

Germ. Gemeiner Terpentın, nostr. Clory.

Impurior est, crassior, opaca, ex flavo rufescens, odoris ingrati, saporis nauseosi, amari.

Obtinetur ex *Pinu sylvestri*, & *Abiete rubra*.

Vires Terebinthinæ calefacientes, balsamicæ, diureticæ, vulnerariæ, hinc in ulceribus renum & vesicæ, phthisi, tabe, inveteratis alvi fluxibus, gonorrhæis &c. prodest. Urinam quandoque etiam salivam odore violaceo inficit. Externe varia emplastra, balsama & unguenta ingreditur.

Terræ sigillatæ Off.

Gall. Terres sigillées.

Germ. Siegel Erden.

Sunt Boli variæ; albæ, fuscæ, flavæ, rubræ, griseæ &c. in trochiscos formatæ & sigillo insignitæ pro diversitate locorum, ubi eruuntur, diverso.

Tales sunt alba & rubra Turcica

rubra Turcica, Melitenfis, Goldbergensis, Strigonienfis &c.

Vires easdem habent, quæ Boli & Terra Lemnia, ficcantes nempe & adstringentes.

Terra Tripolitana, Tripolis Off.

Glarea indurata, cohærens, aspera WALLER. *Mineral.* p. 44.

Argilla (Tripolitana) scabra, nitidula, flavescens, aspera LINN. *Syst. Nat. T. III.* p. 202.

Gall. Terre de Tripolis.

Germ. Trippel, Trippelerde.

Est Argillæ sive Glareæ argillofæ species flavescens, flava vel grisea, variis ex regionibus ad nos allata.

Vires ficcantes ei adscribuntur, sed nostris in oris mechanico usui saltem infervit.

Terra viridis vide Viride montanum.

Tertianaria, Scutellaria Off.

Lysimachia cœrulea galericulata sive Gratiola cœrulea C. B.

Scutellaria RIVIN. *Monop. irreg.* Tab. 77.

Scutellaria Tertianaria dicta BLACKW. Tab. 515.

Cassida foliis oblonge cordatis, crenatis, verticillis nudis bifloris HALL. *Hist.* n. 280.

Scutellaria galericulata LINN. *Sp. plant. T. II.* p. 835.

Gall. Toque.

Germ. Cassida.

Ad rivulos & ora stagnorum provenit.

Usu. Folia amara, odoris debilis alii.

Vires scordii analogæ videntur sed debiliores; laudatur ad febres intermittentes; nostris officinis ignota.

Thea, Thea indica, Thea sinensis Off.

Hoc nomine ex *China* nobis advehuntur folia exsiccata & convoluta, fusca vel viridia; odoris grati, saporis amaricantis subadstringentis. Plurimæ varietates, sapore, colore, odore &c. discrepantes totidemque nominibus diversis insignitæ in tabernis venales prostant. quæ omnes in duas species primarias sive classes dividuntur, Theam nempe fuscam & Theam viridem.

1. Thea fusca, Thea Bohea.

Gall. Thee Boye.

Germ. Theeboe, brauner Thee.

Fusca sive ex fusco-nigricans est.

Arbuscula, unde colligitur vocatur

Chaa herba in Japonia C. B.

Thea frutex folio Cerasi, flore Rosæ sylvestris, fructu unicocco, bicocco & ut plurimum tricocco KÆMPF. *Amœn. exot.* p. 605. c. ic. pag. 606.

Thea & Thea Sinensis BLACKWELL. Tab. 351. &

Thea frutex Bontii, Chaa BLACKW. Tab. 352.

Thea (Bohea) LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 734.

Crescit in Japonia & China.

2. Thea viridis.

Gall. Thee vert.

Germ. Grüner Thee.

Viridi colore suo a præcedente facile distinguitur.

Credebatur hætenus a præcedente non nisi præparatione s. exsiccatione paulo aliter instituta differre.

differre. Nonnulli vero recentiorum ab alio frutice desumi contendunt, qui appellatur

Thea (viridis) floribus enneapetalis HILL. *Exot. Tab.* 22. LINN. *Sp. plant.* T. I. pag. 735.

Habitat etiam in *China*.

Methodum & tempus folia ab arbore decerpenti, coquendi, ustulandi, exsiccandi, convolvendi &c. docent BREYNIUS, KÆMPFERUS aliique.

Vires. Adeo hodierno tempore potus infusi foliorum Theæ per totam fere Europam & orientales regiones in consuetudinem abiit, ut vix inter medicamenta recenferi queat. Diluit, attenuat, aperit, urinam movet &c. Sed omnes forsam vel saltem plerique, quos edit, effectus, aquæ tepidæ & soluto in eâ saccharo adscribendæ sunt.

Thlaspi Off.

Thlaspi arvense filiquis latis C. B.

Thlaspi BLACKW. Tab. 68.

Nasturtium filiculis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris HALL. *Hist.* n. 511.

Thlaspi arvense LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 901.

Gall. **Thlaspi.**

Germ. Baurensenf, Pfenningkraut.

Inter segetes, in hortis & vineis abunde provenit.

Usu. Semen.

Vires. Ad Theriacam requiritur, nullius ceterum usus, nisi quod odore suo alliaceo detestando cimices aliaque insecta arcere dicatur.

Thus vide Olibanum.

Thymiamatis five **Thuris**

cortex, **Thus Judæorum** Off.

Gall. **Styrax Thymiana.**

Germ. Weyrauchrinde, Judensweyrauch.

Fragmenta sunt Corticis tenuia, levia, coloris ferruginei sive ex fusco-rufescentis, tomento albo passim adpersa, odoris fragrantissimi, saporis aromatici, acris, amaricantis.

Undenam desumatur hicce Cortex, qui nobis ex *India orientali* advehitur, nondum penitus constat. Plerique putant ipsius Storacis arboris corticem esse proprio suo balsamo perfusum.

Vires balsamicæ, cephalicæ, nervinæ, roborantes, sed vix nisi ad suffimenta & odoramenta adhibetur.

Thymallus vide *Aschia*.

Thymus creticus Off.

Thymus capitatus, qui *Dioscoridis* c. B.

Satureja (capitata) floribus spicatis, foliis carinatis, punctatis, ciliatis LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 795.

Gall. **Thym de candie.**

Germ. Cretischer Thymian.

In hortis colitur calidiorum regionum incola.

Usu. Summitates odoratæ, aromaticæ, uti tota planta.

Vires sequentis habet etiam in majori gradu, nostris tamen in Officinis non prostat.

Thymus vulgaris Off.

Thymus vulgaris folio tenuiore C. B. &

Thymus vulgaris folio latiore EJUSD.

Thymus BLACKW. Tab. 211.

Thynus (vulgaris) erectus, foliis revolutis, ovatis, flori-

Floribus verticillato-spicatis

LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 824.

Gall. Thym.

Germ. Thymian.

In Europa australi spontaneus in hortis nostris colitur.

Ufu. Folia, grate odorata, aromatica, acris, subamaricantis saporis.

Vires resolventes, discutientes, cephalicæ, nervinæ, carminativæ. In usum culinarium etiam cedit.

Tigliæ Grana Off.

Gall. Pignons d'Inde, Graine de Tilli.

Germ. Purgierkörner.

Sunt Semina ovato-oblonga, cinerea, glabra, nitentia, feminibus Ricini f. Cataputiæ majoris similia, saporis valde acris. Arbor, unde desumuntur, vocatur

Lignum Moluccense folio Malvæ, fructu avellanæ minore, cortice molliore & nigricante, Pavana incolis c. B.

Ricinoides indica folio lucido, fructu glabro, Grana Tiglia officinis dicto BURMANN. *Thes. Zeylan.* p. 200. Tab. 90.

Granum Moluccanum RUMPH. *Herb. Amboin.* Tom. IV. p. 98. Tab. 42.

Croton (Tiglium) foliis ovatis, glabris, acuminatis, ferratis, caule arboreo LINN. *Spec. pl.* T. II. p. 1426.

Habitat in India orientali.

Vires. Sursum & deorsum vehementissime purgant inter drastica fortiora numeranda, hinc non nisi in pertinacissimis morbis summa cum cautela adhibenda.

Pars I.

Ejusdem arboris lignum passim alibi in officinis sub nomine Ligni Moluccensis f. Pavani servatur, nostris in oris ignotum.

Eadem ipsi, quæ feminibus, vires, quando recens est. Exsiccatum vero & per aliquot jam annos servatum mitius fit, sudoriferum tunc & ad quartanas & hydropem laudatum.

Tilia Off.

Tilia femina folio majore & minore c. B. &

Tilia montana maximo folio EJUSD.

Tilia BLACKW. Tab. p. 469.

Tilia foliis cordato-lanceolatis, spongiolis ad nervorum folii angulos sessilibus HALL. *Hist.* n. 1030.

Tilia Europæa LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 733.

Gall. Tilleul.

Germ. Lindenbaum, Linde.

In sylvis crescit & passim in viis, compitis & ambulacris plantatur procera arbor.

Ufu. Flores gratum odorem spargentes.

Vires ipsis tribuuntur cephalicæ, nervinæ, roborantes, antepilepticæ.

Tormentilla Off.

Tormentilla sylvestris c. B.

Tormentilla BLACKW. T. 445.

Fragaria tetrapetala, foliis caulinis sessilibus, quinatis HALL. *Hist.* n. 1117.

Tormentilla erecta LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 716.

Gall. Tormentille.

Germ. Tormentill, Rubrwurz, Blutwurz.

A a a

In

In pascuis humidis, pratis udis,
& sylvis frequens.

Usu. Radix saporis adstringentis
cum aliquo aromate.

Vires valde adstringentes, robo-
rantes, vulnerariæ & merere-
tur reliquis adstringentibus ve-
getabilibus fere omnibus præ-
ferri.

Torna folis coerulea Off.

Est Succus cum calce & urina præ-
paratus & inspissatus fructuum
plantæ, quæ dicitur

Heliotropium tricoccum

C. B.

Ricinoides, ex qua paratur

Tournesol Gallorum

TOURNEF. *I. R. H.* p. 655.

NISSOL. *Mem. de Paris* 1712.
p. 337. T. 17.

Croton (tinctorium) foliis
rhombæis, repandis, cap-
sulis pendulis, caule her-
baceo LINN. *Spec. pl.* T. II. p.
1425. n. 6.

Gall. Heliotrope, Tournesol,
Herbe aux verruës.

Germ. Sonnenwende.

Crescit *Monpelii* & passim alibi in
Europa calidiori.

In glebas cubicas pulchre coëru-
leas, leves formatus hicce suc-
cus vocatur

**Lacca coerulea, Lacca musi-
ca, Laccmus Off.**

Gall. Tournesol en pâte, en
pain, en pierre, Orseille.

Germ. Laccmuß, blauer Lack,
Torniß.

Tinctoribus & condita parantibus
inservit.

Lintea vero hocce succo imbuta
vocari solent

Bezetta coerulea Off.

Gall. Tournesol bleu en dra-
peau.

Germ. Blau Schminkeflecklein,
oder Lapplein.

Eidem, cui lacca coerulea, infer-
vit usui.

**Torna Solis rubra, Bezet-
ta rubra Off.**

Gall. Tournesol rouge en
drapeau.

Germ. Rothe Schminkeflecklein,
Spanischer Flor.

Sunt lintea coccionella tincta. E-
ligenda saturate rubra, quæ ex
Turcia advehuntur.

Vires. Perinde etiam tinctoribus,
conditoribus, sexuique sequiori
ad fucum inserviunt.

**Tota bona vide Bonus
Henricus.**

Tragacanthæ Gummi Off.

Gall. Gomme Adragant.

Germ. Traganth.

Est gummi liccum, tenax, album,
ex albo-flavescens, subfuscum,
nigricans, odoris expers, sapo-
ris mucilaginosi, fatui, figuræ
variæ, granulofum, vermicu-
lorum instar contortum &c.

Stillat ex caudice vel ramis vul-
neratis Fruticis, qui vocatur

Tragacantha officinarum
C. B.

Tragacantha CAMER. Epit. p.
446. BLACKW. Tab. 264.

**Astragalus ramorum petio-
lis spinescens, pinna
impare nulla HALL. Hist. n.**
405.

Astragalus Tragacantha
LINN. *Spec. plant.* T. II. pag.
1073.

Gab. Epine de Bouc.

Germ. Tragacanthstaude, Tra-
gant, Bocksdorn.

In *Alpibus Helveticis* inque *Valesia*,
Hispania, *Sicilia*, *Syria*, toto-
que fere *Oriente*, etiam ad mare
circa *Massiliam* provenit.

Sed & ab alia *Tragacanthæ*
specie, quæ forte nonnisi va-
rietas est præcedentis, gummi
nostrum

nostrum in insulis *Archipelagi* colligi CEL. TOURNEFORTIUS auctor est. Vocatur ab eo

Tragacantha Cretica incana, flore parvo lineis purpureis striato COROLL. ad I. R. H. pag.

Vires easdem possidet ac gummi arabicum & leniendi, incrassandi, involvendi scopo in pectoris morbis, dysenteria &c. frequenter adhibetur. Inservit etiam ad consistentiam saccharo aliisque pulveribus conciliandam, ut trochisci, bacilli &c. inde formari possint. Eligendum album, purum, vermiculatum.

Tragopogon Off.

Tragopogon pratense luteum majus C. B.

Barbula hirci CAMER. *Epit.* p. 312.

Tragopogon foliis gramineis, carinatis, amplexicaulibus, caudatis, subcrispis, calyce flori æquali HALL. *Hist.* n. 8.

Tragopogon pratense LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1109.

Gall. Barbe de Bouc.

Germ. Haberwurz, nostrat. Habermarkt.

Ubique in pratis provenit.

Et

Tragopogon purpureo-cœruleum porri folio, quod Artifi vulgo C. B.

Barba hirci altera CAMER. *Epit.* p. 313.

Tragopogon foliis gramineis, amplexicaulibus, calyce florem superante HALL. *Hist.* n. 9.

Tragopogon porrifolium LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1110.

Gall. Serfisi, Salfisi.

Germ. Artesisi nostratibus dicitur.

Vulgo apud nos in hortis colitur.

Prior species f. pratensis passim a rusticis nostris primo vere in cibum recipitur gratum, salubrem, ægrotis quibuscunque convenientem.

Posterior similiter culinæ inservit, delicatior, etiam scorzonera præfertur, ejusque vices, si deficit, utraque commode supplere potest.

Tribulus aquaticus Off.

Tribulus aquaticus C. B.

CAM. *Epit.* 715.

Trapa petiolis foliorum nantium ventricosus HALL. *Hist.* n. 527.

Trapa natans LINN. *Spec. pl.* T. I. p. 175.

Gall. Tribule aquatique.

Germ. Wassernuß.

In stagnis *Hiltelingsibus* olim nascebatur, sed destructis nunc eis evanuit. Reperi in stagnis prope *Rheinfelden*, versus *Belfort*, *Montbelgardi*, in *Alsatia* &c.

Usu. Fructus & Herba.

Vires. Fructus edules sunt & ad calculum laudantur. Folia refrigerantia, adstringentia audiunt, nobis nullo in usu.

Trichomanes, **Adiantum rubrum**, **Polytrichum** Off.

Trichomanes f. **Polytrichum** officinarum C. B.

Trichomanes CAM. *Epit.* p. 915. BLACKW. Tab. 370.

Asplenium foliis pinnatis, pinnis ovatis, crenatis HALL. *Hist.* n. 1693.

Asplenium **Trichomanes** LINN. *Sp. plant.* T. II. p. 1540.

Aaa 2

Gall.

Gall. Polytric.

Germ. Rother Widerthon.

Abunde ad muros & rupes provenit.

Usu. Folia.

Vires Inter quinque herbas capillares numeratur viribusque cum reliquis convenit.

Sæpius ab insciis Pharmacopœis pro vero Capillo Veneris emittitur.

Trifolium acetosum vide Acetofella.

Trifolium fibrinum, palustre Off.

Trifolium palustre c. B. BLACKW. Tab. 474.

Menyanthes (trifoliata) foliis ternatis LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 208. HALL. *Hist.* n. 633.

Gall. Trefle de marais, Menyanthe.

Germ. Biberklee, Bitterklee, Scharbockklee, Dreyblatt.

In paludosis provenit, apud nos Michelfeldæ & Fridlingæ.

Usu. Folia amarissima & eorum Succus expressus.

Vires aperientes, resolventes, tonicæ, stomachicæ. Laudatur inprimis ad morbos chronicos multos, febres intermittentes, scorbutum, podagram, hypochondriaca mala, hydropem incipientem, calculum &c.

Tripolis vide Terra Tripolitana.

Tunica, Caryophyllus ruber Off.

Caryophyllus hortensis simplex & multiplex flore rubro c. B.

Caryophyllus ruber BLACKW. Tab. 85.

Dianthus (Caryophyllus) floribus solitariis, squamis

calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 587.

Gall. Oeillet rouge.

Germ. Rothe Neldken, rothe Nägelein.

In hortis ubique colitur.

Usu. Flores intense rubri (nam colore plurimum variant), pleni, semipleni vel & simplices, odoris gratissimi, aromatici ad caryophyllos aromaticos accedentis.

Vires cephalicæ, cordiales, analepticæ.

Turpetum verum, Turbith Off.

Turpetum repens foliis Altheæ vel Indicum c. B.

Turbith officinarum & Garcix atque Acoftæ BREYN. *Prodr.* II. p. 103.

Convolvulus Indicus alatus maximus, foliis Ibis non-nihil similibus, alatis, maximis HERMANN. *Hort. Lugd. Bat.* pag. 177. seqq. c. icone.

Convolvulus (Turpethum) foliis cordatis, angulatis, caule membranaceo-quadrangulari, pedunculis multifloris LINN. *Spec. pl.* T. I. pag. 219.

Gall. Turbith.

Germ. Turbith, Turbithwinde, weisser Turbith.

Crescit in insula Zeylon, Malabar, Arabia &c.

Usu. Radix longa, crassa, extus ferruginea sive fusca, intus alba, saporis subdulcis, acris, nauseosi.

Vires. Inter fortiora purgantia refertur, viscosos humores & pituitam potenter educens. Hodie fere negligitur.

Tussi-

Tussilago, Farfara, Filius
ante Patrem Off.

Tussilago vulgaris C. B.

Tussilago CAMER. *Epit.* p. 590,
591.

Tussilago, Farfara BLACKW.
Tab. 204.

Petasites scapo unifloro, flo-
re radiato HALL. *Hist.* n. 143.

Tussilago (Farfara) LINN. *Spec.*
plant. T. II. p. 1214.

Gall. Pas d'Ane, Tussilage.

Germ. Huf-Lattich, Brand-Lat-
tich, nostr. Rossbube.

Provenit ubique in argillosis &
humidis, floretque apud nos
Februario & Martio.

Ufu. Radix, Folia, Flores,
omnia viscida, leniter amara.

Vires lenientes, aperientes, in
morbis pectoris, tussi, asthma-
te, phthisi &c. frequentissimi
usus. Fumus etiam incensæ
plantæ ad Tussim laudatur.

Tutia, Tutia Alexandrina
Off.

Tutia grisea condensata
WALLER. *Mineral.* 595.

Gall. Tutie.

Germ. Tutia, Alexandrinische
Tutia, graues Nichts, Nuz-
gennichts, Ofenbruch &c.

Est Zinci fumus in confectione
Orichalci ad inferiora furni late-
ra in massam compactam, pon-
derosam, cineream, condensatus.

Vires ficcantes, adstringentes, re-
pellentes, ad oculorum inflam-
mationes celebres.

V.

Valeriana hortensis, Phu,
Off.

Valeriana hortensis, Phu
Olusatris folio Dioscoridis
C. B.

Valeriana major odorata ra-
dice IOH. BAUH. *Hist.* T. III.
p. 209.

Valeriana hortensis BLACKW.
Tab. 250.

Valeriana (Phu) floribus
triandris, foliis caulinis
pinnatis, radicalibus indi-
visis LINN. *Spec. plant.* T. I.
p. 45.

Gall. Grande Valeriane.

Germ. grosser Gartenbaldrian.
In hortis hinc inde colitur.

Ufu. Radix odoris & saporis sin-
gularis, aromatici.

Vires resolventes, aperientes, diu-
reticæ, sudoriferæ, præcipue
commendatur ad epilepsiam,
Pars I.

& sæpe valde efficax in diro
hoc morbo præbet remedium,
tum & ad morbos hystericos,
nimiamque nervorum sensibi-
litate; porro ad visum debi-
lem & cephalalgiam; cum
Guajaco mista glandularum
obstructiones superare dicitur.
Vix tamen hodie in officinis
reperitur, & omnes hæc virtu-
tes etiam majori gradu sequens
sylvestris possidet.

Valeriana sylvestris Off.

Valeriana sylvestris major
C. B. &

Valeriana palustris major
EJUSD.

Valeriana sylvestris BLACKW.
Tab. 271.

Valeriana foliis angustioribus
RIVIN. *Irreg. monop.* Tab. 2.
&

Valeriana EJUD. Tab. 1. palu-
str. variet.

Valeriana foliis pinnatis, pinnis dentatis HALL. *Hist.* n. 210.

Valeriana officinalis LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 45.

Gall. Valeriane sauvage.

Germ. wilder Baldrian, Katzenwurzel, Augenwurzel.

In sepibus, dumetis, sylvis locisque aquosis provenit, & feligenda, quæ siccioribus locis crescit, cum palustris varietas debilior censeatur.

Usu. Radix odoris plane singularis, penetrabilis, inter gratum & molestum mediæ, quo feles delectantur.

Vires eadem, ac præcedentis, imo præstantiores, ut hanc præ altera ad usum medicum adhibendam suadeant.

Vaniglia, Vanilla, Aracus aromaticus Off.

Gall. Vanilles.

Germ. Vanillen.

Est siliqua angusta, pene teres, nonnihil compressa, sex uncias fere longa, 4. lineas lata, rugosa, molliuscula, oleosa, rufescens, fragilis, pulpa subrufa, & seminibus minutissimis, nigris lucidisque referta, saporis subamari, pinguis, aromatici, odoris grati, balsamici.

Planta, quæ hunc fructum profert, est

Lobus aromaticus subfuscus terebinthi corniculis similis C. B.

Lobus oblongus aromaticus CLUS. *Exotic.* p. 72.

Epidendrum (Vanilla) scandens, foliis ovato-oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 1347.

In Peruvia & Regno Mexicano præcipue provenit.

Vires calefacientes, analepticae, stomachicae, carminativæ: sed rari in medicina usus: frequentissime vero adhibetur in ea compositione quæ Chocolata dicitur.

Ventriculi Gallinæ, vide Gallinæ ventriculi.

Veratrum, vide Helleborus albus.

Verbascum Off.

Verbascum mas latifolium luteum C. B.

Verbascum thapsus barbatus BLACKW. Tab. 3. male &

Verbascum album BLACKW. T. 502. bene.

Verbascum foliis decurrentibus utrinque tomentosis HALL. *Hist.* n. 581.

Verbascum Thapsus LINN. *Spec. plant.* T. I. p. 252.

Gall. Bouillon blanc.

Germ. Mülkraut, Königskerzen.

Ad vias & in arenosis frequens.

Usu: Folia & Flores dulcis, mellei saporis.

Vires emollientes, anodinæ. Folia calefacta ad podagram laudantur; Florum liquamen ad hæmorrhoides dolentes, & inflammationes, & in cataplasmate ad tumores artuum dolorificos; infusum ad phthisin, & decoctum ad dysenteriam valere dicitur.

Verbena Off.

Verbena comunis flore cæruleo C. B.

Verbena BLACKW. Tab. 41.

Verbena foliis rugosis, tripartitis, spicis nudis, strigosis HALL. *Hist.* n. 219.

Ver-

Verbena officinalis LINN. *Sp.*
pl. T. I. p. 29.

Gall. Verveine.

Germ. Eisenkraut, Tauben-
kraut.

Ubique ad vias.

Usu. Radix, & Folia, inodo-
ra, & fere insipida.

Vires vix ullæ, licet ex super-
stitione insignes ad capitis dolo-
res, oculorum vitia, febres in-
termittentes &c. five amuleti
modo five aliter adhibeatur,
tribui solebant a veteribus.

Veronica, Veronica mas Off.
Veronica masupina & vul-
gatissima, C. B.

Veronica mas BLACKW. Tab.
143.

Veronica caule procumben-
te, foliis scabris, petiolatis,
ovatis, ex alis racemosa
HALL. *Hist.* n. 540.

Veronica officinalis LINN. *Sp.*
plant. T. I. p. 16.

Gall. Veronique male.

Germ. Ehrenpreis, Heil aller
Schaden.

In sylvis crescit.

Usu. Folia amara, herbacei sa-
poris haud admodum grati.

Vires huic herbæ quam plurimæ
adscribuntur, uti etiam ex ger-
manico nomine patet. Sed re-
vera nimix sunt, quæ illi de-
cernuntur, laudes. Leviter ad-
stringens est, vulneraria, hinc
in pectoris morbis, pulmonum
ulceribus & ad expectorationem
promovendam nonnunquam u-
tiliter adhibetur.

Victorialis longa, Off.

Allium montanum latifo-
lium maculatum C. B.

Victorialis longa BLACKW.
Tab. 544.

Allium radice oblonga, re-

ticulo obducta, foliis o-
vato-lanceolatis, umbella
sphærica HALL. *Hist.* n. 1229.

Allium Victorialis LINN. *Sp.*
pl. T. I. p. 424.

Gall. Victorialis longue.

Germ. lange Siegwurz, Aller-
mannsbarnischwurz.

In alpibus & montibus altioribus
reperitur.

Usu. Radix vel Bulbus fasci-
culatus, odore allii.

Vires allii stomachicas & pellen-
tes habet; sed Alpicolis multo &
fere superstitioso in usu est.
Ad crampos gravidarum, amu-
leti loco appenditur.

Victorialis rotunda, femina
Off.

Gladiolus floribus uno ver-
su dispositis major C. B.

Gladiolus RIVIN. *Monop. irreg.*

Gladiolus foliis ensiformibus,
floribus distantibus HALL.
Hist. n. 1261.

Gladiolus communis LINN.
Sp. pl. T. I. p. 52.

Gall. Victoriale ronde, Glay-
eul.

Germ. Runde Siegwurz, Acker-
Schwertel

In calidioribus Europæ regionibus
sponte crescit, apud nos in hor-
tis.

Usu. Radix, quæ dulcis.

Vires emollientes: in vulneribus
vim extrahentem validam de-
monstrare traditur.

Vinca per Vinca, Clematis
daphnoides Off.

Clematis daphnoides minor
C. B.

Vinca Pervinca, Daphnoides
BLACKW. Tab. 59.

Pervinca caulibus procum-
benti-

bentibus, foliis ovato-lanceolatis, petiolis unifloris
HALL. *Hist.* n. 572.

Vinca minor LINN. *Spec. plant.*
T. I. p. 304.

Gall. *Pervenche.*

Germ. *Wintergrün, Sinngrün, Ingrün.*

Ad sepes copiose.

Usu. Folia amara.

Vires adstringentes, vulnerariæ; ad fluorem album, menses nimios, & phthisin laudatur; & ad faucium inflammationem in gargarismate.

Vincetoxicum, Hirundinaria, Asclepias Off.

Asclepias albo flore c. B.

Asclepias, Vincetoxicum, Hirundinaria BLACKW. Tab. 96.

Asclepias ex alis racemosa, caulibus simplicibus, erectis, foliis ovato-lanceolatis
HALL. *Hist.* n. 571.

Asclepias Vincetoxicum
LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 314.

Gall. *Domtevenin, Asclepias.*

Germ. *Schwalbenwurzel.*

Locis asperis, saxosis frequens.

Usu. Radix amara, sapore & odore nauseoso, non absque veneni suspitione.

Vires alexipharmacæ, sudoriferæ, diureticæ; ad menses, & aquas hydropicorum pellendas laudatur; ad pellendas variolas, aut in peste, nauseosa planta minus apta videtur.

Viola Off.

Viola martia, purpurea, flore simplici odore c. B.

Viola martia BLACKW. T. 55.

Viola acaulis, stolonifera, foliis cordatis HALL. *Hist.* n. 558.

Viola odorata LINN. *Sp. plant.*
T. II. p. 1324.

Gall. *Violette de Mars.*

Germ. *Blaue Violen, Veilgen, Merzen-Veilgen.*

Ad sepes.

Usu. Radix, Folia, quæ inter s. herbas emollientes referuntur; Flores odoris grati, narcotici, & Semina.

Vires laxantes in syrupo, floribus ficcis, foliis, succo & semine, & emollientes in omnibus plantæ partibus, hinc laudatur ad urinam movendam, ad pectoris morbos, catarrhos, pleuritidem &c.

Vipera Off.

Vipera GESN. *Serp.* p. 124.

Coluber (Vipera) scutis abdominalibus CXVIII. squamis subcaudalibus XXII. LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 275.

Gall. *Vipère.*

Germ. *Viper, Otter, Natter.*

Animal amphibium, viviparum, pollicem circiter crassum, duos pedes longum, pelle superne variegata, interne candida, rufa, flavicante aut ferruginea, maculis hinc inde notata, solo morfu nocet, & venenatum succum vesiculis circa dentes positis inclusum vulneri instillat.

Habitat in *Italia, Gallia, Helvetia* calidiori in vineis, inter lapidum acervos, ædificiorum ruinas &c.

Usu. Caro recens, detracta cute, capite caudaque rejectis, tum & exsiccata, quæ tamen vix aliquid virtutis possidet, & Axungia.

Vires. Juscula viperina ab antiquissimis temporibus mire extolluntur in cutis defoedationibus, lepra, elephantiasi, scabie ferina,

rina, scrophulis, ulceribus, obstructione viscerum, arthritide, suntque ex Viperis vivis parata emollientia, gelatinosa, acido adversa, analeptica, quibus vires medicatae, ut hodierni quidam autumant, non plane denegari debent. Axungia morbis oculorum valde salubris censetur.

Virga aurea, vide Consolidida farracenica.

Viride Aëris, Aërugo, Aësviride Off.

Gall. Verdet, Vert de gris.

Germ. Grünspan.

Est rubigo quædam viridis ex laminis cupreis, vinaceorum acescentium ope corrosis, enata atque abrafa. Paratur præcipue in Gallia & Hispania.

Vires. Externe ulcera detergit & siccat, carnes fungosas consumit, callos exedit, intus sumtum atrocissimum est emeticum. Ad usus mechanicos præcipue inservit.

Viride montanum, Terra viridis, Chrysocolia veterum Off.

Cuprum solutum, vel corrosum, præcipitatum, viride. Aërugo nativa. Ochra Cupri viridis. Viride montanum WALLER. Miner. p. 358.

Gall. Terre verte, Verd de montaignes.

Germ. Berggrün, grüne Erde.

Duplex est, alterum naturale, alterum factitium. Naturale gignitur in venis ærariis aut arenæ simile, aut metallicæ alicui materie adhærens, a qua secretum arenæ aut pulveris speciem habet, coloris viridis.

Pars I.

Factitium vero paratur vel ex Viridi montano nativo & aceto, vel ex cypria ærugine, nitro & urina, invicem mixtis, contusis, maceratis, lotis, & tandem exsiccatis.

Ex Hungaria præcipue affertur.

Vires videtur easdem, ac Viride aëris, possidere, sed vix in usu est, nisi pictoribus.

Viscus, Viscum Off.

Viscum baccis albis C. B.

Viscum, Viscus quercinus BLACKW. Tab. 184.

Viscum foliis lanceolatis, obtusis, caule dichotomo, spicis alaribus HALL. Hist. n. 1609.

Viscum album LINN. Spec. plant. T. II. p. 1451.

Gall. Gui.

Germ. Mistel.

Innascitur omnis generis arboribus, sed præcipue malis antiquis. Præfertur in usum medicum Quercui arbori innascens.

Usu. Lignum & Folia, odoris subnauseosi, narcotici, saporis adstringentis.

Vires adstringentes, sed præcipue commendari solet ad epilepsiam ceu specificum.

Vitex, vide Agnus castus.

Vitis Off.

Vitis vinifera C. B. BLACKW. Tab. 153.

Vitis foliis semitrilobatis, hirsutis, dentatis HALL. Hist. n. 825.

Vitis vinifera LINN. Sp. plant. T. I. p. 293.

Gall. Vigne.

Germ. Rebe, Rebstock, Weinstock.

Ubique colitur.

Usu. Folia, Lacryma, Fructus maturi, & immaturi,

C c c

turi, & Lignum f. Sarmenta.

Vires. Folia leniter adstringunt, vix tamen hodie in usu. Lacrymæ verno tempore ex læso caudice stillantes, ad oculorum vitia laudantur, diureticæ sunt, etiam in febribus acutis utiles. Uvæ immaturæ saporis acidi, acerbi, dant Omphacium, *Gallis* Verjus dictum, plurimi quibusdam factum ceu remedium refrigerans, antisepticum & adstringendo roborans. Ex fructibus maturis parantur Passulæ majores & minores de quibus suo loco, & ex succo expresso post fermentationem prægressam Vinum, quod summum est analepticum, calefaciens, vim cordis & circuitum humorum augens, secretionem perspirationis & urinæ augens. Ligni cineres lixivium diuretica, antihydrica ingrediuntur.

Vitriolum, Chalcanthum, Atramentum futorium Off.

Gall. Couperose.

Germ. Vitriol.

Est Sal nauseosus, adstringens, constans acido vitriolico, & terra metallica Veneris, Martis, vel Zinci, cœruleus, viridis, albus, pro indole metalli soluti, hinc tres ejus species præcipue prostant, nempe

Vitriolum album, Vitriolum Zinci Off.

Vitriolum Zinci album nativum WALLER. *Mineral* p. 207.

Vitriolum (album) Zinci

album, dodecaëdron, prismaticum LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 104. Fig. 9.

Gall. Couperose blanche, Vitriol blanc.

Germ. weisser Vitriol, Gallitzstein, Augenstein.

Est sal metallicus non crystallifatus, sed simpliciter siccatus & coagulatus in moles crassiores, albas, sacchari instar, saporis subdulcis & adstringentis. Constat ex acido vitrioli, terra Zinci copiosa, & parte aliqua cupri & ferri.

Goslariæ præcipue paratur, ex minera montis Rammelsberg ubi sub lanuginis specie sponte efflorescit, quæ aqua soluta ad debitam spissitudinem excoquitur.

Vires adstringentes; vulnerum hæmorrhagias vel solutum, vel in globulos redactum sistit, ad lippitudinem oculorum adhibetur, intus sumtum citissime vomitum excitat.

Vitriolum cæruleum, Vitriolum Veneris, Cupri, Vitriolum de Cypro Off. Vitriolum Cupri cæruleum nativum WALLER. *Mineral* p. 206.

Vitriolum (cyprinum) Cupri cœruleum dodecaëdron LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 104. Fig. 38.

Gall. Vitriol de Chypre, Vitriol bleu.

Germ. Blauer Vitriol, Kupfer-Vitriol, Cyprischer oder Römischer Vitriol.

Hoc concretum est in crystallos cæruleas, sapphirorum instar, quæ figuram exhibent rhomboidalem, dodecaedram & depressam, cuprum in se continet, unde color, purum vix unquam

quam in Mineris reperitur, sed mixtum cum Vitriolo ferri, vel & Zinci.

Præparatur variis in locis, sed præcipue in *Hungaria* & *Cypro*.

Vires corrosivæ, acerrimæ; extus adhibetur instar escharotici, ad cancos venereos exurendos, etiam ad sanguinem sistendum, quem coagulat, & simul vasa adstringit. Intus emeticum est vehementissimum; sed vix datur, ne ventriculus inde corrodat. Ad pulverem sympatheticum adhibetur & a Veterinariis in usum trahitur.

Vitriolum viride, Vitriolum ferri seu Martis Off.

Vitriolum ferri viride nativum WALLER. *Mineral.* p. 207.

Vitriolum (Martis) ferri viride, hexaëdrum LINN. *Syst. Nat.* T. III. p. 104.

Gall. Vitriol vert, Coupe-rose.

Germ. Eisen-Vitriol, Kupferwasser, grüner Vitriol.

Constat ex acido Vitrioli & ferri minera, unde pendet color viridis, pro variis locis, in quibus effoditur, dicitur Romanum, Suecicum Anglicum, Gallicum, Hungaricum, Salisburgense &c.

In usum medicum præcipue adhibetur Vitriolum vel Sal Martis artificiale, quod ex limatura Martis & Spiritu Vitrioli, paratur, ne Cuprum illi commixtum sit.

Vires adstringentes, roborantes, cautus tamen debet esse ejus usus internus, ob vim corrodentem quam habet, laudatur ad vermes & tæniam. Extus sanguinem sistit, & adhibetur ubi adstringendum, in pulvere, fomento, linimento. Ad

atramentum conficiendum aliosque mechanicos usus plurimum inservit.

Vitri sal, Fel vitri, Anatron Off.

Gall. Sel de verre, Fiel de verre.

Germ. Glasgalle

Est scoria vitrescibilis, alba, levis, spongiosa, quæ arena aut filicibus calcinatis & contusis, & sali cuidam alcalino invicem mixtis, & ad vitrum formandum vi ignis in fluorem redactis, supernatare solet; constatque ex sale medio, & terra vitrescibili, & simul, ubi soda fuit adhibita, ex acido salis communis.

Vires diureticiæ dicuntur, & dentifriciis admiscetur.

Vitrum venetum Off.

Gall. Verre de Venise.

Germ. Venetianisch Glas.

Arte paratur ex arena & sale alcalino vi ignis in fluorem redactis.

Vires. Dicitur quibusdam cum melle subactum & umbilico impositum anthelminticum esse.

Ulmaria vide Barba capræ.

Umbilicus Veneris Off.

Cotyledon major C. B.

Cotyledon BLACKW. T. 263.

Umbilicus repens CAM. *Epit.* p. 858.

Cotyledon (Umbilicus veneris) foliis cucullato-peltatis ferrato-dentatis alternis, caule ramoso, floribus erectis LINN. *Sp. plant.* T. I. p. 615.

Gall. Escudes, Escuelles, Nombriel de Venus.

Germ. Frauen Nabel, Nabelkraut.

Crescit in *Lusitania*, *Hispania*, *Judea*. &c.

Ccc 2

Ufu,

Ufu: Folia, & Succus.

Vires vulnerariæ, abstergentes, diureticæ.

Unicornu fossile, Ebur fossile Off.

Petrificata animalia dentium elephantorum, Ebur fossile, Unicornu fossile

WALLER. *Mineral.* p. 453.

Zoolithus (Ebur fossile)

Trichechi Rosmari LINN.

Syst. Nat. T. III. pag. 156.

Gall. Unicorne mineral.

Germ. Begraben Einhorn, versteinerte Knochen von vierfüßigen Thieren.

Sunt ossa, cornua, dentes animalium plerumque Elephanti aut Rhinocerotis, quæ variis in locis e terra effodiuntur non plane in lapidem indurata, sed plus minusve fragilia, & sub terra quasi calcinata. Pro ossibus gigantum olim habebantur.

Vires adstringentes, & absorbentes.

Unicornu marinum verum, Monoceros Off.

Gall. Licorne veritable.

Germ. Einhorn.

Est dens ex superiore maxilla piscis Naruhal dicti, horizontaliter protensus, albicans, teres, aliquot ulnas longus, gravis, e latiori basi in acutum mucronem desinens, & spirali ductu striatus, intus cavitatem habet fere ad apicem usque decurrentem; saporis odorisque expers est. Piscis dente hoc instructus dicitur

Monoceros Unicornu marinum CHARLET. *Onom.* p. 168.

Monodon Monoceros LINN. *Syst. Nat.* Tom. I. pag. 105.

Habitat in *Mari Atlantico*, circa *Groenlandiæ* & *Islandiæ* littora.

Vires, quæ Cornu Cervi, demulcentes, temperantes, antacidæ, nam superstitiosæ sunt, quæ ipsi tribuuntur alexipharmacæ, antispasmodicæ, & antepilepticæ.

Vomica Nux vide Nux Vomica.

Ursus GESN. *Quadrup.* p. 14.

Ursus (Arctos) cauda abrupta LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 69.

Gall. Ours.

Germ. Bär.

Fera satis nota, fylvas frigidioris & borealis Europæ inhabitans.

Ufu. Axungia & Fel inspissatum.

Vires. Axungia membris paralyticis & contractis utilis censetur, Fel in anorexia laudatur, & membris dolentibus inungitur.

Urtica alba seu mortua, Lamium album Off.

Lamium album non foetens, folio oblongo C. B.

Lamium album BLACKW. Tab. 33.

Lamium foliis cordato-lanceolatis, ferratis, verticillis multifloris HALL. *Hist.* n. 271.

Lamium album LINN. *Spec. plant.* T. II. p. 809.

Gall. Ortie blanche, ou morte.

Germ. weiße todte Nessel.

Ad sepes sponte crescit.

Ufu. Folia & Flores.

Vires olim credebantur esse eximiae in fluore albo & debilitate uteri, in morbis pulmonum,

num, ut & ad scrophulas. Rustici ad anginam adhibent.

Urtica romana, Urtica pilulifera Off.

Urtica urens pilulas ferens C. B.

Urtica romana BLACKW. Tab. 321.

Urtica (pilulifera) foliis oppositis ovatis ferratis: amentis fructiferis globosis LINN. *Sp. plant. T. II.* pag. 1395.

Gall. Ortie romaine, ou Boulette.

Germ. Römische Nessel.

Calidiorum regionum incola apud nos in hortis passim occurrit.

Usu. Semina.

Vires parum adstringentes, diureticæ; ad affectus pulmonum, asthma, tussim, tum & nephritidem commendantur.

Urtica vulgaris, Urtica urens Off.

Urtica urens maxima C. B. BLACKW. Tab. 12.

Urtica stirpibus sexu distinctis, foliis ovato-lanceolatis, productis, ferratis HALL. *Hist. n.* 1614.

Urtica dioica LINN. *Spec. plant. T. II.* p. 1396.

Gall. Ortie grièche.

Germ. Brenn-Nieslen.

Ubique ad sepes.

Usu. Folia, Semina & Succus expressus.

Vires recentis herbæ alvum emollientes, urinam pellentes, excreationem promoventes. Succus ad hæmorrhagias efficax, etiam ad hæmoptysin & fluxum uteri. Folia recentia rubefaciunt, & vesicæ excitant, ad membra torpida & paralytica cum fructu adhibentur. Semi-

na diuretica censentur.

Huic viribus plane convenit

Urtica urens minor C. B.

Urtica minor acrior LOBEL. *Icon.* p. 522.

Urtica sexubus sede distinctis, foliis ovato-lanceolatis, ferratis, spicis oblongis HALL. *Hist. n.* 1615.

Urtica urens LINN. *Spec. plant. T. II.* p. 1396.

Provenit in plateis, juxta stabula & fimeta, & junior adhuc a pauperibus in cibum recipitur.

Uva Ursi Off. & CLUS. *Hist. I.* p. 63.

Vitis Idæa foliis carnosiss & veluti punctatis C. B.

Radix Idæa putata & Uva ursi JOH. BAUH. *Hist. T. I.* p. 524.

Arbutus caulibus procumbentibus, foliis duris, integerrimis HALL. *Hist. n.* 1618.

Arbutus Uva Ursi LINN. *Spec. plant. T. I.* p. 566.

Gall. Raisin d'ours.

Germ. Bärentraube.

In montosis & alpinis locis provenit.

Usu. Folia amara, austera, adstringentia.

Vires adstringentes, roborantes, in vitiiis viarum urinæ, in ardore lotii, & in hæmorrhoidibus utiliter quandoque adhibetur, & ad ulcera renum, ureterum, vesicæ, & calculum laudatur. Sæpius tamen malum inde exasperatum vidi.

Uvæ corinthiacæ } v. *Passulæ.*
Uvæ passæ }

Vulpes GESN. *Quadrup.* p. 946.

Canis (Vulpes) cauda recta apice albo LINN. *Syst. Nat. T. I.* pag. 59.

Gall. Renard.

Germ. Fuchs.

D d d

Fera

Fera quadrupes fatis nota, in antris montium habitans.

Ufu. Pulmones exsiccati, Lingua & Axungia.

Vires. Ad pulmonum vitia quibusdam commendatur, sed ex me-

ra superstitione. Lingua exsiccata ad sinus vulnerum dilatandos quibusdam adhiberi dicitur.

Axungia ad convulsiones, membrorum contracturas, tremores, aurium dolores &c. laudatur.

W.

Winteranus Cortex spurius, Canella alba, Costus corticosus, Costus dulcis Off. nostr.

Cinamomum five Canella tubis minoribus alba c. B?

Canella alba CLUS. *Exot.* pag. 78?

Laurus foliis enerviis, obverse ovatis, obtusis LINN. *Mat. Med. Spec. plant.* Ed. I. p. 371.

Winterania Canella LINN. *Sp. plant.* Ed. II. Tom. I. p. 636.

Gall. Cannelle blanche.

Germ. Weiße Canel, weisser Zinnet.

Arbor est in *America* passim crescens.

Ufu. Cortex crassiusculus, in tubos convolutus, extus ex albidulo flavescens vel subcinereus, intus albicans, odoris fragrantis quasi ex diversis aromatibus compositi, saporis amaricantis, acris, aromatici.

Vires calefacientes, stomachicæ, carminativæ, antiscorbuticæ &c.

Winteranus Cortex verus Off.

Plurimi Autores eundem faciunt cum præcedente, colore saltem diversum, qui in vero fuscus est vel ad cinamomum accedit; alii tamen vere diversum putant, cum præter colorem etiam sapore differant, multo in vero acriorem & ferventiolem. Neque de planta; unde hicce defumitur, magis constat.

An *Laurifolia* Magellanica, cortice acri c. B?

An Cortex Winteranus CLUS. *Exot.* p. 75?

An *Periclymenum* rectum, foliis laurinis, cortice acri aromatico SLOANE.

An Cortex Winteranus BLACKW. Tab. 206.

Certiora de hoc cortice afferre haud possum, cum nostris officinis ignotus sit, illique præcedens substituatur, neque etiam aliunde ullo modo illum obtinere potuerim.

X.

Xanthium, Bardana minor, Lappula minor Off.

Lappa minor five Xanthium Dioscoridis c. B.

Xanthium BLACKW. Tab. 444.

Xanthium foliis semitriloba-

tis, aculeis uncinatis HALL. *Hist.* n. 1621.

Xanthium strumarium LINN. *Sp. pl.* T. II. p. 1400.

Gall. Petit Glouteron ou Gletteron, petite Bardane.

Germ. Klein Klettenkraut.

Ubi-

Ubique circa urbem nostram ad fossas ficcas & fimeta occurrit.

Usu. Folia, Succus plantæ & Semen.

Vires. Folia amara sunt & adstringunt; Succum ad scro-

phulas laudant & ad depurandum sanguinem. Semina intus assumpta ad erysipelas extus pellendum commendantur; nostras in officinas hactenus nondum introducta.

Z.

Zedoaria, Zedoaria rotunda & longa Off.

Zedoaria longa C. B. &

Zedoaria rotunda EJUSD.

Zedoaria BLACKW. Tab. 399.

Kæmpferia (rotunda) foliis lanceolatis, petiolatis

LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 3.

Gall. Zedoaire.

Germ. Zittwer, lange und runde Zittwerwurz.

Crescit passim in *India orientali*.

Usu. Radix vel oblonga, tuberosa, nodosa, parum compressa, digiti minimi crassitie, vel parva subrotunda, coloris albidi, grisei, flavescentis vel subfusci, odoris fragrantis, camphorati, saporis acris, amaricantis.

Vires summe calefacientes, roborantes, stimulant, attenuantes, sudorem, urinam, menses, flatus pellentes, antasthmaticæ, antihystericæ &c.

Zibethum Off.

Gall. Civette.

Germ. Zibeth.

Substantia est mollis, pinguis, subfusca, consistentiæ butyri f. mellis, saporis sebacei, acriusculi, odoris fragrantissimi.

Reperitur in folliculo membranaceo, glanduloso, piloso, inter genitalia & anum Animalis, quod vocatur

Civette, anciennement Hyæne BELON *Observat.* p. 93.

edit. Paris. 1555. in 4to c. icone.

Felis Zibethi GESN. *Quadrup.* p. 948.

Viverra (Zibetha) cauda annulata, dorso cinereo nigroque undatim striato LINN. *Syst. Nat.* T. I. p. 65.

Gall. Civette.

Germ. Zibethkatz.

Vires anodinas possidere vulgo creditur eoque scopo in colicis doloribus umbilico illinitur, in gravioribus vero affectibus hystericis gossypio exceptum in sinum muliebrem immittitur. Interne quandoque ceu confortans & analepticum ad unum vel duo grana assumitur, & præterea varia balsama & odoramenta ingreditur. Nostrates etiam ad Vulpes capiendos frequenter eo utuntur.

Cum pretiosissimum sit, rarissime purum, plerumque butyro adulteratum in officinis reperitur.

Zincum Off. WALL. *Mineral.*

p. 317.

Gall. Zinc.

Germ. Zink, Spicaute.

Semimetallum est coloris extus plumbei, intus albidi vel ex albo pallide cœrulescentis, in igne ardens, flamma subviridi, volatile, fumo albo lateribus in superiori furni parte adhærente.

Goslarie, in *Anglia*, *India orientali* &c. ex diversis mineris paratur.

D d d 2

Usu.

Usu. Flores Zinci.

Vires siccantēs, adstringentes, ad oculorum vitia, ubi siccandum & adstringendum est, omnibus aliis remediis palmam mihi præripere videntur.

Zinziber, Zingiber, Zinziber album & nigrum
Off.

Zingiber c. B.

Zingiber majus, Alea
RUMPH. *Herb. Amboin.* Tom. V. p. 156. Tab. 66. fig. 1.

Amomum (Zingiber) scapo nudo, spica ovata
LINN. *Sp. pl.* T. I. p. 1.

Gall. Gingembre.

Germ. Ingwer, weisser und grauer Ingwer.

Crescit sponte & colitur passim in *India orientali*, *China* &c.

Usu. Radix tuberosa, nodosa, paululum compressa, parum ramosa; cinerea vel albescens, corneæ fere duritiæ, odoris fragrantis, saporis aromatici, fervidi. Alba a cinerea haud aliter differt, nisi quod exteriore cortice liberata sit.

Vires calefacientes, incidentes, stimulantēs, attenuantes, stomachicæ, carminativæ &c. ad condiendos cibos præterea frequentissime adhibetur.





T A B L E

DES NOMS FRANÇOIS

CONTENUS

DANS LA MATIERE MEDICALE.

A		
Absynthe	3	Anacardé
petite	3	Ancolie
pontique	3	Anet
Acanthe	32	Angelique
Ache	16	Anguille
de Montagne	95	Animé Gomme
Acier	71	Anis
Acemelle	4	etoilé
Acorus	35	Anthora
faux	4	Antimoine
Adragant Gomme	186	Arabique Gomme
Agaric	5	Argent
mineral	91	Argentine
Agnus castus	5	Aristoloché commune
Agripaume	39	longue veritable
Aigremoine	6	ronde commune
Ail	7	veritable
Aiman	100	Armenienne Pierre
Albâtre	6	Armoise
Alcée	6	Armoniac Sel
Alkekenges	7	Arreteboeuf
Alleluja	4	Arroche
Alliaire	7	Arsenic blanc
Alouine	3	jaune
Aloë	7	rouge
Bois	8	Asclepias
Althé	8	Ascalat Bois
Alun	8	Asperge
de Roche	9	Asphodele
plume	9	Aspic
Amandes	11	Affa foetida
Ambre fluide	10	Aubifoin
gris	9	Aunée
jaune	177	Avoine
noir	10	Auronne-male
Ambrette	1	Azur
Ambroisie	31	
Amethyste	9	B
Amiante	78	Balausté
Ammi de Candie	10	Baleine
commun	10	Barbeau
Ammoniac Gomme	10	Barbe de Bouc
Sel	18	Barbotine
Pars I.		
		11 Bardane grande
		16 petite
		12 Basilic
		12 Baume de Canade
		13 Copaiva
		13 Judée
		13 la Mecque
		13 du Peroce blanc
		13 noir
		14 faux
		15 de Tolu
		16 vrai
		17 Bdelium
		14 Beccabunga
		18 Bedeguar
		17 Been blanc
		18 rouge
		17 Belemnite
		18 Belladonna
		19 Bén noix
		18 Benjoin
		122 Benoite
		22 Betoine
		19 de montagne
		19 Bezoar occidental
		19 oriental
		192 Bismuth
		21 Bistorte
		21 Bitume judaïque
		21 Blaireau
		93 Blanc de Balaine
		20 Plomb
		61 Bleuet
		67 Boeuf
		22 Bois de Baume.
		1 Citron
		18 Chandelle
		93 Jarmin
		18 Moluques
		148 Roses
		143 Surinam
		24 Gentil
		45 nephretique
		61 Bol d'Armenie
		187 blanc
		50 rouge
		E e e
		Bonette

Bonette	pag.	141	Cerifier
Borax		30	Gomme de
Botrys		31	Cerifes
Bouc		84	Ceruse blanche
Boucage		134	jaune
Bouillon blanc		190	Cetetrac
Bouleau		29	Cevadille
Bouquetine		134	Chamarras
Bourge Epine		173	Chanvre
Bourgéne		73	Charon
Bourrache		31	Chaquerille
Bourse à Berger.		33	Chardon à cent têtes
Bray sec		54	benit
	&	136	étoilé
Branche urfine		32	Marie
commune		32	roland
Brochet		98	Chassebosse
Brunelle		141	Chat sauvage
Bruyère		32	Chaussetrappe
Bryone		68	Chaux vive
Bugle		55	Chelidoine
Buglose		33	petite
Bugrande		122	Chêne
Buis		33	Chervis faux
			Chevalline
			Chicorée blanche
			fauvage

C

Abaret		20	Chien
Cacao		33	Chiendent
Cachou		43	Chou marin
Cadmie		52	Ciguë
Caffé		53	Cinnabre
Cajerut		34	Cire
Caillelait		75	Citron
Calament commun		34	Citrouille
à grande fleur		34	Civette
odeur de Pouliot		34	Cloportes
Calaminaire Pierre		34	Clou de Girofle
Calamine blanche		118	matrice
de Berry		52	Cobalt
Calamus aromatique		35	Coccons de Soye
Camfre		36	Cochenille
Camomille		47	Cochon
fétide		46	Coffé
romaine		47	Coignassier
Canard		12	Colchique
Cannelle fine		50	Colle de Chair
geroifée		41	poisson
Cantharides		37	Colophone
Caillaire de Canada		38	Coloquinte
Montpellier		38	Concombre
noire		5	fauvage
Cappe de Moine		115	Confoude grande
Caprier		38	Contrayerva
Caragne Gomme		38	Copal
Cardamome		39	Coque de Levant
Carline		40	Coquelicot
Carote		64	Coquerelles
Carouge		176	Corail blanc
Cartame		40	rouge
Carvi		40	Coralline
Casse		42	Coriandre
en baton		42	Corne de Cerf
Casselinette		61	Costus arabique
Cassia		148	Coton
Cassonade		152	Coulevrée
Castor		42	Couperose
Castoreum		42	Craie blanche
Cataire		116	rouge
Celeri		16	Cram
Centauree grande		147	Crane humain
petite		43	Crapaudine
Centinodé		138	Cresson de fontaine
Cerf		45	jardin
Corne de		44	Cristal
Cerfeuil		46	Cubebes
			Cumin

44	Cuivre
44	Curate
44	Cuscuta
44	Cynoglossé
44	Cypres

D

37	Dattes
38	Daucus de Crete
41	Dentaire grande
63	petite
39	Dent de lion
35	Dictame blanc
39	de Crete
68	Domtevenin
100	Doronic
43	Douceamere
35	Doucette
36	

E

47	Ebene
48	Eclair
144	petite
64	Elan
108	Elemi
67	Elleboire blanc
49	noir
37	Emeraude
78	Emeri
172	Encens
50	fauvage
51	Endive
44	Enule campane
51	Epine blanche
199	de Bouc
110	vinette
41	E inette de Canada
14	Erithym
52	Eponge
168	piere
52	Eurge
139	Ers
53	Escudes
61	Esuelles
54	Espargoutte
159	Esquine
87	Esule
54	Eufraise
54	Eupatoire
59	Euphorbe Gomme
59	
55	
56	
56	

F

53	Fenugrec
127	Fenouil
7	doux
56	fauvage
56	Fer
56	Fève de Marais
57	S. Ignace
44	Figues seches
57	Fili endule
30	Flambe
32	Fleur de Muscade
195	Fougère femelle
57	fleurie
150	mâle
145	Fourmi grande
57	petite
169	Fraises
116	Fraisier
116	Framboises
58	Frangula
58	Fraxinelle
59	

Frelon	32	Herbe de la Goutte	148	Lis des vallées	96
Frêne	73	d'Or	81	Litharge	98
Fruit de Baume	123	du siège	164	Liveche	95
Fumeterre	74	sans couture	122	Lotier odorant	106
G		Hermodatte	83	Lycopodium	99
GAlanga	74	Herniole	83	Lyfimachie	100
Galbanon	74	Heron	17	M.	
Galega	75	Hiéble	66		
Galiote	41	Hippopotame	83		
Gants de notre Dame	16	Hiçondelle	84		
Garance	150	Houblon	99		
Garderobbe	2	Houffon :	32	Macis	120
mâle	1	Houx petit	32	Maclou	14
Garou	52	Hyacinthe	85	Macre	187
Gayac	79	Hypociste	86	Mandragore	101
Gazelle	111	Hysope	86	Maniguette	128
Genet	76	des Garrigues	81	Manne	101
Genevrier	89	I.		Marcaffite	102
Gomme	156			Marjolaine	100
Genipi	75. 76	Jalap		faux	124
blanc	76	Imperatoire	86	Maroute	46
Gentiane	77	Inde	87	Marrube blanc	102
rouge	77	Jonc odorant	87	noir	103
Germandrée	46	Joubarbe	162	Marum	103
d'eau	163	Ipecacuanne	166	Mastich	103
Gingembre	200	Iris bleue	87	Mastic	103
Ginseng	118	de florence	87	Matricaire	104
Giroflée jaune	47	Ivette	88	Mauve	101
Gisieres	75	Jugeoline	88	de Jardin	101
Glaveul	88	Jujubes	46	faux	6
Glouteron	26	Ivoire	169	Mechoacan	104
petit	198	Jusquiamé	89	Melasse	152
Goudron	136	blanche	67	Melese	182
&	137	K.		Melilot	106
Goute de Lin	61			Melisse	106
Graines de Kermes	90			faux	107
Musc	1			Melon	107
Paradis	128	Kinkina		Menthe des champs	35
Tilli	185	Kermes		jardins	107
Grapelles		L.		faux	108
Grateron	16			Menyanthe	188
Gratiola	79			Mercure	17
Grattecul	62			Mercuriale	108
Gremil	109			Meu	109
Grenade	78	Labdanum		Mezereon	52
Grenat	78	Lacque colombine		Miel	105
Grenouille	144	de florence		Millefeuille	110
Grofeilles noires	148	Gomme		à odeur de Camfre	110
rouges	148	Laitron doux		Millepertuis	85
Gui		epineux		Minium	110
Guimauve	8	Lait		Mirirot	106
Gutte Gomme	79	de Lune		Morelle	172
H.		Laitée		rampante	66
		Langue de Cerf		Morgeline	8
		Chien		Mors du Diable	111
		Serpent		Mort aux ras	19
Hannebanne	85	Lavande		Moscovade	152
Heliantheme	81	Laureole		Mouron	8
Heliotrope	186	Laurier		Mâle	12
Hellebore blanc	81	Lentille		femelle	12
noir	82	Lentisque		Mouffe marine	56
Hepatique commune	95	Licorne		Moutarde blanche	170
noble	83	Liège		rouge	171
terrestre	95	Lièvre		Muffe de veau	15
Herbe à eternuer	141	terrestre		Muguet	96
Robert	78	Lièvre		des bois	104
pauvre homme	79	Limaçon rouge		petit	104
aux chats	116	Linaire		75 &	104
cuilliers	53	Lin		Mumie	112
perles	109	purgatif		Murier	111
poux	175	faux		Musc	111
puces	141	Lis blanc		Myrobalans	113
tigneux	132	d'eau		Myrrhe	114
verruës	186			Myrte	114
				Myrtille	114
				E e e 2	Nacré

N.

Nacre de perles
Nard celtique
Navet
Neruphar
Nerprun
Nicotiane
Nielle
Ninfi
Nifi
Nitre
Noisetier
Noix
de galles
muscade
vomique
Nombril de venus
Noyer
Nummulaire

O.

Ochre jaune
Oeuf de poule
Oeuillet rouge
Oie
Oignon
Marin
Olivier
Olsnitium
Ombre
Ononis
Opium
Or
Oranger
Oranges fleurs
fruits
Orcanette
Oreille d'homme
de Judas
fouris
Orge
Origan
de Crete
Orlean
Ormin
Orpiment
Orpin
Orseille
Ortie blanche
grièche
romaine
Orvale
Os de seiche
Oseille
Osmonde
Osteocolle
Otruche noire
Ours

P.

Pain à coucou
Pain de pourceau
Palais de lièvre
Palmier Dattier
Panacée
Panais
Panicaut
Paquerette

Pateira brava
Parelle
Parietaire
Pas d'Ane 71 &
Passerilles
Patience sauvage
Pattes d'ecrevisses de mer
Pavot
Pecher
Pelotte de mer
Pepou
Percefeuille
Percefeuille
Perles
Perficair
Perfil
de Macedoine
des montagnes
Perubosse
Pervenche
Pesse
Petafite
Petrole
Petun
Peuplier
Pied d'Alouette
de Chat
griffon
Lion
Veau
Pierre d'Aigle
d'Azur
d'éponge
de Lynx
Hamatite
Judaïque
nephretique
ponce
Pignons
d'Inde
Piloselle
Piment
Pimpernelle
blanche
Pin
des bois
sauvage
Pissenlit
Pistaches
Pivoine
Plantain
Plomb
Pois chiches
Poivre blanc
d'eau
d'Espagne
d'Inde
long
noir
Poivrier
Poix
navale
refine
Polium
des Montagnes
Polygala feneka
Polypode
Polytric
Pomme de merveille
epineuse
Porc
Porreau
Pouliot
Pourpier
Prele

128 Priape de Cerf
Taureau 45
92
128 Primevère 140
189 Propolis 140
129 Pruneaux 140
92 Pulmonaire 142
de Chêne 142
127 Pyrethre 143
131 Pyrole 143

Q.

Queue de Cheval 68
Pourceau 133
Quinquina 49
Quintefeuille 130

R.

Raciné de Rhodus 147
salivaire 143
Raifort 144
sauvage 145
Raisin de bois 114
Corinthe 129
Damas 129
d'Ours 197
de provence 129
renad 129
passe 129
Rave 144
Recife 41
Reglisse 98
Reine des prés 26
Remors 111
Renard 197
Renduée 138
Reponce 145
Reprise 181
Rhapontic 147
vulgaire 147
Rhubarbe 146
des Moines 146
Ricin 42
Rièble 16
Ris 125
Ronce 151
Roquette 68
Rose blanche 149
pâle 149
rouge 149
Tremiere 101
Rosier sauvage 62
Rosmarin 14
de Bohême 149
Rossolis 148
Rubis 150
Ruë 151

S.

Sabine 152
Safran 58
batard 40
des Indes 60
Safranon 40
Sagapenon 153
Sago 153
Salab 155
Salpêtre 119
Salifi

Salfifi	187	Soldanelle	172	Toque	183
Sandarac	156	Sorbier	173	Tormentielle	185
Sang de Dragon	156	Souchet des Indes	60	Tortelle	69
Sangfuë	84	long	63	Tournesol	186
Sanicle	157	rond	63	en pâte	186
Santal blanc	157	Souci	36	bleu en drapeau	186
citrin	157	Soude d'alicante	171	rouge en drapeau	186
rouge	158	Soufre grossier	178	Toute bonne	162
Sapin blanc	1	jaune	178	Trefle	106
rouge	1	vif	178	de marais	188
Sapinette	24	Soye	168	Tribule aquatique	187
Saponaire	159	Spicanard	173	Troëne	96
Sapphir	159	Staphisaigre	175	Turbith	188
Sarcocolle	159	Stœchas Arabique	175	Turquette	83
Sariette	160	citrin	176	Tussilage	71 & 189
Sarsaparille	160	Storax arbre	176	Tutie	189
Sassafras	160	calamite ordinaire	176		
Satyrion	161	en larmes	176		
Sauge grande	155	pains	176		
petite	155	Sarilles	176		
fauvage	156	liquide vrai	176		
Savon d'Alicante	158	Commun	176		
de Venise	158	Stramonium	177		
ordinaire	159	Styrax Thymiana	184		
Sauvevie	151	Succin	177		
Saxifrage	161	Succisse	111		
Scabieuse	161	Sucre	152		
Scammonée	161	candi	153		
Schoënanthe	162	crud	152		
Scille	175	en pains	153		
Scinc marin	162	Suif de Cerf	45		
Scolopendre vulgaire	97	Sumach	178		
Scordium	163				
Scorpion	163				
Scorzonere	163				
Scrophulaire	164				
d'eau	164				
petite	48				
Seau de Salomon	169				
Sebestes	164				
Sedum petit	165				
Seigle	165				
Sel armoniac	18				
commun	154				
d'Epfom	154				
de fontaine	154				
de Sedliz	155				
Verre	195				
gemme	154				
marin	155				
purgatif amer	154				
Sementine	50				
Senecion	166				
Senecka	266				
Senegal Gomme	166				
Senné	167				
Serpent	168				
Serpentaire de Virginie	168				
Serpolet	169				
Serfifi	187				
Sesame	169				
Seseli de Candie	169				
Marseille	170				
Simaruba	170				

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Register

über die in der Materia Medica enthaltene deutsche Namen.

A

Al

Abelmoschsaamen 13
 Aberaute 1
 Akeley 16
 Akerhollunder 66
 Akermann 4
 Akerwertel 191
 Acorus falscher 4
 Adlerstein 5
 Afodill gelber 21
 Agstein 177
 Alant 67
 Alaun 9
 römischer 9
 Allermannsharnischwurz 191
 Altraumwurz 101
 Aloe 7
 Aloesholz 8
 Alpschossstein 99
 Amber süßiger 10
 grauer 9
 schwarzer 10
 Amberkraut 103
 Ameis große rothe 73
 kleine 72
 Amethyst 9
 Ammi cretischer 10
 gemeiner 10
 Amölein 11
 Ammoniac Gummi 10
 Andivien 67
 Andorn schwarzer 103
 weißer 102
 Angelic 12
 Anis 13
 Antimonium 15
 Apostemkraut 61
 Arabischer Gummi 16
 Armenierstein 18
 Arnick 18
 Aronenkraut 20
 Arsenic gelber 19
 rother 19
 weißer 19
 Arteff 187
 Asant sinkender 20
 wohlriechender 28
 Asche 20
 Aschensalz spanisches 171
 Attrich 66
 Augennichts 189
 Augentrost 70
 Augenwurz 190
 Aurin wilder 79
 Auripigment 23

B

Bachbunge 26
 Badblümlein 47

Badschwamm 174
 Bär 196
 Bärenklau 32
 gemeiner 32
 Bärentraube 197
 Bärlappen 99
 Bärwurz 109. 170
 Balsam echter 123
 von Canada 24
 Copaiva 24
 indianischer trockner 25
 peruvianischer 25
 weißer 25
 von Tolu 25
 Balsamapfel 111
 Balsambaum 123
 Balsamholz 123
 Balsamkörner 123
 Balsamkraut 111
 Basilicum 26
 Basilienkraut 26
 Baumwinde 80
 Bäumleinkraut 108
 Baumwollenstaude 30
 Baurensenf 184
 Bellinum 26
 Behen rother 27
 weißer 27
 Beinbruch 126
 Beinholz 96
 Belemnit 99
 Benedictenwurz 41
 Benuß 26
 Benzoe 28
 Berggrün 193
 Bergblau 18
 Bergcrystall 58
 Bergkümnel 170
 Cretischer 169
 Bergmelisse 107
 Bergmünz gemeine 34
 mit grossen Blumen 34
 mit Poley Geruch 34
 Bergpetersilie 124
 Bergpoley cretische 138
 mit gelben Blumen 138
 Bergsalz 154
 Bergzinnober 51
 Bernstein 177
 Bertram 143
 weißer 141
 Berufkraut 169
 Beienbaum 29
 Betonien 28
 Bettstroh 75
 Beyfuß 19
 Bezoar orientalischer 29
 occidentalischer 29
 Biber 42
 Bibergeil 42
 Biberklee 188
 Bibernell 134

Bibernell weiße 134
 Bienenharz 140
 Bienenkitt 140
 Biesam 111
 Biesamkörner 1
 Biesamthier 111
 Bilsenkrant 85
 weißes 85
 Bimsstein 142
 Bingelkraut 108
 Bitterholz Surinamisch 143
 Bitterklee 188
 Bittersalz 154
 Black 167
 Bley 137
 Bleyweiß 44
 Blutigel 84
 Blutkraut 134. 139
 Blutsauger 84
 Blutstein 80
 Blutwurz 185
 Bock 84
 Bocksdorn 186
 Bockshörnlein 170
 Bocksharn 72
 Bohne grosse 70
 Bolus armenischer 30
 rother 30
 weißer 30
 Borax 30
 Borretsch 31
 Bovist 31
 Brandlattich 189
 Braunwurz 164
 Brechwurz indianische 87
 Brennessel 197
 Brombeerstrauch 151
 Bruchkraut 83. 157
 Bruchstein 126
 Brunelle 141
 Brunnenkresse 116
 Bruschwurz 32
 Brustbeerle rothe 89
 schwarze 164
 Buchampfer 4
 Buchs 33
 Buckte 19

C

Cacaobaum 33
 Cajeputöl 34
 Calamenten 34
 Calmus 35
 Cameelstroh 162
 Camfer 36
 Canditzucker 153
 Canell 51
 weiße 198
 Capaun 38
 Capilairekraut 38
 aus Canada 18
 Capperin

Granatstein
Brieffholz
Brieffkraut
Brieffstein
Brieffwurz americanische
Brindwurz
Brünfban
Brundheil
Bürtelkraut
Buldengunfel
Bundeltreiben
Bundermann
Burfen
Butt Gummi

H.

Haarstrang
Haas
Haasfentohl
Haasfentappeln
Haasfentpötlein
Haber
Habermarct
Haberwurz
Hagenbirleinblüth
Hanf
Harnkraut
Harnkraut indianisch
Hartriegel
Harz gelb und weiß
Harzkrant
Haselstaude
Haselwurz
Hauhechel
Häufen
Haußblase
Haußlob größest
Haußwurz große
kleine

Hecht
Heckrose
Heldekraut
Heidelofp
Heidelbeeren
Heil aller Schaden
Heilwurz
Heinrich guter
Herbstblume
Herbstrose
Hermodattlen
Herzengleich
Herzgespann
Herzgesperr
Himbeer
Himmelschlüßelstein
Hindlaufwurz
Hirschkraut
Hirsch
Hirschbrunn
Hirschhorn
Hirschruthe
Hirschunschlitt
Hirschzunge
Hohlwurz
Holder
Holderschwamm
Hollunder
Homigflee
Hopfe
spanische
Huflattich
Hünerdarm
Hünerey

Pars I.

78 Hünernage
116 Hünerscherbe
107 Hund
117 Hundsarag
128 Hundskohl
92 Hundszunge
193 Hutzucker
124 Hyacinth
99 Hypocist
55 Hyssop
80
80
59
79

J.

Jalappewurz
weisse

133 Jasmin
94 Jbsche
172 Je länger je lieber
101 Jgnatiusbohne
131 Indigo
22 Ingwer
gelber
187 Johannisbeeren
schwarze
187 Johannisbrodt
126 Johanniskraut
37 Johannis trauben
schwarze
83 96 Jfop
4 Judasohr
96 Judentirschen
145 Judenpech
46 Judenweyrauch
22 Judenstein
20

K.

122 Kaffebaum
87 Kalchstein
166 Karmesinbeeren
165 Kaz wilde
98 Kazenkrant
98 Kazenmünz
68 Kazenschwanz
81 Kazenwurz
114 Kelleresel
191 Kellerhals
124 Keuschbaum
30 Kiechernebsen
54 Kiefer
101 Kienbaum
83 Kintina
141 Kirchenisop
39 Kirchenglein
39 Kirschen saure
150 schwarze wilde
140 Kirschengummi
49 Klapperrose
66 Klapperschlangenwurz
45 Klebkrant
29 Klettenkrant
44 kleines
45 Knabenkrant
45 Knoblauch
45 Knoblauchkrant
45 Kobalt
45 Kobold
45 Köfelförner
45 Königsferzel
45 Körbelkrant
45 Körfelkrant
45 Kork

75 Korn
8 Kornblume
37 Kornmünz
78 Kornrose
108 Krähang
62 Krebsaugen
153 Kreide
85 Kresse
86 Kropffschwamm
86 Kropffstein
Küchensalz
Kühpuppen
Kümmel römischer
schwarzer
Kümmich
86 105 Kutelum
104 Kuckelbeere
86 Kunigundentkraut
8 Kupfer
66 Kuttelfischbein
70
87
200
60
148
148
170
85
148
148
86
23
7
184
21
89
33
36
90
43
103
116
68
190
110
52
5
49
135
135
49
160
160
44
44
44
128
166
16
26
198
161 181
7
7
52
52
53
190
46
46
177

L.

Lacca Gummi
Laccmug
Lactenknoblauch
Lact
blauer
Florentiner
Ladan Gummi
Lad, Gummi
Lafurstein
Lattich
Lavandel
Lauch
Lauchelkrant
Laufdistel
Laufekrant
Laufsaamen Mexicanischer
Leberkrant edles
Leinkrant
klein
Lendenkrant
Lerchenschwamm
Lewat
Liebstöckel
Lilien blaue
gelbe
weisse
Linde
Linsen
Löffelkrant
schottisch
Löwenfuß
Löwenmaul
Lorbeerbaum
Luchstein
Lungenkrant
gesprengtes

M.

Magnet
Magfaamen
Majoran
edler
Mandlen
Manna
Mannaesche
Mannstreu
Maria Magdalenafrant
Mariendistel
Marum

G g g

Marum	103	Melken rothe	188	Vimpernellen	1
Maßblümlein	28	Melkenrinde	41	Vimpernisse Syrische	1
Maßlieben	28	Melkenzimmet	41	Vinienbaum	1
Mastichkraut	103	Neslen	197	Vistacien	1
Mastir	103	römische	197	Voley	1
Mastirholz	94	weisse todte	196	Vomorange	2
Maueresel	110	Nesseldoste zeylanische	4	Vomoranzenblütthe	1
Mauerkraut	128	Nichts graues		Portulac	1
Mauerraute	151	Nieswurze schwarze	77	Post	1
Maulbeerbaum	111	stinkende	81	Provinzrose	1
Mausedorn	32	weisse	81	Prunelle	1
Maßhölein	131	Ninfi	118	Purgierflachs	1
gelbe	23	Rußbaum	89	Purgierkörner	42
Meerballen	133			Purgiersalz	15
Meerhirs	109	D.		Purzelkraut	14
Meerkohl	172				
Meerkrebsscheeren	36	Schergelb	121	Q.	
Meermoos	57	Sch	181	Quassia	14
Meerroß	83	Schenbrech	122	Queckengras	7
Meerrettich	145	Schsenzung	33	Quecksilber	1
Meersalz	155	rothe	6	Quendel	16
Meertrauben	129	Odermenning	6	Quirtschbeere	17
grosse	129	Delbaum	121	Quittenbaum	6
Meerwinde	172	Deluz	122		
Meerzwiebel	175	Deljaamentkraut alexandrinisches	169	R.	
Megerkraut	75	Delhenich	122		
Meisterwurz	22	Ofenbruch	189		
schwarze	87	Olivenbaum	121		
weisse	22	Oprement	23		
Melde	106	Orlean	125	Rapunzel	14
Melilot	106	Osterluzen	18	Raute	15
Melisse	107	rechte runde	17	Rebstock	19
Melone	22	gemeine runde	18	Reckholder	8
Melte	92	lange	17	Regenwürmer	9
Mengelmurz	110	Otter	192	Reiger	1
Mennig	57			Reinblume	17
Menschenhirnschale	91			Reiß	12
Milch	45	P.		Reitich	14
Milzkraut	110			Rhabarber	14
Minium	113	Pöonien	137	Rhapontic rechte	14
Mirobalanen	193	Walnenbaum	63	gemeine	14
Mistel	64	Vanaxwurzel	124	Rheinfarn	18
Möhren	127	Vaninien	137	spiziger	141
wilde	176	Pantoffelholz	177	Rhodiserdorn	21
Möhrenkümme	37	Pappeln	101	Ringelblumen	3
Mohnstamen	52	Pappelrosen	101	Ritterpörn	35
Mottenkraut	110	Paradiesholz	8	Rocken	16
Mücke Spanische	146	Paradieskörner	128	Röthelstein	18
Mückengift	112	Pasteneyer	130	Rohr süßes	162
Mülleresel	96	Pech	136	Rose bleiche	149
Münchenrhabarber	162	Peponen	136	rothe	149
Mumie	120	Perle	130	weisse	149
Mundholz	120	Perlemutter	102	wilde	62
Muscateellerkraut	74	Perlenhirs	104	Rosenholz	148
Muscatenblütthe	104	Pestlenzwurz	109	Rosenwurzel	147
Muscatennuß	14	Peterskraut	132	Rosinen grosse	129
Muttergummi	109	Petersilien	128	kleine	129
Mutterkraut	42	macedonische	133	Rosshube	71
Mutternelken	114	Pfaffenröhlein	133	Roskamille	189
Mutterwurz	114	Pfeben	180	Rosmarin	46
Mutterzimmet		Pfeffer langer	130	Rosschwefel	14
Myrrhe		schwarzer	136	Ruben gelbe	178
N.		spanischer	136	weisse	64
		weisser	135	Rubin	144
Nabelkraut	195	Pfefferwurz	136	Ruhrwurz	150
Nachtschatten	172	Pfeilstein	135	Rupertskraut	185
Nägeleinköpf	11	Pfenningkraut	134		78
Narden celtische	173	Pferdschwanz	99	S.	
indische	173	Pfirsichbaum	49	Sadelbaum	152
Narrenkappen	16	Pfirsichkraut	68	Saflor	40
Natter	192	Pflaumen	131	Safran	58
Natterwurz	29	Pfriemenkraut	140	Safran wilder	40
Natterzünglein	122	Piment	76	Safran grün	174
			11	Saga-	

Agapengummi	153	Seidenblast	52	Tocamahaca Gummi	179
Agro	153	Seife gemeine	159	Täschleinkraut	33
Alben	155	venetianische	158	Tag und Nachtkraut	128
wilde	156	Seifenkraut	159	Tamarindenbaum	179
Almiac	18	Sens rother	171	Tamariske deutsche	180
Alpeter	119	weisser	68. 170	französische	180
Ammetrose	149	Senegalgummi	166	Tanne rothe	1
Andarach	156	Seneka	166	weisse	1
Andel gelber	157	Sennetblätter	167	Tannenbaum canadischer	24
rother	158	Serapinsast	153	Taubenkraut	191
weisser	157	Sesamkraut	169	Taubenkropflein	74
Anickel	157	Sesil	169	Tausendguldenkraut	43
Apphir	159	Sebenbaum	152	grosses	14
Asiafras	160	Siebenzeit	106	Terpentin cyprischer	182
Asparille	160	Siegelerde	182	gemeiner	182
Aturep	160	Siegwurz lange	191	Strassburger	182
Aubrodt	119	runde	191	Venetianischer	182
Auerampfer	3	Sigmarstrauch	6	Teufelsabbis	111
Auerke	4	Silberglätt	98	Teufelsdeck	20
Aufenchel	133	Singrün	192	Teufelsmilch	69
Aufkraut	172	Sinnau	6	Thee Boe	183
Aurach	28	Smaragd	171	grüner	183
Scabiose	161	Smirgel	171	mexicanischer	31
Scammoneum	161	Sodtbrodt	170	Theer	136
Schaafmüllen	5	Sonnengüsel	81	Thierlein	110
Schabab	118	Sonenthau	148	Thomaszucker	152
Sackerille	41	Sonnenwende	186	Thymian	185
Scharbockflee	188	Sophienkraut	172	cretischer	186
Scharbockkraut	48	Spargel	21	Thymseide	61
Scharlachbeeren	90	Speichelfraut	175	Toback	117
Scharlachkraut	162	Speichelmurz	143	Tollbeeren	27
Schiffpech	137	Spermaceti	45	Tormentill	185
Schirling	50	Sprauter	199	Tornis	186
Schlafkraut	85	Spicknarden	173	Tractanth	186
Schlange	168	Spießglas	15	Traubenkraut	31
Schlangenkraut	119	Spizwegerich	137	mexicanisch	31
Schlangenwurz	29. 164	Springkörner	42	Treibkörner	42. 43
virginische	168	Stabwurz	1	Trippel	183
Schlangenzünglein	122	weiblein	2	Turbith	188
Schlehedorn	3	Stahl	71	Tutia	189
Schlehenmoos	112	Stechapfel	177		
Schlehenfäst	3	Stechrüben	115		
Schlüsselblümlein	140	Steinbrech rother	71		
Schmerwurz	32	weisser	65. 161		
Schminckläpplein	186	Steinklee	106		
blaue	186	zahmer	106		
rothe	169	Steinleberkraut	95		
Schminckwurz	96	Steinöl	132		
Schnecke rothe	47	Steinpeterlen	134		
Schöllkraut	48	Steinsäame	109		
kleines	65	Steinsalz	154		
Schuppenwurz	84	Stendelwurz	161		
Schwalbe	192	Stephesäam:n	175		
Schwalbenwurz	174	Sternanis	13		
Schwamm	174	Sterndistel	35		
Schwammstein	3	Sternleberkraut	104		
Schwarzdorn	55	Stickwurz	32		
Schwarzwurz	178	Stier	180		
Schwefel gelber	178	Stöckhaß arabischer	175		
lebendiger	133	Stöckleinschwefel	178		
Schwefelwurz	139	Stopschwachs	140		
Schwein	16	Storax	176		
wild	19	feiner	176		
Schweinsbrodt	88	flüssiger echter	176		
Schwertel blauer	4	gemeiner	176		
gelber	58	in Röhren	176		
Schwindelkörner	163	rother	176		
Scorpion	164	Storchenschnabel	78		
Scorzonere	33	Streubelwurz	65		
Seckeleinkraut	155	Süßholz	98		
Seeligersalz	110	Syrupzucker	152		
Seebäumen weisse	83				
Seepferd	180				
Seichblumen	168				
Seide	168				
Seidenbälglein	168				

G g g 2

Ball.

Wallsaamen	172	Wernuth	2	
Wallwurz	55	römischer	2	
Wanzenkraut	149	Weichslen	44	
Wasserbathring	163	Wiederstoß rother	27	
Wasserbetonien	164	weisser	27	
Wasserdoften	69	Wiederthron golden	4	
Wassereppich	16	rother	188	
Wassermelone	51	Wiesenkümmel	40	
Wassermünz	108	Wiesensalben	163	
Wassernuß	187	Windenfaß purgierend	161	
Wasserpfeffer	131	Winterblumen	176	
Wegerich	137	Wintergrün	143. 192	
Weggras	139	Winterrosen	101	
Wegsenf	69	Wismuth	102	
Wegtritt	139	Wohlgemuth	124	
Wegwart	49	cretischer	124	
Wegweise	49	Wolferley	18	
Weiderich	100	Wolfsbeere	129	
fräuner	100	Wolfsmilch	69	
geiber	28	Wollkraut	190	
Weinnägelein	181	Wunderbaum	42	
Weinstein	193	Wundkraut	181	
Weinstock	121	gulden	55	
Weirauch	121	heidnisch	55	
wilder	184	Wurmsaamen	50	
Weirauchrinde				

FINIS PARTIS I.





A. Ω.

PHARMACOPOEÆ HELVETICÆ

PARS II, MEDICAMENTA SIMPLICIA ET COMPOSITA, GALLENICA ET CHEMICA

Ordine alphabetico tradens.

A.

ACETA SIMPLICIA.

ACETUM VINI.

Pro conficiendo Aceto Vini simplici, optimo, fumatur Dolium ligneum, *octoginta mensurarum*, totâ intrinsecâ superficie Spiritu vini probè humectatum, cui infunde Aceti boni, & Vini optimi calefacti *ana mensuræ octo*; & in nodulo suspende Piperis hispanici, granorum Paradisi, Zingiberis, Caryophyllorum aromaticorum, & Fermenti panis *ana q. s.* Dolium loco calido teneatur, cui post triduum denuo infundantur

Aceti calefacti *mensuræ octo*, & diligenter agitando commisceantur; dein triduo elapso, rursus addantur

Vini calefacti *totidem mensuræ*, & sic pergatur, quolibet tridui intervallo, novam vini calefacti portionem adjiciendo, usque ad dolii plenitudinem. Ità brevi tempore emerget Acetum Vini præstantissimum, usui servandum; de quo si quid depromatur, mox Vino calido per vices superingerendo, refarciatur. Vid. JUNCKEN *Lex. Chymi. pharmac. P. II. pag. 10.*

Pars II.

A

Alias

Aliàs quoque valentissimum Vini Acetum congelatione paratur, ubi scilicet generosior liquidi pars in meditullio concentratur, aquosiore, & viliori in circumferentia gelascente.

In usum, seu culinarem, seu medicum, eligatur. Acetum limpidum, sapore, odore, & acumine præstans, quod Ill. BOERHAAVIO Elem. Chem. T. II. Proc. 50. liquor est, ex vino, novâ fermentatione mirabili genitus, tenuis, per angustias vasorum corporis humani valde meabilis, cum quovis humore animali miscibilis, virtutis eximie refrigerandi, attenuandi, resolvendi, sudorem ciendi, stimulos acrioris bilis, alcalescens salis, aut putridi, in corpore nati, aut à morsu venenato ferarum profecti, coercendi, sitim sedandi, putredinem arcendi, nervos erigendi, spiritus movendi, vires roborandi, temulentiam discutiendi, erysipelati, phlegmoni, gangrænæ & sphacelo opitulandi. Debilibus, ait, languentibus, lethargicis, soporosis, syncoticis, vomituriensibus, incassum sæpe succurrere conatus, per artificiosissima Chemiæ producta, summum tandem ab Aceto, naribus, orique adhibito, vel in ventriculum ingesto, auxilium impetravi; quinetiam, quod soli credent experti, convulsis, hypochondriacis, hystericis prodesse, sæpius memini. Aliàs quoque in Febris acutis, ardentibus, biliosis, inflammatoriis, malignis, contagiosis, pestilentialibus, exanthematicis, celebratur. A nonnullis authoribus, etiam ad vermes, ad Colicam pituitosam, ad ventriculi ardorem, ad flatum commendatur.

Interno usu venit ad unciam semis, vel integram, per se, vel in potionem, julapio, mixtura, infuso, decocto, juscule.

Externè valet in collutoriis, gargarismis, fomentis, epithematibus, epicarpis, oxyrrhodinis, ad nares, ad præcordia &c.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

REC. Aceti vini optimi qu. pl. impleatur cucurbitæ vitreæ, magnæ, tertia vel dimidia pars, & ex arena, moderato igne destilletur; sic primùm prodibit phlegma, quo sublato, sensim ignis augeatur, ad spiritum colligendum, ante finem faciendo, quàm empyreuma sequatur; cujus scilicet vitandi causâ, non nisi tres circiter partes, sub debito ignis moderamine eliciendæ sunt.

Cel. Pharmacopœa Argentinensis, destillationem Aceti, per retortam, igne arenæ, compendiosius, meliusque procedere docet; ejusque scopum esse, ut depuretur acetum à partibus tartareis, & crudioribus, eoque subtilius ac durabilius reddatur, simplex enim Acetum sæpe vappescere, destillatum verò incorruptibile esse.

Acetum stillatitium est Liquor acidus, oleosus, salinus, ejusdem virtu-

tis, cum Aceto vini simplici, sed magis penetrabilis, & à terrestri inertia liberatus, adeoque agilioris, & validioris efficacis.

Usu potissimum venit, ad varia opera chemica, ad solutionem variorum corporum, ad Saccharum Saturni, & Arcanum tartari conficiendum, nec non ad correctionem virulentis quorundam mixtorum; quo scilicet scopo, ceu subtilius & spirituosius, minusque corruptibile, Aceto simplici præstat.

Pro usu autem interno datur ab uncia semis, ad unciam unam; licet in variis morbis acutis, putridis, malignis, contagiosis, hoc medendi scopo, Acetum vini simplex fere præferri mereatur.

ACETUM ROSARUM.

REC. Florum Rosarum rubrarum, sereno cœlo collectarum, & in umbra ficcatarum uncias sex.

Aceti vini optimi libras tres. Misce, digere per dies octo, tunc leni-

leniter expressus & filtratus liquor ad usum reponatur. Duplicità infusione cum aliis floribus, pro lubitu saturatius Acetum reddi potest.

Aceta vegetabilium medicata, cum aceto stillatitio parata, equidem magis sunt durabilia, nec tamen facultate præstantiora; quin imo cum aceto simplici confecta, usu tam interno, quàm externo, gratiora, odoratioraque esse videntur.

Coloris odorisque gratiâ commendabile hoc acetum, vires habet omnes aceti vini simplicis, supra memoratus, unà cum viribus Rosarum cardiacis, & adstringentibus, combinatas. Usu interno datur ad unciam semis, vel integram, cum vehiculo aquoso: in virium imbecillitate, animi deliquio, nausea, vomitu, febribus acutis &c. Usu vero externo, naribus subjicitur, vel temporibus, fronti, præcordiis, carpis manuum, instar epithematis applicatur; qua ratione vires roborat, nervosum genus erigit, spiritus movet, sensus excitat, æstum temperat, anxietates minuit, eoque nomine in vario morborum casu utilem opem præstat.

Simili ratione parantur alia quoque Aceta vegetabilium simplicia, videlicet:

FLORUM CALENDULÆ,
LAVENDULÆ,
LILIORUM CONVAL-
LIUM,
PAPAVERIS RHEA-
DOS,
SAMBUCI,
TUNICÆ,

FOLIORUM ET SUMMITA-
TUM RUTÆ.

Quæ vires habent Simplicium infusorum, unà cum virtute aceti propria.

Usu præcipuè veniunt externo, pro odoramentis, & epithematibus. Nihil tamen obstat, quo minus etiam interne adhibeantur, si ratio indicantium ita ferat.

ACETUM RUBI IDÆI.

REC. Baccarum Rubi Idæi maturarum libras duas,

Affundantur

Aceti Vini optimi libræ quatuor,

Digeratur per diem & noctem, tunc liquor decantatus novis baccis infusus, post alteram digestionem denuo colatus, usui servetur.

Hoc Acetum insigni coloris, odoris, & saporis gratiâ arridens, facultate pollet Aceti communi, & Rubi idæi propriâ, humectandi, refrigerandi, roborandi, sensus excitandi, putredinem arcendi, sitim sedandi, ardorem leniendi, inflammationem compescendi, &c.

Dosis uncia semis, vel integra, per se, vel in cibis, in potu, julapiis, nixturis, infusis, decoctis. In febribus acutis, ardentibus, inflammatoriis, malignis, putridis, &c. In siti flagrante, oris, labiorum, lingue, palati, faucium ardore, siccitate, scabritie, &c. cum aquæ fontanæ triplo, & Mellis, vel Sacchari q. s. dat colutorium, vel gargarisma præstantissimum; adjectâ sacchari despumati parte tertiâ, habetur Oxyssaccharum nobile, usu tam culinari, quàm medico frequenti celebratum.

ACETUM SATURNINUM, sive LITHARGYRII.

REC. Lithargyrii triti libram unam, Aceti vini destillati libras quatuor.

Coquantur lento igne, in vase figulino probe vitreato, spatulâ ligneâ diligenter agitando, donec acetum satis imprægnatum sit, quod per chartam filtratum usui servetur.

Validè adstringit, siccatur, repellit; nonnisi externo usu veniens, ad inflammationes, & ulcera maligna siccanda, & affluxum prohibendum; vel & gangrænam coercendam. Cum solutione aluminis pro cosmerico habetur;

tur; in quo tamen cautè agendum esse, Ill. BOERHAAVE monet, ne præter opinionem labes in pulmonem redundet: sex enim, vel septem nobiles puellas, ejus fuci abusu mortem obivisse. ELEM. CHEM. T. II. P. III. Process. 172.

Ità etiam ex depulsis tali remedio ulceribus faciei serpiginosis, varis, pustulis, non semel pectoris morbos consecutos esse, Excell. SCHULZIUS testatur. PRÆLECT. in DISPENS. BRANDEB. p. 8.

ACETUM SCILLITICUM.

REC. Scillæ præparatæ & exsiccatæ unciæ octo.

Aceti vini albi acerrimi libras octo,

Scillæ radices minutim incisæ, macerentur in Aceto per plures dies, dein acetum per pannum colatum ad usus reponatur.

Radix Scillæ ex antiquissimis est remediis, præcipuè in Scholis Pythagoreorum celebrata. Ejus acetum instar auxilii habebatur, valde roborantis, polychresti, & saluberrimi, imò etiam ad consequendam longævitatem conducibilis. Nec minùs insignem ejus efficaciam, actionem viscerum vitalem concitandi, humores attenuandi, resolvendi, meatus aperiendi, urinam ciendi, sudorem movendi, sreatum expediendi, &c. hodierna experimenta confirmant. Majore autem dosi, nausèam, vel & vomitum creat, interdum & alvum citat.

Usu tempestivo medetur solidorum debilitati & laxitati morbosæ, glutini & infarctui lento, tussi & asthmatis catarrhoso, frigido, pituitoso, cachexiæ, leucophlegmatiæ, hydropi, &c. Tarditatem aurium gargarisatione cum tali aceto, purgari, & transitum auditûs aperiiri, PLINIUS author est, Hist. N. L. XXIII. Cap. 2. quod Excell. SCHULZIUS suâ experientiâ confirmat. Prælect. in Disp. Brand. p. 9. Sed vetus est cautela, ne quis hoc aceto utatur, qui gingi-

vas, aut internarum partium aliquam exulceratam habet.

Dosis drachma una, ad unciam semis, cum sorbitione, julapio, vel cum Syrupo Capillorum Veneris, aut alio vehiculo idoneo; excessum in dosi cavere, prudens experientia suadet.

ACETA COMPOSITA.

ACETUM AROMATICUM, sive ODORATUM.

REC. Radicis Angelicæ,
Cyperi rotundi,
Galangæ minoris,
Zedoariæ ana un-
ciam semis,
Herbæ Basilici,
Salviæ nobilis,
Florum Lavendulæ,
Liliorum conval-
lium,
Anthos,
Rosarum rubrarum
ana drachmas tres,
Caryophyllorum aromatico-
rum,
Cinnamomi acuti,
Ligni rhodii,
Flavedinis corticum Citri re-
centium, ana drachm. duas.

Aceti vini optimi libras duas,
Incisis & contusis affundatur acetum, in vase vitreo mundo, & post digestionem aliquot dierum, filtratus liquor ad usum reponatur.

A speciebus vim habet aromaticam, roborantem, stimulantem, cum suavi fragrantia, nervoso generi amica, quæ cum socia virtute acetum, in vario debilitatis casu, salutarem opem præstat, aliis sæpe spirituosus anteponebam.

Externè usu venit ad nares, ad tempora, verticem capitis, nucham, scrobiculum cordis, ad carpos manuum, &c. In languore, oscitatione, lipothymia, palpitatione cordis, suffocatione hysterica, vertigine, affectibus soporosis, &c. Aliquando etiam internè ad unciam semis, pro indicantium ratione, adhiberi potest.

ACE-

ACETUM BEZOARDICUM.

REC. Radicis Angelicæ,
 Enulæ,
 Hirundinariæ,
 Imperatoriæ,
 Zedoariæ, ana drach-
 mas sex,

Herbæ Rutæ,
 Salviæ,
 Scordii, ana unciam unam,
 Baccarum juniperi, unciam semis,
 Flavedinis Corticum Citri, drach-
 mas sex.

Minutim incisæ affundantur
 Aceti vini optimi non destillati
 libræ tres.

Post sufficientem digestionem, ex-
 primantur, & filtratum acetum
 usui fervetur.

In morbis epidemicis, malignis, conta-
 giosis, ipsaque pestilentia, exter-
 nè ad collutionem oris, ad odora-
 tum, & epithemata commenda-
 tur: internè autem ad unciam se-
 mis, vel integram propinatur, per
 se, vel in mixturis, &c.

ACETUM BEZOARDICUM

five

AQUA PROPHYLACTICA
SYLVII.

REC. Radicum Angelicæ,
 Zedoariæ ana un-
 ciam unam,
 Petasitidis uncias
 duas,

Foliorum Rutæ hortensis
 uncias quatuor,

Melissæ,
 Scabiosæ,

Florum Calendulæ ana un-
 cias duas,

Nucum juglandium imma-
 turarum confissarum li-
 bras duas,

Pomorum Citreorum re-
 centium confissorum
 libram unam.

Contusis omnibus affunde

Aceti vini optimi libras duodecim.

Digerantur per noctem, manè de-
 stillentur igne lento, ad ficcitatem
 fere, cavendo empyreuma, ace-
 tum prolectum usui fervetur.

Pars II.

Ejus vires sunt antiseptica, roboran-
 tes, sudorifera, alexipharmaca;
 Clar. SYLVIIUS illud admisceri
 suadet potui ordinario, mixturis,
 julapiis, jusculis, &c. cen exci-
 mium antidotum, præservativo &
 curativo scopo idoneum, scil. ad
 sudorem eliciendum, bilis acrimo-
 niam corrigendam, sitim lenien-
 dam, vomitum compescendum, oris
 amarorem emendandum, præser-
 tim in pestilentia, & morbis va-
 riis epidemicis, contagiosis, pu-
 tridis, febrilibus, &c. Externe
 pro collutorio, ad nares, ad tem-
 pora, ad præcordia, carpos ma-
 nuum, &c. interne ad unciam
 semis pro dosi, cum vehiculo aquoso.

ACETUM HYSTERICUM.

REC. Foliorum Rutæ hortensis un-
 ciam unam,

Gummi Galbani unciam se-
 mis,

Affæ fætidæ,

Castorei optimi ana drach-
 mas duas.

Misce, concis. contusis affunde

Aceti vini opt. libram unam.

Digerantur per dies aliquot ad suf-
 ficientem extractionem, tunc
 Liquor filtratus usui fervetur.

Facultatis est roborantis, excitantis,
 antispasmodicæ, antihystericæ, &c.
 Usu præcipue externo valet, ad
 nares, ad verticem capitis, ad
 nucham, ad tempora, ad præcor-
 dia, ad carpos manuum, &c. in
 affectibus hystericis, convulsivis,
 suffocatione, anxietate, lipothy-
 mia, syncope, palpitatione cordis,
 vertigine, oscitatione, sopore, epi-
 lepsia, nausea, vomitu, &c.

Nonnunquam urgente casu etiam in-
 ternè dari potest, ad drachmam
 unam vel duas pro dosi, cum ve-
 hiculo aquoso.

ÆRIS FLORES five ÆS VIRIDE
CRYSTALLISATUM.

REC. Æruginis, five viridis æris
 in pulverem triti libram
 unam,

B

Aceti

Aceti vini destillati libras
sex.

Immittantur cucurbitæ vitreæ, macerentur in loco calido, acetum tinctum, per inclinationem vasis, effundatur; novumque affundatur. Hoc fiat aliquoties & tandem in vase cupreo æs viride, additâ sufficienti aceti quantitate, coquatur, ut solvatur. Tincturas omnes per filtrum tractas leni calore evaporari permitte ad cuticulam, & ad crystallisandum, in locum frigidum repone. Crystallinos inter chartam lenissimo calore exsiccatas serva.

Rarus in Medicina usus, nisi ad unguenta mundificantia, & spiritum veneris destillandum. A Piætoribus, & Mechanicis frequentius expetuntur.

ÆS USTUM.

Æris laminæ stratificantur cum sale culinari, atque in crucibulo probe lutato cæmentantur per duodecim horas, vel usque dum friabiles existant, quæ in pulverem tritæ ad usum reponuntur.

Usus est externus in exsiccandis præsertim ulceribus.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS.

REC. Antimonii crudi purissimi, optimè triti *uncias duas*,
Mercurii vivi è cinnabari resuscitati *unciam unam*.

Terantur multum & diu, in mortario vitreo, usque dum omnes globuli mercuriales evanescant, quod longâ & patienti triturâ perficitur.

Servetur in vitro, vel pyxide lignea.

Huic Æthiopi vires tribuuntur attenuantes, resolventes, antiscorbuticæ, antiveneræ, antarthriticæ, anthelminticæ, &c. Salivationem non solet movere, eo quidem minus, si alternis hebdomadis alviductio interponatur. Usu potissimum venit, in morbis ob-

scænis, scorbuticis, arthriticis, scabie, impetigine, serpigine, tumoribus glandularum colli diuturnis, ulceribus antiquis, cancro occulto, & aperto, febre quartana, lumbricis, &c. Dosis apud adultos ad grana quindecim, scrupulum unum, in pulvere, in bolo, in pilulis. Post singulas doses, haustum decocti radices Bardanæ, vel aliis similis subjungere convenit; Atque inter ejus usum, à vino, cibisque acidis, acris abstinere. In exulcerationibus viscerum ab Exc. SCHULZIO l. c. hic æthiops dissuadetur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

REC. Mercurii vivi è cinnabari resuscitati *uncias tres*,
Florum Sulphuris *uncias duas*.

Misceantur & terantur in mortario vitreo, vel marmoreo satis diu & diligenter, donec mercurius planè dispareat, & cum floribus Sulphuris in pulverem nigrum redactus sit.

Hunc æthiopem gravissimus auctor BOERHAAVIUS, pro massa fossibili inerti, & naturæ hominis indomabili habet, vix nisi vermibus necandis idoneâ, cui sententiæ plures alii subscribunt. Dum aliis contra, ad sanandos glandularum colli tumores, ad aures manantes, exulcerationes fistulosas, ad amarosin, scabiem siccam, menstruorum varia vitia, ad atrophiam infantum, mali veneri principia, febrem quartanam, &c. viribus cum præcedenti æthiope analogis, instar nobilis, efficacis, & securi medicamenti, sub fide experientiæ celebratur. In tanto auctorum divortio, ab experimentis tantum solidis, & satis cumulatis stare, prudentia jubet.

AGARICUS TROCHISCATUS.

Agaricus albissimus radulâ comminuitur, atque per cribrum transmittitur,

mittitur, postea in mortario lapideo pistillo ligneo, cum vino, in quo Zingiber infusum fuit, in massam cogitur, quæ massa in trochiscos majores formatur, qui ut eo magis albescant, hyeme sunt parandi, & in frigore exsiccandi.

Per trochiscationem, quam vocant, correctior habetur, atque in vinis medicatis ad unciam semis infusus, pectoris vitiis, humores crassos & viscidos educendo, mederi creditur. Modicâ dosi, ad sudores immodicos, & colligativos coercendos valuisse, quorundam experimenta testantur.

ALCIS CORNU PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

Cornu Alcis in frustra dissectum in magna copia aquæ fontanæ coquitur, ut mollescat & medullosa exteriorque corticosa pars cultro auferri queat; cornu exsiccatum in pulverem tenerimum teritur & asservatur.

Præ aliis ossibus calcinatis parum prærogativæ habet. Præstat cornu alcis in scobem redactum, & in subtilissimum pulverem tritum, adhibere: additur pulveribus antepilepticis, & antispasmodicis.

Dosis à scrupulo uno ad duos.

ALOE DEPURATA five LOTA.

Vid.

EXTRACTUM ALOES AQUOSUM five GUMMOSUM.

ALOE INSUCCATA.

Quæ cum succo, vel infuso saturato Rosarum, aut Violarum paratur Aloë simplex rosata, aut violata dicta: aut cum succis quatuor combinatis Borraginis, Buglossi, Rosarum & Violarum, composita insuccatio, vix aliquid virtutis accessorix, ab istis succis accipere, neque adeo præ aloë depurata simplici, aliquid prærogativæ habere videtur, ideoque citra dispendium talis insuccatio poterit omitti.

ALUMEN SACCHARINUM.

REC. Aluminis crudi vulgaris *uncias sex,*
Cerussæ venetæ albæ *drachmas sex,*
Vitrioli albi *drachmas tres,*
Sacchari albi canariensis *unciam unam semis.*

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui albumine ovorum & aceti destillati æquali portione in mellis liquidi consistentiam diluatur, probèque agitatus, formis chartaceis, parvis, conicis infundatur, & siccetur.

Usus præcipuus est in Collyriis & Cosmeticis; detergit & carnem luxuriantem aufert.

ALUMEN TINCTUM MYNSICHTI.

REC. Aluminis *unciam unam,*
Sanguinis Draconis veri *unciam semis.*

Cum Aquæ Cardui benedicti q. s. solvatur, dein filtratum ad siccitatem exhalet.

Saporem ingratum oppidò corrigit Nucis moschatæ additamentum.

Virtute adstringente ac antipyreticâ quandoque ad profligandas febres intermittentes contumaces valet, nisi ratio causæ, & conditio viscerum repugnet.

Dosis scrupulus semis ad unum, aliquot horis ante paroxysmum febrilem.

ALUMEN USTUM.

REC. Aluminis vulgaris albi quantum volueris, coquatur & calcinetur in olla fictili nova, donec totum Alumen spiritibus expulsis, leve, porosum, & quasi spumosum evaserit.

Virtute cathæreticâ, & adstringente, usu externo venit, in forma pulveris subtilis, ad carnem luxuriantem coercendam vel consumendam; interdum quoque Dentifriciis deterfivis modicè admiscetur,

vel gingivis luxuriantibus cautè applicatur.

ANTIHECTICUM POTERII.

REC. Reguli Antimonii simplicis
uncias sex,

Jovis, five Stanni Anglici
uncias duas.

Fusa in crucibulo, effundantur, terantur in pollinem, & cum Nitri puri, probè ficcati triplo, vel *unciis viginti quatuor* mixta, in crucibulo detonentur. Refrigerant, massa alba cærulescens iterum teratur, & sufficienti copiâ aquæ fontanæ calidæ edulcoretur, tandem aquâ copiosâ diluatur, ut ponderosior pars fundum petat, levior autem cum aqua, per inclinationem vasis, ab illa separari queat. Pulvis subtilior ita paratus eluatur, leni calore ficcetur, & usui fervetur.

Alias porrò præparandi rationes vid. in Cl. JUNGKEN *Lexic. Pharm. Chem.*

Hujus medicamenti virtus est adstrictoria, suspectæ indolis saturninæ. Vulgo quidem ad hæcticam, & phthisin incipientem, ad sudores colliquativos, ad fluxum sanguinis, & seminis; quin etiam à nonnullis ad luem obscœnam, hydropem, scorbutum prædicatur. Rationes autem chemicæ, & experimenta valde repugnant. Illustri STAHLIO inepta nominis assignatio, & frivolum medicamentum censetur, quod nulli hæctico levamen adferre, nedum mederi queat.

Dosis vulgò ad Drachmam semis statui solet.

ANTIMONII BUTYRUM & CINNABARIS.

REC. Mercurii sublimati corrosivi
libras tres.

Antimonii crudi *libram unam.*

Trita in mortario marmoreo, vel vitreo optimè misceantur, & aquæ fontanæ *unciâ unâ* irrorentur. Immittantur retortæ capaci, & instituatur destillatio igne arenæ, per gradus aucto; educto

liquore crasso, butyri instar, ignis augeatur, atque etiam ad gradum suppressionis *per tres vel quatuor horas* adhibeatur, ut Cinnabaris in collum retortæ sublimetur. Refrigeratis omnibus cinnabaris sublimata conteratur subtiliter, abluatur aquâ fontanâ, & denuo è cucurbita sublimetur; Butyrum verò seorsim fervetur.

Hæc Cinnabaris nihil est aliud, quàm Mercurius, cum sulphure antimonii combinatus, nihilo-fortè præstantior Cinnabari vulgari ritè elaboratâ, nisi pretii discrimine. Vulgo tamen ipsi vires singulares, & specificæ, cephalicæ, antepilepticæ, antispasmodicæ tribuuntur, licet alii vix notabilem ejus in corpore humano effectum agnoscant.

Butyrum verò est concentratissimus salis spiritus, regulinâ antimonii parte saturatus; facultatis summè corrosivæ, quod proin Chirurgi instar caustici usu venit. Præterea quoque ad varios labores chemicos, & pharmaceuticos adhibetur, suo loco dicendos.

ANTIMONII CLYSSUS.

REC. Antimonii crudi,
Nitri,

Sulphuris ana *libram semis.*

Pulverisata misce, & in retortam tubulatam candentem, recipientem magno, cui aquæ simplicis *libra una* infusa, adaptato, nec exactè nimis lutato, successivè ad *drachmas duas* unâ ingerere, ac mox frustulo luti madidi, linteo- lo involuto, tubulum benè claudere; ubi nebulae in recipiente cessaverint, perge ingerendo, donec omnis materia ingesta detonerit; tum liquorem omnem, in recipiente collectum, hinc inde agitando, effunde, filtra, atque aquam ad dimidias abstrahere, & clyssum, sive liquorem acidum residuum in vase clauso serva.

Sitim & calorem nimium extinguit, & in febribus etiam malignis, loco spiri-

Spiritus vitrioli, potui ordinario, vel Julapiis addi, & ad tincturas florum rosarum, & aliorum exaltandas adhiberi solet.

Dosis vix determinari potest; sufficiunt plerumque guttæ quindécim.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM SIMPLEX.

REC. Antimonii optimi libram unam,
Nitri depurati ficcissimi libras tres.

Subtilissimè pulverisata, & exactè mixta, in crucibulo magno ignito, per vices ingesta, detonentur, & agitentur spatulâ ferreâ inter detonationem, ut materia æqualiter deflagret, & calcinetur. His peractis, massa albicans sufficiente quantitate aquæ dissolvatur, pulvis albus fundum petens, copiosâ aquâ affusâ diluatur, ut commovendo subtilior pars cum ea decantari possit, quæ edulcorata & ficcata usui servetur.

Hoc celebre præparatum chemicum, est pars Antimonii regulina per Nitrum calcinata, à nonnullis authoribus pro inertî calce habita, unde vix ullus in corpore humano effectus expectari queat; cui tamen ab aliis virtus absorbens, resolvens, diapnoica, & sanguinem purificans, & si minùs abluta, & edulcorata fuerit, alvum nonnihil stimulans attribuitur. Cum emeticis, aut purgantibus sociatum, horum actionem & effectum secundare observatur. Perfectè edulcoratum hoc Antimonium, si Tartaro emetico jungatur, hujus vim intendere, at minus edulcoratum, per alvum operari Exc. SCHULZIUS docet, Prælect. in Disp. Brand. p. 29. Quidam ipsum à vetustate vitium, & virulentiam contrahere affirmant, unde graves anxietates, vomitus, aliaque symptomata periculosa successerint, quod alii experienciâ freti refellunt, & post elapsum integrum

Pars II.

quadriennium, si modo ritè paratum, & custoditum fuerit, etiam infantibus tutò & securè adhiberi posse, adseverant. Usui venit in febribus omnivariis, in dyscrasia humorum acri, acida, in rheumatismis, scabie, &c.

Dosis scrupulus unus, drachma semis, in pulvere, mixtura, emulsione, &c.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

REC. Limaturæ Martis puræ, Antimonii crudi optimi *an* uncias octo.

Misceantur benè trita, & crucibulo candenti per vices immisâ, agitentur baculo ferreo, usque dum in scorias mixtura abiisse videatur quæ accuratè contrita, & cum triplo Nitri crudi ficcissimi, & purissimi mixta, in crucibulo candenti detonetur, atque post lenem calcinationem, in aquæ tepidæ sufficienti copia solvatur. Sic subsidebit pulvis è luteo fuscus, qui additâ copiosâ aquâ diluatur, ut levior, ac subtilior pars à graviore separetur, quem edulcoratum, atque leni calore ficcatum serva.

Propter martiales particulas leniter adstringit, tonum ventriculi & intestinorum roborat, cachecticis & ictericis prodest.

Dosis grana quindécim ad scrupulum unum.

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Aquæ officinales aliæ per destillationem, aliæ fecus parantur, à prioribus ordiri lubet, ac posteriores subungere. In officinis majoribus aquæ stillatitiæ simplices admodum numerosæ usu veniunt, sed magnam partem supervacuæ, quibus interdum aqua fontana bonæ notæ præstaret, quasque adeo vel abrogare, vel saltem restringere liceret, nisi opinio vulgi, & recepta consuetudo obstaret. Cæterùm destil-

C

latio-

lationis ratio, pro diversa vegetabilium indole, aliquid discriminis habet, quatenus herbæ quædam magis aut minus succulentæ, aliæ succo valde acriturgentes, aliæ verò aromaticæ ac odoriferæ sunt, ideoque plus vel minus aquæ affundendæ requirunt. Quò parcior aqua speciebus adjicitur, eò liquor stillatitius efficacior, cæteris paribus, & quo uberior aqua additur, eò remissior obtinetur. Quoad Vasa destillatoria cuprea, interest illa stanno probè incrustata adhibere, ne aliàs liquidum stillans inde noxam trahat. Porro aquæ destillatæ simplices sine vino paratæ, vix integris viribus in annum durabiles sunt, ac eapropter quotannis semel, aut bis renovandæ. Acres & aromaticæ aliquam habent exceptionem.

Aquæ simplices primùm vires habent cum elemento aquoso communes, humectandi, diluendi, attenuandi, resolvendi, refrigerandi, &c. dein à parte vegetabilium, pro indole & qualitate principii solubilis, varias plus minus activas. Quarum principia sunt viscosiora, aut fixiora, parum aut vix aliquid virtutis aquæ destillandæ impertiunt; plantæ verò acres, tenui, volatili, & activo elemento prægnantes, utique hujus liquorem stillatitium participem reddunt. Sicut etiam species aromaticæ, oleosæ, salino-volatiles moleculas suas liquori destillando infnuant, quæ manifestâ odoris, & saporis efficaciam se produnt.

Usu veniunt aquæ destillatæ simplices, tum per se, tum in julapiis, mixturis, emulsionibus, &c.

Blandæ, parum sapidæ, ad uncias plures pro dosi: acres autem, vel aromaticæ, ad unciam unam, duas, plus minus, pro varia efficacia, ac indicantium ratione.

AQUA DESTILLATA BETONICÆ.

REC. Herbæ rec. Betonice qu. pl.

Concisis affundatur aquæ fontanæ triplum ponderis circiter, & post macerationem horarum viginti quatuor, in vesica cuprea benè stanno incrustata, lege artis blando igne destilletur incirca dimidium, vel quousque liquor stillans idoneum saporem præferat.

Præter vim aquæ communem, nonnihil fortè virtutis à Betonica propriæ habet, ac proinde usu venit in morbis, quorum curationi ipsa Betonica adhibetur.

Dosis ad plures uncias, per se, vel in julapiis, mixturis, emulsionibus, &c.

Pari ratione destillantur aliæ plures Aquæ, ex herbis parum succulentis, ut sunt:

ANSERINA,
BURSA PASTORIS,
CALENDULA,
CARDUUS BENEDICTUS,
CENTAURIUM MINUS,
EUPHRASIA,
FRAGARIA,
FUMARIA,
GALEGA,
HEPATICA NOBILIS,
PLANTAGO,
PRUNELLA,
QUERCUS FOLIA,
SAXIFRAGIA,
SCABIOSA,
SCORDIUM,
SCORZONERA,
SIGILLUM SALOMONIS,
SOLANUM,
TUSSILAGO,
VALERIANA,
VERBENA,
VERONICA.

De quarum viribus, & usu, ex ipsa simplicium historia, secundum Chemie principia, iudicium ferre par est.

AQUA DESTILLATA ACETOSÆ.

REC. Herbæ recentis Acetosæ
qu. pl.

Incisæ affundatur aquæ fontanæ duplum ponderis, & post macerationem horarum duodecim lege artis moderato igne destillantur prope duæ tertiæ partes, vel quousque liquor stillans debitam qualitatem servat.

Humectandi, diluendi, refrigerandi scopo adhibetur, per se, vel in iulapiis, mixturis, &c. in febribus, inflammatione, ardore, siti flagrantē, &c. ad plures uncias pro dosi.

Simili modo parantur aliæ Aquæ simplices, ex variis plantis valde succulentis, ut sunt:

ACETOSELLA,
ANAGALLIS,
BELLIS,
BORRAGO,
BUGLOSSUM,
CARDUUS MARIE,
CICHORIUM,
LACTUCA,
• ENDIVIA,
PORTULACA,
SEDUM,
TARAXACUM,
TELEPHIUM,
URTICA.

De viribus & usu harum aquarum, ex ipsa simplicium notitia, & scientiæ chemicæ præceptis, judicare licebit.

AQUA COCHLEARIÆ.

REC. Herbæ recentis Cochleariæ,
qu. pl.

Incisæ affundatur aquæ in circa duplum, & post brevem macerationem, lege artis destillatione propoliantur liquoris prope duæ tertiæ partes, vel quousque sapidæ qualitatis esse pergat.

Acrimoniâ saporis ipsam Cochleariæ indolem præ se fert, ejusque viribus gaudet, attenuandi, resolvendi, aperiendi, scorbutum acidum, frigidum sanandi, &c.

Dosis uncia una, duæ per se, vel in iulapiis, &c.

Pari ratione instituitur destillatio ex aliis herbis acri succo turgidis, ut sunt:

HERBA ARI,
BECCABUNGÆ,
NASTURTI,
RADICES RAPHANI hortensis,
rusticani.

Quarum vires, & usus, cum præcedenti analogiam habent, atque ex doctrina materiæ medicæ amplius innotescunt.

AQUA ABSINTHII.

REC. Herbæ Absinthii recentis,
qu. pl.

Incisæ affundatur aquæ fontanæ quadruplum ponderis, & post macerationem horarum viginti quatuor, lege artis destilletur liquoris prope dimidium, vel quousque ejus conditio sapida placebit.

A particulis activis absinthii, saporem habet amarum, aromaticum, cum virtute roborante, stomachica, carminativa, antihysterica, &c.

Dosis uncia una ad duas, per se, vel cum saccharo, aut Syrupo edulcorata.

Ad eundem modum destillantur plures aliæ aquæ, ex variis herbis aromaticis, ut sunt:

ANGELICA,
ABROTANUM,
ARTEMISIA,
CHÆREFOLIUM,
CHAMOMILLA,
FOENICULUM,
HEDERA TERRESTRIS,
HYSSOPUS,
LAVENDULA,
LEVISTICUM,
MAJORANA,
MATRICARIA,
MELISSA,
MENTHA,
PETROSELINUM,
PULEGIUM,

ROSMARINUS,
RUTA HORTENSIS,
SALVIA,
SERPILLUM,
TANACETUM.

De viribus, & usu talium aquarum, ex notitia specierum chemico-practica, judicium ferre oportebit.

AQUA FLORUM ACACIARUM.

REC. Florum Acaciarum recentium q. pl.

Affuso aquæ fontanæ pondere triplo, vel parciore citra longam macerationem, lege artis, igne moderato, destilletur liquoris circiter dimidium, vel quousque ejus sapida qualitas, & fragrantia suadebit.

Flores nobiliores ex cucurbita stannea, aut vitrea, in Balneo maris destillare præstat, idque cum modica aquæ additione, quò sic & fragrantior, & efficacior aqua obtineatur.

Hæc aqua odore suaveolenti, & sapore jucundo se commendat, facultate refocillante, cardiacâ, stimulante. Quod si ejus libra una, cum saccharo ebulliat, ac tepidè hauriatur pro dosi, aliquoties vomitum concitare in adultis, experimenta fidem faciunt; idemque minore dosi in pueris expectare fas est. Cæterum usu venit in virium languore, muco vel pituita, fauces, bronchia, stomachum, onerante, raucedine catarrhali, tussi, &c.

Dosis uncia una, duæ, per se, vel saccharo, aut syrupo dulcorata; item in julapiis, mixturis, emulsionibus, &c.

Pari ratione destillantur aquæ simplices, ex aliis atque aliis floribus, ut sunt: .

FLORES AURANTIORUM,
CITRI,
CHEIRI,
CYANI,
LILIORUM ALBORUM,
CONVAL-
LIUM,

FLORES NYMPHÆÆ,
POEONIÆ,
PRIMULÆ VERIS,
ROSARUM,
SAMBUCI.

Quarum vires, & usus, ex indole ac natura specierum definiendus erit.

AQUA ANISI.

REC. Seminis Anisi recentis optimi libram unam.

Affuso aquæ fontanæ sextuplo, macerentur per biduum, tunc moderato igne destilletur aquæ lacteæ ultra dimidium, vel quousque liquor stillans boni coloris & saporis apparebit.

Cum sapore aromatico grato, stomachum roborat, cruditatem corrigit, flatus pellit, sub dosi uncia unius, ad duas, per se, vel cum saccharo, aut syrupo, edulcorata; item in mixturis, &c.

Eodem modo parantur Aquæ, ex aliis feminibus aromaticis:

FOENICULI,
CARVI,
CUMINI.

Quarum vires à principio activo, aromatico, stimulante, roborante, carminativo, æstimare licet.

AQUA CARYOPHYLLORUM AROMATICORUM.

REC. Caryophyllorum aromaticorum uncias tres,

In pulverem subtilem tritis, affundantur

Aquæ fontanæ libræ quatuor;

Et post macerationem tridui, lege artis destillentur aquæ lacteæ circiter libræ tres, usui servandæ.

Inter aquas cordiales, & stomachicas referri meretur, & ob gratum sorem, mixturis cardiacis addi potest.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

REC. Cerasorum nigrorum recentium libras centum.

Eligan-

Eligantur cerasa nigra parva, dulcia, optima, & ilico contusa, confractis simul officulis, affusâ modicâ aquæ copiâ, lento igne destillentur circiter libræ decem, vel plures, donec sapor incipiat vilescere.

Odore & sapore jucunda, temperatæ virtutis cardiacæ, analepticæ, cephalicæ, commodè usu venit in vario languoris casu, in oscitatione, suspirio, vertigine, &c. ad unciam unam, duas, vel plures, per se, vel saccharo cando, albo, vel syrupo Capillorum dulcorata; vel in julapiis, mixturis, emulsionibus cardiacis.

AQUA CINNAMOMI BUGLOSATA.

REC. Cinnamomi acuti *uncias sex, Aquæ Buglossi libras novem.* Contusa macerentur per biduum, tunc lento igne destillentur circiter aquæ libræ sex.

Saporis aromatici, palato jucundi, facultatis roborantis, stomachicæ, cardiacæ, mitioris, quàm altera aqua cum vino destillata, inferius dicendæ.

Dosis uncia una per se, vel in julapiis, mixturis, emulsis.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

REC. Cinnamomi acuti *uncias quatuor,*

Succi Cydoniorum recenter expressi libras sex.

Contusa infundantur per triduum, tunc lege artis eliciantur liquoris circiter *duæ tertiæ partes.*

Vires & usus, ut præcedentis.

AQUA CINNAMOMI ALIA.

REC. Cinnamomi acuti *libram unam,*

Aquæ Cerasorum nigrorum libras duodecim.

Contusa misce, digerantur per triduum, tunc lege artis circiter *duæ tertiæ partes* liquoris elician-

Pars II.

tur, vel quousque saporis gratia suadebit.

Vires cinnamomi nobiles, cum accessoria virtute analeptica cerasorum suavi.

Dosis uncia semis, vel integra, per se, vel saccharo, aut syrupo dulcorata; vel in julapiis, mixturis.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM, vel CITRI.

REC. Corticum recentium Aurantium, vel Citri *libram unam.*

Concisis, contusis affundantur aquæ fontanæ *libræ quatuor*, & post macerationem unius horæ, igne moderato destillentur incirca *libræ duæ*, usui servandæ.

Vis aromatica corticum moderata, roborans, stomachica, carminativa; usus commodi in stomachi debilitate, cruditate, anorexia, flatulentia, &c.

Dosis uncia una per se, vel cum saccharo, syrupo mixta; vel in mixturis.

AQUA FLORUM OMNIUM.

REC. Stercoris vaccini recentis mense Junio collecti, quantum placet,

Includatur sacco lineo, & cum triplo aquæ fontanæ, ex vesica, leni igne destilletur, atque ex qualibet libra stercoris, *circiter libra una semis* aquæ proliciatur.

Laudatur ad arthritidem, colicam, calculum, & urinæ suppressionem; externè inter cosmetica numeratur.

Dosis uncia una, vel altera, per se, vel in mixturis.

AQUA FRAGORUM.

REC. Fragorum sylvestrium recentium *libras quatuor.*

Parum contusis affundantur aquæ fontanæ *libræ octo*, & post brevem macerationem eliciantur aquæ *libræ quatuor*, vel plures, donec liquor defierit odorus & sapidus esse.

D

Diluens

Diluens, temperans, refrigerans, usu venit in nephritide, calculo renum, stranguria, &c.

Dosis plurimum unciarum, per se, vel in julapiis, mixturis, emulsis.

AQUA MELLIS.

REC. Mellis quantum lubet. Destilletur cum aquæ font. q. f. per vesicam, usque dum guttæ exstillantes aclescere incipiant.

Inservire potest internè cochleatim, ad urinam, & menses ciendos; ut plurimum autem usurpatur externè ad capillos adaugendos.

AQUA MYRRHÆ.

REC. Myrrhæ rubræ uncias octo, In pulverem comminutis, infunde

Aquæ fontanæ libras sex, & post digestionem per triduum in loco calido factam, destilla lento igne, atque aquæ oleosæ suavissimi odoris, libras quatuor elice.

Commendatur in affectibus, à vitio mensium ortis, & morbis pectoris, atque ventriculi.

Dosis uncia una, per se, vel cum saccharo, syrupo dulcorata.

Ex residuo in vesica, Extractum Myrrhæ parari potest, si per pannum laneum colatur, & leni igne ad mellis consistentiam evaporatur.

AQUA NIVIS.

REC. Nivis recentis puræ qu. pl. Nivis recens delapsæ, vel glaciei puræ q. f. vasi destillatorio immissâ, lege artis, moderato igne, eliciantur circiter duæ tertiæ partes, usui servandæ.

In quibusdam familiis, instar arcani celebratur; & viribus humectandi, refrigerandi, leniendi, diluendi, resolvendi, commodè adhibetur in morbis acutis, febrilibus, inflammatoriis, &c. pro portione scilicet ad libitum haurienda.

AQUA RUBI IDÆI.

REC. Baccarum Rubi idæi maturarum libras quatuor.

Parum contusis affundantur aquæ fontanæ libræ octo, & post unius, vel alterius horæ macerationem, destillentur circiter libræ quatuor, vel plures, quousque liquor odore ac sapore jucundus stillet.

Odoris ac saporis gratiâ commendabilis aqua, inter refocillantia & cardiaca temperata auxilia referri meretur; ad languorem virium, in vario morborum casu, sublevandum idonea.

Ad unam, pluresve uncias pro dosi, per se, vel in julapiis, mixturis, emulsionibus.

AQUA SPERMATIS RANARUM.

Destillatur, sine aliâ aquæ additione, ex recens collecto spermate, sacco lineo, ne alembicum transcendat, incluso, ad tertiæ partis remanentiam.

Usus est cosmeticus, & ad faciei ruborem, atque in collyriis, adhibetur.

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES cum VINO.

Si loco aquæ simplicis, vinum album optimum speciebus affundatur, ope destillationis inde obtinetur liquor magis subtilis, ac spirituosus, tantò nobilioris usus, & efficacîæ, in temperie frigida, & morbis minùs acutis, proficuæ.

AQUA CINNAMOMI cum VINO.

REC. Cinnamomi electissimi libram unam, Vini generosi albi libras duodecim.

Minutim contusis vinum affunde in vase vitreo clauso, per biduum maceretur, ac postliminio, lento igne secundum artem, ad dimidias destilletur, vel quousque

usque aqua spirituosa lactescens stillabit.

Si magis spirituosa desideretur, præter vinum, adhuc *duæ unciae* spiritus vini rectificati, adjiciuntur.

Hæc aqua, à particulis oleosis cinnamomi, sublaetescens, inter alia multa cardiaca, odoris ac saporis gratiâ & suavitate excellit: virtutis scilicet insignis aromatica, spirituosæ, cardiacæ, analepticæ, stomachicæ, cephalicæ, carminativæ, &c. usu tempestivo salubris, in virium defectu, lipothymia, syncope, dysorexia, dyspepsia, nausea, vomitu, cruditate, flatulentia, oscitatione, suspirio, vertigine, &c. Sed stimulando & calefaciendo nocet, in temperie calida, morbis acutis, inflammatoriis, hæmorrhagia, &c.

Dosis uncia semis, per se, vel in julapiis, mixturis, emulsis. Cum saccharo perlato, vel Julepo Rosarum dulcorata, eximie suavitatis est analepticum.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM cum VINO.

REC. Flavedinis Corticum Aurantium recentium *libram unam,*
Vini albi, veteris, optimi *libras octo.*

Incisa post macerationem unius horæ, lege artis destillantur ad dimidias circiter, vel donec mutatio saporis cessandum suadeat.

Saporis aromatici, spirituosus, virtutis cardiacæ, stomachicæ, carminativæ; usus opportuni in temperie frigida, & morbis à debilitate solidorum, & fluidorum inertia, lentore, genitis; in languore præcordiorum, inappetentia, cruditate acida, pituitosa, flatulentia, &c. Nocet in calidis, febrilibus, &c.

Dosis uncia dimidia, vel integra, per se, vel saccharo, aut syrupo dulcificata; item in julapiis, mixturis, &c.

AQUA LILIORUM CONVALLIUM cum VINO.

REC. Liliorum convallium recentium, *libram unam,*
Vini albi, veteris optimi *libras octo.*

Rejectis stipitibus macerentur in alterum, vel tertium diem, tunc lento igne destillantur, ad remanentiam dimidii, vel quousque liquor sapidus bonæ notæ stillabit.

Nervina, cephalica, antispasmodica, valet in morbis frigidis, catarrhalibus, soporosis, vertigine, comate, lethargo, hemiplegia, apoplexia, aphonia, &c.

Dosis uncia una, per se, vel in mixturis, julapiis, &c.

AQUA MELISSÆ CUM VINO.

REC. Herbæ Melissæ recentis *libras duas,*
Vini albi, veteris, optimi *libras octo.*

Incisa post macerationem horarum duodecim, lege artis destillantur ad dimidias circiter, vel quousque liquor benè sapidus stillabit.

Aromatica, cephalica, cardiaca, carminativa, uterina, commodè usu venit, in pathematibus spasmodicis, hystericis, hypochondriacis, vertigine, palpitatione cordis, suffocatione, flatibus, &c.

Dosis uncia una per se, vel saccharo, syrupo dulcorata, vel in julapiis, mixturis, &c.

AQUA VERONICÆ CUM VINO.

REC. Herbæ Veronicæ florentis *libras tres,*
Vini albi, veteris, optimi *libras octo.*

Incisa post macerationem horarum duodecim, lege artis destillantur ad dimidias circiter.

Balsamica, vulneraria, tonica, commendatur in tussi pulmonali, & hypochondriaca; præsertim in senibus asthmaticis, & ad marasimum dispositis.

Dosis uncia una, *bis, ter* quotidie, *per se, vel cum saccharo, aut syrupo dulcorata.*

AQUA ZEDOARIÆ CUM VINO.

REC. Radicis Zedoariæ *uncias octo,*
Vini albi, veteris, optimi *libras octo.*

Contusa post debitam macerationem, lege artis destillentur ad dimidium circiter.

Aromatica, roborans, carminativa, alexipharmaca, usu venit in stomachi debilitate, anorexia, dyspepsia, flatulentia, &c.

Dosis uncia semis, *vel integra, per se, vel in mixturis, &c.*

AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ.

Aquæ compositæ destillatæ, in dispensatoriis magno luxuriant numero, quæm restringere, & ex omnibus selectum, & compendium facere, utique rationes medicæ suaderent; sed hîc, ut alibi, opinio & consuetudo recepta, tantum juris sibi vendicat, ut ab ea pro arbitrio recedere, minus liceat. Cæterum ex his compositionibus nonnullæ sunt tantum aquosæ, aliæ vinosæ, aliæ spirituosæ; quarum omnium vires, partim à menstruo affuso, partim ab indole & natura specierum, æstimandæ veniunt. Nonnullis obsoletioribus omissis, cæteras hodiernum usitatas retinebimus, hinc inde saltem, quod è re videtur, monituri.

AQUA ACOVISTICA.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ,
Levistici,
Valerianæ *ana unciam semis,*
Herbarum Majoranæ,
Origani,
Rarismarini,
Rutæ hortensis,

Herbarum Salviæ hortensis,
Serpilli,
Florum Lavendulæ,
Sambuci *ana drachmas tres,*

Seminum Coriandri,
Fœniculi,
Rutæ,

Baccarum Juniperi,
Lauri *ana unciam semis,*

Ceparum incisarum *uncias duas semis,*

Castorei *drachmas duas.*

Incisis & contusis in cucurbita vitrea affundantur

Aquæ Epilepticæ Langii,
Spiritus baccarum Juniperi
ana uncie quindecim,

Succi Raphanorum *libra una semis.*

Digestis per biduum addantur

Cinerum clavellatorum *drachma quatuor,*

Salis ammoniaci *drachmae duæ,*

Camphoræ *drachma una.*

Destillentur ex cucurbita vitrea, & liquoris spirituosus volatilis *uncie sedecim* proliciantur, in vasis probè clausis servandæ.

Crassos humores, nervos & meatus auditorios obstruentes, attenuat, atque tympani atoniæ roboranda medetur. Auribus applicatur, cum frusto panis è clibano adhuc calentis, vel gossypio aliquot guttæ exceptæ, auri immittuntur.

AQUA ANHALTINA.

REC. Terebinthinæ Venetæ *uncias sex,*

Thuris masculi *unciam unam,*
Ligni Aloës *uncias tres,*
Caryophyllorum aromaticorum,

Cinnamomi acuti,
Cubebæ,
Galangæ,

Granorum Mastiches,
Nucistæ,

Florum Anthos, *ana drachmas sex,*
Semi-

Seminis Foeniculi,
Baccarum Lauri, ana unciam

semis,
Croci orientalis integri,
drachmas duas,

Spiritûs Vini rectificati li-
bras quinque,

Aquæ fontanæ libram unam.

Pulverifatis affunde spiritum, &
post digestionem dierum sex a-
quam adjice, & leni calore bal-
nei lege artis destillentur circi-
ter librae quinque, clarum à turbi-
do separatim reponendo.

Si completa desideretur, ejus librae
uni immergantur Moschi veri
grana tria.

Odoris & saporis est terebinthinati,
minus jucundi; virtutis spirituo-
sæ, balsamicæ, nervinæ, cephalicæ,
diureticæ; usu tempestivo va-
lere potest in solidorum debilitate,
& laxitate, humorum lentore vis-
cido, frigido, & morbis inde ge-
nitis, catarrhis frigidis, affecti-
bus soporosis, apoplexia pituitosa,
vertigine, tremore, paralyti, li-
pothermia, &c. Nocet in tempe-
rie calida, motu vitali incitato,
febri, inflammatione, &c.

Datur internè ad drachmam unam,
vel duas, cum vehiculo aquoso. Ex-
ternè adhibetur in forma lotionis,
vaporationis, vel epithematis, præ-
sertim in rheumatismo, arthritide
indolis frigida; item in vomitu,
cardialgia, colica flatulenta, &c.

AQUA ANIMALIS, sive DESTIL- LATUM EQUINUM.

REC. Herbae recent. Beccabungae,
Chaerifolii,
Nasturtii a-
quatici,
Petroselinii a-
na manipulos
sex,

Pomorum citri recentium
No. quatuor,

Stercoris equini recentis li-
bras duas,

Incisis affundantur

Pars II.

Aquae fontanae librae duode-
cim;

& post macerationem horarum duo-
decim, lege artis moderato igne
per vesicam destillentur librae cir-
citer octo, usui reponendae. Eli-
gere juvat stercus equi maris,
junioris, fani, foeno & avenâ
probè nutriti.

Saporem stercoreum obtundit vis na-
sturcina potior, sic que fastidium
minuit, praesertim, si quis ingre-
dientium ignarus aquam hauriat.

Vires habet eximias, attenandi, resol-
vendi, aperiendi, sudorem movendi,
urinam ciendi, spasmos leniendi,
scorbuticam labem emendandi, &c.
usûs probati in doloribus rheumati-
cis, arthriticis, podagricis, scor-
buticis, colicis, hystericis, &c.
magis tamen in temperie frigida,
diathesi acida, lenta, viscida, fe-
bris & inflammationis experte,
quàm secus.

Dosis unciae duae plus minus, bis vel
ter quotidie, per se, vel syrupo flo-
rum Papaveris erratici edulcorata,
per integram hebdomadam, vel lon-
gius etiam, pro indicantium ratione.

AQUA ANTIHECTICA.

REC. Herbae rec. Agrimoniae,
Bellidis mino-
ris,
Betonicae,
Hederae terre-
stris,
Tussilaginis,
Veronicae ana
uncias sex.

Incisis & mixtis affundantur Lactis
vaccini deflorati librae duodecim,
& post macerationem horarum duo-
decim, lege artis destillentur li-
quoris circiter librae octo usui ser-
vandae.

Viribus humectandi, diluendi, tem-
perandi, demulcendi, usu venire
potest in atrophia, phthysi, febre
lenta, hectica, &c.

Sub dosi unciarum sex manè ac vespere,
per se calidè, vel adjecto saccha-
ro cando edulcorata, per integrum
mensem, vel ultra.

E

AQUA

AQUA ANTIMELANCHOLICA.

REC. Herbæ & flor. rec. Borragin.
Buglossi,
Melissæ,
Salviæ,
ana uncias
duas,

Pomorum Aurantiorum,
Citri ana quatuor,
Croci optimi Austriaci drach-
mas duas,

Incisa cum Vini albi veteris opti-
mi libris octo,

Macerentur spatio horarum duode-
cim, tunc lege artis destillentur
ad dimidias circiter.

*Virtute roborandi, nervosum genus
excitandi, spiritus refocillandi, me-
lancholicis adhiberi potest, ad tor-
porem, terrorem, metum & tri-
stitiam leniendam.*

*Dosis uncia una, vel duæ, per se,
vel saccharo, aut syrupo dulcificatæ.*

AQUA ANTISCORBUTICA TEM-
PERATA.

REC. Herbæ rec. Acetosæ,
Beccabungæ,
Bellidis mino-
ris,
Chærefolii,
Fumariæ,
Nummulariæ,
Trifolii fibrini,
Veronicæ ana
uncias octo,

Baccarum Rubi Idæi libram
unam;

Incisis, mixtis affundantur

Aquæ fontanæ libræ duodecim,
& post debitam macerationem de-
stillentur libræ circiter sex, usui
servandæ.

*Viribus diluendi, temperandi, lenien-
di, resolvendi, valet in diathesi
humorum scorbutica, & sympto-
matibus variis inde oriundis.*

*Dosis unciæ duæ, tres, per se, vel
in julapiis, mixturis, emulsioni-
bus, &c.*

AQUA APOPLECTICA
SPIRITUOSA.

REC. Herbæ Basilici,
Majoranæ,
Mari veri,
Rorismarini,
Salviæ,
Serpilli ana
uncias unam semis,
Florum Betonicæ,
Lilior. convallium,
Lavendulæ,
Primulæ Veris,
Tiliæ,
Tunicæ ana unciam
unam,

Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum aromatico-
rum drachmas sex,

Nucis moschatæ unciam u-
nam,

Cardamomi minoris,
Cubebæ,
Galangæ,
Zedoariæ,

Santali citrini ana unciam se-
mis.

Herbæ & flores recentes successi-
vè per æstatem colligantur, &
in spiritus vini rectificati libris
quinque macerentur. Postea aro-
mata, minutim incisa & contu-
sa, vini albi, veteris, genero-
si libris quinque infundantur, &
post digestionem per biduum,
cum priori infuso commixta, e
Vesica lento igne destillentur.
Clarum & magis spirituosum,
seorsim pro usu externo, quod
sequitur oleosum albicans, pro
usu interno, servandum.

*Tales aquæ spirituum nomine dignio-
res, utpote spiritu vini rectificato,
& sale volatili oleoso aromatico
constantes, vires habent nervosum
genus roborandi, spiritus commo-
vendi, sensus excitandi, motum
vitalem accelerandi, calorem au-
gendi, &c. usus interdum oppor-
tuni, in systematis motorii, &
sensorii debilitate, catarrhis frigi-
dis, vertigine, gravedine, cory-
za, comate, lethargo, hemiplegia,
apo-*

apoplexia, paraplegia, lipothymia, syncope, &c. sed nomini fallaci credere, & in quovis apoplexiæ casu, ad hoc genus remedii confugere, multoties à ratione medendi alienum foret; siquidem in apoplecticis actio vitalis plerumque concitator est, imò sæpe quàm in acuta febre valentior, cui remedium adeo stimulans, & calefaciens, utique damno foret.

Uso externo, in forma lotionis, epithematis, fomenti, ad nares, ad verticem, nucham, ad præcordia, ad carpos manuum, adhibetur. Internè rariùs, nonnisi in magna & repentina animi defectione, summo languore vitali, & extrema virium jactura, tempestivè datur.

Dosis drachma una, vel duæ, cum triplo vehiculi aquosi.

Si minùs spirituosà desideretur, omisso spiritu vini, cum solo vino generoso maceratæ species lege artis destillantur.

AQUA ASTHMATICA.

REC. Radicum Angelicæ,
Enulæ,
Iridis Florentinæ
ana uncias duas,
Herbæ Hederæ terrestris,
Tussilaginis,
Scabiosæ ana uncias
sex,
Hyssopi,
Marrubii albi,
Pulegii,
Salviæ ana uncias tres,
Seminis Anisi,
Foeniculi ana un-
ciam unam,
Spiritus Vini rectificati li-
bram unam,
Aquæ fontanæ libras duode-
cim;

Incisa & mixta digerantur per tri-
dium, tunc igne moderato è
vesica libræ sex, vel septem, de-
stillentur, cessando scilicet, quàm
liquor stillans vilescere incipiet.
Vires habet temperatas stimulandi,
roborandi, attenuandi, scretum

promovendi; usûs eommodi, in
muco lento, viscido, fauces, tra-
cheam, bronchia, pulmones infe-
stante: in asthmate pituitoso, tussi
catarrhali, frigida, contumaci,
senili. Secus in temperie calida,
statu febrili.

Dosis uncia una per se, vel saccharo,
aut syrupo Capillorum edulcorata;
nec non in mixturis, julapiis, &c.

AQUA BALSAMICA ad GONOR-
RHOEAM RIVERII, vid. AQUA
ad GONORRHOEAM.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

REC. Herbæ Serpilli in umbra fic-
catæ libras duas,
Saturejæ florecentis,
Thymi florecentis,
Florum Chamomillæ Roma-
næ ana uncias duas,
Cinnamomi uncias tres,
Macis unciam semis.

Incisa & contusa misce, atque per
biduum vini albi generosi libris
octodecim infusa, lento igne libræ
octo plus minus eliciantur.

Prodest illis, qui catarrhis & deflu-
xionibus vexati sunt, nervos &
ventriculum, cum reliquis visceri-
bus, corroborat, asthmaticis sub-
venit, urinam, calculum & men-
ses movet, omnibusque aquis, quas
vocant apoplecticas, fortasse præfe-
renda est.

Dosis ab unica semis ad integram.

AQUA CAPONIS.

REC. Caponem evisceratum atque
in frustra incisum, depo-
sitâ pinguedine, decoque
in sufficiente quantitate
aquæ, donec carnes ab os-
sibus separentur: con-
tundatur ad pultis for-
mam, cui adde

Aquæ Borraginis,
Buglossi ana libram
unam semis,
Brodii, five decocti Caponis
libras duas semis,

Florum quatuor cordialium
ana drachmas duas,

Cinnamomi electi unciam,

Destilletur ex maris balneo.

Utique potiores, & sapidiore esse vires nutrientes, & analepticas decocti saturati, vel jusculi ex Capone parati, nemo dubitabit, ideoque supervacua talis aqua omitti posset, nisi opinioni ac desiderio quorundam aegrorum indulgendum videretur.

Pro auxilio instaurante, extenuatis, hecticis, tabidis, interdum commendari solet; sub dosi plurimum unciarum, mane & vespere ad plures hebdomadas.

AQUA CARBUNCULI.

REC. Herbæ Majoranæ,

Salviæ, ana unciam
unam semis,

Florum Lavendulæ uncias quatuor,

Liliorum convallium,

Rorismarini,

Rosarum,

Cinnamomi,

Cardamomi minoris ana unciam unam,

Nucis Moschatæ,

Macis,

Caryophyllorum ana unciam semis,

Zingiberis,

Galangæ,

Baccarum iuniperi ana drachmas tres,

Spiritûs vini rectificati libram unam,

Aquæ Rubi Idæi,

Lavendulæ ana libras tres,

Fiat infusio per octiduum, in loco tepido, postea destillatio ad dimidias. Liquori destillato, splendoris vulgo expetiti causâ, folia auri immergi solent.

Usus frequens est externus, pro epithematè ad præcordiâ, ad carpos; ad fœtum roborandum, gravidarum abdomini, cum aqua embryonum imponitur. Internus usus rarior est.

Nomen inde habere ajunt, quod carbunculos & bubones pestilentiales expellat, & retrocessionem eorum prohibeat.

Dosis uncia semis, per se, vel cum vehiculo aquoso.

AQUA CARMINATIVA.

REC. Herbæ Absinthii pontici unciam semis,

Centaurii minoris,

Pulegii,

Origani, ana drachmas duas,

Flor. Chamomillæ Romanæ,

Vulgaris,

ana li-

bram u-

nam se-

mis,

Seminis Anethi uncias duas,

Anisi,

Fœniculi ana unciam unam,

Carvi unciam semis,

Corticum Aurantiorum exteriorum uncias duas,

Incisa & contusa infundantur per quatrividuum in aquæ fontanæ libris duodecim, postea ad residuum unius tertiæ destillantur.

Cum menstruo tantum aquoso parata, temperatæ qualitatis est, aromatica, roborantis, carminativæ; usus salubris in cruditate acida, pituitosa, flatulenta, ruinatione molesta, colica flatuosa, affectione hysterica, doloribus à partu, menstruorum difficultate.

Dosis uncia una per se, vel cum saccharo, syrupo; vel in julapiis, mixturis, &c.

AQUA CARMINATIVA SPIRITUOSA.

REC. Calami aromatici,

Herbæ Menthæ crispæ,

Serpilli florescentis

ana uncias duas,

Florum Chamomillæ Roma-

næ libram semis,

Semi-

Seminis Anisi,
Fœniculi *ana uncias*
duas semis,

Cinnamomi acuti *uncias tres,*
Nucum Moschatarum,
Baccarum Lauri,

Juniperi *ana un-*
ciam semis,

Corticum Aurantiorum re-
centium *uncias duas.*

Incisa infundantur

Spiritûs vini rectificati *libris*
novem,

Aquæ fontanæ *libris quinque;*
digerantur per triduum, postea
destillantur ex vesica *libræ de-*
cem.

Ratione menstrui, & quorundam in-
gredientium, hæc compositio magis
est spirituosâ, aromatica, roborans,
stomachica, carminativa; ad me-
dendi scopum idonea, in temperie
minus calida, stomachi languore,
dyspepsia, cruditate viscida, acida,
flatibus ventriculû & intestina
infestantibus, colica inde genita,
pathematibus hystericis, &c.

Dosis uncia semis, per se, vel cum ve-
hiculo aquoso; vel in mixturis, &c.

AQUA CEPHALICA CAROLI QUINTI.

RECIP. Summitat: Majoranæ,
Melissæ,
Origani,

Florum Anthos,
Lavendulæ,
Liliorum conval-
lium,
Rosarum rubra-
rum,

Salviæ,
Caryophyllorum arom.
Nucum Moschatarum *ana*
uncias duas,

Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Cubebæ,
Granorum Paradisi,
Macis *ana unciam semis.*

Incisa & contusa grosso modo in-
fundantur in

Spiritûs vini optimi *libris octo;*
Stent *per dies sex* in loco calido, &
postea additâ

Aquæ fontanæ *librâ unâ semis l. a.*
destillantur; Si libuerit,

Ambra griseæ &

Moschi *ana grana quinque,*
aliquotæ illius destillatæ parti, aut
roistro etiam alembici imponi po-
terunt, pro iis, qui odorem fer-
re possunt, & tunc completa vo-
cabitur.

Vires, usus, dosis, ut aquæ apople-
cticæ superius suo loco dictæ.

AQUA CORDIALIS CINNAMOMI.

REC. Aquæ Borraginis,

Buglossi,

Rosarum,

Violarum *ana libram*
unam & semis,

Cinnamomi electi *uncias qua-*
tuor,

Post triduanam infusionem fiat de-
stillatio, ita, ut tertia pars sit
residua.

Vis blanda ab aquis cardiacis tempe-
ratis, & aromatica, roborans, car-
diaca, stomachica, à Cinnamomo.
Usus proficui in virium languore,
stomacho imbecilli, anorexia, nau-
sea, vomitu, cruditate, flatulen-
tia, &c. ubi nulla acrimonia,
nec inflammatio, nec æstus febrilis
subest.

Dosis uncia una, per se, vel in
mixturis, julapiis, emulsis; ad-
dito saccharo, vel julepo rosarum,
analepticum est, odore & sapore
suavissimum.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA & TEMPERATA.

Vix amplius in usu esse solent.

AQUA E CORDE CERVI.

A Corde Cervi aqua stillatitia, ni-
hil virium accipere potest; vir-
tus autem caeterorum ingredien-
tium, in aliis aquis compositis
uberius & commodior habetur.

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

REC. Rafurae Cornu cervi *uncias sex,*

Pomorum citri, cum corti-
cibus incisorum, *Nº. qua-
tuor,*

Affunde per nycthemeron

Aquæ Rosarum,
Scabiosae,
Acetosae,
Cardui benedicti,
Melissæ,
Scordii *ana libram unam.*

Postea destilla ad quartae partis re-
manentiam.

*Analeptica & alexipharmaca depræ-
dicatur; hinc in febris malignis
utilis. Apposuius formulam, quia
jam à longo tempore à pluribus in
usum vocatur.*

Dosis uncia una ad duas.

AQUA DIURETICA E NUCLEIS.

REC. Amygdalarum amararum,
Nucleorum Persicorum,
Cerasorum *ana
uncias duas,*

Florum Sambuci *uncias sex,*
Vini generosi *libras octo.*

Contusa digerantur per biduum in
loco calido, dein destillantur ad
dimidias.

*Commendatur nephriticis & calculo-
sis, in quibus neque inflammatio-
nis, nec mictûs cruenti metus est,
post copiosam infusi Theæ, vel ca-
lidæ potionem, ad unciam dimi-
diam aut integram sumenda. Tor-
mina sedat & urinam pellit.*

AQUA sive BALSAMUM EMBRYO-
NUM.

REC. Nucum Moschatarum *uncias
tres semis,*

Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubebæ,
Granorum Paradisi,
Zedoariæ *ana uncias duas,*

Macis *unciam semis,*
Galangæ *drachmas tres,*
Croci orientalis *drachmas
duas,*

Florum Tunicæ,
Tiliæ *ana libram u-
nam,*

Lavendulæ,
Herbæ Salviæ,
Seminum Carvi,
Fœniculi *ana un-
cias tres,*

Menthæ crispæ,
Radicum Pœoniæ,
Seminum ejusdem,
Visci querni *ana uncias duas,*
Medullæ panis triticeï à fur-
no calentis *libras duas,*

Incisa & contusa infundantur in
Vini Malvatici *libris decem,*
Aquæ Borraginis,
Buglossi *ana libris qua-
tuor,*

Florum Liliorum convallium
*libris duabus, & un-
ciis octo,*

Fragorum,
Rosarum, *ana uncias
sedecim.*

Digerantur per triduum, postea de-
stillentur lento igne ex vesica ad
dimidias.

Descriptio, hîc exarata est Phar-
macopœæ Augustanæ, quæ, cum
à longo tempore apud nos in
usu fuerit, nihil immutare vo-
luimus.

*Aqua est valde spirituosâ, aromatica,
cardiaca, stomachica, carminativa,
non nisi cautè & circumspectè adbi-
benda; in quibusdam gravidarum
symptomatibus, virium languore,
animi deliquio, nausea, vomitu,
flatulentia, cruditate, &c. Nocet
autem in subiectis calidis, choleri-
cis, sanguineis, plethoricis, ad hæ-
morrhagiam & abortum propensis.*

*Dosis uncia semis, per se, vel ad-
jecto saccharo, aut syrupo, aut in
mixturis. Externè cum crusta pa-
nis tostâ, ventriculo, vel umbilico,
calidè, roborandi scopo, imponi solet.*

AQUA

AQUA EMBRYONUM CORRECTIOR, sive ELIXIR VITÆ MULIERUM.

REC. Radicis Galangae,
Zedoariae, ana un-
ciam semis,

Herbae Melissae,
Menthae ana unciam
unam,

Florum Stœchados Arabicæ,
Tiliae,
Tunicae ana drach-
mas quinque,

Seminum Fœniculi Cretici,
Sileris montani a-
na unciam semis,

Nucis moschatae unciam u-
nam,

Cinnamomi drachmas sex,
Corticum rec. Aurantiorum,
Citri ana un-
ciam unam se-
mis,

Misceantur, & incisa ac contusa in-
fundantur in

Vini albi veteris libris decem,
& post digestionem horarum vi-
ginti quatuor, lege artis, destil-
lentur ad dimidias.

Cum præcedenti convenit, tamen non
adeo aromatica, calida, & pretio-
sa, ad internum usum magis com-
mendabilis est.

Dosis cochlearia duo, tria.

AQUA EPIDEMICA LONDINENSIS.

REC. Rad. Angelicae,
Gentianae,
Liquiritiae,
Tormentillae,
Zedoariae,

Herbæ Absinthii,
Agrimoniae,
Anagallidis,
Artemisiae,
Betonicae,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chelidonii majoris,
Dracontii,
Melissae,
Roris solis,
Rorismarini,

AQUA

23

Herbae Rutae,
Salviae,
Scabiosae,
Scordii, ana unciam u-
nam.

Macerata in vini albi libris duodecim,
lege artis destillentur ad dimi-
dias.

Vires sunt alexipharmacæ; usus in
febris epidemicis, malignis, &c.
scopo prophylactico, & therapeu-
tico.

Dosis uncia semis, uncia una, per
se, vel in mixturis.

AQUA EPILEPTICA LANGII.

REC. Florum Liliorum conval-
lium recentium,
uncias sex,
Lavendulae, unciam
unam,

Rorismarini,
Stœchados Arabicæ,
Tiliae ana unciam
semis,

Cinnamomi drachmas sex,
Nucum Moschatarum unciam
semis,

Piperis longi,
Cubebæ ana drachmas
duas,

Visci querni,
Radicum Pœoniae,
Fraxinellæ, sive Di-
ctamni nostratis
ana unciam semis.

Macerata in vini generosi libris octo
per triduum, destillentur ad di-
midias.

Ad epilepsiam, vertiginem, apople-
xiam, tum præservandi, tum cu-
randi sine etiam in ipso paroxysmo
vulgo commendari solet. Cum verò
aqua sit aromatica & spirituosâ,
prudenter est judicare, an & quan-
tum in his morbis valere possit?

Assumi potest ad unciam semis, vel in-
tegram, per se, vel in mixturis, &c.

AQUA ad GONORRHOEAM HOFFMANNI.

REC. Radicis Iridis Florentinæ un-
cias duas,

F 2

Herbæ

Herbae Menthae ficcae *uncias tres,*

Dictamni Cretici *unciam unam,*

Seminis Agni casti,

Rutae *ana uncias duas semis,*

Terebinthinae Venetae *uncias decem,*

Vini albi generosi *libras decem.*

Misce, fiat ex M. B. lege artis destillatio ad dimidias.

Nonsolum in gonorrhœa, sed & fluore albo fœminarum, præmissâ purgatione, insignis est utilitatis.

Dentur suadente authore, ægrotis manè duabus, vel tribus horis ante pastum, & vespere quatuor horis post cœnam, duo cochlearia.

AQUA ad GONORRHOEAM RIVERII.

REC. Radicis Iridis Florentinae *uncias tres,*

Foliorum Dictamni Cretici, Menthae ficcae *ana unciam unam semis,*

Seminis Fœniculi *uncias duas,*

Rutæ *unciam unam,*

Terebinthinae claræ Venetæ *libram semis,*

Vini albi *libras decem.*

Post infusionem per triduum, destillentur ad dimidium ex vesica.

Ad Gonorrhœam virulentam, tam inveteratam, quam recentem laudatur: partes enim exulceratas detergit, & materiam corrosivam educit.

Dosis ad unciam semis, ad unciam unam.

AQUA HIRUNDINUM.

REC. Pullorum Hirundinum dissectorum *numero triginta,*

Visci querni,

Radicis Pœoniae *ana unciam unam semis,*

Seminis ejusdem *unciam unam,*

Florum Liliorum convallium *uncias quatuor,*

Sambuci *unciam unam semis,*

Aquæ fontanæ *libras decem.*

Misceantur & destillentur ad dimidias.

A Pullis Hirundinum, vix ac ne vix quidem aliquid virtutis per destillationem expectari potest; ac proinde non nisi in gratiam mulierularum hæc aqua paratur; quæ illam sæpius desiderare solent, atque infantibus adhibere.

Dosis uncia semis, per se, cum saccharo, vel Syrupo de Pœonia; vel etiam in mixturis; ad insultus epilepticos.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

REC. Pullorum Hirundinum vivorum, in partes dissectorum *numero quadraginta,*

Foliorum Rutæ hortensis recentium, *uncias duas,*
Castorei orientalis veri, *unciam unam,*

Vini albi *libras octo.*

Misceantur, & statim ex vesica destillentur ad dimidias.

Vires sunt antepilepticae & hystericae.

Dosis ab uncia semis, ad unciam unam per se, vel cum aliis.

AQUA HUNGARICA, sive REGINÆ HUNGARIÆ.

REC. Herbæ Rorismarini, Florum ejusdem recentium *ana libras duas,*

Misce, incisis affunde

Spiritûs vini Gallici, optimi, rectificati *libras duodecim,*

Aquæ fontanæ *libras duas.*

Post debitam macerationem, lege artis, moderato igne, per vesicam destillentur circiter *libræ decem,* vel quousque liquor bonæ qualitatis stillabit.

Si

Si cum folis floribus hunc spiritum destillare libeat, vel speciebus, aliquot *uncias* Cinnamomi & Zingiberis adjicere, hac ratione spiritus tantò fragrantior & efficacior habebitur; multò magis, si cohobatio accedat.

Vires sunt aromatica, nervinæ, cephalicæ, roborantes, stimulantes; usu præcipuè externo celebratæ, ad nares, ad frontem, verticem, nucham, tempora, ad præcordia, ad carpos manuum. In spirituum languore, animi defectione, anxietate, syncope, vertigine, oscitatione, suspirio, sopore, catarrhis frigidis, suffocatione hysterica, metu, tristitia, contusione, sugillatione &c. In enormi virium deliquio etiam internè ad drachmam unam, duas, vel cum uncia una vehiculi aquosi propinare licet.

AQUA HYSTERICA.

REC. Radicum Pœoniæ,
Zedoariæ,
Levisticæ,
Imperatoris anæ
unciam unam,
Herbarum Melissæ,
Matricariæ,
Menthæ,
Florum Chamomillæ Romanæ anæ unciam unam semis,
Seminis Carvi,
Sileris montani,
Fœniculi,
Corticis Citri exterioris, anæ unciam unam,

Incisa & contusa infundantur cum Spiritus Vini rectificati libra dimidia,

Aquæ fontanæ libris septem.

Digesta per biduum, destillantur lento igne, ex vesica, donec libræ quatuor liquoris habeantur.

Vires ejus sunt aromatica, roborantes, carminativa, antispasmodica; usus proficui, in affectibus hystericis frigidis, languore, oscitatione, nausea, vertigine, flatibus stomachi, & intestinorum, epi-

Pars II.

lepsia hysterica, doloribus in partu spasmodicis, menstruis & lochiis cunctantibus, partu languido, secundinis tardantibus &c. Nocet in temperie calida, motu vitali concitato.

Dosis uncia una per se, vel nonnihil dulcorata cum Syrupo Cardui Benedicti, vel in mixturis.

AQUA LIGNI SASSAFRAS COMPOSITA.

REC. Ligni Sassafras odorati uncias sex,

Cinnamomi acuti uncias tres,
Vini generosi libras decem.

Mixta stent in digestionem per aliquot dies, postea destillantur ad dimidias.

Carminativa & stomachica, senibus & phlegmaticis, in affectibus catarrhalibus, conducit.

Dosis uncia semis, vel integra.

AQUA LOOCH SANI & EXPERTI.

REC. Radicum Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ,
Herbæ Capillorum Veneris,
Calaminthæ montanæ,
Hyssopi anæ uncias duas,
Seminis Anisi,
Fœniculi anæ unciam unam,
Cinnamomi electi uncias duas.

Misce, incisa & contusa macerentur in aquæ fontanæ libris decem & post digestionem per triduum, destillantur ex vesica, ad remanentiam librarum quatuor.

Saporis, odorisque grati, pectori est amica, cum eaque paratur Looch sanum & expertum; aliàs ad unciam unam, vel duas, propinari solet.

AQUA MAGNANIMITATIS.

REC. Formicarum, mense Majo, vel Junio collectarum, libras duas,
Spiri-

Spiritûs Vini rectificati *libras tres*,
Macerentur per *quinque* vel *sex* dies,
postea in Balneo maris abstrahatur spiritus ad ficcitatem, cui porro infunde

Cinnamomi electi *unciam unam*,

Caryophyllorum aromaticorum,

Cardamomi minoris *ana drachmas sex*,

Cubebæ *unciam semis*,

Zedoariæ *drachmas decem*.

Post digestionem per triduum, abstrahantur in Balneo maris.

Viribus nervinis, roborantibus, commendatur ad vitia nervorum frigida, venerem languidam; externe ad articulos à paralyfi debilitatos.

Dosis drachmæ duæ ad unc. semis.

AQUA MASTICHINA.

REC. Mastiches *uncias quatuor*,
Nucum Moschatarum *unciam unam*,

Contusis, & per triduum in spiritûs Vini rectificati *libra una* maceratis, addantur aquæ fontanæ *libræ quatuor*, destillentur ex vesica, leni igne, donec residuum sit *librarum duarum*; liquor lacteus prodiens servetur.

Aqua hæc vires habet stomachum confortantes; hinc in singultu, ciborum fastidio, flatulentia, diarrhæa, & vomitu commendatur.

Dosis ab uncia dimidia, ad integram.

AQUA MELISSÆ SPIRITUOSA CARMELITARUM, sive EAU des CARMES.

REC. Herbæ Melissæ recentis *libram unam semis*,

Flavedinis Corticum Citri recentium, *uncias quatuor*,

Nucum Moschatarum,

Seminis Coriandri *ana uncias duas*,

Cinnamomi acuti,

Caryophyllorum *ana unciam unam*,

Incisis affundantur

Spiritûs vini rectificati *libræ sex*,

Aquæ Melissæ *libræ duæ*.

Post digestionem per biduum, destillentur ad *quintæ partis* remanentiam; spiritus eductus fervetur.

Inter aquas spirituosas eminens commendatur adversus apoplexiam, paralyfin, & quoscunque morbos nervorum à causa frigida ortos. Stomachicum & carminativum est egregium; externe adhibetur ad spasticos & rheumaticos dolores, cephalalgiam, vomitum, colicam &c.

Dosis à drachma una ad drachmas tres, cum vehiculo aquoso.

Pro usu externo tincturâ croci tingi solet.

AQUA MELISSÆ HYSTERICA.

REC. Foliorum Melissæ recentium *libram unam*,

Baccarum Lauri,

Seminis Cumini *ana unciam unam*,

Myrrhæ electæ *unciam semis*,

Castorei *drachmas duas*,

Vini albi spirituosi *libras duodecim*.

Post sufficientem digestionem destillentur ad dimidias.

Vires ex titulo patent.

Dosis uncia semis ad integram.

AQUA NEPHRITICA E. N. C.

REC. Fragorum recentium maturorum *mens: quatuor*.

Baccarum Alkekengi *libram unam semis*,

Radici recentis Raphani rusticani,

Seminis Dauci vulgaris *ana libram semis*,

Succi Betulæ mense Martio collecti *libras viginti quatuor*.

Misce, post macerationem horarum *duodecim* lege artis ex maris balneo destillentur, circiter ad *libras quindecim*.

Virtute blandâ, diluente, attenuante, deter-

detergente, diureticâ, ad renum & vesicæ morbos, ipsamque lithiasin commendatur; sed ubi inflammatio, vel ulcus subest, vel præsens Nephralgiæ paroxysmus, abstinere prudentia jubet.

Dosis uncia una, vel duæ, per se, vel adjecto saccharo, vel syrupo edulcorata.

AQUA ODORIFERA.

REC. Herbae Rorismarini,
Majoranæ, ana un-
ciam unam,
Florum Lavendulae,
Liliorum conval-
lium,
Rosarum ana uncias
duas,

Ligni Rhodii,
Corticis Citri recentis ana
unciam unam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum aromatico-
rum unciam unam semis,
Mixtis & contusis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ
octo,

Aquæ fontanæ libræ quatuor,
& post Digestionem per triduum,
leni igne tres quartæ inde destil-
lentur.

Pars ejus Ambræ & Moschi odore
imbui potest in gratiam eorum,
qui talem fragrantiam benè fe-
runt, quæ multis aliis adver-
sari solet.

Odoris suavitate pollet, viribus spi-
ritus refocillandi, sensoria exci-
tandi, nervos roborandi, motum
vitalem & animale incitandi,
vires reficiendi. Usu potissimum
externo venit, ad nares, ad tem-
pora, nucham, verticem capitis,
ad præcordia, ventriculum, carpos
manuum, pro lotione, vel epithema-
te. In virium defectu, nervorum
debilitate, vertigine, sopore, lipo-
thymia, & aliis pathematibus, à
debilitate motus vitalis & anima-
lis, oriundis. Internè ad drach-
mam unam cum vehiculo aquoso
rariùs adhibetur.

Ne calefaciendo, stimulando no-
ceat, leges methodi medendi
cavere jubent.

AQUA PANIS.

REC. Crustæ panis recenter è cli-
bano extracti, adhuc ca-
lentis, libras duas,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum,
Nucum Moschatarum ana
unciam dimidiam,
Vini albi spirituosi libras octo,
Destillantur leni igne ad dimidias.
Inter aquas stomachicas & analepti-
cas eminet, & gustui grata est.
Dosis uncia dimidia, ad integram.

AQUA PHYSAGOGA, vide AQUA
CARMINATIVA.

AQUA PROPHYLACTICA SYLVII,
vide ACETUM BEZOARDICUM.

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

Tam parum ab aqua apoplectica
spirituosa discrepat, ut ejus com-
positione supersedere liceat.

AQUA STOMACHICA.

REC. Summitatum Menthæ cri-
spæ recentis uncias tres,
Galangae,
Nucum Moschatarum,
Cinnamomi ana unciam u-
nam,
Vini spirituosi libras octo,
Destillantur ad dimidias.
Vires ex ipsa denominatione patent.
Dosis uncia semis, ad integram.

AQUA THERIACALIS SIMPLEX.

REC. Theriacæ Andromachi un-
cias quatuor,
Vini albi libras quinque.
Misc. abstrahantur lege artis libræ
duæ semis,
Vires roborantes, stomachicæ, carmi-
nativæ, alexipharmacæ.
Dosis uncia dimidia, vel integra, in
morbis epidemicis, malignis, cum
circumspectione.

AQUA THERIACALIS COMPOSITA.

REC. Radicis Angelicæ,
Cardopatii,
Ostrutii,
Valerianæ,
Zedoariæ, *ana un-*
ciam unam,

Herbæ Rutæ,
Scordii, *ana unciam*
unam semis,

Corticum Citri recentium
uncias duas,

Baccarum Juniperi *unciam u-*
nam,

Theriaceæ Andromachi *li-*
bram semis,

Aquæ fontanæ *libras decem,*

Misce & post debitam maceratio-
nem, lege artis destillentur *libræ*
sex.

Alexipharmaca, stomachica, carmina-
tiva, in febris malignis, affectibus
ventriculi, vomitu, torminibus, dy-
senteria, &c. additur mixturis &
potionibus.

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA TYPHORUM CERVI
SIMPLEX.

REC. Typhorum Cervi succulen-
torum *libram unam,*
Vini albi, veteris, optimi *li-*
bras tres,

Incisa post debitam macerationem,
ex Maris Balneo lege artis destil-
lentur ad dimidias.

Ad partum difficilem, & in febris
malignis prædicatur; sub dosi un-
ciæ unius, per se, vel in mixturis,
&c.

AQUA TYPHORUM CERVI
COMPOSITA.

REC. Typhorum Cervi succulen-
torum *libras duas semis,*

Radicis Pœoniæ *unciam u-*
nam,

Herbæ Melissæ,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Rorismarini,

Florum Tunicæ *ana unciam*
unam semis,
Rosarum *unciam se-*
mis.

Incisis affundantur

Vini albi spirituosi *libræ duo-*
decim,

Destillentur leni igne ad dimidias.
Vires habentur alexipharmacæ, cordia-
les & antimelancholicæ.

Dosis uncia una, vel duæ.

AQUA VISCERALIS MAUCHARTI.

REC. Radicis Farfaræ,
Liquiritiæ,
Symphyti majoris,
ana uncias quinque,

Herb. rec. Bugulæ,
Chærefolii,
Hederæ terrestris,
Hyperici florentis,
Plantaginis mino-
ris,

Scabiosæ,
Veronicæ, *ana ma-*
nipulos quatuor,

Seminis Anisi itellati *drach-*
mas sex,

Macis *drachmam unam,*
Mastiches electæ *drachmas*
tres,

Cancrorum fluviatilium vi-
vorum N^o. *triginta,*
Pulmonem vituli recens
maciati,

Incisis superfundantur

Aquæ Buglossi,
Chærefolii,
Hederæ terrestris,
Veronicæ, *ana libra*
una semis.

Destillentur per Balneum maris, &
lege artis liquoris *quatuor libræ*
eliciantur.

Vulneraria, demulcens, præsertim atro-
phicis, hecticis, phthisicis convenit.

Dosis uncia una, vel plures.

AQUA VITÆ MULIERUM, vid.
AQUA EMBRYONUM.

AQUA VULNERARIA, Gallis
EAU D'ARQUEBUSADE.*Pharm. Paris.**REC.* Radicis Symphyti majoris,
Foliorum ejusdem,
Herbarum Bellidis majoris,
& minoris,Bugulae,
Saniculae,
Betonicae,
Scrophulariæ,
Plantaginis,
Agrimoniae,
Hyperici cum
summitatibus,
Vincæ pervincæ,
Hederæ terrestr.
Artemisiæ,
Veronicae,
Verbenae,
Telephii majoris,Millefolii *ana uncias quatuor,*Salviae,
Angelicae,
Tanacetii,
Absinthii,
Chelidonii majoris,Fœniculi,
Aristolochiæ clematitidis,Menthae,
Hyssopi,
Nicotianæ, *ana uncias octo,*Rutæ,
Chamomillæ,
Scordii,
Majoranae,
Rorismarini *ana uncias quatuor,*Summit. & Flor. Lavendulæ,
Origani,
Calaminthæ,
*ana uncias sex.*Macerentur per quatrimum in Vini generosi *libris quinquaginta* ponderis civilis, postea destillentur ad dimidias.*Pars II.*

Si aqua jam destillata cum

Herbar. Angelicæ,
Absinthii,
Fœniculi,
Hyssopi *ana uncia una,*
Majoranae,
Salviae nobilis,Florum Anthos,
Lavendulæ *ana unciis duabus,*

Cohobetur novâ destillatione; ita haud paulo odoratio, & generosior habebitur. Si verò iisdem speciebus, loco vini, Spiritus vini gallici non rectificati eadem quantitas affundatur, & post debitam macerationem, blando igne, destillatio instituat, hoc modo liquor tantò spirituosior, & viribus potentior obtinebitur.

Laudatur aqua hæc ad contusiones, sugillationes, luxationes, ambusta, inflammationes, gangrænam præcavendam, ad vulnera, nec non ad partes roborandas. Sunt, qui etiam internè adhibere solent, ad flatum & tormina discutienda: spiritiosa enim est & aromatica.

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

REC. Zedoariæ *uncias sex,*
Seminis Anisi *uncias tres,*
Corticum Citri *unciam unam,*
Incisa infunde per triduum in Vini generosi *libris decem;*
Postea destillentur ad dimidias.*Eadem cum simplici habet vires: flatum discutit, & tormina exinde oborta.**Ab uncia dimidia, ad unciam integram assumi potest.*AQUÆ OFFICINALES SIMPLICES & COMPOSITÆ, sine
DESTILLATIONE
PARANDÆ.

AQUA ALUMINOSA LONDINENSIS.

H

REC.

REC. Aquæ Rosarum rubrarum,
Scordii cohobatæ,
ana libram unam,

Aluminis crudi,
Mercurii sublimati corro-
sivi *ana drachmas duas.*

Trita & mixta bulliant cum aquis,
in vase vitreato clauso, ad me-
dietatis consumptionem; postea
dierum quinque residentia con-
cessa, fiat colatura.

*Virtutis est insignis, ad ulcera mun-
dificanda, cacoethea, & venerea.*

AQUA CALCIS VIVÆ.

REC. Calcis vivæ recentis *libram*
unam,

Contusæ parum affundantur sen-
sim, in vase mundo
terreo,

Aquæ fontanæ *libræ sex,*
& per vices commiscendo, post
horas duodecim, liquor limpidus
decantetur, & per filtrum tra-
jectus usui servetur.

*Vires habet abstergerendi, depurandi,
aperiendi, siccandi, acidum cor-
rigendi, urinam movendi.*

*Usu externo venit in lotionem, in-
jectionem, epithemate, fomento, ad
inflammationes, ambusta, gangræ-
nam, ulcera, tumores œdematosos,
&c.*

*Interne celebratur ad nephritidem,
calculos renum & vesicæ, scorbu-
tum acidum, frigidum, ad lum-
bricos intestinorum, aliosque mor-
bos, lentæ & frigida indolis; in
acrimonia alcalescente, biliosa, pu-
tredinosa, omnique statu febrili
magis nocet; etiam minus in cali-
dis regionibus, convenire, quam
in frigidis, observatur.*

*Dosis uncia duæ, vel tres, manè
ac vespere, per se, vel cum aequa-
li lactis vaccini portione mistæ; vel
cum anatica dosi decocti radicis
Bardanæ, vel decocti lignorum,
aliusve ad medendi scopum idonei,
ad plures hebdomadas successivas.
Pro usu sive interno, sive externo,
recentem parare præstat.*

AQUA BENEDICTA RULANDI,
feu
VINUM EMETICUM.

REC. Croci Metallorum *drachman*
unam,

Vini albi veteris, optimi *un-
cias sex.*

Misce, digerantur in vase vitreo mun-
do per *horas viginti quatuor*, in-
terdum commovendo, tandem
à substantia fundum tenente, li-
quor supernatans decantetur, &
per chartam emporeticam dupli-
catam filtratus, usui servetur.
Si quis loco Croci Metallorum,
Vitrum Antimonii adhibere ma-
lit, à scopo non aberrabit. Vul-
go tamen Croci paulo lenior in-
doles haberi solet.

*Medicamentum insignem, à Cel. RU-
LANDO quondam pro arcano ha-
bitum: emeticum valentioris gene-
ris, tenellæ ætati, & subjectis de-
licatis, imbecillis, ipsis dein fœmi-
nis gravidis, nequaquam congru-
um; quin imò & in robustioribus,
nonnisi cautè ac circumspèctè adhi-
bendum. Vomitus præcipue ciet,
sed & alvum exturbat forti-
ter. Ubi ratio indicantium eva-
cuationem supernam, vel & simul
infernam suadet, ex ratione mor-
bi, & causæ morbificæ, sympto-
matum, & virium conditione, ju-
dicandum, an ejus usus opportunus
esse queat?*

*Dosis uncia una vel una semis, per se,
vel cum adjecta drachma syrupi Ca-
pillorum veneris, & drachma di-
midia Aquæ Cinamomi.*

AQUA CARDIACA OFFICINALIS.

REC. Aquæ Borriginis,
Buglossi,
Cerasorum nigrorum,
Rosarum,
Violarum,
Rubi Idæi *ana uncias*
duas,

Cinnamomi cum vi-
no *unciam unam,*

Julepi

Julepi Rosarum *unciam unam semis,*

Matris Perlarum præparatæ,
Coralliorum alborum præparatorum *ana drachmam unam.*

Misceantur ad usum.

Si majore copiâ parare velis, vitandæ corruptionis causâ, satius erit aquas unâ cum pulveribus mistas, seorsim reponere, & usûs tempore demum *in singulas uncias, drachmam unam* julepi ad-
dicere. Cæterum loco Margaritarum, aliàs usualium, Matrem Perlarum substituere utique fas erit; nisi pro opulentioribus, etiam pulverem pretiosum eligere malis.

Odoris fragrantia, & saporis suavitate commendabilis aqua, vires habet moderatè refocillantes, & cardiacas, cuius prope ætati, ac temperamento idoneus, hystericis tamen exceptis, quæ Rosarum fragrantiam vulgo agrè ferunt; cæterum in omnivariis morbis usu commodo venit, in virium languore, spirituum inopia, actione vitali imbecilla, animi deliquio, &c. Nec facile nocet, nisi acuta febris, inflammatio, hæmorrhagia, &c. quemcumque stimulum auctiorem dissuadeant.

Datur cochleatim, per se, vel in julapiis, mixturis, emulsionibus. Cum additamento Confectionis Alkermes, ad scrupulum unum, in singulas uncias, efficacior reddi potest, si ratio morbi ita ferat.

AQUA CARDIACA PERLATA.

REC. Aquæ Ceraforum nigrorum
uncias novem,
Flor. Tiliæ, *uncias tres,*
Cinnamomi *vinosæ*
drachmas sex,
Margaritar. occidentali-
um scrupulum unum,
Corallior. albor. præparato-
rum drachmam semis,
Cornu Cervi usti *scrupulos*
duos,

Julepi rosati, *unciam unam semis.*

Misce, & usui repone.

Pulveres ad scopum cardiacum per se nihil facere, satis liquet. Nec Margaritæ præ Matre Perlarum aliquid prærogativæ habent. De Julepo usûs demum tempore addendo, idem monitum valet, si majore copiâ paretur.

Vires & usus cum præcedente coincidunt.

AQUA CARMINATIVA sex SEMINUM, Gall. ROSSOLI des fix GRAINES.

REC. Seminum Anethi,
Anisi,
Carvi,
Coriandri,
Dauci,
Foeniculi, *ana un-*
ciam semis.

Misce, parum contusis affunde

Spiritus vini optimi *libras quatuor.*

Stent per aliquot dies in digestione, tunc adde

Sacchari clarificati *libram unam.*

Demum liquor per chartam emporeticam filtratus usui servetur.

Hujus clareti vires, à spiritu vini, & seminum qualitate acri, aromatica, æstimandæ veniunt, vid. stimulant, calefacientes, roborantes, carminativæ. Adhiberi potest in temperie frigida, stomacho imbecillo, coctione infirma, cruditate pituitosa, frigida, flatulentia primæ vias infestante, &c. Nocumeto foret in diathesi opposita, solidorum tensione, humorum acrimonia, statu plethorico, febrili, inflammatorio, &c.

Dosis uncia semis, ad integram, per se, cavendo abusum, in copia & frequentia.

AQUA COSMETICA.

REC. Aquæ Florum Fabarum *un-*
cias decem,
Aurantiorum,
Aquæ

Aquæ Florum Rosarum, *ana*
unciam u-
nam,
 Tincturæ Benzoin *drachmas*
duas.

Misce ad usum.

*Cum eximia fragrantia, balsamica
 & absterſivæ facultatis, usu ex-*
terno venit, ad faciei, & manuum
lotionem.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

REC. Aquæ Ceraforum nigrorum,
 Pœoniæ,
 Primulæ veris,
 Tiliæ, *ana unciam u-*
nam,

Julepi Violarum *unciam ſe-*
mis,

Pulveris epileptici Marchio-
 nis *scrupulos duos.*

Misce d. ad Vitrum.

Aqua haud ingrata, modicè reficiens,
cephalica, antispasmodica, antaci-
da, usu venit infantibus in
casu acoris, epilepsia, pavorum à
ſomno, inquietudine, agrypnia,
torminibus, &c.

Cochleatim ſæpe dari ſolet, plus minùs
liberaliter, pro indicantium ra-
tione.

AQUA FORTIS.

REC. Vitrioli vulgaris ad rubedi-
 nem calcinati,

Nitri purissimi *ana libras duas.*

Misce, trita deſtillantur per retor-
 tam terream, igne aperto gra-
 datim adhibito, in vas recipiens
 valde capax, juncturis luto pro-
 bè obturatis, cui aquæ fontanæ,
libra una antè ſit infuſa.

Rarus ejus in medendo uſus; ſed plu-
rimùm à chemicis, & aliis artifi-
cibus adhibetur.

AQUA GRYSEA.

REC. Mercurii vivi,

Aquæ fortis *ana unciam unam.*

Misce, reponantur in locum cali-
 dum, ut ſolvatur Mercurius; ſo-
 lutioni adde decoctum ſequens:

REC. Radicis Chelidonii majoris,
 Aristolochiæ longæ,
 Herbar. Rutæ hortensis,
 Scordii,
 Florum Rosarum *ana unciam*
unam,

Mixta & incifa coquantur in
 Aquæ fontanæ *libris quinque,*
 ut poſt colaturam remaneant *li-*
bræ quatuor,

Misceantur calidè, & ſtatim abi-
 bunt in liquorem gryſei coloris.

Uſu externo commendatur ad ulcera
phagedænica, & ſpecificè ad Sy-
noviam.

AQUA HERMETICA.

REC. Mercurii vivi purissimi *un-*
cias quatuor.

Cum Aquæ fontanæ *libris duabus*
 ebulliant lento igne, in vaſe ter-
 reo clauſo, per horæ quadran-
 tem; tunc decantatus humor vi-
 tro mundo exceptus, in uſum
 trahatur.

Subſtantiæ & ponderi Mercurii,
 tali coctione nihil ad ſenſum de-
 cedit, omnisque ſaporis aqua
 eſt expers. Num verò aliquid
 virtutis à Mercurio trahat?
 omnino dubitare fas eſt. Sunt
 tamen, qui experimentorum fi-
 de, non proſus inertem eſſe
 opinantur. Uſum ejus ſecurum,
 & innoxium nemo in contro-
 verſiam vocat.

Pueris datur ad libitum haurienda,
per ſe, vel cum ſaccharo, aut ſyrupo
quodam dulcoratà; adverſus lum-
bricos, ventriculum, vel intelli-
na occupantes, febrem vermino-
ſam, aliaque ſymptomata ejusdem
cauſæ.

AQUA MERCURIALIS

ad

USUS EXTERNOS.

REC. Ceruſſæ Venetæ *unciam u-*
nam,

Alyminis crudi *drachmas*
ſex,

Lithargyrii *unciam ſemis,*
 Mercurii ſublimati corroſivi,
 Salis

Salis Ammoniaci, *ana drach-*
mam unam,
 Aquae Nymphææ,
 Plantaginis,
 Rosarum,
 Solani, *ana uncias qua-*

tuor,
 Aceti Vini optimi *libram se-*
mis.

Trita & commixta modicum bul-
 liant, tunc non colata usui fer-
 ventur.

Virtute cathartica valet ad cutis de-
formitates, verrucas, scabiem ma-
lignam, serpiginem, fici, fissu-
ras, ulcera venerea, & ubi mundi-
ficatione opus est, penicillo illita.

AQUA MILLEPEDUM.

REC. Millepedum vivorum loto-
 rum, *uncias duas,*
 Sacchari candi albi, *unciam*
unam.

Misce, subigantur probè in morta-
 rio vitreo, vel marmoreo, sen-
 sim affundendo

Aquæ Nasturtii aquatici *li-*
bram unam.

Colatura expressa detur ad vitrum.
Insigni virtute attenuandi, resolven-
di, aperiendi, urinam ciendi, valet
in viscerum actione debili, humo-
rum inertia, diathei aquosa, ob-
structione lenta, cachexia, œde-
mate, anasarca, hydrope, asthma-
te, arthritide, &c.

Dosis unciaë duæ manè ac vespèrè.

AQUA OPHTHALMICA.

REC. Aquae Florum Cyani,
 Rosarum alba-
 rum, *ana un-*
ciam unam,

Tutiae præparatæ,
 Florum Zinci, *ana scrupu-*
lum semis,

Camphoræ,
 Vitrioli albi, *ana grana duo.*

Misce, subactis ad summam tenuita-
 tem pulveribus, detur ad vitrum.

Virtute humectandi, blandè detergen-
di, resolvendi, leniendi, valet in

Pars II.

ophthalmia, lippitudine, pruritu,
&c. in oculi bulbum tepidè instil-
lata, vel in forma lotionis, epi-
thematis, vaporis.

AQUA PAREGORICA.

REC. Caputum Papaveris albi, unâ
 cum feminibus *uncias*
duas.

Concisa, contusa ebulliant per ho-
 ræ quadrantem,

Cum Aquæ fontanæ *libra una.*

Colatura usui reponatur.

Usui externo dicata, virtute eximia
paregorica, leniente, sedativa,
hypnotica, se commendat, in va-
rio dolorum sævientium casu, ce-
phalalgia, hemicrania, otalgia, o-
dontalgia, arthritide, rheumatis-
mo, cardialgia, colica, nephral-
gia, agrypnia, &c. Commode
adhibetur in forma epithematis, aut
fomenti, liquori calenti telam
laneam, vel lineam, aut spongiam
mollem immergendo, & expressam
calidè parti offensæ applicando,
& per vices recalesfaciendo; aut
ejus bullientis vaporem per infundi-
bulum ad partem dolentem, linteo cir-
cumvelatam, per minuta decem, aut
quindecim derivando. Ad somnum
accersendum, epithemata capiti ra-
so, aut saltè fronti, & tempo-
ribus superdantur.

AQUA PHAGEDÆNICA.

REC. Aquæ Calcis vivæ, *libram*
unam,

In hac dissolve
 Mercurii sublimati corrosivi
drachmam unam,

Solutioni adde
 Spiritûs vini non rectificati
uncias quatuor,

Et usui serva.

Vi detergente, mundificante, cathæ-
retica, antiseptica, usu externo
venit, in forma lotionis, injectio-
nis, epithematis; ad ulcera sordi-
da, maligna, venerea, fistulas, sca-
biem fœdam, &c.

AQUA PROPHYLACTICA SYLVII.

Vide

ACETUM BEZOARDICUM.

AQUA REGIS.

REC. Aquæ Fortis *uncias sex*,
Salis Ammoniaci puri *un-*
ciam unam.

Misce, solvatur, & filtretur.

Menstrui loco ad auri solutionem Chem-
micis usu venire solet.

AQUA SAPPHIRINA.

REC. Aquæ Calcis vivæ *libram*
unam,
Salis Ammoniaci *drachmam*
unam,

Mixta stent *per horas viginti qua-*
tuor, in vase cupreo, donec aqua
colorem nitidum saphireum ac-
quisiverit, quæ filtrata usui re-
ponatur.

Aliàs audit aqua ophthalmica cæru-
lea, licet nihilo magis ad oculos,
quàm ad alias partes pertinere vi-
deatur. Ejus vires sunt abster-
gendi, depurandi, resolvendi, sic-
candi; usu externo recepta, in
forma lotionis tepidæ, injectionis,
epithematis, fomenti; ad cutis sor-
des, pruritus, pustulas, scabiem,
impetiginem, serpiginem, inflam-
mationes, ulcera, ambustionem;
oculorum ruborem, inflammatio-
nem, pustulas, ulcera, maculas,
unguentum, &c. Instillationem ejus
in oculum, bulbi teneritudo agrè
fert, nisi adjectâ aquâ blandiore
Plantaginis, vel aliâ diluatur.

AQUA ad TORMINA INFANTUM,

Dispensat. Argent.

REC. Aquæ Chamomillæ,
Menthæ, *ana unciam*
unam,

Syrupi Chamomillæ,
Papaveris rhœados
ana drachmas duas.

Misce, detur ad Vitrum.

Vi demulcente, carminativâ, anti-
spasmodicâ, ad infantum tormina
lenienda, cochleatim adhibetur.

ARCANUM DUPLICATUM,

five

NITRUM VITRIOLATUM.

REC. Vitrioli Hungarici, vel alius
martialis *libras duas,*

solvatur in

Aquæ fontanæ calidæ *libris*
octo, vel decem;

Nitri fixi *libras duas, in*
Aquæ fontanæ *libris quinque*
soluti.

Ambas solutiones filtratas sensim
commisce, Nitri fixi solutionem
alteri lentè instillando; præci-
pitabitur terra metallica, cum
quodam effervescentiæ indicio.
Affundatur solutio alcalina ad
punctum saturationis usque. Fil-
tretur postea permixtus liquor.
Terra præcipitata eluatur affusâ
aquâ calidâ, ut omnis extraha-
tur falsedo. Evaporentur com-
mixti liquores ad cuticulam, &
ad crySTALLIFICATIONEM reponantur.
Aliàs ex capite mortuo Aquæ for-
tis, ex Vitrioli optimi, & Nitri
ficcissimi, *partibus æqualibus,*
sufficienti ignis torturâ destil-
latæ, sequenti modo paratur:

REC. Capitis mortui Aquæ fortis,
qu. pl.

solvatur in

Aquæ fontanæ ferventis
quantitate sufficiente,

& post digestionem *horarum vi-*
ginti quatuor, Aqua filtrata per
chartam emporeticam, evapo-
retur ad cuticulam, & in frigi-
do crySTALLIFETUR.

Est sal medium, virtute attenuandi,
resolvendi, aperiendi, urinam cien-
di, vel & alvum solvendi, præ-
stans; usus frequentis, in humo-
rum spissitudine, lentore, vasorum
& viscerum obstructione, crudi-
tate primarum viarum, febribus
variis, malo hypochondriaco, &c.

Dosis alterandi scopo drachma semis,
cum vehiculo aquoso; laxandi cau-
sâ ad drachmam unam, vel duas
propinatur.

ARCA-

ARCANUM TARTARI,
five
TERRA FOLIATA TARTARI.

REC. Salis Tartari albiſſimi *uncias*
quatuor,

Aceti Vini deſtillati *libras ſex.*
Commisceantur, & evaporetur ace-
tum in vaſe figulino probè vitrea-
to, ad ſiccitatem, in fine leniſ-
ſimum ignis gradum adhibendo.
Si non ſatis forſan alcali ab ace-
to ſaturatum fuerit, quod guſtu
deprehendetur, *alia libra* acet
vini deſtillati affundatur, atque
eodem modo tractetur. Rema-
nentia ſalina denuo aquâ fonta-
nâ ſolvitur, atque ſolutio per
chartam bibulam filtrata, rur-
ſus, uti antea dictum, evapora-
tur, & ſiccata, in vitro probè
clauſo, loco calido, ne lique-
ſcat, ſervatur.

Loco hujus medicamenti pretioſi,
Illustr. BOERHAAVE Elem.
Chem. T. II. p. 271. in gratiam
pauperum, alium ſalem analo-
gum parare docet, cineres pu-
ros clavellatos, cum *Aceti acer-*
rimi quantitate ſufficiente miſcen-
do, ſolvendo, colando, inſpiſ-
ſando, &c.

Arcanum Tartari ritè paratum, eſt
menſtruum ſalinum, pulcherrimum
omnium, convertens admixtu ſuo,
& digeſtu, objecta, in æquabilem,
ſolutam, maſſam, per corpus facile
meabilem, viribus propriis inſtru-
ctiſſimam. In corpore, ſummum
hactenus cognitum reſolvens, eò-
que pulcherrimum, quod calidis non
obſit, frigidis proſit, omni ferè
ægro accommodatum. BOERH.
it. L. c. Scilicet medicamentum eſt
ſaponaceum, attenuans, reſolvens,
aperiens, diureticum, alvum
ſolvens, &c. uſus commodi, in
humorum lentore, vaſorum & vi-
ſcerum obſtructione, ictero, cache-
xia, hydrope, rachitide, arthri-
tide, malo hyſterico, hypochondria-
co, febris variis, &c. Si tem-
peſtivè, & adæquatâ doſi adhi-
beatur.

Doſis ad ſcrupulum unum, vel drach-
mam ſemis, cum vehiculo aquoſo.

AURUM FULMINANS.

REC. Auri puriſſimi *drachmas duas,*
Aquæ Regis uncias duas.

Solutis inſtilletur *Spiritus ſalis am-*
moniaci volatilis, urinoſi, qua-
tum ſatis, ad plenariam auri præ-
cipitationem; præcipitatum, repe-
titâ affuſione & ablutione cum a-
quâ fontanâ, edulcora, & pulve-
rem luteo-fulci coloris, chartâ bi-
bulâ exceptum, & leniſſimo calo-
re cautè exſiccatum, in vitro ad
uſum ſerva.

Aurum vulgo purum non habetur,
ſed omne cupri particeps eſt; unde,
ſi hoc medicamentum paretur, vi-
ruſentiam trahit pernicioſam. Quin
etiam ſi cum auro purificato con-
ficiatur, tamen violentæ indolis eſt,
ac draſticis purgantibus annume-
randum, à cujus uſu in medicina
abſtinere, prudentia jubet; præ-
ſertim in tenellis infantum corpu-
ſculis.

Doſin quidam ſtatunt ad granum
unum & ultra.

BACILLI ad FORNACEM

vid.

MASSA ad FORNACEM.

BACILLI

de

LIQUIRITIA ALBI.

REC. Gummi Arabici,
Specierum diaireos ſimpli-
cium,
diatragacanthæ,
ana unciam ſemis,

Radicis Liquiritiæ,
Amyli *ana unciam unam;*

Terantur omnia in pollinem ſub-
tiliſſimum, cui addantur

Sacchari albi pulveriſati *libra*
duæ,

Mucilaginis Tragacanthæ
quantum ſatis.

Pinſantur in mortario, fiat maſſa,
ex qua formentur, pro lubitu,
bacilli, qui ſub nomine *LIQUI-*
RITIÆ ALBÆ COCTÆ, re-
ponantur.

Lubricant, abstergent, leniunt, demulcent, ore per vices accipiendi, ut sensim liquati per fauces demittantur. Singulis vicibus fragmentum avellanae magnitudine assumere juvat.

BACILLI

de

LIQUIRITIA CITRINI.

REC. Liquiritiæ pulverisatæ *unciam unam,*

Iridis Florentinæ,

Amyli albi *ana unciam semis,*

Croci subtilissimè triti *scrupulum unum,*

Sacchari albi *libram unam.*

Fiat cum mucilaginis Tragacanthæ sufficiente quantitate massa, ex qua formentur bacilli.

In catarrhis, & defluxionibus acerbis ad fauces, indeque orta tussis sicca, & raucedine profunt.

BALNEUM DETERSIVUM.

REC. Radicis Oxylapathi,

Herbæ ejusdem *ana libram semis,*

Malvæ *uncias sex,*

Saponis Veneti *unciam unam.*

Incisa misce, ebulliant cum

Aquæ mensuris decem.

Impleatur cupa balnearia aquæ frigida q. s. cui aquæ decoctæ affundatur q. s. ad debitum caloris gradum, cui æger insideat loco clauso per unam, alteramve horam, iterando hanc lotionem manè & vespèrè longè à pastu, per duas, vel tres hebdomadas.

Valet in prurigine, scabie, impetigine, aliisque cutis defædationibus, cum debito regimine.

BALNEUM EMOLLIENS.

REC. Herbae Althææ,

Malvæ,

Verbasci,

Florum Chamomillæ *ana uncias sex,*

Furfuris *libram unam.*

Misce, incisa excipiantur sacco lineo,

& ebulliant in aheno cum

Aquæ mensuris decem.

Cupa vero aquâ simplici, frigida, ultra pedis altitudinem impleatur, & ex aheno aquæ bullientis affundatur q. s. ad gradum caloris temperati; cui æger insideat lumbotenus, vel paulo altius, per unius vel alterius horæ spatium, longè à pastu.

Valet humectando, molliendo, laxando, leniendo, abstergendo, in solidorum siccitate, rigiditate, dolore, nephralgia, colica, dolore rheumatico, ischiadico, hæmorrhoidali, uterino, catameniorum, hæmorrhoidum retentione, ischuria, stranguria, dysuria, lassitudine, ardore, siti, &c.

BALNEUM PAREGORICUM.

REC. Capitem Papaveris albi *uncias quatuor.*

Concisa ebulliant cum

Aquæ, &

Lactis vaccini ana mensuris duabus.

Hoc decoctum Balneo mollienti admixtum, dabit semicupium, doloribus leniendis, demulcendis, obtundendis idoneum, cum debita cautela, & circumspèctione adhibendum, in cardialgia, colica, nephralgia, ischiade, hæmorrhoidum dolore, &c.

BALSAMA.

Balsama sunt vel nativa, vel artificialia: illa in parte prima hujus operis recensentur; de his autem hic agendi locus est. Eorum alia simplicia, unâ saltem basi constant, alia composita, ex pluribus conflantur. A prioribus ordiri lubet, ac posteriora subjungere, utrinque ordinem alphabeticum servando.

BALSAMA SIMPLICIA.

Hæc parantur ex unico quodam oleo destillato, quod excipitur Olei Nucistæ expressi q. s. additâ quâdam coloris grati tincturâ. Proportio inter oleum liquidum, & corpus balsami, vulgo talis obser-

observatur, ut sint illius partes *duæ*, & corporis partes *quinque*, vel q. f. ad justam consistentiam. Quò autem eminentior sit olei principis fragrantia, usu receptum est, oleum Nucistæ ope spiritûs vini suo proprio odore privare; licet hac omisâ correctione, nihilo vilior esset balsami efficacia. Cæterum vires talium Balsamorum, præcipuè ab oleis destillatis æstimandæ veniunt, quæ usu externo nervis roborandis, sensibus excitandis, spiritibus recreandis conferunt; internè autem humores concitant, fibras & vasa validè stimulant, circulationem accelerant, calores accendunt, &c.

BALSAMUM ANGELICÆ.

REC. Olei Angelicæ destillati
drachmam unam,
Nucistæ expressi *drach-*
mas duas semis.

Misce, fiat Balsamum debitæ consistentiæ, pauxillo, si lubet, Coccionellæ tingendum.

Vires habet ab oleo destillato Angelicæ, roborantes, nervinas, cephalicas, antiloimicas, &c. Externè naribus, vertici, temporibus, nuchæ, scrobiculo cordis, carpis manuum, affricatur. Vitandi contagii causâ, tantillum quoque ore contineri potest. Tussientibus quoque, & colicâ flatulentâ laborantibus, modicâ dosi prodesse, & hystericis ad nares convenire, Cel. SCHULZIUS affirmat.

Eâdem ratione præparantur alia Balsama simplicia odorifera, videlicet:

Caryophyllorum aromati-
corum,

Pulvere subtili eorun-
dem,

Cinnamomi,
Lavendulæ,
Ligni Rhodii,
Majoranae,
Macis,
Rosmarini,
Rutæ,
Succini,

Bolo Armenâ.
Cæruleo montano.
Laccâ Florentinâ.
Magisterio foliorum.
Croco.
Magisterio suo.
Floribus viridis æris.
Curcumâ.

Balsama

tingenda

Vires singulorum ex indole, proprietate & efficacia oleorum, quæ basin ipsorum constituunt, repetendæ sunt; ex quo principio etiam usus illorum definiendus, & varii morborum casus, in quibus magis, aut minùs convenire videantur. In genere opus est cautelâ & circumspectione, ne vis eorum acriter stimulant, & calefaciens, in systemate sensorio, & motorio, majores turbas concitet, quas fortè jam ingruentes, aut præsentès, componere oporteret.

BALSAMA COMPOSITA.

Horum alia sunt crassioris consistentiæ, unguinosæ, ut Balsamum

Pars II.

Arçæi, alia verò liquida & spirituosâ, ut Balsamum vitæ, pleraque magis usui externo dicata; omnium vires, ex indole & facultate ingredientium, eorundemque proportionè æstimare licet.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

REC. Olei Nucistæ expressi *unciam*
semis,

Jasmini,
Cinnamomi,
Ligni Rhodii *ana grana*
quindécim,
Lavendulæ,
Majoranae,
Caryophyllorum *ana*
scrupulum semis,
K Moschi,

Moschi,
 Ambrae ana grana tria,
 Zibethi granum unum,
 Balsami Peruviani scrupulum
 semis,

Spodii nigri præparati quan-
 tum satis pro colore.

Oleo Nucistæ lento igne liquato,
 instillentur olea destillata, Mo-
 schus & Ambra cum spiritu ro-
 sato trita, Zibethum & Balsamum
 Peruvianum in fine addantur.

Parari etiam absque Moscho, Am-
 bra, & Zibetho debet, pro illis,
 qui horum odorem ferre ne-
 queunt.

Quia hujus Balsami in officinis non-
 nisi modica est dispensatio, satius
 est illud minore tantum copiâ
 parare. Oleum Rutæ, & Succini,
 ob graveolentiam omittere
 visum est, ne cæterorum suavita-
 tem obtundant.

*Pro suavi odramento præcipuè ex-
 ternò usu venit, ad nàres, ad ver-
 ticem capitis, ad tempora; aliàs
 in spirituum languore, sensuum stu-
 pore, affectibus capitis frigidis,
 vertigine, sopore, apoplexia serosa,
 &c. commendatur. Ubi morbus
 vitalis est concitator, & mor-
 bus calidæ indolis, prudentia jubet
 abstinere. Internè vix usu veni-
 re solet. Hystericis, aliisque sub-
 jectis mobilioribus, ingens fragran-
 tia adversari solet.*

BALSAMUM ARCÆI.

REC. Terebinthinae Venetae,
 Gummi, vel potius
 Resinæ Elemi,
 Sevi Cervini ana uncias duas,
 Olei Hyperici unciam unam,
 Santali rubri drachmam u-
 nam.

Gummi Elemi in terebinthina
 lenissimo igne solvitur, quibus
 successivè adduntur Sebum &
 Oleum Hyperici, in alio vase li-
 quata, tandem pulvis Santali
 subtilissimus admiscetur.

Præstans vulnerarium & digestivum

*est, quod in vulneribus feliciter
 adhibetur.*

BALSAMUM CEPHALICUM SAXONICUM.

REC. Olei dest. Lavendulae,
 Succini albi ana
 scrupulum unum,
 Pulegii,
 Anthos,
 Majoranae,
 Salviae,
 Saturejae ana gra-
 na quindecim,
 Macis,
 Rutae, ana scrupu-
 lum semis,
 Menthae,
 Origani ana grana
 duodecim,
 Nucistae expressi un-
 ciam unam.

Misce, fiat Balsamum.

*Roborans, cephalicum, nervinum, sto-
 machicum, &c. instar Balsami apo-
 plectici adhiberi potest.*

BALSAMUM COMMENDATORIS, vid. BALSAMUM PERSICUM.

BALSAMUM COSMETICUM.

REC. Spermatidis Ceti recentis al-
 bissimi unciam semis,
 Olei Tartari per deliquium
 limpidissimi q. s.
 Misce in mortario vitreo, tunc adde
 Olei Jasmini recent. scrupu-
 lum unum,
 Succicetri acidi recent. drach-
 mas duas.

Misce ad usum.

*Cautè adhibitum prodest ad guttam
 rosaceam, varos, furfurationes,
 lentigines, &c.*

BALSAMUM EMBRYONUM. vid. AQUA EMBRYONUM.

BALSAMUM HYSTERICUM.

REC. Olei Nucistæ drachmas duas,
 Castorei optimi drachmam
 unam,
 Assæ

Alfæ foetidæ *scrupulum unum*,
 Camphoræ, *scrupulum semis*,
 Olei dest. Galbani,
 Nucis Moschatae,
 Rutae,
 Menthæ *ana gut-*
 tas decem.

Misce, fiat Balsamum.

Viribus roborantibus, nervinis, antispasmodicis, valet in languore hysterico, vertigine, anxietate, suffocatione, aliisque pathematibus nervosi generis; externe naribus, vertici, temporibus, præcordiis, umbilico, carpi manu illinendo.

BALSAMUM LOCATELLI.

REC. Olei Olivarum *uncias sex*,
 Cerae Citrinae *uncias quatuor*,
 Vini Canariensis *uncias quinque.*

Leni igne ad consumptionem vini coctis, adde
 Terebinthinae Venetae *claræ uncias sex*,
 Balsami Peruviani *drachmas duas*,
 Santali rubri *unciam semis.*

Ad vulnera, contusiones, variasque læsiones, internas pariter, ac externas, commendatur. Interne propinatur à drachmis duabus, ad unciam semis in jusculo.

BALSAMUM LOIMICUM.

Ejus loco Balsamum Angelicæ simplex usu venire potest.

BALSAMUM MAGICUM.

Ut morbi incantationum credulam superstitionem sapiunt, sic medicamenta anti-magica pari passu ambulant, quibus citra dispendium rei medicæ superfedere licebit.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

REC. Olei Ligni sancti *drachmas duas*,
 Caryophyllorum *drachmam unam*,
 Opium,

Camphoræ *ana scrupulos duos*,
 Olei Nucistæ expressi *drachmas sex*,

Opium & Camphora Spiritûs Vini pauxillo soluta, miscantur cum reliquis.

Vires in sistendis gravissimis dentium doloribus compertæ sunt, si vel solum, vel gossypio exceptum, cavitatibus dentium applicetur.

BALSAMUM PECTORALE MEIBOMII.

REC. Terebinthinae Venetae *finissimæ*,
 Olei Amygdalarum dulcium *recentissimi*,
 Hyperici *recentiss. ana uncias duas*,
 Spermatis Ceti *recentiss. unciam semis*,
 Sanguinis Draconis *finissimi*,
 Balsami Peruviani *genuini ana drachmas tres*,
 Extracti Opii cum aqua parati *scrupulum semis.*

Misce fiat Balsamum.

Alia hujus Balsami compositio extat apud Cel. SCHULZIUM, *Prælect. in Disp. Brand. p. 86.* cum magno quoad Opii proportionem discrimine.

Viribus demulcentibus. Et balsamicis, laudatur ad Phthisin pulmonalem ulcerosam, aliaque ulcera interna.

Dosis drachma una, ad duas Et ultra, cum vehiculo sorbitionis, seri lactis dulcis, vel infusi herbarum pectoralium, Et traumaticarum.

BALSAMUM PERSICUM.

Gall. BEAUME de COMMANDEUR.

REC. Storacis Calamitæ,
 Thuris masculi, *ana uncias duas*,
 Balsami Indici ficci *unciam unam*,
 Benzoes *uncias tres*,
 Aloës Socotrinæ,
 K 2 Myrrhæ,

Myrrhæ,
 Angelicæ odoratæ *ana unciam
 semis,*
 Florum Hyperici *unciam u-*
nam,
 Spiritus vini rectificatissimi
libras tres.

Misce, digesta per mensem, & filtra-
 trata usui ferventur.

Completum redditur addendo

Ambrae gryseæ grana sex,
 Moschi grana quinque.

*Essentia præstans balsamica, viribus
 traumaticis, deterfivis, antisepti-*
cis, consolidantibus, valde celebra-
tur, in vulneribus & ulceribus
variis, etiam pravis, & malignis,
extrinsecus secundum artis leges
adhibita; etiam interno usu, ad
guttas decem, vel quindecim, cum
vehiculo aquoso commendatur, ni-
si temperies calida, inflammatio,
calor, aut febris repugnent.

BALSAMUM SAMARITANUM.

REC. Olei Hyperici recentis *uncias
 sex,*

Vini albi generosi *libram
 unam.*

Mixta coquantur ad consumptionem
 vini, & colatura ad usum
 reponatur.

Virtute blandâ traumaticâ, vulneri-
bus recentibus sanandis idoneum ha-
beri meretur.

BALSAMUM SOMNIFERUM.

REC. Unguenti pomati,
 Olei Nucistæ expressi *ana un-*
ciam semis,

Opii in spiritu vini soluti,
 Camphoræ *ana drachmam se-*
mis,

Olei ligni Rhodii *guttas de-*
cem.

Misce fiat Balsamum.

Viribus narcoticis, valet in cephalal-
gia, agrypnia, inquietudine; na-
ribus admotum, ad tempora, ponè
aures, vertici capitis illitum, vel
etiam pulsibus, aut plantis pedum
affricatum.

BALSAMUM STOMACHICUM.

REC. Olei dest. Absinthii,
 Corticum Auran-
 tiorum,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Menthæ *ana drach-*
mam semis,

Balsami de Peru *drachmam
 unam,*

Olei Nucistæ expressi *unciam
 unam.*

Misce fiat Balsamum.

*Ventriculum confortat, vomitus &
 singultum sistit, flatus & ructus*
pellit ac discutit, epigastricæ re-
gioni illitum.

BALSAMUM SULPHURIS.

AMYGDALATUM.

REC. Florum Sulphuris *unciam
 unam,*

Olei Amygdalarum dulcium
 recens expressi *un-*
cias sex.

Digerantur in arena calore conve-
 nienti, donec Oleum colore fit
 tinctum rubro.

Convenit ad ulcera tam interna, quàm
externa, & securè dari potest, à
guttis quindecim, ad triginta,
cum vehiculo idoneo.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

REC. Florum Sulphuris *unciam u-*
nam,

Olei destillati Anisi *uncias
 sex.*

Misce, digerantur calore arenæ blan-
 do, donec oleum rubicundo co-
 lore saturatum fit, tunc filtretur,
 & ad usum reponatur.

In hoc Balsamo, combinantur vires
Florum Sulphuris absterisivæ, re-
solventes, consolidantes, cum vir-
tute olei Anisi aromatica, acri, sti-
mulante, movente; usu interno in-
terdum valet in diathesi frigida,
catarrhis frigidis, tussi, asthmate
pituitoso, phthisi pulmonali lenta,
colica

colica flatulenta, &c. Nocet in
temperie calida, statu febrili, &c.
Dosis guttæ decem cum vehiculo sy-
rupi Capillorum, vel alio idoneo.

Eâdem ratione parantur

Balsamum Sulphuris Succina-
tum,
Terebin-
tinatum,

Si *uncia una* Florum Sulphuris,
cum *sextuplo* olei Succini, vel
Terebinthinæ digeratur, & post
saturationem filtretur.

*Vires à parte oleorum prædominan-
tur, valde acres, stimulant, ca-
lescentes. Balsamum succinatum,
in subjectis valde torpidis, & af-
fectibus catarrhalibus frigidis, non
febrilibus, moderato usu nonnum-
quam valere potest. Terebinthina-
tum scopo deterfivo, in ulceribus
internis; aliàs scopo diuretico, in
hydropicis, vel etiam utroque in
Gonorrhoea virulenta, usu venit.
Externè verò, triplo spiritûs vini
rectificati dilutum, ad vulnera par-
tium tendinosarum, cautè adhibe-
tur.*

BALSAMUM SULPHURIS RULANDI.

REC. Florum Sulphuris *uncias*
duas,

Olei recens expressi Papave-
ris albi *libram unam,*

Vini optimi *uncias tres.*

Misce, digerantur leni calore per
octiduum, tunc ebulliant ad hu-
midi consumptionem, & cola-
tum usui servetur.

Hæc compositio extat in Cel.
SCHULZII *Prælect. in Dispent.*
Brand. p. 190. Aliis placet Oleum
Lini, aut Nucum, quod discrimen
tanti momenti non est. Cel.
Authores DISPENS. WIRTEMB.
præter majorem Olei Lini pro-
portionem, addunt Olei Tere-
binthinæ *uncias tres.*

Usum externo digerit, resolvit, mun-
dificat, demulcet, in casu vulne-
ris, ambustionis, &c. Aliàs con-
Pars II.

ficiendo Emplastro Diasulphuris R.
inservit.

BALSAMUM VITÆ.

REC. Olei dest. Caryophyllorum
aromaticorum,
Cinnamomi,
Corticis Citri Ita-
lici,
Ligni Rhodii *ana*
drachmam semis,
Anthos,
Lavendulae,
Macis,
Majoranæ *ana scru-
pulum unum,*
Balsami Peruviani veri *drach-
mam unam,*
Ambrae Gryseae *scrupulum*
semis,
Salis Tartari ficcissimi *un-
ciam semis,*
Spiritûs Anthos cohobati,
rectificatissimi *uncias decem.*

Ex Floribus recentibus Anthos, cum
Spiritu vini Gallico optimo, ite-
ratâ cohobatione cum novis flo-
ribus, paretur spiritus aromati-
cus rectificatissimus, Sali Tarta-
ri, cum Ambra & Balsamo Pe-
ruviano, subactis, oleisque com-
mixtis, in Cucurbita vitrea, af-
fundendus; digeratur in balneo
arenæ per dies octo, quotidie
nonnihil agitando; tunc filtra-
tum Balsamum usui servetur.

Valde interest, olea stillatitia ge-
nuina esse, nec vetusta nimis,
quoniam adulterina nec gratiam,
nec efficaciam debitam habent,
& quæ minùs recentia sunt, justo
spissiora, solutioni difficilior ob-
temperant.

*Balsamum est spirituosum, & aroma-
ticum, nobile, cum insigni odoris
suavitate; ad nervos roborandos,
spiritus excitandos, vires vitales
invigorandas, actionem vasorum,
& viscerum promovendam, magnæ
efficaciæ. Usum nempe tempestivo
confert, in virium jactura, ani-
mi deliquio, syncope, oscitatione
multa, suspirio, animi metu, &
tristi-*

tristitia, vertigine, sensuum stupore, affectibus soporosis frigidis, catarrhis frigidis, vasorum & viscerum imbecillitate, nausea, ructu, vomitu, frigore, horrore, membrorum torpore, impotentia, paralyti; externè scil. naribus admotum, vel temporibus, ponè aures, vertici capitis, nuchæ, carpis manuum, scrobiculo cordis affricatum. Quin etiam internè, ad guttas decem vel quindecim, saccharo vel syrupo, aliòve vehiculo exceptum ingeritur. Sed ubi temperies calida, morbus indolis calidæ, motus vitalis, & animalis citatior; ubi diathesis inflammatoria, febris, in hæmorrhagiam, fluxum hæmorrhoidalem, uterinum, proclivitas, in promptu fuerit, prudens experientia jubet abstinere.

BALSAMUM VULNERARIUM.

*REC. Spiritus vini rectificatissimi unciæ sex,
Terebinthinæ Venetæ unciam unam semis.*

Misce, solvantur in liquorem aurei coloris, usui servandum.

Ad vulnera recentia, præcipuè nervosarum partium, punctim inflicta, non sine insigni fructu adhibetur.

BALSAMUM VULNERARIUM
DIPPELII, vid. LIQUOR.BALSAMUM VULNERARIUM
MINDERERI.

*REC. Terebinthinæ Venetæ claræ, unciam unam semis,
Gummi Elemi pulverisati unciam semis.*

*Misce, solutis lenissimo igne addatur Olei Hyperici, ex floribus per infusionem parati, uncia una semis,
Ceræ destillati scrupuli duo.*

Misce, fiat Balsamum.

Viribus balsamicis, ad sanationem vulnerum recentium, lege artis applicatum, prodesse solet.

BALSAMUM VULNERARIUM
VIRIDE, Disp. Argent.

*REC. Olei Seminis Lini expressi, Olivarum ana unciæ sex,
Laurini unciam unam,
Terebinthinæ Venetæ unciæ duas.*

Simul igne lento liquefiant, refrigeratisque permisce

Viridis æris subtilissimè triti drachmæ tres,

Aloës Socotrinæ pulverisatæ drachmæ duas,

Vitrioli albi drachmam unam semis,

Olei stillatitii Caryophyllorum drachmam unam,

Baccarum juniperi unciam

semis,

Et factum erit Balsamum.

Conducit ad mundificanda vulnera, & ulcera, ad inducendam carnem, & cicatricem. Laudatur quoque ad morsus animalium venenatorum.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis recens Viperarum Italicarum.

Vires ipsi tribuuntur alexipharmacæ, sudoriferæ, depurantes, antipsoræ; & in morbis malignis, morsu animalium rabidorum, & venenatorum, ipsiusque Viperæ; nec non in scabie, impetigine, lepra, arthritide, malo venereo &c. commendatur.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis.

BEZOARDICUM JOVIALE.

REC. Reguli Antimonii simplicis unciæ quatuor,

Stanni Anglici unciæ duas.

Fundantur simul in crucibulo, dein effusa, & refrigerata pulveriscentur, postea additis

Mercurii sublimati uncis octo,

atque optimè in mortario vitreo mixtis, ad intimiorem solutionem,

nem, reponantur per aliquot dies, noctesque, in cellam; tum retortæ immiffa deftillantur, butyri antimonii inftar; liquor prodiens affufâ magnâ aquæ fontanæ quantitate, diluatur, fic præcipitabitur pulvis albus, qui repetitâ aquæ tepidæ affufione, edulcoratus, & ficcatus, cum triplo Nitri detonetur; idemque affusâ porro multâ aquâ, omni fallidine privatus, ufui fervetur.

Inftar Calcis Stanni, & Antimonii se habere videtur, cui tamen à nonnullis magnæ tribuuntur vires diaphoreticæ, antifebriles anodynæ, præsertim in affectibus Mulierum hystericiis variis excimæ; non sine aliorum authorum gravi dissensu. Dosis faciunt à scrupulo semis ad unum.

BEZOARDICUM MARTIALE.

REC. Limaturæ Martis uncias quatuor.

Immitte in crucibulum, inter carbones collocatum, donec probè candeat, tunc adde

Antimonii pulverisati uncias sex.

Quibus benè fluentibus fucceffivè injiciantur

Nitri depurati libræ duæ semis.

Detonentur, calcinenturque, subinde agitando, & postea massa aquâ tepidâ edulcoretur.

Cum pulvere cachectico LUDOVICI, & Specifico stomachico POTERII coincidit.

Viribus roborandi, transpirationem promovendi, acidum absorbendi, commendatur in morbis talem effectum exigentibus.

Dosis granorum quindecim ad scrupulum unum, cum vehiculo aquoso.

BEZOARDICUM MINERALE.

REC. Mercurii Vitæ uncias duas, Nitri crystallisati, exsiccati uncias sex.

Misceantur, & in crucibulo, per vices ingesta, lenissimè detonentur. Massa alba, salina, solvatur aquâ fontanâ, atque edulcoretur, pulvis autem subsidens leni calore exsicceetur.

Vires, usus, dosis, cum Antimonio diaphoretico simplici pares.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus Armena pulverisata, diluitur aquâ fontanâ, hæc turbida, tenuissimis boli particulis referata, leni inclinatione separatur à spisso, novaque aquæ copia toties affunditur, & decantatur, donec præter arenulas, & crassamentum nihil superfit. Tandem bolus in aqua detractâ subsidens, hac effusâ, ficcatur & ufui reponitur.

Viribus alexipharmacis, adstringentibus, acidum obtundentibus, usu venit in febribus continuis, epidemicis, vomitu, diarrhœa, dysenteria, &c.

Dosis ad scrupulum unum, drachmam semis.

BUTYRUM ANTIMONII.

Vide

ANTIMONII BUTYRUM.

*

BUTYRUM CACAO.

Vide

OLEUM EXPRESSUM.

*

BUTYRUM,

Majoranæ Potabile

Rubrum,
Viride.

Vide UNGUENTA.

*

CANDELÆ FUMALES.

REC. Styracis Calamitæ unciam unam semis,

Benzoës,

Mastiches,

Caryophyllorum aromaticorum,

Sacchari albi ana drachm. sex,

Carbonum Tiliæ uncias quindecim.

L 2

Misce

Misce fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum

Mucilaginis Gummi Tragacanthæ q. s. redigatur in massam debitæ consistentiæ, ex qua formentur lege artis candelæ conicæ, acuminatæ, basi tripedes;

Si massæ modò præscriptæ addantur,

Balsami Peruviani *uncia semis*,

Olei destillati Caryophyllorum,

Ligni Rhodii,
Lavendulæ

ana scrupulus unus.

Candelæ fragrantiores, & sic dictæ COMPLETÆ efficiuntur.

CASSIA EXTRACTA.

Vide

PULPA CASSIÆ.

CAUTERIUM POTENTIALIALE.

Fit ex Lixivio Saponariorum acerrimo, cum Calce viva parato, in sartagine ferrea tam diu coquendo, donec omnis fere humiditas ablata sit, atque residuum salinum siccescere, & concrefcere incipiat. Tunc ab igne removetur, & massa jam solidescens, spatulâ ferreâ eximitur, inque vase vitreo sicco, accuratè clauso, prope fornacem calidum asservatur.

Inservit ad excitandos fonticulos, vel auferendas excrescentias præternaturales verrueas.

CERA ARBOREA.

REC. Cerae citrinæ,
Resinæ Pini,
Colophonix *ana libram semis*,
Terebinthinæ vulgaris,
Adipis suillæ *ana uncias duas.*

Liquefcant & colentur.

Utuntur eâ Hortulani ad insitionem, & læsiones arborum.

CERA SIGILLARIS RUBRA.

REC. Cerae Citrinæ *uncias sedecim*,
Resinæ Pini *uncias sex*,
Terebinthinæ Venetæ,
Cinnabaris factitiæ præparatæ *ana uncias tres.*

Liquetur cera & resina, atque mixturæ colatæ addatur Cinnabaris, modico olei Lini trita, & effundatur in formas consuetas.

CERA SIGILLARIS VIRIDIS.

Eodem modo paratur, loco Cinnabaris, addendo Æruginis, si-ve Viridis Æris probe triti, & in olei Lini *drachmis duabus* soluti, *unciam unam.*

Cerae rubrae in Medicina nullus usus est, viridi ad clavos & verrucas nonnunquam utuntur Chirurgi.

CERATA.

Vix nisi molliore & minùs tenaci consistentiâ, ab Emplastris differunt, quæ proin inter Emplastra suo loco referre lubet.

CHALYBIS PRÆPARATIO.

Limatura Martis, seu Ferri purissimi, aquâ fontanâ sæpiùs abluatur, & à fordibus mundetur; post iteratas humectationes, & siccationes, in mortario ferreo in subtilissimum pollinem teratur, & in Porphyrite lævigata fervetur.

Vires ejus insignes sunt tonicæ, aperientes, adstringentes, antacidæ, tempestivo usu salutares, in variis morbis chronicis, à lentore humorum, & atonia viscerum oriundis: in stomachi debilitate, in chlorosi, cachexia, ictero, malo hypochondriaco, hysterico, menstruum cunctatione, retentione, anomalia, &c. Ejus usu pulsus arteriarum invalescit; facies floridior fit, alvinæ fæces nigrescunt, quod boni ominis habetur. Motu & exercitatione corporis, ejus efficacia promovetur. Qui sedentarii

rii sunt, vel lecto prorsus affixi, ejus effectum minus bene ferunt.
Dosis scrupulus semis; unus, per se, cum vehiculo, vel in bolo, electuario, pilulis. *Etiam minor dosis proficit, si longius adhibeatur.*

CHALYBS cum SULPHURE
 PRÆPARATUS.

REC. Limaturæ Martis *uncias quatuor,*

Sulphuris citrini *uncias duodecim,*

Optimè misceantur, atque in patina terrea, sub perpetua agitatione, leni igne calcinentur, usque dum mars, per deflagrationem sulphuris, in pulverem ferrugineum calcinatus fuerit.

Alii frustum Martis candefaciunt, atque illud Sulphuris magdaleoni admovent, sic Mars cum Sulphure funditur, & in vas suppositum, aquâ frigidâ repletum, destillat, qui colligitur, in pulverem teritur, atque leni igne calcinatur.

Vires, usus, dosis, cum præcedenti pares.

CHOCOLADA SIMPLEX.

Vide

SUCCOLADA SIMPLEX.

*

CHOCOLADA COMPOSITA.

Vide

SUCCOLADA COMPOSITA.

*

CINNABARIS ANTIMONII.

Vid.

ANTIMONII CINNABARIS.

*

CINNABARIS FACTITIA.

REC. Sulphuris citrini purissimi *uncias quatuor,*
 Mercurii vivi purissimi *uncias duodecim.*

Fluat Sulphur in vase figulino satis capaci, cui per vices, Mercurius, in tigillo calefactus, ad-

Pars II.

datur; misceantur fistulâ, quâ fumum Tabaci haurimus, exactè; solet tum fieri subito magnus sibilus, & exoriri fumus densus atque cum sonitu inflammari materies; operculo igitur vas tegendum. Refrigerata postea massa nigra, immittatur cucurbitæ vitreæ, vel vasi sublimatorio, cui imponatur alembicus; lutetur luto ex argilla & calce facto, ponatur in furnum sic, ut vas sublimatorium fere fundum cupellæ attingat, obruaturn arenâ paulo altius, quam materies; adhibeatur ignis per gradus, ad summum usque. Ascendit primò parum phlegmatis, deinde flores subalbidi, postea nigri, & tandem Cinnabaris. Ubi ignis summus per *tres horas* applicatus est, frigescent sponte, & Cinnabaris ab adhærente nigredine separata fervetur.

Cinnabaris factitia ritè ac fideliter elaborata, licet vilioris pretii, native tamen cæteroquin nihil cedit, quæ posterior interdum recrementata mineralia, incertæ vel suspectæ indolis, admixta habet. Itaque si aliquas modò in corpore humano vires à Cinnabari expectare licet, eas factitia non minus, quam nativa, imò quàm illa antimonii, præstabit.

Dosis grana quinque, vel scrupulus semis, in pulvere, bolo, pilulis.

CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

REC. Cinnabaris native puræ *qu. pl.*

Trita in pulverem subtilem, excipiaturo Vitro sublimatorio, atque igne arenæ, per *tres horas*, adhibito fortissimo, sublimetur; iterando sublimationem, si opus videatur; tandem super marmore lævigata, cum aqua pura probè abluatur.

Huic medicamento quondam vires insignes,

M

signes, attenuantes, resolventes, diaphoreticas, cephalicas, antispasmodicas, antepilepticas, &c. passim authores tribuebant; ejusque usum in febris continuis, acutis, malignis, in vertigine, cephalæa, convulsione, epilepsia, magni faciebant. Moderni verò ratione & experientiâ fulti, parum efficaciæ ipsi inesse contendunt.

Dosis grana quinque, vel scrupulus semis, in pulvere, bolo, pilulis, &c.

CLARETUM è sex SEMINIBUS.

Vide

AQUA CARMINATIVA sex SEMINUM.

● COLCOTHA R.

Est Vitriolum viride ad rubedinem calcinatum.

Virtutis potenter adstringentis, & siccantis, usus externi in emplastris, &c.

CONCHÆ CITRATÆ.

REC. Concharum à mucore mundatarum, & subtilissimè pulverisatarum *libram unam.*

Affundatur

Succi Citri recentis *libra semis.*

& leni calore, in patina vitrea exsiccata ad usum servantur.

Loco succi Citri, etiam aceto destillato saturari possunt.

Vires habentur digestivæ, diaphoreticæ, diureticæ, antifebriles; & usu veniunt in febris continuis, & intermittentibus, &c.

Dosis scrupulus unus, drachma semis, in pulvere, mixturis, emulsionibus.

CONCHÆ PRÆPARATÆ.

Testis Concharum oblongis, affundatur acetum forte, macerentur, ut fordes, & mucor abradi queant. Mundatæ exsiccantur, pulveriscentur subtilissimè, & super marmore lævigentur.

Observari meretur, Conchas, si

calcinentur, causticas reddi, instar calcis vivæ, ideoque talem præparationem minùs quadrare. Cuidam memini à Conchis calcinatis, faucium inflammationem accidisse.

Vires habentur absorbentes, diaphoreticæ, diureticæ, antifebriles; usus frequentis in acrimoniâ humorum, febris continuis, ac intermittentibus.

Dosis & usus, ut præcedentis.

C O N D I T A.

Ex regno vegetabili condiri solent, radices, caules, fructus, cortices, non solum in gratiam palati, ut jucundiùs gulam afficiant, sed etiam, ut longiùs corruptioni resistent. Quoad usum, sanis & ægris præsidio, & oblectamento sunt, si tempestivè ac moderatè fumantur. Aromatica stomachum roborant, ac vires viscerum motrices augent. Acidula varia modicè nutriunt, os, linguam, palatum, fauces, suaviter humectant, refrigerant, permulcent, abstergent, viresque refocillant; salutarium cum effectu, in siti flagrante, linguæ & faucium ardore, ficitate, scabritie, in febris acutis, inflammatoriis, benignis & malignis, simplicibus & exanthematicis, etiam lentis, & hecticis. Ne autem dulcedo nimia, vel usus intempestivus nocumento sit, prudentia therapeutica cavere jubet.

Aromata quædam, & fructus exotici, ex India conditi ad nos afferuntur, ut

ANANAS,

AURANTIA, }

CITREA. }

NANA.

CARYOPHYLLI AROMATICI,

NUX INDICA,

ZINGIBER.

Modico usu, roborandis stomachi, & viscerum viribus, idonea; per se, vel in Electuariis, morsulis.

CORTI-

CONDIT.

CORTICES AURANTIORUM, & CITRI CONDITI.

Corticibus eorum recentibus affundatur lixivium è cineribus clarum, sic post unam, vel alteram ebullitionem, in vase figulino, mollescent. Quo facto abluantur aquâ fontanâ calidâ, & mundati ab albedine, cribro inverso imponantur, ut superfluo humore orbentur. Postea in vase vitreo repositis, affundatur saccharum clarificatum, & fere ad consistentiam tabulati, coctum, ad supereminentiam unius digiti, sicque usui servantur.

Vi aromaticâ, cardiacâ, stomachicâ, carminativâ, prosunt in virium debilitate, stomachi languore, anorexia, dyspepsia, flatulentia, &c.

Dosis uncia semis, per se, vel in electuariis, morsulis.

CONDITURA CYDONIORUM.

REC. Cydoniorum maturorum aliquamdiu repositorum qu. pl.

Detracto cortice, dissecta in aqua fontana coquantur ad mollitiem, tunc siccatis nonnihil à superfluo humore, affundatur sacchari albi clarificati, & ad justam consistentiam cocti, ad eminentiam digiti, vel q. s. & postquam satis saccharo imprægnata videantur, in vase vitreo, vel terreo usui servantur.

Saporis grati, refrigerant, refocillant, roborant, adstringunt; usu haud insalubri, in stomacho debili, nausea, vomitu, diarrhœa, dysenteria, languore & aestu febrili, &c.

Dosis ad unciam, vel pro lubitu, per se, vel in electuariis, &c.

CONDITURA FRUCTUUM MOLLIORUM

BERBERUM,
CERASORUM,
CORNORUM,
CYNOSBAMOS,
FRAGORUM,

CONDITA

47

PRUNORUM,
RIBIUM,
RUBI IDÆI,
UVARUM.

Fructus recentes, statim à principio maturescentiæ, probe mundati injiciantur saccharo clarificato, & prope ad consistentiam tabulati cocto, in eoque tamdiu relinquantur, donec saccharo satis imprægnati videantur, tunc fructus eximantur, saccharum verò succo eorundem liquatum, ad spissiore[m] rursus consistentiam coquendo redigatur; cui demum nonnihil refrigerato, fructus reddantur, & sic usui servantur.

Alimentum & medicamentum blandum, saporis jucunditate, linguæ, palato, & gulæ, mirificè gratum, humectans, refrigerans, refocillans; in vario morborum genere, ardore ac siti, inflammatione, febribus acutis & lentis, continuis & intermittentibus, oris & linguæ ariditate, viscositate, &c. opportunum sæpe solatium, si modò secundum salubritatis leges, tempestivè in usum ducatur.

CONDITURA NUCUM JUGLANDIUM.

Colligantur Nuces circa festum St. Johannis; stylo undique perforatæ, per octiduum in aqua fontana, bis quotidie recenti affundendâ, macerentur, tunc ad mollitiem coctæ, Cinnamomo, & Caryophyllis aromaticis hinc inde stipatæ, cum duplo sacchari clarificati, lege artis dulciariæ, condiantur.

Præter vim aliquam alendi, facultate aromaticâ, roborante, stomachicâ, cardiacâ, valent in virium debilitate, stomachi & intestinorum inertia, dyspepsia, cruditate.

Dosis N^o. 1. per se.

CONDITURA RADICUM
CALAMI AROMATICI,
CICHORII,
ENULÆ,
ERYNGII,
SATYRII,
SCORZONERÆ.

Radices recentes probè mundatæ,
& in taleolas sectæ, maceren-
tur in aquæ fontanæ q. s. per *ho-
ras duodecim*; dein ad mollitiem
coctæ, saccharo clarificato, & ad
debitam consistentiam cocto, im-
mergantur; postridie repetatur
coctio tandemque modica, humi-
ditate fatis consumptâ, radices
usui servantur.

*Vires ex natura simplicium notæ ha-
bentur. Usu veniunt vel per se,
vel in Electuariis, pro libitu.*

CONFECTIO ALKERMES.

REC. Succum Pomorum Borstorfien-
sium depurati,

Sacchari albissimi *ana libram
unam semis.*

Misce, solvantur lento igne, & in-
spissentur ad consistentiam mel-
lis, tunc addatur

Succi Granorum Kermes
Monspeliensis spissioris
libra una semis.

Dein ab igne sepositis, adhuc te-
pidis addantur

Ligni Aloës,
Cinnamomi optimi *ana
drachmæ sex,*

Margaritarum orientalium
præparatarum *drachma
una semis,*

Coccionellæ, cum aliquot
guttis olei Tartari per de-
liquium tritæ *drachma
semis,*

Foliorum Auri purissimi
No. triginta.

Omnia diligenter mixta ad usum
reponantur.

Antehac in istam compositionem
recipiebatur quoque *Lapidis La-
zuli drachma una cum semisse,*
quem prudenter Cel. Authores
Dispens. Argent. omiserunt. Quo

autem consilio, vel quo fato,
lapis tam drastica, & prope ve-
nenatæ facultatis purgantis, in
hanc confectionem irrepperit, me-
ritò quæritur. Num fortè apud
primum Auctorem Arabem, alius
lapis erat scriptus? & ab inter-
pretibus malè intellectus, fon-
tico errori ansam dedit? Pue-
rum memini à dosi largiore hu-
jusmodi confectionis, sursum at-
que deorsum validè purgatum,
velut ex hypercatharsi pericli-
tâsse. In nonnullis Dispensato-
riis Croci orientalis *drachma* adji-
citur.

Apud Majores pro incomparabili
fere cardiaco, & in hunc prope
diem à multis pro eximio, &
nobilissimo analeptico celebra-
tur, licèt experientiæ suffragio
tantum laudis non mereatur. A
succo Kermes aliquid virtutis sti-
mulantis, & à Cinnamomo, &
Ligno Aloës, vim aromaticam,
roborantem habet; coloris gra-
tiam Coccionella, & splendorem
folia Auri conciliant, à Saccharo
saporis gratia accedit, à Marga-
ritis pretium augetur.

*Dosis à drachma dimidia, ad drach-
mam unam, per se, vel in julapiis,
mixturis, emulsis, bolo, electua-
riis, &c. In quo casu morborum
conveniat? vel non? ex indican-
tium ratione petendum est; ubi in-
flammatoria diathesis, ubi multa fe-
bris, dolor, calor, vel molimina ad hæ-
morrhoides, menstruum profluvium,
vel quancunque hæmorrhagiam
adsunt, ab ejus usu præstat absti-
nere.*

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.

REC. Confectionis incompletæ li-
bram unam,

Ambre gryseæ veræ *scrupu-
lum unum,*

Moschi optimi *scrupulum se-
mis.*

Ambra cum Sacchari albi *drachmis
dua-*

duabus teratur, & Moschus in aqua Rosarum solvatur, sicque omnia commisceantur.

Viribus præcedentis, in hac compositione accedit fragrantia stimulans ingens, à duplici additamento.

Dosis & usus idem. Excipiendæ Mulieres hystericae, & quicumque fragrantiam aversantur.

CONFECTIO ANISI LAXATIVA.

REC. Seminis Anisi electi *uncias tres,*
Radici Jalappæ *unciam unam,*
Cinnamomi optimi,
Zingiberis ana *drachmam unam,*
Sacchari albi *uncias viginti.*

Ahenum confectorium super ignem, saccharo soluto, & clarificato imbuatur; huic Anisum injiciatur, eique subacto, aliquantum de reliquis speciebus tenuiter pulverisatis inspergatur, & agitando æquabiliter commisceatur. Sic invicem sacchari liquati additione, & pulveris insperione pergatur, tandemque ultimâ sacchari adjectione, & incrustatione opus finiatur.

Cum vi aromatica, jungitur vis cathartica Jalappæ, quæ mitior Diacrydio præferenda videtur. Uncia semis hujus confectiois continet circiter Jalappæ scrupulum semis, quæ Dosis congruit puero decem plus minus annorum.

CONFECTIO CINNAMOMI REGIA.

REC. Succoladæ Indicæ *uncias quatuor,*
Nucum Moschatarum in India conditarum, *majorum, Numero tres,*
Syrupi Cinnamomi *libram dimidiam,*
Confectionis Alkermes incompletæ *unciam unam,*
Olei Cinnamomi *drachmam semis.*

Pars II.

Misce, fiat Confectio liquida.

Analepticum gratissimum, & stomachicum egregium præbet hæc confectio. Datur etiam parturientibus, ad fœtum pellendum, & vires restaurandas.

Dosis est drachma una, ad duas.

CONFECTIO HAMECH.

Compositio vetusta Medicorum Arabum, prope in hodiernum diem celebrata, sed minus concinna, & supra modum violenta, non immerito tandem evilescit. Utpote cui tot alia electuaria purgantia mitiora, paratu facilia, ac tutioris usus anteferenda videntur. Nec solida est ratio, cur in morbis obsœnis, aliisque obstinatis, & chronicis, tanti à nonnullis habeatur. Quod si non nemo, illam unguento populeo intermistam, contumaci alvinæ obstructioni, singulari experimento mederi credat, fortè non minori efficaciam ad eundem scopum valebit, sola Colocynthis eidem unguento adjecta.

CONFECTIO
de
HYACINTHO.

REC. Specierum de Hyacintho *unciam unam,*
Syrupi acetositis Citri *uncias tres.*

Mixta reponantur in vase porcellano satis amplo, ne ob effervescentiam disrumpatur.

Ad splendorem vulgo adduntur Folia Auri No. decem. Et si completa desideretur, Ambrae & Moschi grana quinque.

Lapides pretiosi, ipsumque os de corde cervi, nihil opis promittunt; à cæteris ingredientibus vires sunt adstringentes, cardiacæ; stomachicæ; ratione quarum usu venit in vomitu, diarrhœa, dysenteria, hæmorrhagiis immoderatis, sudore immodico, &c.

Dosis drachma semis, vel integra, per se, vel in bolo, electuario, mixturis, &c.

N

CON-

CONFECTIONES SICCÆ

SEMINUM ANISI,
CORIANDRI,
CYNÆ,
CUBEBARUM,
FOENICULI,
SINAPIS,

Non tam à Pharmacopœis, quàm à
Conditoribus parari solent, qua-
rùm aliquæ in officinis in Tra-
geam grossam, vel etiam in com-
positiones Morfulorum quorum-
dam recipiuntur: semen autem
CYNÆ præsertim infantibus &
pueris, ad lumbricos fugandos,
ad *drachmam unam, duas*, per ali-
quot dies successivos adhibetur,
posteaque medicamentum pur-
gans, ætati congruum subjun-
gitur.

CONSERVÆ.

Hoc nomine venit Medicamentum
interno usui dicatum, molle,
spissum, ex *una parte* florum
recentium, aut foliorum, vel
etiam pulpæ cujusdam, & *dua-
bus partibus* sacchari tenuissimè
pulverisati, invicem probè com-
mixtis, & subactis, conflatum.
Cujus vires à parte sacchari dul-
ces, mucilaginosæ, demulcentes,
à parte vegetabilium verò variæ
sunt, pro diversa eorundem qua-
litate, quam ex historia Simpli-
cium nosse oportet. Usu veniunt
vario medendi scopo, ad *drach-
mam unam, duas*, per se, vel in
bolo, electuario, morfulis, &c.

CONSERVÆ FLORUM USITA-
TIORES sunt:

ANTHOS,
BELLIDIS,
BETONICÆ,
BORRAGINIS,
BUGLOSSI,
CENTAURII,
CICHORII,
FARFARÆ,

CONSERVÆ.

NAPHÆ, five
AURANTIORUM,
PAPAVERIS ERRATICI,
POEONIÆ,
PRIMULÆ VERIS,
ROSARUM PALLIDARUM,
RUBRARUM

Simplex,
Vitriolata,

SALVIÆ,
TUNICÆ,
VIOLARUM.

Pro conserva Rosarum rubrarum
vitriolata, in libram unam illius
adjicitur Spiritus Vitrioli ad
drachmas duas.

Flores abjectis calycibus minutis-
simè incisi, & comminuti, cum
sacchari albi pulverisati *duplo
pondere*, in mortario marmoreo,
pistillo ligneo, probè contundun-
tur, ac intimiùs subiguntur. Spe-
ciebus ficcioribus autem modi-
cum aquæ additur. Denique mas-
sa vase vitreo, vel porcellano ex-
cepta custoditur.

*Vires singularum, ex indole & vir-
tute specierum intelliguntur.*

Dosis drachma una, *duæ*, per se, vel
in bolo, electuario, morfulis.

CONSERVÆ FOLIORUM

ARSINTHII,
ACETOSÆ,
ACETOSELLÆ,
BECCABUNGÆ,
COCHLEARIÆ,
EUPHRASIÆ,
MAJORANÆ,
MENTHÆ.

Tenuiter concisa, & contusa folia,
cum duplo Sacchari pulverisati,
parantur eâdem ratione.

*Vires, usus, dosis, ex simplicium
facultate noscendæ sunt.*

CONSERVA CITRI è PULPA.

REC. Pulpæ Pomorum CITRI re-
centium, abjectis femi-
nibus, & albedine fungo-
sâ, ac tunicis, *qu. pl.*

Cum

Cum duplo pondere Sacchari pulverisati, subigatur in mortario marmoreo, & fiat lege artis conserva, usui servanda.

Humectat, refrigerat, refocillat; opportuno usu, in oris, linguae, palati, faucium, ardore, siccitate, siti urgente, febris ardente, &c.
Dosis drachmæ duæ per se, vel potui adjectæ.

CONSERVA MILLEPEDUM.

REC. Millepedum vivorum *uncias quatuor,*
 Sacchari albissimi *uncias decem.*

Millepedes purgati à sordibus, & Vino probè loti, cum Saccharo probè subigantur in mortario marmoreo, tunc vase vitreo, vel porcellano excepta conserva usui servetur.

Vires habet attenuandi, resolvendi, aperiendi, urinam movendi; ac proficit in obstructione lenta, in ictero, cachexia, leucophlegmatia, hydrope, asthmate, febre quartana, tussi ferina, &c.

Dosis drachma una, duæ, per se, vel cum vehiculo aquoso.

CONSERVA SPAGYRICA.

REC. Salis Absinthii *uncias duas,*
 Melissæ,
 Urticæ ana *unciam unam,*

Tartari vitriolati *unciam semis,*

Arcani duplicati *uncias duas.*

Misce fiat Pulvis, cui affundantur Spiritus Sulphuris per campanam *drachmæ duæ.*

Postquam deferbuerint, addantur Conservæ florum Rosarum rubrarum,
 Tunicæ ana *libra una,*

Olei Cinnamomi,

Corticum Citri,

Anisi ana *drachma una,*

Fœniculi,

Menthæ ana *drachma semis.*

Misce, & si completam desideres, addantur Ambræ gryseæ in Spiritu Rosarum solutæ *grana quindécim.*

A Salibus, & Spiritu acido, nec non ab Oleis destillatis, insignem habet acrimoniam, salino-aromaticam, in copia conservarum dispersam. A viribus stimulandi, roborandi, attenuandi, aperiendi, laudatur instar medicamenti polychresti, ad obstructiones viscerum lentas, cachexiam, icterum, hydropem, febres intermittentes, &c. ubi solidorum languor & inertia, humorum vero viscositas & lentor dominatur. In diatbesi opposita, & morbis ab acrimonia, vel motu aucto genitis, utique ejus usus damno foret.

Dosis drachma semis, ad drachmam unam, per se, vel in bolis, electuariis.

CORALLIA ALBA & RUBRA
 PRÆPARATA.

Teruntur super lapide Porphyrite, & cum aquæ adspersione lævigantur tam diu, donec nullum amplius inter dentes stridorem edant, dein in conulos redacta, & rursus ficcata usui servantur.

Pulvis terreus, insipidus, vi absorbente, antacidâ, vel & modicè adstringente, valet in acrimonia morboſa acida, ardore stomachi, acore primarum viarum, & torminibus infantum, aliisque morbis à simili causa genitis.

Dosis ad drachmam semis, per se cum vehiculo, vel in electuariis, mixturis, emulsionibus.

CORNU ALCIS PRÆPARATUM.

Limâ in scobem redactum, super lapide in pollinem subtilissimum teritur, & usui servatur.

Vis antepileptica vulgo ipsi tribuitur, realis, an opinata, & superstitiosa?

Dosis ad scrupulum unum, per se, vel in mixturis, &c.

CORNU CERVI PHILOSOPHICE
PRÆPARATUM.

REC. Cornu Cervi in frusta secti
qu. pl.

Coquatur in Aquæ fontanæ q. s.
donec mollescat, tunc medulla
& cortex nigricans cultro sepa-
retur, cornu verò albicans ex-
ficcatum, lege artis in pollinem
subtilissimum teratur.

*Vires ejus censentur absorbentes,
diapnoicæ, antispasmodicæ, alexi-
pharmacæ, usûs frequentis in fe-
bribus continuis, epidemicis, ma-
lignis, exanthematicis, variolis,
morbillis, &c.*

*Dosis ad scrupulum unum, duos,
per se in pulvere, vel in julapiis,
mixturis, emulsionibus.*

CORNU CERVI USTUM.

Calcinatur in frusta dissectum, aper-
to igne, ad albedinem, & tunc
instar Coralliorum præparatur.

*Virtute siccandi, absorbendi, modi-
cè adstringendi, acidum corrigen-
di, lumbricos fugandi, valet in
acrimonia acida, soda stomachi,
torminibus infantum, nausea, vo-
mitu, diarrhœa, dysenteria, lum-
bricis alvum occupantibus, &c.*

*Dosis ad scrupulum unum, duos,
per se, cum vehiculo aquoso, vel
in mixturis, emulsis, &c.*

CORNU CERVI AURATUM.

REC. Cornu Cervi usti præparati
unciam unam,

Foliorum Auri purissimi li-
bellos octo.

Misce, terantur in mortario mar-
moreo tandiu, donec aurum
dispareat; postea calcinentur in
crucibulo probè tecto, per tri-
horium, & pulvis purpurei co-
loris usui servetur.

*Vires ab Auro cordiales in corpore
humano expectare, inter somnia
Clar. author apud SCHULZIUM
merito reponit. Nec, quid alexi-
pharmaci habeat speciosum hoc cor-
nu, divinari potest. D. VOLCK-*

*MARO in arcanis, & in quibus-
vis morbis, etiam periculosissimis,
sacram quasi anchoram fuisse, per-
bibetur.*

*Dosis faciunt à scrupulo semis ad
scrupulum unum.*

CORNU RHINOCEROTIS PRÆPA-
RATUM.

Limâ in scobem redactum, lege
artis, in tenuissimum pulverem
teritur, qui per linteum subtile
trajectus, usui servatur.

*Venenis resistere, sudorem movere,
& epilepticis prodesse, creditur.*

*Dosis grana quindecim ad drach-
mam semis.*

CRANIUM HUMANUM PRÆPA-
RATUM.

Cranium hominis, violentâ morte
perempti, à membranis, & omni
immunditie liberatum, ficcatur,
& lege artis in subtilissimum pol-
linem teritur.

*Vires ipsi vulgo tribuunt specificas
antepilepticas, ejusque dosin fa-
ciunt à scrupulo semis ad scrupu-
lum unum. Sed anilem supersti-
tionem sapere hoc medicamen-
tum videtur, è foro medico uti-
que proscribendum.*

CREMOR & CRYSTALLI
TARTARI.

REC. Tartari albi, aquâ calidâ ali-
quoties à fordibus exter-
nis abluti, & pulverisati
libras duas.

Coquendo in libris viginti quatuor
Aquæ fontanæ, in vase figulino,
dissolvantur, & fervens adhuc
decoctum trajiciatur per mani-
cam Hippocratis, in aliud vas
terreum; ubi refrixerit, crystal-
los exhibet, in superficie autem
liquoris, crustam, cremoris no-
mine notam, qui ope cochlearis
ablatus, unâ cum crystallis,
aquâ fontanâ, frigidâ abluatur,
dein exficcat, super Porphy-
rite in pulverem albissimum con-
teratur.

Est

Est sal essentielle Vini, crassos & viscidos humores incidens, resolvens, album blandè stimulans, urinam ciens, appetitum excitans, febricitantibus, hypochondriacis, cachecticis, hydropicis, &c. usu tempestivo proficiuus. Purgantium vires stimulo suo auget. Difficulter, nec nisi in calido liquore solvitur.

Dosis drachma semis, vel integra; & amplius, si album movere velis; cum vehiculo aquoso calido. Aliàs pulveribus aliis, decoctis, mixturis, admiscetur.

CRETA ALBA PRÆPARATA.

Creta alba, Colonienfis, purissima, terendo, humectando, & lævigando super lapidem Porphyritem, instar Coralliorum paratur.

Vires habet siccandi, absorbendi, adstringendi, acidum debellandi; & usu venit in acrimonia morbofa, acido primarum viarum, soda stomachi. Externè adspersionem præbet, in erysipellate, impetigine, excoriatione, intertrigine commodam.

Dosis drachma semis, per se, vel cum aliis pulveribus mixta, aut in mixturis, emulsionibus.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

REC. Limaturæ ferri purissimæ uncias quatuor,

Dissolve in

Spiritus Vitrioli,

Aquæ fontanæ ana uncias octo.

Solutionem ad ficcitatem in vase ferreo evapora, & forti igne in pulverem rubicundum calcina.

Vires siccantes & adstringentes. Plurimumque usu tantum externo venit, in pulvere, vel in Emplastris & Unguentis. Rarius internè adhibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

REC. Vitrioli Martis uncias quatuor, Solvantur in

Aquæ fontanæ calidæ libra una.

Pars II.

Solutioni instilletur Salis alcali, vel Cinerum clavellatorum lixivii, aquâ fontanâ calidâ facti, & per chartam emporeticam filtrati, quantum ad saturationem acidi vitriolici, & præcipitationem satis. Pulvis præcipitatus aquâ fontanâ calidâ edulcoretur, & leniter ad rubedinem calcinetur. Liquor salinus evaporari ad cuticulam potest, qui ad crystallisationem repositus, largitur Tartarum vitriolatum.

Alia parandi ratio simplicior est, Limaturam ferri purissimam aquâ humectatam, radiis solaribus exponendo; tunc in pulverem terendo, humectando, iterumque ficcando; eumque laborem tandiu repetendo, donec pulvis perfectè croceus emergat, usui servandus.

Vires ut Chalybis præparati, roborantes, aperientes, acidum emendantes: usus commodi, in vasorum & viscerum debilitate, humorum lentore, obstructione viscerum, Chlorosi, Cachexia, Menstruorum cunctatione, vel retentione &c.

Dosis ad scrupulum unum, drachmam semis, in pulvere, bolo electuario, pilulis.

CROCUS MARTIS APERITIVUS
ANTIMONIATUS STAHLII.

REC. Clavorum ferreorum libram unam,

Antimonii libras duas.

Fluant optimè in crucibulo, quibus adde

Cinerum clavellatorum uncias quinque;

Cum omnia colliquata fluxerint, effunde in conum fusorium, & regulum à scoriis separatum serva.

Scoriæ, fusci coloris, frustillatim contusæ, sive aëri umbroso, humidâ tempestate, sive cellæ expositæ, dilabuntur in pulverem subnigrum; hunc pulverem aquâ tepidâ multâ dilutum, & probè agitatum, ita separa, ut,

O

quic-

quicquid ejus, post crassiorum particularum subsidendam, ac aliquam moram, aquæ turbidum adhuc internatat tenuissimum, cum hac effundas; crassiore parte, sedimenti instar, infundo remanente. Exit verò tenerioris hujus substantiæ oppidò parum, quæ scorsim asservanda est, & cum triplo Nitri purissimi, in crucibulo levissimè candescente, detonanda; massa inde nata rubicunda edulcoretur, atque pulvis dilutè rubens, sub titulo *CROCI MARTIS* aperitivi tenuioris fervetur. Subsidens verò illa altera portio similiter tractanda, edulcoranda, ficcanda, & cum triplo Nitri detonanda, quæ rursus edulcorata & ficcata dat *Crocum Martis aperitivum* obscurioris coloris, quàm præcedens tenuior.

Vires ut præcedentis, sed à consortio particularum antimonialium, auctiores, roborantes, aperientes, acidum corrigentes; salubri effectui in obstructionibus, in hæmorrhagia uterina, lochiorum & hæmorrhoidum profluvio, in diarrhœa, in Febribus intermittentibus, in Cachexia, aliisque morbis obstinatis, si secundum rationem indicantium tempestivè adhibeatur.

Dosis grana quinque, ad scrupulum semis, in pulvere, pilulis, bolo, &c.

CROCUS METALLORUM.

REC. Antimonii crudi in pulverem triti,
Nitri crudi purissimi & ficcissimi ana libras duas.

Probè mixta detonentur in mortario, & cum refrixerint, massa regulina, à scoriis separata, in pulverem teratur. Quæ massa

ob colorem etiam *Hepar Antimonii* vocatur.

Virtutis est emeticæ vehementis. Ex eo paratur Aqua benedicta Rulandi, seu Vinum emeticum, Tartarus emeticus, Syrupus emeticus. In substantia hominibus adhibere nefas est, propter violentiam. A Veterinariis autem ad equos purgandos, plures drachmæ exhibentur. Ejus infusum aquosum nonnulli in oculorum morbis commendant.

CROCUS SOLIS.

REC. Auri per Antimonium depurati partem unam,
Mercurii è Cinnabari revivati partes sex.

Fiat amalgama, cui probè commisceatur duplum Sulphuris triti, & sub tegula fulminatoria, rudiculâ ferreâ continuè movendo, donec omne Sulphur & Mercurius avolârit, igne sufficiente calcinetur, sic aurum in pulverem abibit rufum, subtilissimè super marmore terendum.

Bezoardicas & cordiales vires illi tribuere vulgo solent. A Cel. SCHULZIO, pretii tantum augendi gratiâ, pulveribus bezoardicis, vel aliis quibuscumque, addi posse censetur.

Dosis ad granum unum, duo.

CROCUS VENERIS.

Ex Vitriolo, vel CrySTALLIS Veneris, per calcinationem paratur, & affusâ aquâ calidâ edulcoratur. Externè ad detergendum, depurandum, exedendum, siccandum, unguentis vel emplastris admiscetur; vel etiam Aquis ophthalmicis, & Collyriis, non sine cautela & circumspeditione jungitur.

CRYSTALLUS MONTANA PRÆPARATA.

Sicuti Corallia præparatur.

Vis

Vis dubia absorbens, vel adstringens.
Vulgo tamen, in diarrhœa biliosa,
Et ad lac augendum commendari
solet.

Dosis à scrupulo uno, ad drachmam
semis, in pulvere, vel julapiis,
nixturis, emulsionibus.

DECOCTUM ALBUM.

REC. Micæ Panis albi,
 Cornu Cervi usti ana *uncias*
duas.

Mixta ebulliant cum
 Aquæ fontanæ *sufficiente*
quantitate,

Colaturæ librarum duarum addan-
 tur

Syrupi acetositis citri *un-*
ciae tres.

Misce detur ad vitrum.

Viribus temperandi, leniendi, valet
in æstu febrili, in diarrhœa, dysen-
teria, &c. pro lubitu hauriendum.

DECOCTUM AMARUM.

REC. Radicum Gentianæ,
 Cichorei ana *un-*
ciam unam,

Herbarum Cardui benedicti,
 Centaurii mino-
 ris,

Chamædryos,
 Scordii ana *mani-*
pulum unum.

Incisa & mixta ebulliant cum
 Aquæ fontanæ *quantitate suf-*
ficiente.

Colatura librarum sex detur ad
 vitrum.

Viribus roborandi, attenuandi, ape-
riendi, acidum corrigendi, conve-
nit in stomachi debilitate, cacochy-
mia acida, anorexia, lumbricis, ob-
structionibus, febribus intermitten-
tibus, malo hypochondriaco, hyste-
rico, cachexia, &c.

Dosis uncia quatuor, manè Et vespè-
rè; at in febribus intermittentibus,
sextâ quavis horâ, inter finem
unius paroxysmi Et principium al-
terius.

DECOCTUM ANTIFEBRILE.

REC. Radicum Cichorei,
 Graminis,
 Scorzonæræ,
 Taraxaci ana *un-*
ciam unam,

Passularum minorum *drach-*
mas sex,

Nitri depurati *drachmam u-*
nam.

Incisa misce, ebulliant cum
 Aquæ fontanæ q. s.

Colatura librarum quatuor detur ad
 vitrum.

Vires attenuantes, resolventes, ape-
rientes, diapnoica, diuretica, tem-
perantes. Usus in febribus acutis
Et lentis, continuis Et intermit-
tentibus, benignis Et malignis.

Dosis uncia quatuor tepidè vel cali-
dè, quolibet trihorio per diem.

DECOCTUM AVENACEUM

LOWERI, vid.

SPECIES pro DECOCTO AVENA-
 CEO.

DECOCTUM CORNU CERVI
 CITRATUM.

REC. Hordei optimi,
 Rasuræ Cornu Cervi ana *un-*
ciam unam;

Mixta ebulliant cum
 Aquæ fontanæ *quantitate*
sufficiente.

Colaturam librar. quatuor affunde
 Pomo citri recentis in taleo-
 las secti No. uni.

Cum sacchari albi *unciis duabus*
 mixta detur ad vitrum.

Sapore suavi, viribus humectandi, re-
frigerandi, leniendi, se commendat
in febribus continuis, ardentibus,
epidemicis, contagiosis, exanthema-
ticis, oris Et linguae siccitate, siti
urgente, &c.

DECOCTUM DIÆTETICUM
 SYDENHAMI.

REC. Radicis Saffaparillæ *unc. sex,*
 Glyzrrrhizæ *unciam*
unam,

Chinæ,

Ligni Sassafras ana *unc. duas.*

Coquantur in aquæ fontanæ congiis *duobus* (mensuris *sex*) per per *horæ dimidium*; deinde stent vase clauso super cineres calidos, per *horas duodecim*; postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem. Cum primum ab igne amoveatur, infunde feminis Anisi *unciam semis*. Post *duas horas* coletur, & postea per residentiam depuretur, & liquor lagenis vitreis probè clausis ad usum reponatur.

Sit pro potu ad libitum, per triginta dies, scopo prophylactico in podagricis.

DECOCTUM LIMACUM.

REC. Limacum hortensium rubrorum N^o. *sex*.

Purgatos & incisos coque in aquæ fontanæ q. f. per spatium *horæ unius*; tunc colaturæ *libræ unius* addatur tantumdem lactis vaccini, vel caprini, & sacchari albi q. f. ad gratam dulcedinem.

Viribus molliendi, lubricandi, abstergendi, demulcendi, valet in raucedine, tussi, phthysi, &c.

Quolibet trihorio hauriantur uncia sex calidè, pergendo ad multos dies.

DECOCTUM PASSULATUM.

REC. Passularum minorum mundatarum *uncias duas*,
Cremoris Tartari *drachmas duas*.

Incisa coquantur in aquæ fontanæ q. f. per minuta *quindecim*, colaturæ *librarum quatuor* addantur Sacchari albi *uncia dua*.

Misce detur ad vitrum.

Humectando, diluendo, temperando, valet in ardore, siccitate, siti, febre, &c. pro potu ad libitum hauriendo.

DECOCTUM PINI.

REC. Turionum Pini resinosorum *uncias quatuor*.

Incisi infundantur per noctem in Aquæ fontanæ q. f. postridie

manè coquantur per *horæ quadrantem*,

Colatura *librarum quatuor* detur ad usum.

Vires balsamicæ, attenuantes, aperientes, depurantes, diureticæ.

Usus in dyscrasia humorum scorbutica, in rheumatismo, arthritide, nephritide, catarrho, febre lenta, phthysi, &c.

Dosis uncia quatuor aliquoties per diem, calidè, per se, vel saccharo, aut syrupo adjecto dulcoratæ.

DECOCTUM TAMARINDORUM.

REC. Tamarindorum recentium, Passularum minorum mundatarum *ana uncias duas*.

Mixta ebulliant cum

Aquæ fontanæ q. f.

Colatura *librarum quatuor* detur ad usum.

Sapore acidulo, facultate diluente, temperante, alvum lubricante, urinam movente, confert in humorum lentore, spissitudine, fervore, acrimonia, alvi segnitie, ardore, siti, febre, &c.

Dosis ad uncias quatuor, sextâ quavis horâ, vel pro libitu, tepidè vel frigidè, adjecto, si lubet, sacchari, vel syrupi Capillorum momento.

DECOCTUM TRAUMATICUM.

REC. Herbarum Agrimonie, Bellidis, Betonicæ, Lingue cervin. Plantaginis, Veronicæ, *ana manipulum unum*.

Incisa, mixta ebulliant in Aquæ fontanæ q. f.

Colaturæ *libræ quatuor* dentur ad usum.

Vires modicè adstringentes, antisepticæ, depurantes, consolidantes, &c. Usus in contusionibus, vulneribus, ulceribus, hæmorrhagia, hæmoptysi, phthysi, profluvio hæmorrhoidum, menstruorum nimo, &c.

Do-

DECOCT. DENT.

Dosis *uncia quatuor, sextâ quâvis hora*, tepidè, per se, vel saccharo, aut syrupo dulcoratæ.

DECOCTUM ANTI-VENEREUM.

REC. Ligni Guajaci,
Corticis ejusdem,
Radici Saraparillæ *ana uncias duas*,
Chinæ electæ,
Ligni Sassafras *ana unciam unam*,
Liquiritiæ rasæ *unciam semis*.

Misce, quatuor species priores infunde per noctem in aquæ fontanæ q. f. postridie coquatur per spatium *horæ unius*, vel donec remaneant *libræ octo*, sub finem adde Glycyrrhizam cum ligno Sassafras, demum colatura detur ad usum. Residuæ species à coctione, cum aquæ fontanæ *libris duodecim* de novo ebulliant pro potu ordinario.

Vires attenuantes, resolventes, stimulant, depurantes, diaphoreticæ, &c. Usus in scabie, impetigine, psora, gonorrhœa, fluore albo, lue venerea, ulceribus sordidis, &c.

Dosis *uncie sex, ter, vel quater intra nyctemerum, calidè; pergen- do in multos dies, vel etiam hebdomadas, prout ratio indicantium suadebit. In subjectis frigidis liberalius, in calidis moderatius, interponendo alvi ductionem pro re nata.*

DENTES APRI PRÆPARATI.

In subtilissimum pollinem teruntur, & usui servantur.

Vires dubie, an diapnoicæ? Vulgo in pleuritide commendantur, & hæmorrhagiis.

Dosis *ad scrupulum unum, drachmam semis, in pulvere, mixturis, emulsionibus.*

DENS HIPPOPOTAMI PRÆPARATUS.

Ejusdem est præparationis; eademque virtus, usus, dosis.

Pars II.

DIAC. DIACYD.

57

DESTILLATUM EQUINUM,

vid.

AQUA ANIMALIS.

DIACODIUM, vid. SYRUPUS.

DIACYDONIUM SYMPLEX.

REC. Pomorum Cydoniorum *libras duodecim*.

Poma benè matura, & cum corticibus dissecta, coquantur in aquæ fontanæ *libris triginta sex*, ad medietatis consumptionem, tunc ab igne remota per diem, colentur & exprimantur; Dein colaturæ clarificatæ *libris sex*, adde Sacchari *libras duas*.

Et coquantur ad consistentiam Gelatinæ.

Palato grata, refocillans, roborans, adstringens, confert in stomacho debili, vomitu, diarrhœa, hæmorrhagia, sudoribus, &c.

Dosis *uncia semis, per se.*

DIACYDONIUM COMPOSITUM AROMATICUM.

REC. Diacydonii simplicis adhuc calentis *libram unam*,
Essentiæ Corticis Citri *saccharinæ uncias duas*,
Specierum Imperatoris *drachmas duas*.

Misce fiat Gelatina, ad usum repouenda.

Vires analepticæ, cardiacæ, stomachicæ. Usus in stomachi & virium languore, nausea, vomitu, diarrhœa, &c.

Dosis *uncia semis, per se.*

DIACYDONIUM JALAPPINUM.

REC. Resinæ Jalappæ optimæ *unciam unam*,

Teratur diligenter cum Nucleorum Pini recentium *drachmis duabus*.

Misceantur frigidè cum Diacydonii simplicis *unciis sedecim*.

Et usui servantur.

Ad æquabilem distributionem, melius est Resinam cum Nucleis

P

sub-

subactam cum Diacydonio miscere, quàm cum spiritu vini eandem solutam, Gelatinæ incorporare. Ejus drachma una continet Resinæ grana tria cum dimidio circiter.

Vires purgandi validæ à Magisterio Jalappæ; quod si cum spiritu vini solutum adhibeatur, etiam omni diligentia miscelæ, vix potest ejusdem æquabilis distributio obtineri; unde una portio gelatinæ præ alia, plus aut minus resinæ continebit. Ex quo non tam certus est dosium effectus, & aliquando hypercatharsis oriri potest. Cæterum hæc Gelatina nihil ingrati saporis habens, commodè iis adhibetur, qui alia fortè omnia purgantia respuunt. Si modò talis sit morbi, & indicantium omnium conditio, cui acrimonia Jalappæ non repugnet.

Dosis in adulto ad drachmas duas, vel tres, per se, vel in potiuncula.

DIAGRYDIUM cum LIQUIRITIA PRÆPARATUM.

REC. Scammonii Aleppensis optimi uncias sex,
Decocti Liquiritiæ libras duas semis.

Duæ uncie Liquiritiæ coquantur cum aquæ fontanæ libris tribus, ad consumptionem sextæ partis; cum hoc decocto fervente, solvatur Scammonium in mortario, sub perpetua agitatione, solutio lactea à fœcibus nigricantibus per inclinationem separetur, atque lenissimo igne, vel in M. B. ad extracti consistentiam evaporetur; residuum blando calore ficcatum, in pulverem teratur, usui fervandum.

Tali præparatione, Scammonio multum de suo odore, & sapore nauseoso demitur, absque virium dispendio. Facilius solvitur in ventriculo, & commodè alvum ducit, humores quoque valde attenuat, ac resolvit. Ideoque tempestivo usu valet, in variis morbis, à lentore

viscido, ac tenaci oriundis, cacochymia, febre intermittente, cachexia, hydropes, &c.

Dosis ad grana quinque, scrupulum semis, in pulvere, bolo, pilulis, potiunculis.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM.

REC. Scammonii electi uncias tres. In pulverem teratur, & supra chartam albam, acu perforatam, tenuiter ac æqualiter expandatur, atque supra cratem, cui carbo vivus sit subditus, in quem sulphuris uncia successivè injiciatur, suffumigetur, & ne liquefiat, vel chartæ adhæreat, aut comburatur, spatulâ ferreâ diligenter moveatur.

Inter valida purgantia resinosa, jam ab antiquo tempore valde usitatum, & in varias compositiones officinales receptum est. Sunt qui hanc cum Sulphure præparationem supervacuam esse arbitrantur, nec eâ opus esse, si modò Scammonium genuinum, purum, & selectum habeatur.

Vires, usus, dosis, ut antecedentis.

DIAPHORETICUM JOVIALE, vid.

ANTIHECTICUM POTERII.

DIAPHORETICUM MARTIALE, vid.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

EBUR PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

Eâdem ratione, sicut Cornu Cervi philosophicum paratur.

Vires, usus, dosis, ut Cornu Cervi.

EBUR USTUM ALBUM, seu SPODIUM.

REC. Eboris in tenues lamellas dissecti libram unam.

Ignis aperto ad albedinem calcinetur, tandem super marmore, cum aquæ

aquæ adspersione lævigetur, & exsiccetur.

Vires, usus, dos, quæ Cornu Cervi usti.

E C L E G M A.

Eclegma, Linctus, Looch, medicamenti interni syrupo tantillo spissioris, sat frequentis præcipue in morbis oris, faucium & pectoris usûs, formulam constituunt, ex mollioribus ingredientibus compositam, quod ore assumptum sensim deglutitur. Looch nonnulla suo loco occurrent infra. Eclegmata alia ex tempore modò præscribuntur.

E L A T E R I U M.

REC. Cucumerum agrestium, si-
ve asinorum *q. pl.*

Intra octiduum collecti, scindantur apice cultelli, circa petioli insertionem, ut matura semina è fructibus profiliant; semina reliqua & mucago super cribrum proliciantur, quæ postea in mortario, pistillo ligneo, affuso sensim liquoris tenuis, è fructibus concisis, exstillantis, & aquæ pluviae tantillo, contundantur, dum liquor pinguis & oleosus, è medulla seminis in pulpam contritus, per cribrum setaceum novum tenuissimum, transmitti possit; qui lenissimo calore evaporatus, redigatur in consistentiam massæ pilularis, & usui fervetur.

Medicamentum est hydragogum violentum, non nisi in robustioribus subjectis, cautè & circumspectè adhibendum. Usû potissimum venit in hydropicis, ad quorum curationem, ejus efficaciam Cl. LISTE-RUS prædicat.

Dosis ad grana tria, quinque, in pilulis, bolo, potiuncula, &c.

E L Æ O S A C C H A R A.

Hoc nomine venit Saccharum in pulverem tritum, & oleo quodam idoneo plus minùs imprægnatum, alterandi scopo, usui

interno destinatum. Vix autem, nisi in usum præsentem, recentia Elæosacchara parari solent.

ELÆOSACCHARUM ANISI.

REC. Sacchari candi albi *unciam unam,*

Olei destillati Anisi *guttas viginti.*

Misce, fiat Pulvis subtilis, detur ad usum.

A Saccharo vis mucilaginosâ, deter-siva, ab oleo vis acris, aromati-ca, stimulans, stomachica, carminativa. Usus in flatulentia frigida, pituitosa, catarrho pectoris mucoso, frigido, &c.

Dosis drachma una, aliquoties per diem, per se, vel cum vehiculo aquoso, calido.

Pari ratione conficiuntur alia Elæosacchara simplicia:

CARYOPHYLLORUM,
CINNAMOMI,
FOENICULI,
MACIS,
NUCIS MOSCHATÆ,
SUCCINI.

Quorum vires, & effectus, præcipue ab indole, & efficacia oleorum, æstimandi sunt, quibus saccharum pro vehiculo esse solet.

ELÆOSACCHARUM AURANTIORUM & CITRI CORTICUM.

Simili cum præcedentibus ratione, nimirum ex oleis destillatis parari potest; sed usitatius est, illud ex corticibus recentibus conficere, Saccharum scil. Canariense cortici pomorum affricando, donec oleosâ flavedinis substantiâ, satis imprægnatum videatur. Ità paratum, sapore ac odore gratius & jucundius obtinetur, quod aliàs *Essentiæ corticis saccharinæ siccæ* nomen gerit.

Vires ejus fragrantæ, aromaticæ, stomachicæ, cardiacæ, carminativæ, usûs salubris in languore stomachi-

machi, anorexia, dyspepsia, flatulentia, &c.

Dosis drachma una, per se, vel cum aliis pulveribus, infusis, decoctis, cibis.

ELÆOSACCHARUM CARDIACUM.

REC. Sacchari candi albi unciam

unam,
Olei destillati, Cinnamomi

guttas viginti,
Confectionis Alkermes com-

pletæ drachmam unam.

Misce fiat Pulvis, detur in scatula.

Vis fragrans, roborans, cardiaca, analeptica. Usus in virium de-

fectu, spirituum penuria, actionis vitalis, & animalis languore.

Dosis drachma una, per se, vel cum

aliis medicamentis mista.

ELÆOSACCHARUM CEPHALICUM.

REC. Sacchari candi albi unciam

unam,
Ambraæ gryseæ veræ scrupu-

lum unum,
Moschi optimi scrupulum se-

mis,
Olei destillati Caryophyllo-

rum,
Cinnamomi
ana guttas
decem.

Misce, fiat pulvis subtilis, detur ad scatulam.

Vires fragrantæ eximie, aromaticæ, nervinæ, roborantes, cephalicæ.

Usus in affectibus capitis frigidis, catarrhosis, vertigine, sopore, &c.

Dosis drachma una, per se, vel cum vehiculo aquoso, bis quotidie.

ELÆOSACCHARUM ERRHINUM.

REC. Sacchari albi drachmam unam,

Elaterii grana quinque,

Olei destillati Majoranæ,

Ligni Rhodii
ana guttas

duas.

Misce fiat Pulvis subtilissimus, detur in scatula.

Nares stimulando, mucum & serum potenter elicit, cum vel sine sternutatione, si quotidie semel, aut bis, grana aliquot naribus excipiantur; quod aliquando in gravedine, coryza, sopore, vertigine, barycoia, &c. locum habere potest.

ELÆOSACCHARUM SPERMATIS CETI.

REC. Spermatis Ceti recentissimi

unciæ semis,

Radici Iridis Florentinæ
drachmas duas,

Sacchari albi unciæ duas.

Misce fiat pulvis subtilissimus, detur in scatula.

Virtute molliendi, lubricandi, resolvendi, demulcendi, valet in rancidine, tussi, asthmate catarrhali, phthisi, alvi segnitie, stranguria, &c.

Dosis drachma una quovis triborio, plus minus, per se, vel cum vehiculo calido, aquoso.

ELECTUARIA.

Hoc nomine veniunt medicamenta mollia, interna, consistentiâ mellis, magis minusve spissâ, vario alterandi, vel evacuandi scopo, usitata. Quædam eorum in usum præsentem, recentia parantur, alia verò multa in officinis prostare solent. Fermentationi obnoxia in vasis minus plenis, & loco minus calido custodienda sunt.

ELECTUARIUM DE ACORO.

REC. Radici Acori vulgaris rasp.

unciæ sex,

Vini rubri libram unam.

Ebulliant in vase figulino

Colaturæ unciarum decem

adde

Sacchari albi unciæ triginta,

Radici Calami aromatici
conditæ,

Zingiberis in India conditi
ana unciæ quatuor,

Conditu-

Condituræ Corticum Auran-
tiorum,
Citriana
unciam
unam
semis,

Cardamomi minoris,
Nucis moschatae,
Piperis longi ana drachmas
tres,
Caryophyllorum aromatico-
rum drachmas quinque,
Cinnamomi acuti unciam u-
nam,
Conservæ Rosarum rubra-
rum libram unam.

Misce fiat lege artis Electuarium,
usui servandum.

Sapore haud ingrato, & virtute ro-
borante, stomachicâ, carminativâ,
commendatur in stomachi debilita-
te; virium languore, digestionem
imbecilla; præsertim in subjectis
senilibus, phlegmaticis, frigidis.

Dosis uncia dimidia, per se.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

REC. Baccarum Lauri unciam u-
nam semis,

Foliorum Rutæ,
Menthastri,
Origani,
Seminum Ammeos,
Cumini,
Nigellæ,
Ligustici,
Carvi,
Dauci,

Calami aromatici,
Piperis nigri,
longi,

Castorei ana drachmas duas,
Sagapeni unciam semis,
Opopanax drachmas tres.

Misce, diligenter trita excipiantur
Mellis despumati unciis sep-
tendecim.

Fiat lege artis Electuarium.

Vires roborantes, stomachicæ, car-
minativæ. Usus in anorexia, dy-
spepsia, cruditate, flatulentia fri-
gida, &c. præsertim in clysmatibus.

Pars II.

Dosis drachma una per se, vel cum
vehiculo aquoso. In clysteribus ad
unciam semis.

ELECTUARIUM CATHOLICUM.

REC. Radicis Polypodii querni un-
cias sex,

Ebulliant in

Aquæ fontanæ libris quatuor.

In colaturæ libris tribus

dissolvantur

Pulpæ Cassiæ recentis,

Tamarindorum ana
uncias quatuor,

Sacchari albi libras quatuor.

Omnibus leni igne, ad Mellis con-
sistentiam redactis, paulatim in-
sperge sequentes pulveres sub-
tilissimè tritos, & cribratos:

Radicum Polypodii,

Rhabbarbari veri
ana uncias duas,

Liquiritiæ drach-
mas duas,

Foliorum Sennæ orienta-
lium uncias quatuor,

Florum Violarum,

Seminis Anisi ana uncias
duas.

Diligenter miscendo fiat lege artis
Electuarium.

A Majoribus instar medicamenti pur-
gantis, velut universalis, habitum,
& in morbis omnivariis celebratum,
benignè alvum ducit, sive intro
sumptum, sive clysmatibus adje-
ctum.

Dosis uncia semis, ad integram,
per se, vel in potione. In clyste-
ribus stimuli loco additur, eâdem,
vel majore dosi.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

REC. Limaturæ Martis purissimæ,
in alcohol redactæ uncias
duas,

Specierum Imperatoris,

Rhabbarbari veri electi ana
drachmas duas,

Tartari solubilis unciam semis,

Sacchari albi clarificati, &
ad consistentiam idoneam
inspissati uncias duodecim.

Q

Misce

Misce fiat lege artis Electuarium instar opiatæ, usui servandum.

*Vires aperiendi, attenuandi, rob-
randi, stimulandi. Usus in soli-
dorum laxitate, humorum lentore,
& inertia, cachexia, chlorosi,
menstruorum defectu &c.*

*Dosis drachmæ duæ, ad unciam se-
mis, per se, vel cum vehiculo a-
quoso, aut vinoso.*

ELECTUARIUM DIACASSIÆ

cum

M A N N A.

REC. Prunorum Damascenorum
uncias duas,

Florum Violarum *drachmas
sex.*

Ebulliant cum

Aquæ Fontanæ *q. s. in co-
laturæ uncis decem,*

Solvantur

Syrupi Violarum *uncia sex,*
Sacchari albi *uncia duæ.*

ad justam consistentiam coctis ad-
dantur

Pulpæ Cassiæ recentis *uncia
sex,*

Tamarindorum *uncia
una,*

Mannæ Calabrinæ *uncia
duæ.*

Misce, fiat lege artis Electuarium,
usui servandum.

*Blando stimulo alvum subducit, &
in vario morborum casu laxandi
scopo proficuum esse potest, ubi va-
lentiora purgantia minus quadrant.*

*Dosis ad uncias duas, tres, per se, vel
in potione.*

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

REC. Radicum Satyrii recentium
uncias quatuor.

Minutim incisis & contusis in mor-
tario lapideo, adde

Sacchari albi, ad consisten-
tiam tabulati cocti *uncias
duodecim,*

Nucis Indicæ conditæ,

Zingiberis conditi,

Pinearum recentium,

Pistaciorum recentium *ana
unciam unam,*

Caryophyllorum aromatico-
rum,

Cinnamomi acuti,

Stincorum marinorum *ana
unciam semis,*

Brodii Zingiberis conditi
q. s.

Misce fiat lege artis Electuarium,
usui servandum.

*Pro analeptico, & aphrodisiaco ha-
betur.*

Dosis uncia semis, per se.

ELECTUARIUM DIASCORDII FRACASTORII.

REC. Radicum Bistortæ,

Gentianæ,

Tormentillæ,

Herbarum Dictamni Cretici
ana unciam semis,

Scordii *unciam u-
nam,*

Seminis Acetosæ *drachmam
unam semis,*

Cinnamomi acuti,

Cassiae lignae verae,

Gummi Arabici,

Galbani,

Styracis *ana unciam semis,*

Piperis longi,

Zingiberis *ana drachmas duas,*

Opii Thebaici *drachmam u-
nam semis,*

Boli Armenae *unciam unam
semis,*

Terrae Lemniae *unciam se-
mis,*

Conservae Rosarum rubra-
rum *libram unam,*

Mellis despumati *libras duas
semis,*

Vini Canariensis *q. s.*

Opium, Gummi Arabicum, & Gal-
banum, in Vino solvantur, &
optimè cum melle misceantur;
postea reliqua in pollinem sub-
tilem trita adjiciantur; tandem
Conserva Rosarum addatur, &
omnia probè agitando, in Ele-
ctuarium redigantur.

*Medicamentum nobile alexipharma-
cum,*

cum, viribus roborandi, adstringendi, sudorem ciendi, dolores leniendi, venena debellandi, &c. celebratum. Usu tempestivo, in morbis epidemicis, contagiosis, malignis, febribus exanthematicis, singultu, vomitu, diarrhœa, dysenteria, torminibus infantum, &c. proficuum. Ejus semuncia circiter unum Opii granum complectitur.

Dosis ad drachmam unam, duas; in clysmatibus ad drachmas plures.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE.

REC. Roob Sambuci,
Corticis Peruviani electi *ana unciam unam,*
Salis polychrecti *drachmas duas,*
Extracti Centaurii minoris,
Chamomillæ,
Caryophyllorum aromaticorum *ana drachmam semis,*
Syrupi acetositis Citri q. f.
Misce fiat Electuarium, detur ad fictile.

Viribus attenuantibus, roborantibus, diapnoicis, specificis, tempestivo usu medetur febribus intermittentibus, quotidianis, tertianis, quartanis, &c.

Dosis drachmæ duæ, quolibet trihorio extra paroxysmum, cum vehiculo aquoso; sive bis, ter, quater, inter finem unius, & principium alterius paroxysmi sequentis.

ELECTUARIUM GINGIVALE.

REC. Lapidum Pumicis,
Cancrorum præparatorum,
Cremoris Tartari *ana drachmam unam,*
Aluminis usti *grana duodecim,*
Coralliorum rubrorum præparatorum *drachmam semis,*
Myrrhæ electæ *grana quindecim,*
Radici Iridis Florentinae *scrupulum unum,*
Coccionellæ *scrupulum semis,*

Salis Tartari *grana sex,*
Olei Caryophyllorum *guttas duas,*

Mellis Rosarum q. f.

Misce fiat Electuarium.

Gingivis, & Dentibus firmandis, mundandis, item ad cariem arcendam, & scorbutum oris sanandum, adhiberi solet: nimirum Gingivas & dentes mane, & vespere blandè fricando, at postea os aquâ eluendo.

ELECTUARIUM HIERA PICRA SIMPLEX.

REC. Aloës Socotrinae *uncias duodecim,*

Asari,
Cinnamomi,
Croci,
Mastiches,
Spicæ Indicæ,
Xylobalsami,

aut ejus loco

Ligni Aloës *ana drachmas sex,*

Mellis Despumati *libras quatuor semis.*

Misceantur pulveres cum melle fere subfrigefcente, & fiat lege artis Electuarium.

Ab Aloë, & Asaro, vires habet valide purgantes, cum insigni & nauseosa amaritie. Usu venit in variis morbis chronicis & contumacibus.

Dosis ad drachmam unam, vel duas, per se, vel in bolo, vel in potinacula. Frequentius autem in Clysteribus adhibetur ad unciam semis, & ultra.

ELECTUARIUM ANTI-HYDROPICUM.

REC. Roob Ebuli,
Sambuci,
Cynosbatos, *ana unciam semis,*
Arcani duplicati, *drachmas duas,*
Radici Scillæ præparatae,
Millepedum præparatorum, *ana drachmam unam,*

Q 2

Syrupi

Syrupi de Spina Cerv. q. f.
Misce fiat Electuarium, detur ad
fiatile.

*Viribus attenuandi, resolvendi, ape-
riendi, urinam movendi, usu tem-
pestivo proficit in cachexia, ana-
sarca, hydropse, asthmate, &c.*

*Dosis drachma una, duæ, per se,
vel cum vehiculo aquoso, manè ac
vesperè.*

ELECTUARIUM LENITIVUM
FLORENZOLÆ obsolevit.

ELECTUARIUM de MANNA.

REC. Mannae Calabrinæ electae,
Sacchari albi, ana uncias duas.

Solvantur in

Aquæ Florum Acaciarum,
Rosarum ana
uncia una.

deinde per linteum colatis addantur

Radicis Iridis Florentinae in
tenuissimum pulverem
tritæ, drachma una,

Olei Amygdalarum dulcium
uncia una.

Misce, fiat Electuarium, usui ser-
vandum.

*Alvum molliter lubricando, & sti-
mulando laxat, ac præsertim in-
fantibus tenellis recens natis, ad me-
conium expurgandum, tormina le-
nienda, singultum & vomitum
debellandum adhibetur. Aliàs quo-
que ad alvi segnitiam, raucedinem,
tussim, usu venire potest.*

Dosis drachma una, pluresve.

ELECTUARIUM MITHRIDATIUM
DAMOCRATIS.

REC. Radicum Aristolochiae ro-
tundae verae,

Phu pontici ana
uncias quatuor
semis,

Calami aromatici
uncias quinque,
drachmas tres,

Gentianae uncias
septem semis,

Meu athamantici
uncias tres &
drachmas sex,

Zingiberis albi
uncias quindecim,

Herbarum Dictamni Cretici
uncias septem
semis,

Polii montani,
Scordii Cretici
ana uncias de-
cem semis,

Foliorum Indorum uncias
duodecim,

Florum Hyperici uncias tres
semis,

Stoechadis Arabicæ
uncias duodecim,

Rosarum rubra-
rum,

Spicae Celticae ana uncias
septem semis,

Nardi Indicæ uncias
quindecim,

Schœnanthi uncias tredecim,

Seminum Thlaspios uncias
quindecim,

Seseleos uncias
duodecim,

Dauci Cretici un-
cias decem semis,

Petroselinii Mace-
donici,

Fœniculi ana un-
cias septem semis,

Anisi uncias qua-
tuor semis,

Baccarum Juniperi unciam
unam,

Piperis longi uncias duode-
cim,

albi,

Carpobalsami ana uncias de-
cem semis,

Cardamomi minoris uncias
septem semis,

Croci optimi uncias quindecim,

Cinnamomi uncias quindecim
semis,

Costi veri uncias duodecim,

Cassiae lignæ uncias decem
semis,

Agarici trochiscati uncias
quindecim,

Casto-

Castorei *uncias duodecim*,
 Stincorum marinorum *un-*
cias tres semis,
 Myrrhæ electæ *uncias sede-*
cim,

Olibani *uncias quindecim*,
 Bdelli *uncias decem semis*,
 Gummir Aabici *uncias septem*
semis,

Radices, herbæ, & femina, leni ca-
 lore ficcata, cum aromatibus &
 reliquis mixta, in subtilissimum
 pulverem rediguntur, & per cri-
 brum trajecta, seorsim servantur;
 his peractis

REC. Gummi Galbani,
 Opopanacis *ana un-*
 cias duodecim,
 Sagapeni *uncias qua-*
 tuor semis,
 Succi Hypocistidis *uncias*
 duodecim,
 Acaciæ *uncias qua-*
 tuor,
 Opii electi *uncias septem se-*
 mis.

Solvantur in
 Vini generosi *libris octo*,
 soluta commisceantur cum
 Mellis despumati *libris cen-*
 tum & sedecim,
 & successivè, inter perpetuam a-
 gitationem, pulvis reliquorum
 inspergatur, tandem,
 Styracis in granis *unciis duo-*
 decim, in
 Terebinthinæ claræ *unciis*
 quatuor decim,

liquatis, addantur
 Opobalsami *uncie duodecim*,
 atque agitatio, ad perfectam in-
 gredientium mixtionem; per
 aliquot horas continuetur. De-
 nique in vase satis magno, ut
 fermentare & commodè sin-
 gulis octiduis, spatulâ magnâ
 lignæ, agitari, ac commoveri
 queant, reponantur.

Medicamentum est antiquissimæ fa-
mæ, pro insigni Antidoto, & ve-
lut universali auxilio celebratum.
Cujus vires sunt roborantes, adstrin-
gentes, anodynæ, cardiacæ, alexi-
Pars II.

pharmacæ, anthelminticæ, sudori-
feræ, &c. Ejus qualibet semun-
cia habet opii granum unum, &
croci grana duo.

Usu venit, in virium languore, ani-
 mi metu, & terrore stomachi &
 viscerum debilitate, nausea, vom-
 itu, diarrhœa, dysenteria, lumbric-
 is, doloribus variis, affectu hyste-
 rico, frigore febrili, morbis epi-
 demicis, contagiosis, pestilentialibus,
 veneno accepto, ictu, vel morsu ab
 animalibus venenatis, rabiosis, &c.
 Sed compositio, multis valde acri-
 bus, aromaticis, & calefacienti-
 bus abundans, in temperie calida,
 & morbis calidæ indolis, minùs
 convenire videtur. Quocirca, ne
 intempestivo usu noceat, secundum
 leges methodi medendi, cautè &
 prudenter consulendum est. Con-
 fert animadversio nostra in ele-
 ctuarium Theriacæ Andromachi,
 paulo inferiùs scripta.

Dosis ad drachmam semis, vel in-
 tegram, per se, vel cum vehicu-
 lo aquæ, vel oxycrati, vel in bo-
 lo, electuario, potione, &c. Quo
 minùs calefaciat, cum aceti vehi-
 culo propinare juvat.

ELECTUARIUM PECTORALE.

REC. Radicis Althææ,
 Iridis Florentinæ,
 Liquiritiæ,
 Gummi Arabici, *ana drach-*
 nam unam,
 Spermatidis Ceti recentis *un-*
 ciam semis,
 Olei Amygdalarum dulcium
 recentis *uncias duas*,
 Syrupi Capillorum veneris
 q. f.

Misce, fiat Electuarium, detur ad
 fictile.

Molliendo, lubricando, demulcendo,
 abstergendo, scretum promovendo,
 confert in tussi, catarrho pectoris,
 phthisi, &c.

Dosis drachmæ duæ, pluresve, quo-
 libet trihorio.

ELECTUARIUM PHILONIUM
ROMANUM,

&

ELECTUARIUM REQUIES
NICOLAI.Ceu compositiones obsoletas con-
sultò prætermittere lubet.

ELECTUARIUM RESUMPTIVUM.

REC. Radicum Liquiritiæ,
Herbae Hederae terrestres,
Veronicae *ana un-*
ciam semis,

Infundantur in

Aquæ fontanæ ferventis li-
*ris quinque,*Macerentur per noctem, manè co-
lentur, in colatura coquanturRadicum Farfaræ recentium
minutim incisarum,
Passularum minorum *ana*
*unciae sedecim,*usque quò mollescant; contundan-
tur in mortario marmoreo, atque
per cribrum trajiciantur. Mag-
mati vel pulpæ addanturSacchari albi *unciae triginta*
*duæ,*Coquantur leni igne ad justam con-
sistentiam, refrigeratis admisce-
anturAmygdalarum dulcium mi-
nutim incisarum *unciae*
*septem,*Flavedo Citri à tribus pomis
recentibus derafa,Cinnamomi acuti *uncia se-*
*mis,*Caryophyllorum aromatico-
rum *drachmæ tres.*Misce, fiat Electuarium, usui ser-
vandum.*Abstergerendo, lubricando, molliendo,*
demulcendo, se commendat hæcticis,
tabidis, tussi acri, siccâ, &c. la-
*borantibus.**Dosis ad unciam semis, vel integ-*
*ram, bis vel ter per diem sumenda.*ELECTUARIUM TAMARINDO-
RUM.*REC.* Pulpæ Tamarindorum *un-*
*cias quatuor,*Pulpæ Passularum mino-
rum,Prunorum *ana un-*
ciam unam semis.

Misceantur, postea adde

Foliorum Sennæ electæ pul-
verisatorum *unciam unam*
*semis,*Cremoris Tartari *drachmas*
*sex,*Cinnamomi acuti,
Seminis Foeniculi *ana drach-*
*mas duas,*Olei Nucistæ destillati *gut-*
tas decem.

Misce, fiat additâ

Syrupi rosati solutivi *quantiti-*
tate sufficiente

Electuarium.

Blandè alvum ducit, ac humores seu
biliosos, seu alios morbosos, commo-
dè subducit, in cacochylia, caco-
*chymia, febris, &c.**Dosis uncia semis, ad unciam in-*
tegram, per se, vel cum vehicu-
*lo aquoso calido.*ELECTUARIUM THERIACÆ AN-
DROMACHI.*REC.* Radicum Dictamni albi, si-
ve Fraxinellæ,
Scillæ præparatæ
ana libras duas,
Iridis Florentinæ
libram unam,
Pentaphylli *un-*
cias sex,
Calami aromati-
ci,Phu pontici *ana*
*uncias quinque,*Rhabarbari veri,
Zingiberis albi*ana uncias sex,*
Angelicae,Gentianæ *ana un-*
*cias quatuor,*Aristolochiæ lon-
gæ veræ *uncias*
*duas,*Asari *drachmas*
quinque, scrupu-
lum unum,

Her

- Herbarum Scordii Cretici *libram unam,*
 Dictamni Cretici *uncias sex,*
 Chamædryos *uncias quatuor,*
 Marrubii albi,
 Calaminthæ montanæ *ana uncias sex,*
 Polii Cretici,
 Chamæpytyos *ana uncias quatuor,*
 Centaurii minoris *uncias duas,*
 Majoranæ,
 Mari veri *ana unciam semis, scrupulos quatuor,*
 Foliorum Indorum *uncias quinque,*
 Floorum Rosarum rubrarum *libram unam,*
 Stœchadis Arabicæ *uncias sex,*
 Hyperici *uncias quatuor,*
 Seminum Napi *libram unam,*
 Amomi racemosi *uncias octo,*
 Petroselinii Macedonici *uncias sex,*
 Anisi,
 Fœniculi Cretici,
 Ammios,
 Seseleos,
 Thlaspios *ana uncias quatuor,*
 Dauci Cretici *uncias duas,*
 Schoënanthi *uncias septem,*
 Spicæ, vel Nardi Indicæ *uncias octo,*
 Celticæ *uncias quatuor,*
 Piperis longi *libras duas,*
 albi,
 nigri *ana uncias sex,*
- Cardamomi minoris,
 Carpobalsami, vel Cubebarum *ana uncias quatuor,*
 Cinnamomi acuti *uncias octo,*
 Costi aromatici *uncias septem,*
 Ligni Aloës five Xylobalsami *unciam unam,*
 Asphalati *drachmas quinque, scrupulum unum,*
 Agarici trochiscati *libram unam,*
 Myrrhæ electæ *uncias octo,*
 Olibani electi *uncias sex,*
 Mastiches *scrupulos octo,*
 Gummi Arabici *uncias quatuor,*
 Bituminis Judaici, vel Asphalti *uncias duas,*
 Terræ Lemniæ *uncias quatuor,*
 Castorei *uncias duas,*
 Viperarum Italicarum *libras duas,*
- Eligantur simplicia præscripta optimæ notæ, quæ herbis, floribus, radicibus, & aliis ficcationis indigis, leni calore ficcatis admisceantur, & simul in pulverem subtilissimum redacta, seorsim ferventur.
- Squinanthum & Spica Indica, minutim incisa, cum Gummi Arabico, in aqua soluto, probè pinfentur, & leni calore rursus efficcata in pulverem redacta, reliquis addantur.
- Flores Rosarum seorsim terantur & cum Chalcitidis, vel Vitrioli martis ad albedinem calcinati, *unciis quatuor,*
 Croci Austriaci, optimè triti *unciis octo,*
 Vino diluantur; sequentia verò in Vini Malvatici *sufficiente quantitate* solvantur
 Opii Thebaici *libræ dua,*
 Succu Liquiritiæ *libra una,*
 Hypocistidis,
 Acaciæ,
 Sagapeni *ana uncia quatuor,*
 Galbani *uncia dua.*
- R 2 Solu-

Soluta & colata commisceantur cum Mellis optimè despumati triplo, vel libris centum sedecim; addantur Crocus, Chalcitis, & flores Rosarum vino diluta, agitentur diligenter, semper de pulvere priori inspergendo per cribrum. Tandem

Styracis in granis unciæ quatuor, in

Terebinthinæ claræ uncis sex, Solutæ &

Opobalsami veri, vel in ejus defectu

Olei Nucistæ expressi unciæ tredecim

adjiciantur, & per horæ unius spatium, ut exactissimè misceantur, agitentur, atque in vase capaciore, ut fermentare, & aliquoties per mensem moveri queant, reponantur.

Antidotum vetustissimæ compositionis & pro auxilio panchresto, insigni, præsertim adversus venena, mirificis elogiis communi velut consensu celebratum. At verò tam ingens simplicium farrago, tam liberaliter consarcinata, tanta virium & qualitatis discrepantia, imò plurium repugnantia, nec non tam obscura proportionis ratio, quid aliud præ se ferre videtur, quàm confusum Chaos? in quo calida cum frigidis, humida cum siccis, acria cum blandis, acida cum dulcibus, amara cum insipidis, stimulantia cum sopientibus, attenuantia cum iussifsantibus, mollientia cum adstringentibus, alterantia cum evacuantibus &c. invicem pugnant; adeò quidem, ut à priori nonnisi confusa de ejus virtute idea concipiatur. Sed nonne venerabilis est Antiquitas? atque tot Heroum Medicinæ Authoritas? tantusque experientiæ consensus? Ergo in almæ veritatis sinu quæstionem reponere fas sit. Num ex tam diversa ingredientium congerie, fermentationis intercedentis efficacità, novum concretum emergere videtur? cujus proprietates & virés, nonnisi à posteriori, experimentorum fide co-

gnoscenda & æstimanda veniant. Ipso autem ejus usu se prodit facultas stimulandi, calefaciendi, roborandi, adstringendi, dolores sopiendi, sudorem movendi, vermes fugandi, venenum coercendi. Quæ quidem facultas, vel salutaris & proficua, vel noxia & damnosa accidit, prout ex prudenti indicantium consilio opportunè, vel sine methodo temerè & intempestivè adhibetur. Legitimè datum medetur virium debilitati, formidini & terrori, actionis vitalis & animalis inertia, lipothymia, oscitationi, frigori & horrore febrili, languori hysterico, cardialgia & colicæ flatulentæ, frigida, singultui, diarrhœa, dysenteria, hypercatharsi, lumbricis alvum occupantibus, veneno corrosivo propinato, læsioni vel morsui ab animalibus venenatis, aut rabiosis; nec non morbis quibusdam epidemicis, malignis, contagiosis, pestilentialibus &c. In temperie calida, biliosa, sanguinea, in plethora, in febre continua, acuta, ardente, inflammatoria, alvi segnitie, hæmorrhoidum, menstruorum, aut lochiorum fluxu instante, vel præsentem magis nocumento, quàm auxilio esse solet.

ELECTUARIUM TETRAPHARMACUM

sive

THERIACA PAUPERUM.

REC. Pulveris Rad. Aristolochiæ rotundæ, Helenii,

Myrrhæ,

Roob Juniperi ana unc. tres.

Misce & additâ

Syrupi Corticum Aurantiorum sufficiente quantitate

Fiat Electuarium.

Stomachicum est, antisepticum, bezoardicum, post morbos acutos ad restaurandas digestionis officinas proficuum.

Dosis scrupuli duo ad drachmas duas bis quotidie.

ELIXIR.

ELIXIR.

Hoc nomine venit Medicamentum liquidum spirituosum, interno usui dicatum, & uno vel pluribus simplicibus, cum spiritu Vini, vel Vino generoso, nunc solâ infusione, nunc etiam destillatione parandum, essentiâ vulgo dilutius, vario medendi scopo, idoneum.

ELIXIR ACIDUM DIPPELII.

REC. Olei Vitrioli optimi *unciam semis*,
Spiritus Vini alcoholisati *uncias quatuor*,
Granorum Kermes,
Coccionellæ *ana grana quinque*.

Spiritus indatur phialæ vitreæ, fati amplæ, epistomio vitreo benè munitæ, cui sensim instilletur olei modica portio, mox iterum claudendo vasculum, sicque per vices interposito semper spatio, omne oleum ingeratur; deinde reponatur per aliquod tempus, ad plures scilicet dies, donec aliqua odoris fragrantia se prodatur. Demum separatus liquor vitro accuratè obturato, usui fervetur.

Aliis quoque Elixirium antipodagricum, antinephriticum, polychrestum, val etiam sedativum Archæi appellatur. Virtutes ipsi eximias Auctor tribuit, in febribus putridis, malignis, ardentibus, in diarrhæa, dysenteria, scorbuto, morbis arthriticis, calculosis, &c. Etiam inter topica vulneraria laudatur.

Dosis ad guttas viginti cum vehiculo aquoso ad uncias duas.

ELIXIR ANTIFEBRILE.

REC. Radicum Gentianæ rubrae *unciam unam*,
Serpentariae Virginianae,

Pars II.

Herbarum Cardui benedicti,
Centaurei minoris,
Trifolii fibrini,
Absinthii Pontici
ana drachmas tres,
Corticis Peruviani *unciam unam semis*,
Cascarillae,
Winterani *ana unciam semis*,
Florum Salis Ammoniaci
martialium *drachmas sex*.

Incisa infunde in
Spiritus Vini rectificati *libris duabus*;

post digestionem per *quatuor dies*, exprimantur, & Elixir per chartam filtratum usui fervetur.

In declinatione febrium intermittentium, ad tonum restaurandum, & appetitum excitandum, inservit.

Dosis à drachma semis, ad scrupulos duos, cum vehiculo aquoso.

ELIXIR APERITIVUM
CLAUDERI.

REC. Salis Tartari vel
Cinerum clavellatorum depuratorum *unciam unam*;

Solvantur in

Aquae Florum Sambuci,
Cochleariae,
Nasturtii *ana uncias quinque*;

Solutio filtretur, & affundatur

Aloës,
Myrrhae *ana uncia uni*,
Crocii *uncia semis*.

Per triduum digerantur, filtrentur, & ad usum fervetur Elixir.

Amarum, balsamicum, stimulat, roborat, attenuat, aperit, alvum solvit; ac tempestivo usu medetur anorexiæ, dyspepsiæ, flatulentie, cruditati acidæ, pituitosæ, lumbricis, menstruorum defectui, chlorosi, cachexiæ, segnitiei alvinæ, &c. Sed in temperie calida, cholericæ, sanguineæ, diatbesi hæmorrhoidali, propensione ad hæmorrhagiam, hæmoptysin, proflu-
S *vium*

*vium menstruorum; item in com-
motione febrili, &c. abstinere,
prudencia jubet.*

*Dosis guttæ triginta, quadraginta
cum vehiculo aquoso, manè ac ve-
sperè.*

ELIXIR CORDIALE & STOMA-
CHICUM vulgò GARRUS.

Pharmacop. Parisiens.

*REC. Aloës Succotrinæ uncias duas
semis,
Myrrhæ unciam semis,
Crocì orientalis drachmas
duas,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ ana scrupu-
lum unum.*

Pulverifatis affunde

*Spiritûs Vini rectificati libras
duas,*

Aquæ fontanæ uncias duas.

*Digerantur per viginti quatuor ho-
ras, postea ex maris balneo ad
siccatatem destillantur.*

*REC. Spiritûs hujus prolecti,
Syrupi Capillorum Veneris
ana libram unam,
Aquæ Naphæ unciam unam.*

Misceantur.

*Vires sunt cardiacæ, stomachicæ, &
carminativæ, præsertim verò, in
colica, à menstruo fluxu mulierum
non rite succedente orta, commen-
dari potest.*

Dosis cochlear unum, vel duo.

ELIXIR MYRRHÆ LONDI-
NENSE.

*REC. Extracti Sabinæ unciam u-
nam.*

Dissolvatur in

*Essentiæ Myrrhæ libra una,
Castorei libra semis.*

*Misce post sufficientem digestio-
nem Elixir filtretur.*

*Instar Elixiris uterini Crollii, ad
mensum, utrique vitia commen-
datur.*

*Dosis à guttis quadraginta ad quin-
quaginta.*

ELIXIR PECTORALE BALSAMI-
CUM EDINBURGENSE.

*REC. Balsami Tolutani,
Benzoës electæ,
Styracis calamitæ,
Myrrhæ electæ ana drachmas
tres,
Crocì optimi drachmas duas,
Spiritûs Vini rectificati un-
cias viginti.*

*Digerantur, atque post sufficien-
tem extractionem filtrentur.*

*Verè balsamicum est hoc Elixir, &
tam ad internos, quàm externos
usus commendabile.*

*Dosis guttæ triginta ad quadragin-
ta usque.*

ELIXIR PECTORALE REGIS
DANIÆ.

*REC. Radicis Angelicæ uncias tres,
Levistici unciam se-
mis,*

*Florum Chamomillæ Roma-
næ unciam semis,*

*Seminis Anisi uncias octo,
Fœniculi uncias quin-
que,*

*Macis drachmas tres,
Nucum Moschatarum,
Myrrhæ electæ ana unciam
unam,*

*Cinerum clavellatorum un-
cias octodecim;*

*Incisis & contusis affundantur, in
cucurbita vitrea,*

*Spiritûs vini rectificati libræ
quatuor,*

Aquæ Fœniculi libra una;

*Stent in digestionem per triduum,
tunc adde:*

*Salis Ammoniacci pulverifati
libram unam;*

*Destillantur, juncturis vitri probè
clausis, lento igne, ad residuum
libræ unius, liquor prolectus vo-
latis superfundatur*

*Succi Liquiritiæ Hispanicæ
unciis quinque,*

*Crocì orientalis drachmis dua-
bus.*

Dige-

Digerantur per aliquot dies, postea Elixir, per chartam filtratum fervetur.

Est Spiritus Vini, sale volatili, & oleis vegetabilium imprægnatus, succo Liquiritiæ edulcoratus, & multum convenit cum spiritu Salis Ammoniaci anisato, & liquore oleoso Sylvii, tonum pulmonum roborando, & decubitus humorum tenacium dissipando. Excellens etiam est remedium carminativum, atque ad colicos dolores mitigandos, ventriculum roborandum, & urinam pellendam, commendabile. Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta, cum vehiculo aquoso.

ELIXIR PECTORALE WEDELII.

REC. Radicum Enulæ,
Iridis Florentinæ,
Scillæ præparatæ
ana unciam unam,
Liquiritiæ unciam
semis,
Herbæ Rorellæ unciam unam
semis,
Ligni Santali rubri unciam
unam,
Seminis Anisi unciam semis,
Benzoes drachmas sex,
Myrrhæ unciam semis,
Gummi Ammoniaci uncias
duas,
Crocii optimi drachmas tres,
Spiritus vini rectificati libras
duas,

Gummata seorsim, & reliquæ species comminutæ seorsim affuso spiritu digerantur, & post sufficientem extractionem, filtrentur, & exprimantur, demum ambæ extractiones commixtæ usui ferventur.

Vires balsamicæ, roborantes, attenuantes, aperientes, diuretici, à scilla potentiores, &c. Usus in catarrhis frigidis, raucedine, tussi, asthmate, gravedine, coryza, vertigine, diathesi hydropica, &c. Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta cum vehiculo aquoso.

ELIXIR POLYCHRESTUM
HALLENSE.

REC. Extracti Panchymagogi unciam unam,
Spiritus Vini rectificati uncias sex,
Vitrioli drachmas tres,

Misce, digerantur, & usui ferventur.

Vis cathartica valida, ab extracto, cujus ingredientia sunt valde acris. Ejus drachma habet ultra septem grana extracti.

Ad alvum moderatè stimulandam datur ad guttas triginta vel quadraginta, ad eandem valentiùs movendam, à guttis sexaginta ad centum.

ELIXIR PROPHYLACTICUM
AMARUM.

REC. Radicum Angelicæ,
Calami Aromatici,
Cichorei,
Gentianæ,
Herbarum Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Salviæ,
Scordii,
Rhabarbari veri electi ana drachmas duas,
Aloës depuratæ unciam unam,
Myrrhæ electæ unciam semis,
Crocii optimi,
Corticis Aurantiorum ana drachmam unam,
Salis Tartari drachmas duas,
Spiritus Vini rectificati libras quatuor,

Misce incisa & contusa digerantur cum spiritu vini optimo, per dies octo; tunc colatura usui fervetur.

Virtute stimulante, roborante, stomachicâ, attenuante, aperiente, anthelminticâ, laxativâ, alexipharmacâ, scopo seu prophylactico, seu therapeutico, conferre potest adversus quosdam morbos epidemicos, ad animi metum & terrorem, virum

rium penuriam, stomachi languorem, nauseam, dyspepsiam, cruditatem, cardialgiam & colicam frigidam, flatulentiam, affectionem hysterica, lumbricos, frigus & horrorem febrilem, alvi constipationem &c. si modo temperici conditio, & indicantium ratio bene intellecta, non repugnent; in quo, nequis vel sibi, vel alteri, usu remedium intempestivo noxam contrahât, & rationis, & experientiae dictamen, omni studio & curâ observandum est.

ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM HELMONTII.

REC. Aloës Socotrinæ lucidæ,
Myrrhæ electæ,
Croci optimi ana unciam unam.

Misce in pulverem trita indantur cucurbitæ vitreæ, quæ alembico coeco munita, ad digestionem in maris balneo reponantur; augeatur ignis per gradus, ut aqua ebulliat, & materia in massam coalescat, atque guttulæ flavæ, ad latera cucurbitæ, in conspectum veniant. Frigescant, & massæ affundatur

Aquæ Cinnamomi spirituosæ libra una.

Post digestionem è balneo destillantur, & liquor prodiens, sub nomine ELIXIRII albi, fervetur.

Vires sunt balsamicæ, stomachicæ, cardiacæ, carminativæ.

Dosis drachma una vel duae cum vehiculo aquoso.

ELIXIR PROPRIETATIS DULCE, vel Sine ACIDO.

REC. Myrrhæ electæ uncias duas.
Trita irroretur

Olei Tartari per deliquium unciâ unâ.

Fiat pasta mollis, & leni igne factâ evaporatione humiditatis, adde
Aloës Socotrinæ uncias duas,
Croci optimi unciam semis,

Cum

Spiritûs vini rectificati libris duabus semis.

Misce digerendo in maris balneo vase accuratè clauso, per dies quatuor, interdum vas agitando, fiat lege artis Elixir, & filtratum usui fervetur.

Vires balsamicæ, stimulant, roborantes, calefacientes, stomachicæ, album solventes, emmenagogæ, &c. Usus in stomacho debili, anorexia, cruditate acida, chlorosi, cachexia, menstruorum retentione, &c. Sed in temperie calida, diathesi plethorica, hæmorrhoidali, febrili inflammatoria, &c. nimis stimulando, & calefaciendo, nocumento foret.

Dosis ad guttas quadraginta, quinquaginta cum vehiculo aquoso.

ELIXIR PROPRIETATIS Sine ACIDO BOERHAAVII.

REC. Aloës optimæ,
Myrrhæ electæ,
Croci optimi, ana unciam unam.

Misce, tritis, in cucurbita vitrea affundatur liquor, ex

Tartari tartarifati unciis tribus in

Aquæ fontanae unciis sex soluti, paratus, digerantur per triduum in balneo, & speciebus integrè solutis, superfundantur

Spiritûs vini rectificatissimi libræ duæ.

Denuo digerantur, eo calore, ut ad finem ebulliant. Frigescant; & postquam per quietem spissum subsederit, clarum effundatur, novâque Spiritûs vini librâ unâ superfusâ, digestio continuetur. Separetur dehinc clarum, & repetatur, donec omnia ferè soluta sint. Omnes liquores filtrentur per chartam bibulam, & spiritus superflui eò usque per destillationem evocentur, donec uncia viginti restent, quæ ferventur pro elixirio.

Nec

Nec alcalino, nec acido, sed mediæ indolis menstruo salino, paratum hoc elixir, eo nomine ab aliis discrepat; virtutis eximie, balsamicæ, roborantis, resolventis, aperientis stomachicæ, antisepticæ, alvum solventis, emmenagogæ, &c. usu tempestivo proficuum, in stomachi, & viscerum debilitate, humorum lentore & viscositate frigida, anorexia, dyspepsia, cacochylia, alvi obstructione, menstruorum cunctatione, obstructionibus lentis, &c. Sed minus convenit, ubi solida sunt irritata, & motus vitalis concitatus.

ELIXIR PROPRIETATIS

cum

ACIDO BOERHAAVII.

REC. Myrrhæ electæ,
Aloës socotrinæ,
Crocī optimi ana *unciam unam.*

Tritis affunde

Aceti vini albi *libras quatuor.*

Immissa cucurbitæ vitreæ, ebulliant lenissimo igne, per aliquot horas. Frigefacta requiescant, ut fæces subsideant. Liquorem clarum per inclinationem à facibus effunde, residuo adde

Aceti novi *libras duas.*

Ebulliant iterum, ut prius; frigescant, subsideant; effundatur clarum, & cum priore extractione, per telam raram coletur. Tincturas mistas leni igne, ex cucurbita vitrea destilla, ad remanentiam *unciarum decem*, quibus adde

Spiritūs vini rectificatissimi *uncias decem.*

Digerantur, filtrentur, & serventur.

Elixir est insigne, acidum, aromaticum, balsamicum, stomachicum, attenuans, resolvens, antisepticum, anthelminticum, polychrestum. Usus opportunus, in stomacho laborante, anorexia, cacochylia, lumbricis, cachexia, chlorosi, ictero, malo hypochondriaco, hysterico, fe-

Pars II.

bre intermittente, scorbuto, mensium defectu, putredine imminente, &c.

Externè ulcera putrida, saniosa, fætida, fistulosa emendat, depurat; labiorum, gingivarum, palati, linguae, faucium ulcera sanat.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta cum vehiculo aquoso, aut vinoso, longè à partu, manè ac vespere.

ELIXIR PROPRIETATIS

PARACELSI.

REC. Aloës Socotrinæ,
Myrrhæ electæ ana *uncias duas,*

Crocī optimi *unciam unam.*

Misce in pulverem tritis affunde
Spiritūs vini rectificati, cum
Spiritūs Sulphuris *uncias tribus,*

per octiduum digesti *libram unam semis;*

Stent in digestionem per aliquot dies; liquorem tinctum effunde, atque speciebus residuis denovo superfunde

Spiritūs ejusmodi *libram semis.*

Post digestionem extractiones conjunge, atque per chartam bibulam filtratas ferva.

De hoc Elixirio magna sunt PARACELSI promissa, ad vitam sanam & longævam tuendam, ad morbos omnivarios, ad pestem, & mortem ipsam fugandam. Ceterum ex specierum ingredientium, & menstrui natura & proprietate, satis apparet, ejus vires & effectus, cum præcedenti elixirio analogas esse, adeoque & usum non disparem.

Dosis ad guttas quadraginta, sexaginta, cum vehiculo aquæ.

ELIXIR PROPRIETATIS

cum

RHABARBARO.

REC. Aloës Socotrinæ,
Myrrhæ electæ, ana *unciam unam,*

T

Rha-

Rhabbarbari veri electi *drachmas sex,*

Croci optimi,

Salis Tartari *ana drachmas duas.*

Misce pulverifatis affunde

Vini Hispanici optimi *libram unam semis.*

Digerantur loco tepido *per dies octo,*
tunc filtratus liquor usui serve-
tur.

Ratione menstrui temperatius est, ac ratione specierum accessoria est virtus Rhabbarbari, in cæteris, cum antecedentibus elixiriis prope convenit. Solida roborat, humores attenuat, obstructions reserat, cruditates emendat, appetitum excitat, alvum subducit, vermes fugat, hypochondriacis, hystericis, cachecticis, iëtericis prodest, si secundum genuinas medendi leges adhibeatur. In subjectis sanguineis, plethoricis, cholericis, hæmorrhoidariis, febricitantibus, & morbis calidis, abstinere, satius est.

Dosis drachma una ad duas, cum vehiculo aquoso, per aliquot dies, manè ac vespèrè.

ELIXIR SALUTIS.

REC. Radicum Enulæ,

Liquiritiæ,

Rhabbarbari veri
ana unciam unam,

Foliorum Sennæ orienta-
lium *uncias duas,*

Seminis Anisi,

Carvi,

Coriandri *ana un-
ciam unam,*

Uvarum passarum, absque
acinis *uncias
quatuor,*

Salis Tartari *drachmas duas,*

Incisis & contusis affunde

Aquæ fontanæ ferventis *li-
bram unam.*

Refrigeratis adde

Spiritûs vini rectificati *libras
duas.*

Digerantur & post sufficientem
extractionem, exprimantur &
filtrentur.

*Commendatur illis, qui à tarditate
alvi & flatibus vexantur.*

*Dosis drachmæ duæ, ad unciam
semis.*

ELIXIR STOMACHICUM VISCE- RALE TEMPERATUM HOFF- MANNI.

REC. Extracti Absinthii,

Cardui benedicti,

Centaurii minoris,

Gentianæ *ana un-
ciam unam,*

Flavedinis Corticum Auran-
tiorum amarorum,
ab omni albedine
mundatorum, *un-
cias quatuor,*

Affunde

Vini Hungarici optimi *libras
duas,*

Spiritûs Corticum Auran-
tiorum rectificati,
uncias duas.

Stent per triduum infusa in dige-
stione, postea filtrata reponan-
tur.

*Elixir egregium, & usu frequentis-
simo celebratum; viribus roboran-
di, stomachi & viscerum actionem
promovendi, humores attenuandi,
emendandi, appetitum stimulandi,
flatu pellendi, cruditates debellan-
di, acidum corrigendi, &c. in
vario languoris, & morborum ca-
su, se commendans: in dysorexia,
dyspepsia, cacochylia, cacochymia,
cachexia, flatibus, affectione hy-
pochondriaca, hystérica, &c. in
reliquiis morborum lentis.*

*Dosis drachma una ad duas, cum ve-
hiculo aquæ, vini, cerevisiæ, manè
ac vespèrè, ad plures dies.*

ELIXIR STOMACHICUM SPIRI- TUOSUM HOFFMANNI.

REC. Herbae Scordii, *unciam un-
nam,*

Centaurii minoris,
Fla-

Flavedinis Corticum Auran-
tiorum,

Myrrhae electae, *ana un-
ciam semis,*

Zedoariae,

Nucistae, *ana drachmas tres,*

Ligni Aloës *drachmam unam
semis,*

Croci Austriaci *drachmam
unam,*

Succini *drachmas tres.*

Incisis & contusis superfundatur
Spiritus Vini rectificati *libra
una semis.*

Post sufficientem digestionem ex-
primantur, & liquori per filtrum
trajecto addantur

Olei Cardamomi,

Caryophyllorum *ana
guttae decem,* in

Spiritus Salis Ammoniaci
vinosi *uncia una soluta.*

*Alexipharmacum, & anticatarrhale
est, ventriculum roborat, chyli-
ficationem promovet, & ab illustri
Auctore, praesertim ad diarrhoeas
chronicas, ex intestinorum levi-
tate, commendatur.*

*Dosis guttae sexaginta bis in die,
cum vehiculo idoneo.*

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI

juxta

DISPENSAT. VIENNENSE.

REC. Radicum Galangæ minoris,
Zingiberis,

Zedoariæ *ana un-
ciam unam,*

Calami aromatici,

Foliorum Majoranæ,

Menthæ,

Thymi,

Serpilli,

Florum Rosarum,

Salviæ,

Rorismarini *ana un-
ciam semis,*

Seminis Anisi,

Fœniculi *ana drach-
mas duas,*

Cinnamomi acuti *uncias tres,*

Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ,

Macis *ana unciam unam,*

Cubebæ,

Ligni Aloës,

Santali citrini,

Cardamomi minoris *ana un-
ciam semis,*

Corticum Citri recentium
uncias tres.

Incisa & contusa macerentur in
Spiritus Vini rectificati *libris
duodecim,*

per triduum, postea addantur,

Aquæ fontanæ *libræ quatuor,*

& lento igne ex balneo destil-
lentur circiter *libræ tredecim.*

si completum desideretur Elixir,

Ambraë gryseæ &

Moschi *ana scrupuli duo,*

addantur, & pro lubitu,

Croco tingatur.

*Singularis efficacie prædicatur hæc
Aqua spirituosæ, Elixir Vitæ di-
cta, tam internè, quàm externè
adhibita. Epilepticis, animo de-
ficientibus, præcipuè autem in mor-
bis, à causâ frigida ortis, com-
mendatur. Flatibus discutit, ven-
triculum roborat.*

*Dosis à drachma una, ad unciam
semis.*

ELIXIR VITÆ MULIERUM,

vid.

AQUA EMBRYONUM.

ELIXIR VITRIOLI MYNSICHTI.

REC. Calami aromatici *unciam un-
nam,*

Galangæ minoris *unciam un-
nam semis,*

Zingiberis albi *drachmas tres,*

Menthæ crispæ,

Salviæ nobilis *ana unciam
semis,*

Caryophyllorum,

Cinnamomi electi *ana drach-
mas tres,*

Cubebæ,

Nucis Moschatæ *ana drach-
mas duas,*

Ligni Aloës ponderosi,

Corticum Citri recentium
ana drachmam unam.

Misce incisis & contusis superfunde
Spiritus Vini rectificati li-
bram unam semis.

Macerentur per dies quatuordecim,
deinde addantur

Spiritus Vitrioli optimi unciæ
duæ.

Digerantur per sex dies, tum ex-
pressa per chartam emporeticam
colentur; Residuo affundantur

Spiritus Vini unciæ quin-
que vel sex.

Digerendo essentiam reliquam ex-
trahe, quam cum priori con-
junctam, superfunde

Sacchari albi, parum tosti
unciis quatuor.

Atque post digestionem debitam,
mediante filtro, à facibus sepa-
ratam, usui serva.

*Ab Authore suo, pro insigni & no-
bilissimo stomachico celebratur, ejus-
que vires roborandi, appetitum ci-
tandi, flatus dissipandi, spasmos
mitigandi, sodam leniendi, &c.
ipse usus tempestivus, & experi-
menta confirmant.*

*Dosis guttæ decem ad viginti cum
vehiculo aquoso.*

ELIXIR UTERINUM.

REC. Herbæ Artemisiae, unciæ
tres,

Incisis affunde

Spiritus Vini rectificati un-
ciæ quindecim.

Digerendo per aliquot dies, extra-
hatur Essentia, quae colata, &
expressa affundatur

Castorei orientalis unciæ u-
ni semis,

Croci optimi pulverisati un-
ciæ semis.

Misce digestis leni calore, expres-
sis, & per chartam bibulam fil-
tratis, adde

Olei destillati Anisi,
Angelicae,
Succini ana
guttas qua-
draginta.

Et usui servantur.

*Est Elixir CROLLII correctum,
cujus vires ab artemisia, castoreo,
& croco, dein & ab oleis de-
stillatis liberaliter adjectis, æstiman-
dæ veniunt; videlicet valde stimu-
lantes, moventes, calefacientes,
roborantes, emmenagogæ, &c.
Commendatur in morbis uterinis,
menstruorum retentione, fluore al-
bo, &c. Sed prudenti cautela
opus est, ne acri stimulo nimium
quantum corpus incendat.*

*Dosis guttæ viginti, triginta cum
vehiculo aquoso.*

EMPLASTRA & CERATA.

Hoc nomine venit medicamentum
topicum, ex massa plus minus
tenaci & glutinosa constans,
quod linteo, vel alutæ exten-
sum, cuti immediatè applicatur.
In genere tegendæ, & munien-
dæ cuti dicatur, in specie autem
vario medendi scopo adhibetur,
molliendi, adstringendi, resol-
vendi, discutiendi, maturandi,
ficcandi, roborandi, excitandi,
refrigerandi, consolidandi, de-
rivandi, revellendi, repellendi,
rubefaciendi, vesicas excitandi,
vermes fugandi, dolores sopien-
di, vel etiam alvum movendi, &c.
Illius verò efficaciam, non tan-
tùm in superficiem corporis,
cuticulam, cutem, ejusque fi-
bras & vascula nervosa, sangui-
nea, lymphatica, folliculos glan-
dulofos, papillas nerveas, &c.
operari, sed etiam altius ad in-
teriora penetrare, ipse usus &
experientia fidem facit. Siqui-
dem Mercurialia, ad glandulas
salivales, Cantharides, ad cola-
torium renale, Purgantia verò
ad intestina, suos effectus ede-
re certum est. Circa Organum
cutis observari meretur, illud
in quibusdam subjectis, tantæ
esse teneritudinis, ac sensibili-
tatis, ut omnis propè Emplastri
sit impatiens, adeò ut brevè ab
imposito topico, oriatur pruri-
tus,

tus, rubor, inflammatio, pustulæ, dolor, tandemque, nisi maturè removeatur, gangrænosa affectio succedat. Cæterum in officinis vulgò tanta est Emplastrorum luxuria, ut eorum maxima pars, absque artis medendi detrimento, posset abrogari, siquidem modicus illorum numerus, ad quasvis indicationes therapeuticas sufficeret. Verumtamen opinio, & consuetudo, seu Chirurgorum, seu plebejorum hominum, ipseque adeò trium syllabarum tyrannus *mos* facit, ut invitis utcunque Medicis, quàm multæ compositiones, sæpe nimium quantum prolixæ, & parum concinnæ retineantur. Quod perinde ac in aliis Dispensatoriis, etiam in hoc ipso evitari non potuit.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

five de
CERUSSA.

REC. Olei Olivarum *libras duas,*
Cerussæ *libram unam semis,*
Cerae albae *uncias quatuor,*
Cerussam cum oleo, leni igne, ad debitam consistentiam coquendo, sub coctione modicum aquae subinde instillando, tandemque ceram in eo liquefaciendo, fiat lege artis Emplastrum.

Siccat, refrigerat, sanat: commodum ad cutis excoriationes, intertrigines, ambustiones, erysipelas pustulosum, ulceratum, crura hydropicorum stillantia, vulnera, & ulcera.

EMPLASTRUM de AMMONIACO.

REC. Unguenti dialthææ *unciam unam semis,*
Cerae citrinae *uncias quatuor,*
Resinae Pini *unciam unam.*
Super ignem colliquatis, & colatis adde

Pulveris radicis Bryoniae,
Iridis Florentinae,

Pars II.

Pulveris feminis Foenigræci
ana drachmas sex.
Misceantur, & sub finem addantur

Gummi Ammoniaci, in aceto soluti *uncie duæ,*
Emplastri de Meliloto *uncia una.*

Fiat Emplastrum.

Emollit, maturat, resolvit, mitigat.

EMPLASTRUM ANODYNUM.

REC. Emplastri Diachyli simplicis,
de Meliloto *ana drachmas duas,*

Camphoræ,

Opium *ana drachmam semis.*

Misce fiat lege artis Emplastrum.
Doloribus leniendis, sedandis idoneum: in cephalalgia, vertici & temporibus, in hemirania, parti dolenti, in otalgia, pone aures, in cardialgia, stomacho, in colica, umbilico, in rheumatismo, loco affecto, applicandum, superdando vesicam vitulinam lacte calido subsempiternam.

EMPLASTRUM ANT - APOPLECTICUM.

REC. Gummi Galbani,
Opopanacis *ana drachmas duas,*
Radici Pyrethri,
Piperis longi,
Castorei *una drachmam unam,*
Terebinthinæ Venetæ *drachmas tres,*
Olei destillati succini *scrupulum unum.*

Misce fiat lege artis Emplastrum.
In morbis soporosis, apoplexia, & paralyti, &c. capiti roseo applicari potest. An & quantum, hoc vel alia topica, in ejusmodi malis prestare queant? ex Aetiologia illorum, judicare fas est. In titulo non nisi lubrica fides est.

EMPLASTRUM ANT - EPILEPTICUM CRATONIS.

REC. Succini albi,

U

Thu-

Thuris,
 Mastichis *ana drachmam u-*
nam semis,
 Galbani,
 Opopanacis *ana scrupulum u-*
num,
 Visci querni *drachmas duas,*
 Seminis Pœoniæ *maris*
drachmam semis,
 Ladani *drachmam unam se-*
mis,
 Olei Nucistæ *drachmam semis,*
 Ambræ gryfææ *grana sex,*
 Moschi *grana tria,*
 Olei Rosarum *quantum satis.*
 Misce fiat lege artis Emplastrum,
 cui in aluta extenso, adspersa-
 tur pulvis Cubearum, & futu-
 ræ coronali ad verticem capitis
 imponatur, capillis primùm ab-
 ras.

Vertiginosis & Epilepticiis ab Au-
thore commendatur. De viribus
eadem, quæ de præcedenti, censura
locum habet.

EMPLASTRUM ANTI-PODAGRI- CUM.

REC. Olei feminis Hyoscyami,
 Papaveris albi,
 Lini *ana uncias*
quatuor,
 Minii rubri *libram unam,*
 Aquæ Florum Sambuci *li-*
bram semis.

Coque lento igne, ad solutionem
 Minii, tunc adde
 Saponis Veneti *uncias tres,*
 & hoc soluto
 Cerae citrinae *uncias duas.*

Misce fiat lege artis Emplastrum.
Ad mitigandos dolores podagricos com-
mendatur. At experienciâ teste,
omnia fere topica malum exaspera-
re solent; & quæ repellendi vim
habent, majoris damni periculum a-
lunt, ideoque consultius omittun-
tur.

EMPLASTRUM

de

BACCIS LAURI.

REC. Baccarum Lauri *uncias qua-*
tuor,

Cyperi rotundi, vel
 Costi amari, vel
 Corticis Winterani,
 Thuris,
 Mastichis,
 Myrrhae *ana unciam unam.*
 Misce fiat omnium pulvis: po-
 stea
REC. Cerae citrinae *uncias octo,*
 Resinae *uncias duas.*
 Super ignem liquatis, adde
 Olei Laurini,
 Terebinthinae *ana uncias*
duas.

Quibus pulverem reliquorum im-
 miscendo fiat lege artis Empla-
 strum.

Resolvit, discutit, roborat, flatus
abigit; ad dolores ventriculi, in-
testinorum, vesicæ, & matricis,
à causa frigida ortos, nec non ad
hydropem, tympaniam, commen-
datur.

EMPLASTRUM

sive

CERATUM de BETONICA.

REC. Cerae flavae,
 Resinae Pini,
 Terebinthinae *ana uncias*
duas.

Liquefactis resinâ & cerâ, cola-
 tisque & aliquantum refrigeratis,
 Terebinthinam adde, hisque
 unitis insperge pulveres subtilif-
 simos:

Betonicae *unciam unam,*
 Mastiches,
 Mumiae,
 Thuris *ana drachmas duas.*

Misce fiat Emplastrum.

Roborans, resolvens, celebratur ad
contusiones, & vulnera capitis,
etiam gravissima; item ad cepha-
lalgiam, catarrhos, aliosque ca-
pitis morbos; capillis abrasis ver-
tici imponendum.

EMPLASTRUM CAMPHORATUM STAHLII.

REC. Olei Olivarum *libram unam,*
 Minii cribrati *libram semis.*
 Coquan-

Coquantur ad dissolutionem Minii,
per vices aliquid aquæ inspergen-
do, tandem refrigeranti adde
Camphorae *uncias duas*.

Fiat Emplastrum in magdaleones
formandum.

*Refrigerat, resolvit, mitigat, & lon-
gâ experientiâ commendatissimum
habetur: ad dolores rheumaticos,
ad inflammationes, pernicioses, excori-
ationes, &c.*

EMPLASTRUM CAPUCINORUM.

REC. Gummi Ammoniaci,
Olibani,
Masticis,
Tutiae præparatae, *ana un-
ciam unam,*
Euphorbii,
Pyrethri,
Salis communis *ana uncias
duas,*
Picis navalis, *uncias tres,*
Terebinthinae *unciam unam,*
Cerae flavæ *uncias tres.*

Pix, terebinthina, & cera, leni igne
fundantur, quibus colatis reli-
qua in pulverem subtilem trita
commisceantur.

*Resolvens, ad nodos, & tumores pe-
dum, à frigore, vel etiam longâ
genuum fluxione, abortos, Revr.
P. P. Capucin. usu venire solet.*

EMPLASTRUM CATARRHALE.

Dispens. Brandenb.

REC. Gummi Elemi,
Masticis,
Tacamahacæ *ana
unciam unam,*
Carannæ,
Opii Thebaici *ana drachmas
duas,*
Olei Nucistæ *drachmam u-
nam,*
Balsami Indici *scrupulos duos,*
Terebinthinae Venetae, q. s.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

*Roborans, resolvens, anodynum; af-
fectibus capitis dolorificis, catar-
rhalibus, hemicranie, otalgia,
odontalgia, leniendis, vel dissipan-
dis idoneum. Ejus usu, Virum*

*quendam, à diuturno dolore, sævo
& fixo, à regione temporali ad
dentes interdum excurrente, tan-
dem feliciter liberatum, testatur
Cel. SCHULZIUS Prælect. in
Disp. Brand. p. m. 179.*

*Vertici, temporibus, vel pone aures,
imponere juvat.*

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

Disp. Brand.

REC. Gummi Tacamahacæ,
Benzoës,
Styracis Calamitæ,
Masticis,
Hederæ,
Olibani,
Ladani puri *ana un-
ciam semis,*
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ *ana drach-
mam unam,*
Cinnamomi,
Terebinthinae Venetae *ana
drachmas duas,*

Misce cum

Styracis liquidæ *quantitate
sufficiente.*

Fiat lege artis Emplastrum.

*Vires roborantes, nervinæ, cephalicæ,
attenuantes; usus in morbis
capitis frigidis, catarrhalibus, su-
porosis; vertigine, gravedine, co-
ryza, aurium sonitu, comate, ba-
rrycoia, paralyxi, &c. Vertici,
temporibus, fronti, pone aures,
adhibere juvat.*

EMPLASTRUM

de

CICUTA cum AMMONIACO.

REC. Succus Cicutæ *uncias sedecim,*
Aceti Scillitici,
Gummi Ammoniaci *ana un-
cias octo.*

Dissolvatur Gummi Ammoniacum
in Aceto Scillitico, coletur, &
addito succo Cicutæ, rursus in-
spilletur ad pultis consistentiam,
addantur

Pulveris Cicutæ *uncia octo,*
Cerae Liquatæ *libra una,*
Olei Capparum *uncie qua-
tuor.*

U 2

Misce-

Misceantur leni calore, ut fiat
Emplastrum.

Potenter resolvens, attenuans, discutiens, laudatur ad infarctus, & tumores lentos, obstinatos, scirrhusos glandularum, lienis, hepatis, &c. nec non ad clavos, & verrucas pedum, &c.

EMPLASTRUM five CERATUM CITRINUM.

REC. Resinae libram unam,
Cerae citrinae uncias octo,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinae uncias duas.

Fiat emplastrum, omnia liquando
& colando, atque pro colore,
addendo

Pulveris Curcumae unciam
semis.

*Ad recentia vulnera sananda, nec
non ad ulcera valet.*

EMPLASTRUM ad CLAVOS & VERRUCAS PEDUM.

REC. Galbani unciam unam,
Picis navalis unciam semis,
Diachyli simplicis drachmas
duas,

Viridis Æris,
Salis Ammoniaci ana scrupulum unum.

Galbano in aceto dissoluto, & ad
spissitudinem evaporato, addatur
pix & emplastrum diachylon, in
fine sal ammoniacum & viride æ-
ris pulverifata;

Fiat emplastrum.

*Clavis & verrucis pedum abigendis,
cum felici effectu adhiberi solet.*

EMPLASTRUM de CRUSTA PANIS.

REC. Crustæ panis abundè fermen-
tati, mediocriter tostæ,
in pulverem tritæ, &
aceto forti maceratæ
uncias duas,

Tacamahacæ unciam unam,
Mastiches electæ,
Caryophyllorum aromatico-
rum,

Nucis Moschatæ,
Menthæ ana unciam semis,
Cerae citrinæ uncias sex,
Terebinthinae,
Olei Mastiches,
Cydoniorum ana unciam
unam.

Cerae, cum terebinthina colliqua-
tæ, olea & reliqua commiscen-
do, fiat Emplastrum.

*Stomachale est, inque vomitionibus
puerorum, & ubi concoctio non
rectè succedit, ventriculi regioni
applicatur.*

EMPLASTRUM de CUMINO.

REC. Cerae Citrinae,
Emplastri Diapalmae,
Olei Olivarum,
Seminis Cumini ana uncias
sex,

Baccarum Lauri uncias duas,
Olei destillati Cumini drach-
mam unam.

Cera, oleum, & emplastrum leni
igne liquentur, quibus pulvis
ex cumino & lauri baccis opti-
mè immisceatur; tandem oleum
destillatum Cumini addatur &
emplastrum, vesicæ bubulæ in-
volutum reponatur.

*Resolvit, roborat, flatus dissipat, hy-
pochondriacis, hystericis, tympani-
ticis, conveniens.*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM FELICIS WÜRZII.

REC. Cerae Citrinae libram unam,
Resinae uncias duas,
Sevi Hircini uncias sex,
Terebinthinae unciam unam,
Herbae Alchimillae pulve-
rifatae uncias sex.

Misce fiat Emplastrum, addendo si
viridius delideretur, coloris cæ-
rulei Indici scrupulos duos, vel
quantum placet.

*Leniter adstringit, refrigerat, & ni-
mium affluxum humorum à parti-
bus affectis arcet.*

EM-

EMPLASTRUM DEFENSIVUM
RUBRUM WEPFERI.

REC. Butyri recentis,
Olei Lini *ana uncias sex,*
Corticum viridium Sambuci
recentium *uncias quatuor.*

Coquantur leni igne, ad humidi-
tatis consumptionem; colatis &
expressis adde

Cerae Flavae,
Minii rubri *ana uncias sex.*

Misce fiat lege artis Emplastrum.

*Refrigerat, adstringit, mitigat; con-
fert in ulceribus antiquis, in am-
bustis, in cute à vesicatoriis læsa,
& ubi inflammationis metus est.
Ad leniendos dolores, & in can-
cro, sive occulto, sive ulcerato,
palliativum est.*

EMPLASTRUM DIABOTANUM
BLONDELLI. *Disp. Argent.*

REC. Foliorum recentium, unà cum
radicibus, Angelicae hor-
tensis,

Bardanae,
Calendulae,
Chamæpythos,
Chelidonii ma-
joris, & mino-
ris,

Cicutae,
Cucumeris syl-
vestris,

Enulæ campa-
nae,

Gratiolae,
Illecebrae,
Levisticæ,
Petalitidis,
Raphani rustica-
ni,

Scrophulariae,
Valerianae ma-
joris *ana un-
ciam unam se-
mis.*

Coque in

Aquæ fontanæ *sufficiente
quantitate,*

ad medietatis consumptionem;
colatis & expressis adde

Pars II.

Succi Chelidonii majoris,
Cicutae,
Hormini *ana uncias se-
decim,*
Illecebrae *uncias qua-
tuor.*

Exhalent balnei calore, ad extracti
solidioris consistentiam; hujus
uncias sedecim admisce

Gummi Ammoniacy,
Galbani,
Opopanacy,
Sagapeni, in aceti
scillitici q. f. solu-
torum, & inspif-
satorum *una unciam
unam.*

Interea

REC. Lithargyrii pulverisati *un-
cias octo,*

Olei Lumbricorum,
Meliloti,
Mucaginum *ana uncias
duas semis,*
Aquæ fontanæ circiter *uncias
quinque.*

Coquantur simul ad Emplastri pau-
lo ficioris consistentiam; cui
per vices admisce Extractum su-
pradictum, permixtum cum
Gummatibus, balneo maris prius
liquefactis. Tum adde

Sulphuris vivi tenuissimè
pulverisati *uncias tres,
drachmas sex.*

Postea liquefiant:

Cerae citrinae,
Styracis liquidæ repurgatæ,
Picis Burgundicæ *ana uncia
quatuor.*

Dein massæ semirefrigeratæ in-
sperge pulveres:

Radici Coronæ Imperialis,
Cyclaminis,
Hellebori albi,
Ireos Florentinæ,
Ranunculi tuberosi,
Serpentariæ *ana
drachmam unam
semis,*

Ari,
Sigilli Salomonis *a-
na drachmus duas,
Trium*

Radicis Trium Aristolochia-
rum *ana drachmam*

semis,

Afari *drachmas sex,*

Foliorum Pistachiorum, *scrupulos duos, grana quinque,*

Baccarum Lauri *drachmam unam,*

Seminum Angelicae,

Nasturtii *ana drachmam unam semis,*

Cumini *drachmas sex,*

Fimi Columbini *drachmas duas,*

Bituminis Judaici,

Olibani,

Mastiches *ana uncias duas,*

Gummi Tacamahacae *uncias tres,*

Bdellii,

Myrrhae *ana drachmas sex,*

Euphorbii *drachmas duas.*

Omnibus ritè permistis, tandem adde

Camphorae *drachmas tres,*

Olei Caryophyllorum *drachmas duas,*

de Lateribus *drachmas quinque.*

Camphorâ in oleo Caryophyllorum solutâ,

Misce fiat lege artis Emplastrum.

A copia vegetabilium nomen gereus, viribus mollientibus, resolventibus, digerentibus, apud Chirurgos Gallos mirificè celebratur; ad dissipandos tumores pituitosos, lentos, contumaces, glandulosos, scirrhosos, cysticos, ad sarcocelen, ad testiculi indurationem, post gonorrhœam virulentam, &c. longo tempore applicandum, & subinde renovandum.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

REC. Mucilaginis Fœni græci,
Lini,

Radicum Al-
theæ *ana li-
bram unam,*

Olei Olivarum clari *libras tres,*

Lithargyrii in pulverem subtilissimum triti *libras duas.*

Coque oleum & lithargyrium leni igne, sub perpetua agitatione, semper *unciam unam* aut alteram aquæ fontanæ instillando, ad solutionem lithargyrii, & emplastri albi, subgrisei consistentiam. Postea addantur mucilagines, & continuatâ lentâ coctione, ad justam emplastri consistentiam redigantur.

Emollit, lenit, maturat, tumores ad suppurationem spectantes. Vis in recenti bona, in vetusto & arido evilescit.

EMPLASTRUM DIACHYLON

cum

GUMMI.

REC. Emplastri Diachyli simplicis *libram unam.*

Adde

Gummi Ammoniacy,

Galbani, in Aceto solutorum *ana unciam unam,*

Croci pulverisati *drachmam unam semis.*

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Emollit, maturat, digerit, in abscessu fiente suppurationem accelerat, in facto, & aperto, reliquam durtiem emollit ac resolvit egregiè.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ

aliàs

DIACHALCITEOS.

REC. Axungiae Porcinæ,

Olei Olivarum,

Foliorum Quercûs teneriorum *ana libras duas.*

Folia conscindantur, & impastentur cum axungia & oleo; postea coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur.

Colaturæ adde

Lithargyrii in subtilissimum pollinem triti *libras duas.*
Len-

Lentissimo igne, sub perpetua agitatione, unâ coquantur, semper de solutione

Vitrioli albi *unciarum trium*
in

Aquæ fontanæ *libris duabus*

facta, parum instillando, donec consistentiam emplastri acquisiverit, coloris albi, subcinerei.

Est tenacissimum emplastrum siccat, & adstringens, labiis vulnorum recentium adducendis, & glutinandis idoneum: item ubi cauterium potentiale adhibetur, ad ambitum muniendum: sic etiam fonticulis acrem ichorem fundentibus, & viciniam rodentibus, circumponitur, quin & fracturis post repositionem, continendis, aptum habetur. Ab aliis quoque, ad ulcera sordida, œdemata, & contusiones adhibetur.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.

REC. Cerae flavæ *uncias undecim*,
Colophonii,
Bdellii *ana uncias quatuor*,
Succini citrini *uncias tres*,
Gummi Ammoniacy,
Terebinthinæ puræ *ana uncias duas*,

Galbani,
Sandarachæ *ana unciam unam*,

Maffiches,
Thuris *ana unciam semis*.

Cera cum colophonio liquetur, & coletur; quibus ab igne sepositis, & semirefrigeratis, terebinthinam, & reliqua in pulverem contrita, immiscendo, fiat lege artis Emplastrum.

Attenuans, resolvens, discutiens, roborans, commendatur ad tumores serofos, pedum œdemata, parotides, nodos Venereos, dolorem ischiadicum, ganglia, luxationes, &c.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

REC. Olei Solani *libras duas semis*,

Cerae albæ *libras duas, uncias sex*,

Cerussæ,

Plumbi usti *ana libram semis*,

Pompholygos,

Olibani *ana uncias quatuor*.

Cerussa & oleum lenissimo igne, unâ cum

Aquæ Solani *libra una* coquantur, ad unguenti spissioris consistentiam; quibus addatur cera, & cum sub perpetua agitatione ferè refrixerint, reliqua subtilissimè trita commisceantur.

Siccatur, refrigeratur, mitigatur, sanat, in ulceribus malignis, cancro, &c. conveniens.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS RULANDI.

REC. Cerae citrinæ,
Balsami Sulphuris Rulandi
ana uncias sex.

Leni igne solutis, adde pulveris subtilissimi

Myrrhæ electæ *uncias octodecim*,

Colophonii *uncias sex*.

Misce, fiat lege artis Emplastrum. Resolvit, siccatur, mundificatur, consolidatur; Vulnura recentia citò sanat. Ulcera varii generis commodè detergit. Putredinem arcet. Tumores glandularum, ac præsertim strumas dissipat. Cum Balsamo Peruviano malaxatum, ad vulnera sclopetaria citò, tutòque curanda, maximopere commendatur à MICHAELIS. In vehementibus lymphæ, salivæque effusionibus, miram ejus efficaciam prædicat Cel. SCHULZIUS, in Prælect. in Disp. B. p. m. 189.

EMPLASTRUM DIVINUM.

REC. Lithargyrii optimè triti *libram unam semis*,

Olei Olivarum *libras tres*.

Coquantur lento igne, sub perpetua agitatione, & subinde aquæ modicâ instillatione, ad emplastri consistentiam; tunc adde

Ceræ flavæ *uncias octo*,
Lapidis Magnetis præparati
uncias sex,

Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii *ana uncias tres*,
Myrrhæ,
Olibani,
Mastiches,

Æruginis,
Aristolochiae rotundae, om-
nium subtilissimè trito-
rum *ana unciam unam semis*,

Terebinthinae *uncias quatuor*.

Misce diligenter, ac fiat lege artis Emplastrum.

Spécioso nomine donatum, viribus roborandi, resolvendi, detergendi, sanandi, celebratur; in vario tumorum, vulnerum, ulcerum, casu.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM MICHAELIS.

REC. Fuliginis splendentis,
Telarum Aranearum,
Terebinthinae *ana drachmas duas*,
Camphoræ *scrupulos duos*,
Olei Aranearum *drachmas duas vel quantum satis*.

Misce fiat lege artis Emplastrum.
Carpis manuum, aut flexuræ cubiti, applicatum, ante novi paroxysmi febrilis ingressum; hunc avertere, vel iteratis tempestivè applicatio- nibus, tandem fugare febrem in- termittentem, experimenta docent. Ipse Cl. Author MICHAELIS, ejus usu senem 80. annorum, à febre quartana convalescente, testa- tur. Nec alia desunt exempla, quæ ejusmodi topica interdum ali- quid valuisse, fidem faciunt. Quod præsertim accidere videtur, ubi febris aliqua jam diu perseverans, tum naturæ virium beneficio, tum proprio quasi Marte suo, vel etiam

ope regiminis, & aliorum auxi- liorum, plus minus infracta fuerit, ac foriè suâ sponte brevè cessatu- ra.

Analogum est Emplastrum STRO- BELBERGERI, *Ph. Aug. re- nov. ex terebinthina, araneis, earumque telis, asphalto, sale am- moniaco & oleo scorpionum.*

Aliud Emplastrum febrifugum pa- rat, Cl. FAUSTIUS, ex *Nu- cleis alii, Fuligine, radice Ranun- culi, telis aranearum, sale, Cro- co, foliis Bursæ pastoris, Rutæ, & Terebinthina; vid. JUNGK. Lex. Pharm. Chem. P. II. p. m. 180.*

Aliud porrò Cel. SCHULZIUS, *in Prælect. p. m. 172. ex Theriaca, Terebinthina, Floribus Sulphuris, Alumine, Pipere, Camphora, & oleo Rutæ.*

Quò etiam referri potest, singu- lare experimentum Topici anti- febrilis, quod à medico quodam Wirtembergico acceptum, pub- licavit Cl. LENTILIUS, *in Misc. Med. Pract. P. I. p. 240.* quod constat ex tenui membrana, ovi testam intus succingente, quæ digito cuidam circumvoluta, foli eidem paroxysmum frigoris, æ- stusque febrilis conciliare dicitur, immuni manente reliquo cor- pore.

EMPLASTRUM FILII ZACHA- RIÆ.

REC. Ceræ albæ,
Sevi Cervini *ana libram u- nam*,
Axungiae Anseris,
Gallinæ *ana uncias sex*.

Misce fundantur lento igne, & fiat lege artis Emplastrum.

Molliens, resolvens, leniens, ad spasticos, & pleuriticos dolores, commendatur.

EMPLASTRUM ad FONTICULOS.

REC. Ceræ flavæ *uncias sex*,
Sevi

Sevi Cervini *uncias duas*,
 Olei Liliorum alborum,
 Terebinthinæ claræ *ana un-*
ciam unam semis,
 Minii *uncias quatuor*.

Misceantur omnia probè, & fiat,
 linteo subducto, lege artis Em-
 plastrum.

Ad fonticulos tegendos usu venit.

EMPLASTRUM ad FRACTURAS
 &
 LUXATIONES.

REC. Cerae *uncias sex*,
 Picis *libram unam*,
 Terebinthinæ *uncias duas*.
 Misce, super ignem liquatis in-
 spergantur pulveres:
 Radicis Consolidæ majoris,
 Barbæ caprinæ,
 Boli Armenae *ana uncia*
duæ.

Miscendo accuratè omnia, fiat le-
 ge artis Emplastrum.

Tenacissimum emplastrum ad fractu-
ras, & luxationes, à Chirurgis
interdum adhiberi solit; cujus ta-
men cutis vix est patiens, quin
molestus inde rubor ac pruritus
oriatur. Aliàs ad glutinanda vul-
nerum labia, suturæ loco, aut glu-
tinis, & retinaculi, vicem ad
alios usus, præstare potest.

EMPLASTRUM
 de
 GALBANO CROCATUM MYN-
 SICHTI.

REC. Gummi Galbani in aceto
 soluti *uncias sex*,
 Emplastri Diachyli simplicis,
 de Meliloto *ana un-*
cias tres,
 Cerae *uncias duas*,
 Terebinthinæ *unciam unam*,
 Croci orientalis *drachmas*
sex.

Misce fiat lege artis Emplastrum.
Molliens, resolvens, demulcens, val-
de à suo Authore extollitur, ad
tumores duros, & scirrhosos, præ-
sertim ad strumas dissipandas; item
ad dolores variarum partium, pe-
Pars II.

toris, mammarum, scapularum,
ventriculi, hepatis, renum, ute-
ri, &c. sedandos; nec non ad con-
vulsionem & sigultum leniendum.
Porro ad malum hystericum, &
tumores mammarum muliebrium,
commendatur.

EMPLASTRUM ad GANGLIA.

REC. Gummi Ammoniaci,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Sagapeni,
 Myrrhæ electæ *ana*
uncias tres,
 Olei Laurini,
 Spiritûs Vini *ana unciam u-*
nam,
 Sulphuris vivi,
 Vitrioli Romani,
 Salis Ammoniaci *ana unciam*
semis,
 Euphorbii *drachmas duas*.

Myrrha pulverifetur, reliqua gum-
 mata aceto solvantur, colentur,
 & inspissentur, & omnia miscen-
 do, fiat lege artis Emplastrum.
Molliendo, attenuando, resolvendo,
longo usu, gangliis dissipandis,
vel saltem curationi manuali faci-
liori præparandis, valere potest.

EMPLASTRUM GRYSEUM.

REC. Lapidis Calaminaris præpa-
 rati *unciam unam*,
 Lithargyrii *uncias duas*,
 Thuris electi,
 Mastichis,
 Tutiae præparatae *ana un-*
ciam semis,
 Myrrhae electæ *drachmas*
duas,
 Cerae *uncias tres*,
 Sevi Cervini *uncias quatuor*,
 Terebinthinæ *unciam unam*
semis,
 Camphoræ *drachmam unam*
semis.

Cerâ & sevo liquatis terebinthina
 addatur, quibus semirefrigera-
 tis, sub assidua agitatione, cum
 pistillo ligneo, admisceantur pul-
 veres subtilissimè triti, ac de-
 mum Camphora, cum pauxillo
 Y — Spiri-

Spiritus Vini subacta, fiat Emplastrum.

Siccando . repellendo , consolidando , ad arcendum affluxum , & ad ulcera Sananda confert.

EMPLASTRUM ad HERNIAS.

REC. Terebinthinæ Venetæ *uncias quatuor*,
Mastiches electæ *unciam unam semis*.

Liquefactis invicem adde
Ceræ flavæ *uncias sex*,
Myrrhæ electæ,
Olibani,
Sanguinis Draconis *ana drachmas sex*,
Radici Symphiti majoris,
Seminis Perfoliatæ *ana unciam unam*,
Lapidis Haematitæ praeparati,
Vitrioli ad flavedinem calcinati *ana unciam semis*.

Myrrha cum caeteris speciebus in subtilem pollinem redacta, cum cera & terebinthina liquatis probè commisceatur, fiat lege artis Emplastrum.

Linteo , vel alutæ spissiusculè indutum , & post omentum ac intestina in cavum ventris reposita , herniosis rectè applicatum , injecto insuper bracherio idoneo , constringendo prodesse creditur ; majore cum spe , apud infantes , aut pueros , quam apud adultos.

EMPLASTRUM

ad

HYDROPEM FULLERI.

REC. Emplastri de Sapone *uncias duas*,

Clei Anisi,
Petrae *ana drachmam semis*.

Misce fiat Emplastrum.

Serum aquosum stagnans , & coacervatum in membrana cellulosa , movendo , attenuando , dissipando , hydropicis prodesse creditur ; toti abdomini , femoribus , cruribus , & pedibus superdatum.

EMPLASTRUM

de

HYASCYAMO..

REC. Olei seminis Hyoscyami albi expressi,
Succi ejusdem ex foliis *ana libram unam*.

Coquantur ad humiditatis consumptionem ; colaturae adde

Ceræ citrinae *uncias quindecim*,

Terebinthinæ *unciam unam semis*,

Pulveris foliorum Hyoscyami *uncias duas*.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Viribus resolvendi , molliendi , sedandi ; ad dolores rheumaticos gravissimos sopiendos : ad tumores partium glandulosarum , tonsillarum , hypochondriorum , &c. dissipandos : ad testium abscessum , atque ad hydrocele curandum , laudatur . Emplastro vesicatorio adjectum , nimium ardorem , vel pruritum , inde metuendum , temperare valet.

EMPLASTRUM HYSTERICUM

vid.

MATRICALE.

EMPLASTRUM INCOGNITUM

vid.

SANTALINUM.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

REC. Picis navalis *uncias duas*,
Gummi Galbani *unciam unam*,

Sulphuris vivi,
Succini citrini *ana drachmas duas*,

Seminis Cumini,
Florum Chamomillæ *ana drachmam unam semis*.

Galbanum in aceto solvatur, atque, cum pice optimè permisceatur, dein reliqua in subtilem pulverem trita addendo, fiat lege artis, Emplastrum. Demum usus tempore emplastrum oleo Petrae rubro malaxetur.

Robo-

Roborando, resolvendo, discutiendo, valet in doloribus Ischiadicis, aliisque rheumaticis, si post alia, vel cum aliis auxiliis tempestivè adhibeatur.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

REC. Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani *ana uncias tres,*
In aceto dissolutis adde
Cerae Flavæ,
Terebinthinæ *ana uncias*
quinque,
Magnetis arsenicalis subtilis-
simè triti *uncias tres,*
Terræ Vitrioli dulcis,
Olei succini rubri *ana unciam*
unam.

Misceantur exactè, & ferventur.

Viribus attenuandi, maturandi, attrahendi, usu venit, ad curandos carbunculos, & bubones pestilentiales; item ad parodites in febribus malignis erumpentes; nec non ad profligandam febrem quartanam, regioni lienis impositum.

EMPLASTRUM MALACTICUM.

REC. Cerae citrinæ *uncias octo,*
Terebinthinæ,
Colophonix *ana uncias tres,*
Olibani *uncias duas,*
Tartari albi *drachmas duas,*
Myrrhæ,
Seminis Fœni græci,
Lini *ana unciam u-*
nam,
Radicum Althææ,
Curcumæ,
Farinae Fabarum *ana uncias*
duas,
Olei Lini *unciam unam semis.*

Misceantur, fiat Emplastrum.

Emolliendo, attenuando, resolvendo, maturando, in vario tumorum genere, usu venire potest.

Nota. In Dispensatorio Augustano, &c. duo habentur Emplastra malactica, alterum sine Gummi, alterum cum Gummi, inter quæ tam parum est discriminis, ut alterutrum solum, ad scopum medendi,

abundè sufficere queat. Quare hic unicam compositionem proposuisse, satis videbatur.

EMPLASTRUM MAMMILLARE.

REC. Spermatiss Ceti *uncias duas,*
Emplastri de Spermate ranarum *unciam unam semis,*
Olei Chamomillæ cocti *drach-*
mas sex,

Fufis leni igne; addantur
Pulveris seminis Carvi *uncia*
una,
Olei destillati Carvi *drachmæ*
duæ,
Camphoræ *drachma una.*

Misceantur, fiat Emplastrum.

Ad tensiones dolorosas mammarum, à lactis abundantia, mitigandas, coagulationem lactis impediendam, & coagulatum resolvendum commendari solet. Sed in subjectis tenerioribus, à pulvere, & oleo stillatitio Carvi, cutis fortè nimium irritamentum, indeque rubor, pustulæ, pruritus molestus, oriri potest.

EMPLASTRUM MATRICALE.

REC. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Alæ foetidæ *ana un-*
ciam unam semis.

Solvantur in

Aceti Rutæ *sufficiente quan-*
titate atque ad spissitudi-
nem pultis redigantur;
adde

Terebinthinæ Venetæ *un-*
ciam unam semis,
Cerae citrinæ, seorsim liqua-
tæ, & aliquantulum refrige-
ratæ *uncias quatuor,*

Myrrhæ *unciam unam,*
Castorei *drachmam unam,*
Olei destillati Angelicæ,
Succini *ana*
scrupulum u-
num.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

*Viribus roborandi, stimulandi, resol-
vendi, spasmos mitigandi, flatus
dissipandi, laudatur in affectibus*
hyste-

hystericis, languore, anxietate, suffocatione, cardialgia, colica, menstruorum retentione, &c. ventriculo, vel umbilico impositum.

EMPLASTRUM MATRICALE,
five

HYSTERICUM SYDENHAMI.

REC. Galbani in tinctura Castorei
soluti, & colati *drachmas tres,*

Tacamahacæ *drachmas duas.*

Misce fiat Emplastrum.

Alutæ inducendum, & umbilico tepidè superdandum; eodem medendi scopo.

EMPLASTRUM
de
MELILOTO.

REC. Herbæ & Florum Meliloti
uncias quatuor,

Florum Absinthii,

Chamomillae,

Baccarum Lauri,

Seminis Apii, *ana drachmas sex,*

Styracis Calamitæ *unciam semis,*

Gummi Ammoniaci *unciam unam.*

Optimè in pulverem trita, excipiantur

Ceræ Citrinæ *unciis octo,*

Sevi Hircini *unciis quatuor,*

Terebinthinæ,

Resinæ *ana uncia una semis,*

Olei Chamomillae *unciis duabus.*

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Viribus molliendi, leniendi, resolvendi, discutiendi, valet in varia humorum stagnatione, in tumoribus plus minus duris glandularum, tonsillarum, paroditum, inguinalium, testiculorum; in duritie ventriculi, hepatis, lienis, omenti, &c. in cardialgia, colica flatulenta hypochondriacorum, &c.

Parum tenacitatis habet hoc Emplastrum, cui proin auctior proportio resinæ, & terebinthinæ

conveniret; aut in usum commodiorem, misceatur cum Emplastro Diachylo.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

REC. Emplastri Diachyli simplicis
libram unam,

Gummi Ammoniaci *libram semis,*

Mercurii vivi *uncias octo,*

Terebinthinæ *unciam unam,*

Styracis liquidæ *unciam semis.*

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Potenter attenuat, ac resolvit, varios sive glandularum, sive aliarum partium tumores, à spissitudine ac viscositate humorum oriundos, præsertim qui virulentie venereæ debentur, ut topi, nodi, gummata.

EMPLASTRUM five CERATUM
de

MINIO RUBRUM.

REC. Cerae Citrinæ,

Sevi Cervini,

Olei Rosarum *ana uncias sex.*

Cerâ & sevo liquatis, atque ferè refrigeratis adde

Minii rubri, cum oleo Rosarum optimè triti *uncias sex,*

Camphoræ *drachmam unam semis.*

Misce fiat Emplastrum molle.

Ad partes inflammatas, ambustas, & à vesicatorio applicato suppurantes, item ad Perniones dolentes demulcendos, leniendos, & sanandos, commodo usu venit.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

REC. Cerussæ *libras duas,*

Lithargyrii,

Minii *ana uncias sex.*

Subtilissimè tritis adde

Olei Olivarum *libras tres.*

Coquantur lenissimo igne, dein addantur

Saponis Veneti *rafi uncia quatuor.*

Solu-

Solutis, & ad emplastri paulo durioris consistentiam coctis, admisceatur

Camphorae *uncia una*,
Baccarum Lauri subtilissime tritarum *uncia semis*.

Misce fiat Emplastrum.

Siccandi, refrigerandi, resolvendi, sanandi virtute, polychrestum habetur hoc emplastrum, magnifico nomine insignitum; ad vulnera, & ulcera sananda, ad dolores rheumaticos, arthriticos, ad icterum, & duritiem in hypochondrio, ad tumores quoscunque frigidos, ad alvi segnitiam, ad menstrua cessantia, umbilico impositum; item ad obstructionem glandularum mesenterii, indeque metuendam atrophiam, in infantibus. Ubi aliquamdiu impositum fuit, tantisper removendum esse hoc emplastrum, Cel. SCHULZIUS monet, ne cuticulam elevet, praesertim in subiectis tenerioribus; quae cautela non minus ad plura alia emplastra pertinere solet.

EMPLASTRUM à MUCILAGINIBUS.

REC. Olei Mucaginum *uncias sex*,
Cerae flavae *libram unam*,
Gummi Ammoniacy,
Galbani,
Opopanacy,
Sagapeny,
in aceto solutorum
ana unciam semis,

Terebinthinæ *uncias duas*,
Croci orientalis *drachmas duas*.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Emollit, digerit, maturat, ac suppurationem accelerat.

EMPLASTRUM NERVINUM
HOFFMANNI.

REC. Gummi Ammoniacy,
Resinae Elemi *ana unciam semis*,

Tacamahacæ,
Mastiches,
Olibani *ana drachmas tres*,
Carannæ *drachmas sex*,

Pars II.

Succini citrini *drachmas duas*,
Omnia pulverisata excipiantur
Terebinthinæ Venetae *unciis duabus*,

Cerae flavae *unciis sex*.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Viribus roborandi, resolvendi, digerendi, leniendi, nervosarum partium morbis convenit; doloribus rheumaticis, arthriticis, frigida indolis, lumbagini, malo ischiadico, impotentiae membrorum, paresi, paralyti; ut & partibus à luxatione, fractura, infirmis.

EMPLASTRUM de NICOTIANA
LE MORT.

REC. Nicotianae *uncias quatuor*,
Olei Olivarum *libram unam*,
Vini rubri *uncias quinque*.

Coctis leni igne, ad consumptionem humiditatis, colatis, & expressis addatur

Cerae citrinae,
Colophoniae *ana libra una*.

Quibus admisce

Tacamahacæ,
Elemi,
Myrrhae,
Aloës *ana unciam unam*,
Olei Tabaci, per descensum
destillati *uncias duas*.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Acri stimulo alvum movet, abdomini impositum. Ab Authore Splenetici commendatur. In subiectis tenerioribus, & valde irritabilibus, forte nimium quantum viscera turbaret.

EMPLASTRUM NORIMBERGENSE.

REC. Olei Rosarum *libram unam*,
Minii rubri *uncias octo*,
Aceti Vini *uncias quatuor*.

Coque ad emplastri, brunei coloris, & mollioris consistentiam, tunc adde

Cerae citrinae *unciam unam semis*,

Camphorae *drachmas duas*.

Misce & effunde in scatulas.

Viribus roborandi, siccandi, resolvendi, sanandi, instar polychresti

Z

eni-

emplastri, ad vulnera, ulcera, dolores, tumores omnivarios, populari usu valde celebratur; miraculoso affine.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

REC. Tacamahacae,
Elemi,
Mastiches electæ ana unciam
unam,

Opium drachmas duas.

Omnia probè trita excipiantur
Terebinthinæ claræ Venetæ
drachmis duabus.

Misce fiat Emplastrum.

A parte gummatum resolvendi, & à parte opii demulcendi, ac sopiendi vires habet. In cephalalgia, hemi-crania, otalgia, odontalgia levamen pollicetur, si secundum leges indicantium, tempestivè adhibeatur, vertici, temporibus, pone aures, maxillæ, scilicet parti dolenti præcipuè applicandum. In Emplastro odontalgico Cel. WEP-FERI, longè potior est opii proportio, cum additamento Cantharidum, & olei Nucistæ, unde composita virtus, & major efficacia habetur.

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

REC. Lithargyrii triti uncias octo-
decim,

Olei Olivarum libras duas,
Aceti Vini,

Aquæ fontanæ ana uncias
quatuor.

Sensim addendo aquam & acetum,
coque lento igne, ad colorem
dilutè fuscum, tunc adde

Ceræ flavæ uncias sex,

Terebinthinæ uncias qua-
tuor.

Agitentur pistillo ligneo, ut citiùs
refrigescant, & spissescant, por-
ro adde

Gummi Ammoniaci,

Bdellii ana uncias
duas,

Galbani,

Opopanax, ana un-
ciam unam.

In aceto solutis, & ad mellis con-
sistentiam reductis commisce in
subtilem pollinem trita:

Aristolochiæ rotundæ veræ,
longæ veræ,

Lapidis Calaminaris præpa-
rati,

Thuris,

Myrrhæ,

Mastichis ana unciam unam,

Olei Laurini unciam unam
semis.

Misce subigantur assiduè agitando,
donec refrigescant.

*Ab Authore suo PARACELSO, tan-
tùm non pro universali emplastro
habetur, idque vulnera sanare, spi-
cula, tela, & aliena quævis ex-
trahere, affluxum humorum arce-
re, & symptomata periculosa aver-
tere, prædicatur.*

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

REC. Ceræ citrinæ,

Resinæ albæ ana libras duas
semis,

Colophonix pulverisatæ li-
bras duas,

Croci pulverisati & Spiritu
Vini irrorati unciam unam,

Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Mastiches,

Myrrhæ,

Olibani,

Terebinthinæ ana uncias sex.

Ceræ & resinæ liquefactis, & co-
latis adde Colophoniam & Cro-
cum, post immisce Ammonia-
cum, & Galbanum, in Tere-
binthina soluta, dein ultimò ad-
junge reliqua tenuissimè pulve-
risata, & fiat lege artis Empla-
strum.

*Emplastrum celebre, & frequentissi-
mi usûs; viribus roborandi, atte-
nuandi, resolvendi, leniendi, lau-
datur ad dolores nervosarum par-
tium, ad membra contusa, fracta,
dislocata, distorta, ad tumores
duros, abscessus inveteratos, &c.
Cuti satis tenaciter inhaerendo, ac
valde stimulando, admodum cale-
facit,*

facit, ac diu impositum, sæpe ruborem, pustulas, pruritus gignit, præsertim in subiectis tenerioribus, ac tum in tempore removendum est, ne gravior noxa sequatur.

EMPLASTRUM
de
RANIS, VIGONIS
sine
MERCURIO.

REC. Ranarum vivarum *No. decem,*
Lumbricorum terrestrium
vivorum *uncias quatuor,*
Schoenanthi,
Stœchadis Arabicae,
Matricariae,
Croci orientalis *ana unciam semis,*
Radicum Ebuli,
Enulae *ana uncias tres,*
Vini albi *libras duas,*
Aceti Vini *libram unam semis.*

Incisa misce, lento igne, coquantur ad dimidium, & colatura servetur. Postea

REC. Olei Olivarum,
Lithargyrii optimè triti *ana libram unam.*
Coquantur lenissimo igne, spatulâ semper agitando, & decocti superioris subinde aliquid instillando, ad emplastri durioris consistentiam, ab igne remotis adde
Olei Laurini expressi,
Terebinthinae clarae,
Cerae flavae *ana uncias duas.*

Quibus liquatis commisce porro
Pulveris Olibani *drachmas sex,*
Euphorbii *drachmas quinque,*
Styracis liquidæ *unciam semis.*

Omnia pistillo ligneo probè subigendo, misce fiat emplastrum.

Molliendo; leniendo, resolvendo, valet ad dolores, & tumores, à causa frigida ortos.

EMPLASTRUM
de
RANIS, VIGONIS
cum
MERCURIO.

REC. Emplastri superioris *libram unam,*
Mercurii vivi *unciam unam semis.*

Mercurius cum Terebinthinæ *drachmis duabus,* vel *q. s.* optimè subigatur, donec globuli mercuriales penitus evanescant, deinceps cum emplastro diligenter commisceatur. Si duplicatum, triplicatum, vel quadruplicatum desideretur, eidem portioni emplastri, duplum, triplum, vel quadruplum Mercurii, cum terebinthina extincti, adhibere oportet.

Ab accessoria facultate Mercurii, potentius resolvit, atque doloribus, & tumoribus variis glandularum lentis, & obstinatis, etiam cysticis; præcipue verò malis externis, quæ ab inquinamento venereo originem duxerunt, nodis, gummatis, scirrhis, bubonibus, testiculis tumentibus, &c. resolvendis, ac dissipandis adhibetur; utique si interna quoque auxilia ad scopum medendi idonea conjungantur, aut jam præmissa fuerint.

EMPLASTRUM REGIUM BURRHI.

REC. Cerae citrinæ *libram unam semis,*
Resinae Pini *libram semis,*
Terebinthinae Venetae *libram unam,*
Gummi Ammoniæ,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii,
Assæ foetidae,
Hederæ,
Elemi,
Olibani,

Tacamahacæ,
Sanguinis Draconis *ana unciam unam,*
Z 2 Traga-

Tragacanthæ *uncias decem*,
 Castorei *unciam semis*,
 Extracti Opii,
 Croci ana drachmas
 duas,
 Salis volatilis Ammoniaci,
 Cornu Cervi
 ana drach-
 mas sex.

Cera & refina lento igne liquata colentur; quibus ex parte refrigeratis admisceantur Tacamahaca, Elemi, Olibanum, Sanguis Draconis, omnia in subtilissimum pollinem trita; postea Gummi Ammoniacum, Galbanum, Opopanax, Bdellium, Assa foetida, Hederæ, cum Extractis in aceto soluta, & expressione per linteum colata, atque leni igne in mellis consistentiam redacta, addantur. Tandem Terebinthina Veneta, Tragacantha, Castoreum, & Salia Volatilia adjungantur, & perpetuâ, ac diligenti mistione, fiat emplastrum; quod in cylindros crassiores formatum, & vesicæ bubulæ involutum, usui servetur. *Nervinum est, resolvens, ac dolores sopiens; in tumoribus præsertim œdematosis commendatum.*

EMPLASTRUM
 five
 CERATUM SANTALINUM,
 aliàs
 INCOGNITUM.

REC. Cerae novae,
 Resinae *ana uncias quatuor*,
 Santali rubri *unciam unam*
 semis,
 Croci *drachmas duas*,
 Olibani,
 Mastiches,
 Myrrhae,
 Aluminis *ana drachmam unam*
 semis.

Cerae & resinae liquefactis, colatis, & semirefrigeratis, Santalum & Crocus trita, & Spiritu vini diluta, cum reliquis in subtilem pulverem redactis, accu-

ratè commisceantur, fiatque emplastrum.

Attenuans, resolvens, roborans, obstructioni ac indurationi hepatis, aliorumque viscerum dicatur: à plebe vulgò ad omnis generis dolores, tumores, vulnera, & ulcera sananda expetitur.

EMPLASTRUM SAPONATUM
 BARBETTE.

REC. Olei Rosati *libram unam*,
 Cerussæ,
 Minii *ana uncias quatuor*.
 Coquantur, sub assidua agitatione, subinde aliquot uncias aquae fontanae instillando, ad solutionem cerussæ, & minii promovendam, atque adustionem praecavendam, in emplastri mollioris consistentiam; tunc adde
 Saponis Veneti rasi *uncias quatuor*.
 Quibus solutis, & ab igne remotis admisceatur
 Camphoræ in Spiritu Vini
 solutae un-
 cia semis.

Fiat emplastrum.

Cum emplastro miraculoso affine, viribus siccandi, refrigerandi, resolvendi, mitigandi, usu frequentiter venit, ad dolores spasmodicos, rheumaticos, arthriticos, podagricos, ad tumores lentos, frigidos; ad icterum, & duritiem in hypochondriis; item ad ambusta, & perniciiones. Abdomini impositum infantibus alvum solvere dicitur, & foeminis menstrua movere.

EMPLASTRUM SATURNINUM
 MYSIGHTI.

REC. Sevi Hircini,
 Cerae citrinæ *ana uncias quin-*
 que,
 Terebinthinæ claræ,
 Plumbi usti, optimè loti, &
 subtilissimè triti *ana un-*
 cias duas,
 Lapidis Calaminæ præpara-
 rati,
 Cerus-

Cerussæ albæ ana unciam semis,

Nihili albi,

Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,

Myrrhæ,

Mastiches,

Olibani,

Aloës,

Nitri ana drachmam unam,

Camphoræ drachmam semis,

Omnia in subtilem pulverem redacta, ceræ, sevo, & terebinthinæ liquatis, & ab igne remotis admiscendo, fiat lege artis Emplastrum.

Siccans, refrigerans; consolidans, à suo Authore, ad ulcera fœtida, excessu, inflammationes, & ambusta commendatur.

EMPLASTRUM

de

SCROPHULARIA.

REC. Folior. recent. Scrophulariæ,
Digitalis purpureæ ana uncias octo,

Axungię suillæ libram unam.

Coque ad humiditatis consumptionem, colatis & expressis adde

Ceræ citrinae,

Resinae Pini ana uncias sex,

Terebinthinæ Venetae,

Æruginis ana unciam unam.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Laudatur ad Ulcera antiqua, & Scrophulas, etiam exulceratas.

EMPLASTRUM

de

SPERMATE CETI.

REC. Ceræ albae uncias quatuor,
Spermatis Ceti uncias duas,
Olei Amygdalarum dulcium,
Gummi Galbani,
Terebinthinæ clarae ana unciam semis.

Cum cera liquata, commisceantur oleum, terebinthina, sperma ceti, tandemque galbanum subtilissimè tritum, ac fiat lege artis Emplastrum.

Pars II.

Molliens, digerens, resolvens, doloribus, ac tumoribus mammarum muliebrium, à copia, spissitudine, stagnatione, coagulo lactis oriundis; quin etiam sugillatis, contusis, œdematibus, commodè adhibetur.

EMPLASTRUM

de

SPERMATE RANARUM.

REC. Olei Spermatis Ranarum,
Cerussæ tritæ ana libras quinque.

Coquantur lenissimo igne, sub assidua agitatione, semper aliquid aquæ fontanæ, & aceti destillati addendo, tam adustionis præcavendæ, quàm solutionis cerussæ promovendæ causâ, ad emplastri albi consistentiam; cui ab igne remoto, & pistillo ligneo probè agitato, adde

Aluminis crudi uncias quinque,

Camphoræ in Spiritu Vini solutæ unciam unam.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Præstat, alumen in aquæ fontanæ libra una semis, vel duabus dissolvere, & inter coquendum, subinde hujus solutionis parum affundere; ita cerussa citius solvitur, & omnia perfectius uniuntur.

Siccandi, refrigerandi, adstringendi, sanandi virtute, medetur inflammationi, excoriationi, ambustioni, acrimoniæ rodenti, uceribus sordidis, antiquis, prurigini, impetigini, &c.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

REC. Foliorum Cicutæ,
Ebuli ana uncias duas,

Nicotianæ,

Florum Genistæ ana unciam unam,

Aceti Vini libram unam.

Macerata per biduum ebulliant, & in colatura expressa dissolve

A a

Gum-

Gummi Ammoniacy *libram unam.*

Solutioni per pannum colatæ, & ad mellis consistentiam inspissatæ, adde

Cerae citrinae *uncias sex,*
Resinae Pini,
Terebinthinae,
Olei Capparum *ana uncias duas.*

Quae seorsim in sartagine liquata, & semirefrigerata, cum caeteris exactissime misceantur.

Emplastro de Cicuta affine, viribus attenuandi, resolvendi, discutienti, cum illo parem usum habet, ad obstructions lentas, tumores obstinatos glandularum, & viscerum, praesertim lienis, hepatis, &c.

EMPLASTRUM STIPTICUM CROLLII.

REC. Lithargyrii,
Minii,
Lapis Calaminaris *ana uncias sex,*

Olei Lini,
Olivarum *ana libram unam,*

Vitrioli albi *unciam unam.*

Lithargyrium, minium, & lapis calaminaris subtilissime trita, cum oleo lini & olivarum, lenissimo igne, sub perpetua agitatione coquantur; quibus vitriolum, in aquae fontanae *libra una* solutum, successive additur, donec justam consistentiam acquisiverint; tunc adjiciantur,

Colophonii,
Cerae citrinae *ana libra una,*

Terebinthinae clarae,
Olei Laurini expressi *ana unciae sex.*

Mistis porrò adde

Gummi Ammoniacy,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhae,
Aristolochiae longae, verae,
Sanguinis Draconis,
Lapis Haematitae praeparati *ana unciam unam.*

Omnia probe misceantur, & fiat Emplastrum coloris spadicei.

Sub lunari globo non reperiri efficacius emplastrum, hoc suo scriptico, Author affirmat, illudque velut pro universali habendum censet. Ipso usu satis frequenti, vires siccandi, resolvendi, mundificandi, consolidandi praestat: eoque nomine ad vulnera sananda, apostemata maturanda, affluxum humorum nimium arcendum, ulcera mundificanda, & consolidanda, dolores rheumaticos, & arthriticos debellandos, adhibetur. E vulneratis partibus, aliena quævis, ferrum, plumbum, lignum, vitrum, etiam profundius infixa, sine dolore extrahere dicitur; quæ fallacia est non causæ pro causa, siquidem conatu, & actione naturæ medicatricis, non emplastri efficaciam res alienæ ejiciuntur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM de TACAMAHACA.

REC. Cerae citrinae *uncias octo,*
Tacamahacae *uncias quatuor,*
Terebinthinae *unciam unam,*
Balsami Peruviani,
Olei destillati Menthae *ana drachmas duas,*
Caryophyllorum *drachmam unam.*

Cerae cum terebinthina liquefactae, & semirefrigeratae, admisceatur tacamahaca trita, ac tandem balsamum cum oleis.

Viribus roborandi, prodest in stomachi debilitate, nausea, vomitu, diarrhoea, dyspepsia, flatibus, cardialgia, colica, &c.

EMPLASTRUM SUPPEDANEUM BOERHAAVII.

REC. Emplastri de Meliloto,
Gummi Galbani,
Sagapeni *ana unciam unam.*

Misce

Misce fiat Emplastrum.

Scopo derivandi, & revellendi, ejus portio alutæ, vel linteo induc-ta, plantis pedum applicatur, ad horas duodecim, vel longius; in febribus continuis, dolore capitis, sopore, delirio, stupore, agrypnia, &c. stipatis; item in variolis, morbillis, petechiis, in comate, lethargo, apoplexia, podagra retrograda, &c.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

REC. Minii optimè triti,
Aceti vini albi ana libram unam,

Olei Rosarum libras tres.

Coquantur leni igne, ad emplastri consistentiam, coloris fusco-spadicei, cui nonnihil refrigerato adde

Camphoræ cum Spiritu vini tritæ unciam unam semis.

Misce fiat Emplastrum, in scatulas effundendum.

Emplastro Norico affine, viribus sic-candi, resolvendi, sanandi, ulceribus antiquis curandis præsertim adhibetur.

EMPLASTRUM ad VERMES.

REC. Aloës hepaticæ,
Trochiscorum Alhandali,
Radiciis Asari,
Foliorum Absinthii,
Sabinae,
Tanaceti,

Myrrhæ ana drachmas tres.

Pulverifata subtilissimè misceantur cum

Fellis Tauri recentis unciis tribus.

dein

REC. Cerae citrinae uncias tres,
Olei Absinthii cocti,
Terebinthinae Venetae ana drachmas sex.

His liquatis, sub perpetua agitatione, præcedentia successivè commisceantur, sub finem addendo Olei destillati Sabinae,

Olei Petrae albi ana drachmam unam.

Fiat lege artis Emplastrum.

Abdomini impositum, acri stimulo penetrante, ventriculum ac intestina movet, lumbricos pellit, alvum citat; experimento in pueris, vel adultis commodo, qui fortè alia quævis auxilia respuunt. Cautelam verò & circumspeditionem prudentia suadet, ne fortè vis drastica enormes in visceribus turbas concitet, quod præsertim in subjectis delicatioribus metuendum foret.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

REC. Cantharidum tenuiter pulverifatorum uncias quatuor,

Cerae flavæ uncias decem,

Terebinthinae Venetae,

Olei Rosarum ana uncias duas semis,

Camphoræ drachmas tres.

Misce fiat lege artis Emplastrum.

Alutæ, vel linteo induc-tum thaleri magnitudine, & per horas duodecim plus minus cuti applicatum, vi cantharidum causticæ fibrillas & vascula cutanea irritando, copiam seri elicit, eoque coacervato cuticulam in bullam attollit, cum rubore inflammatorio circumcirca pruriente. Tempestivo usu prodest, in affectibus catarrhalibus frigidis, cephalalgia, hemi-crania, otalgia, odontalgia, barycoia, vertigine, gravedine, coryza, comate, lethargo, apoplexia, hemiplegia, ophthalmia, lippitudine, aphonia, &c. temporibus, vertici capitis, nuchæ, pone aures, impositum. In rheumatismo quoque, arthritide, ischiade serosa, parti affectæ, aut vicinæ adhibetur. In podagra retrograda, femoribus, cruribus, aut pedibus; in variolis, purpura miliari, petechiis, aliisque exanthematibus tardantibus, vel recedentibus; item in scabie repulsa, &c. inter scapulas, brachiis, cruribus, hinc inde admoventur.

EMPLASTRUM VESICATORIUM
MITIUS.

REC. Emplastri de Meliloto *un-*
cias novem,
Cantharidum recens subtili-
ter pulverifatorum *uncias*
tres,
Camphoræ *drachmas duas.*
Malaxando misceantur.

Super communi quodam emplastro
vulnerario, pollice extensum &
parti per *viginti quatuor horas* im-
positum, absque magno crucia-
tu vesicas excitat; & minùs mo-
lestè cuti adhæret, quàm aliæ
Emplastri vesicatorii compositio-
nes.

EMPLASTRUM VIRIDE.

Dispens. Argent.

REC. Cerae, Resinae,
Terebinthinae *ana un-*
cias quatuor,
Mastiches,
Olibani,
Viridis æris *ana uncias tres.*
Misce fiat Emplastrum.
Detersivum, vulneribus, & ulceri-
bis sanandis; item clavis & ver-
rucis abigendis, idoneum.

EMULSIO.

Emulsio, Emulsum est medicamen-
tum internum aqueo - oleolum,
colore & consistentiâ lacti simile,
ex partibus vegetabilium oleosis
cum menstruo aquoso tritis, &
expressis præparatum. Præscrip-
tionis est frequentis, in morbis
humectantia, lubricantia, de-
mulcentia, temperantia &c. po-
stulantibus. Cæterum
Emulsiones ob facilem, citamque
corruptionem in officinis asser-
vari nequeunt; ad magistrales
igitur compositiones pertinent;
Nonnullas tamen apponere vi-
sum est.

EMULSIO ANALEPTICA.

REC. Amygdalarum dulcium re-

EMULSIO.

cens excorticatarum
drachmas sex,
Nucleorum Pinearum non
rancidarum *drachmas*
duas semis,
Perficorum,
Pistaciorum *ana*
drachmam u-
nam semis,

Aquæ Borraginis,
Buglossi *ana uncias*
tres,
Ceraforum nigro-
rum,
Florum Tiliæ *ana*
uncias duas.

Fiat secundum artem Emulsio, co-
letur & exprimatur, addendo

Aquæ Perlarum *unciam se-*
mis,

Naphæ *drachmam u-*
nam,

Syrupi Limonum *unciam u-*
nam.

In debilitatibus variis, ad reparandas
vires sæpe aliquot uncia bibantur.

EMULSIO ANODYNA

&

TEMPERANS.

REC. Amygdalarum dulcium re-
cens excorticatarum *un-*
ciam semis,

Seminis Papaveris albi *drach-*
mas duas,

Aquæ Portulacæ *uncias*
quatuor,

Florum Tiliæ *un-*
cias duas.

Fiat lege artis Emulsio, colaturæ
addantur

Syrupi de Sempervivo,
Papaveris albi *ana*
drachmæ tres,

Nitri crystallifati *grana sex.*

In doloribus variis, æstu, somno im-
pedito, singulis horis, vel biborio pars
tertia ingeri potest.

EMUL-

EMULSIO.

EMULSIO EXTERNI USUS PRO
FRONTALI.

REC. Seminis Papaveris albi,
Nucleorum Perficorum *ana*
unciam semis,
Aquæ Verbenæ *uncias tres,*
Rutæ,
Nymphææ *ana uncias*
duas.

Fiat Emulsio, cui addi possunt
Spiritus Vini Camphorati
drachmæ duæ.

Lintea complicata hac Emulsione
humectantur, tepidè fronti ap-
plicantur, quibus nonnunquam
dolor capitis aliquanto compes-
cere se finit.

EMULSIO LUBRICANS DIU-
RETICA.

REC. Radicum Althææ,
Graminis *ana un-*
ciam semis.

Incisæ coquantur cum
Aquæ fontanæ purissimæ
libra una semis,
per quadrantem horæ, dein super-
fundantur

Florum Malvæ,
Verbasci *ana pugilli*
tres;

post refrigerationem leviter expres-
sum cum

Seminum Malvæ,
Papaveris albi *ana*
drachmis
duabus

Fiat Emulsio, cui addantur
Nitri depurati *scrupulus semis,*
Syrupi de Althæa Fernelii
uncia una semis.

Dosis aliquot uncia singulo bihorio
in ardore urinæ, nephritide, aut
calculo.

EMULSIO VIOLATA MYNSICHT.

REC. Amygdalarum dulcium re-
cens excorticarum *un-*
ciam unam semis,
Seminum Violarum *drach-*
mas tres,
Papaveris albi
drachmam unam
semis.

Pars II.

ENEMA.

97

Contundantur cum
Aquæ Nymphææ,
Lactucæ *ana uncis*
sex,
Violarum *libra una.*

Expressæ Emulsioni addatur
Julepi violati *uncia una semis.*
Cujus unciaë quatuor ad sex subinde
refrigerandi, humectandi ergo, nec
non ad dolores mitigandos, somnum
conciliandum in febribus malignis,
etiam in nephritide bibi possunt.

E N E M A.

Enemata in officinis nulla ordina-
riè jam parata prostant, sed ne-
cessitatis tempore, secundum me-
dici formulam magistralem, præ-
parari demum solent. Cum au-
tem medico plures ægros, pau-
cas intra horas, invadere coacto,
valde commodum sit, loco inte-
græ compositionis, tantum scri-
bere titulum ejus, aliquas ad
frequentem usum accommoda-
tas, huic operi inseruisse, haud in-
utile existimavimus.

ENEMA ANODYNUM,

&

BALSAMICUM.

REC. Lactis dulcis ebullientis cum
Florum Meliloti,
Verbasci,
Hyperici *ana pu-*
gillis duobus

Expressi *uncias octo,*
Vitellum ovi recentem *Nº.*
unum,

Balsami Peruviani,
Terebinthinæ Venetæ vi-
tello ovi solutorum
ana drachm. duas,

Olei Liliorum alborum,
Mellis rosati *ana unciam u-*
nam.

Misceatur, & detur cum vesica,
post repetitam purgationem alvi,
in dysenteria injiciendum, & pro
re nata repetendum.

ENEMA EJUSDEM VIRTUTIS.

Pharm. extemp. Full

REC. Jusculi intestinorum Verve-
cis *uncias decem,*
Vitel-

B b

Vitellos ovorum No. duos,
Balsami Locatelli *unciam u-*
nam,

Sevi ovini *uncias duas.*

Misc. Itidem injicitur in dysente-
ria.

ENEMA EMOLLIENS

&

LAXANS.

REC. Radicis Liliorum alborum
drachmas duas,

Herbarum Althææ,
Violarum *ana*
manipulum se-
mis,

Florum Verbasci,
Chamomillæ *ana*
pugillos duos.

Concisa coquantur cum
Aquæ fontanæ *unciis duode-*
cim.

Colaturæ *unciarum novem* addan-
tur

Olei Lini *uncia due,*
Mellis Mercurialis *uncia u-*
na,

Salis Seidschizenfis *drach-*
mæ due.

Conducit in alvo segniore.

ENEMA five CLYSTER INTES-
TINA EMOLLIENS, APERIENS,
ANODYNUS.

Gaub. Meth. conc. form.

REC. Herbarum Malvæ cum Flo-
ribus,

Parietariæ,
Hederæ terrestris
ana manipulum
unum,

Seri Lactis recentis *quan-*
tum sat.

Coquantur spatio *unius quadrantis*
horæ, colaturæ expressæ *uncia-*
rum novem addatur

Olei Lini *uncia una,*
Nitri purissimi *drachma se-*
mis.

Manè & vespere injiciendum ad cal-
culum minuendum, & sabuli in ne-
phritide expulsionem promoven-
dam.

EPITH. ESSENTIA.

ENS VENERIS BOYLËI,
vid.
SULPHUR VITRIOLI
ANODYNUM.

*
EPITHEMATUM

Materiam cum ficcorum, five soli-
dorum, tum liquidorum & hu-
midorum aut mollium præbent
omnis generis solida & liquida,
vel intermedia tam officinalia,
quàm magistralia, quæ, cum
necessaria sunt, ex tempore com-
poni solent.

E S S E N T I A

Est Medicamentum spirituosum
tam internum, quàm exter-
num, fluidum, coloris varii &
ad varias indicationes, in plu-
ribus morbis accommodatum.
Internè plerumque *guttatim,*
cum conveniente vehiculo, assu-
mitur, & haud magnâ proin quan-
titate præscribitur.

ESSENTIA ABSINTHII
COMPOSITA.

REC. Comarum Absinthii vulgaris
unciam unam,

Radicum Zedoariæ *unciam*
semis,

Caryophyllatæ
drachmas duas,

Foliorum Cardui benedicti,
Florum Centaurii minoris
ana unciam semis,

Corticum Aurantiorum,
Citri *ana drachmas*
duas,

Caryophyllorum aromatico-
rum *drachmam unam.*

Incisis & contusis affunde
Spiritus Vini rectificati *li-*
bram unam.

Stent in digestionem, per dies quatuor,
in vase optimè clauso; postea
prælo exprimantur, expressum
per chartam bibulam filtretur,
& fervetur.

Stomachica & Carminativa est.

Datur à drachma dimidia ad inte-
gram.

ESSENTIA ABSINTHII SIMPLEX.

REC. Summitatum Absinthii flori-
darum

darum & ad maturitatem proximè accedentium, cum foliis minoribus, in umbra Siccatarum *uncias quatuor*, Spiritûs Vini rectificati *libras duas*.
post digestionem exprimantur, expressum aliis superaffundatur
Absinthii *unciis duabus*,
atque post sufficientem digestionem exprimantur & filtrentur.
Vires absinthii habet stomachicas, carminativas, anthelminticas.
Dosis drachma una ex vino.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA
STHALII.

REC. Radicum Angelicæ,
Imperatoricæ,
Helenii *ana unciam unam*,
Carlinæ,
Hirundinariæ,
Pimpinellæ albæ
ana unciam unam semis,
Herbæ Scordii *uncias tres*,
Spiritûs Vini rectificati *libras duas semis*.
Post sufficientem extractionem exprimantur & per filtrum trajecta essentia fervetur.
Medicamentum est verè polychrestum; ventriculum roborat, flatus dissipat, urinam & transpirationem promovet; hinc in omnibus fere morbis, febribus, etiam malignis, catarrhalibus & intermittentibus, lymphæ & sanguinis vitiis prodest.
Commendatur à guttis quadraginta ad quinquaginta.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA
TEMPERATA
five
SIMPLICIOR STHALII.

REC. Radicum Pimpinellæ albæ,
Hirundinariæ *ana uncias tres*,
Herbæ Scordii *uncias duas*.
Incisa infundantur & extrahantur

Spiritûs Vini rectificati *libris tribus*.
Exprimantur & filtrentur atque *tertia pars* Spiritûs per destillationem è balneo maris evocetur, residuum fervetur.
Temperatior & mitior est ordinariâ, ideoque secure, etiam ad exæstuationem sanguinis prona, dari potest.
Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ESSENTIA AMARA.

REC. Herbarum Tanacetii *unciam unam*,
Scolopendrii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Radicum Gentianæ,
Lapathi acuti *ana drachmas tres*,
Corticum Aurantiorum recentium viridum *unciam semis*.
Incisa macerentur in
Spiritûs Vini tartarifati *unciis duodecim*.
Post sufficientem extractionem exprimantur & expressum per chartam filtretur.
Hæc si cum limaturæ martis purissimæ in pollinem tritæ *uncia dimidia* præparetur, erit simul Martiata Essentia & magis corroborans.
Digestionem promovet, ventriculum roborat, flatus dissipat, vermes necat.
Dari potest à guttis quinquaginta ad septuaginta ex vino.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

REC. Ambre veræ griseæ *scrupulum unum*.
Immittatur phialæ & lenissimo igne carbonum liquetur, affundantur postea
Liquoris anodynii pariter calefacti *uncia duæ*.
addantur

Moschi orientalis grana quatuor.
Servetur usui.

Analepticum, cordiale & cephalicum est medicamentum. Commendabile in apoplexia, vertigine, memoria confortanda; additur etiam aphrodisiacis.

Dosis guttæ viginti ad quadraginta.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

REC. Ambrae griseae drachmam unam,

Moschi in Spiritu Rosarum soluti scrupulum semis,

Olei Cinnamomi destillati guttas quinque,

Sacchari albissimi uncias duas.

Misce, & asserva in vase vitreo benè clauso.

Analepticum est & cum Pulvere cordiali sive Elæosaccharo Cinnamomi Cinnabarino mixta in apoplexia serosa & aliis capitis morbis, ambram & moschum nauseantibus dari potest. Trageis etiam additur.

Dosis à scrupulo semis ad scrupulum unum.

ESSENTIA ANGELICÆ.

REC. Radicis Angelicæ uncias tres, in

Spiritûs Vini optimè rectificati uncias quindecim

Macerentur per aliquot dies, ut extrahatur Essentia, filtranda & fervanda.

Habet vires Angelicæ radicis alexipharmacas, stomachicas, diureticas, carminativas.

Dosis à drachma semis ad scrupulos duos.

ESSENTIA ANODYNA OFFICINALIS.

REC. Extracti Opii aquâ fontanâ parati unciam unam,

Aquæ Cinnamomi Spirituosæ uncias novem.

Post sufficientem digestionem filtrentur.

Dolores sedat, somnum conciliat & easdem, quas Laudanum opiatum, virtutes possidet.

In scrupulo uno, duo sunt grana opii. Dosis guttæ quinque, decem, quindecim ad viginti.

ESSENTIA ANODYNA

five

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAM.

REC. Extracti Opii aquosi uncias duas,

Croci optimi unciam unam,

Caryophyllorum aromaticorum,

Cinnamomi ana drachmam unam.

Pulverifata infundantur in

Vini Hispanici albi libra una.

Digerantur per tres vel quatuor dies. Colatura servetur ad usum.

Ejusdem quidem cum priore virtutis, sed multò calidior, ab adultis à guttis sex, octo ad quindecim in vehiculo aquoso sumi potest.

Uncia una continet opii scrupulos quatuor, drachma una grana decem & croci grana quinque.

ESSENTIA ANTARTHRITICA

J. M. HOFFMANN

fine

OPIO.

REC. Lumbricorum terrestrium præparatorum uncias tres.

His affunde

Olei five Liquoris Salis Tartari per deliquium uncias duas;

stent in vitro benè clauso per viginti quatuor horas, postea affundantur

Spiritûs Vini rectificatissimi uncia duodecim.

addantur

Castorei drachmæ duæ,

Croci drachma una.

Stent denuo in digestionem per tri-duum. Liquor tinctus per chartam emporeticam filtratus fervetur.

Dosis

Dosis guttæ quinquaginta ad septuaginta.

ESSENTIA ANTARTHRITICA
ejusdem cum
O P I O.

REC. Lumbricorum terrestrium
præparatorum *uncias duas*,
Radici Cynoglossæ *unciam*
unam,
Castorei *drachmas duas*,
Crocii optimi *drachmam se-*
mis,
Opium *drachmam unam*.

Affunde tritis
Spiritus Vini rectificati *li-*
bram unam,

post sufficientem extractionem &
filtrationem adde
Spiritus Cochleariæ *unciam*
unam.

Ambæ commendantur in doloribus
arthriticis, aliisque scorbuticis &
spasmodicis mitigandis; adicterum,
asthma convulsivum, retentio-
nem urinae à guttis quindecim
ad triginta. Uncia una habet
Opium circiter grana quinque.

ESSENTIA ANTHYDROPICA
HOFFMANNI.

REC. Radicum Hirundinariæ,
Bryoniæ *ana*
drachmas sex,
Herbæ Absinthii,
Florum Sambuci *ana unciam*
semis,
Aloës Socotrinæ *drachmas*
sex,
Myrrhæ *drachmam unam*,
Gummi Ammoniaci *drach-*
mas tres,
Macis,
Caryophyllorum aromatico-
rum *ana drachmas duas*,
Millepedum,
Lumbricorum terrestrium
ana drachmam unam semis,
Crocii *drachmam unam*,
Salis Ammoniaci,
Tartari *ana drachmas*
duas.

Incisis & contusis superfundantur
Aquæ Florum Sambuci *uncie*

quatuor,
digerantur per aliquot horas, po-
stca addatur

Spiritus Vini optimè de-
phlegmati *libra una semis*.
Fiat lento calore digerendo *Essentia*.
In Cachexia, Leucophlegmatia &
Hydrope propinanda manè ad scru-
pulos duos.

ESSENTIA ANTASTHMATICA
&
ANTHYDROPICA. A.

REC. Radicum Scillæ recens præ-
paratarum *unciam*
semis,
Iridis Florentinæ,
Millepedum recens præpara-
torum *ana drachmas*
duas,

Spiritus Salis Ammoniaci
anifati *uncias quatuor*.
Misce digere, filtra & ad usum ferva.
In asthmate humido & hydrope à
scrupulo uno ad duos semel aut bis
de die cum aqua Alkekengi & Ta-
raxaci & Syrupo de Erysimò L O-
BELII aut simili alio propinari
poteft.

ESSENTIA ALIA

ejusdem

VIRTUTIS & USUS. B.

REC. Radicum Scillæ recens præ-
paratarum *unciam*
semis,
Zingiberis,
Cardamomi minoris *ana scru-*
pulum unum,
Gummi Ammoniaci Aquæ
asthmaticæ *sufficiente*
quantitate soluti drach-
mam unam semis,

Arcani Tartari *drachmas duas*.
Mixta & Contusa cum
Spiritus Aurantiorum *f. q.*
digerenda & extrahenda *Essentia*,
cujus *scrupulus unus* aut *drachma*
semis & ultra manè & vesperi
cum grato quodam vehiculo in
dictis morbis pro re nata condu-
cere potest.

ESSENTIA ANTISCORBUTICA.

REC. Radicum Ari,
 Lapathi acuti *ana*
unciam unam,
 Herbarum Trifolii fibrini,
 Sedi vermicula-
 ris,
 Centaurii mino-
 ris,
 Seminis Lapathi acuti *ana*
drachmas sex,
 Corticum Winterani *uncias*
duas,
 Fraxini,
 Sassafras,
 Myrrhæ electæ *ana* *unciam*
unam,
 Salis Tartari *unciam unam*
semis.

Incisa & Contusa infundantur in
 Spiritûs Cochleariæ *libris tri-*
bus;

digerantur per aliquot dies, po-
 stea exprimantur, expresso ad-
 dantur

Essentia Succini *uncia tres,*
 Spiritûs Vitrioli dulcis *uncia*
una semis.

Digerantur & filtrentur.

Vires sunt antiscorbuticæ, inciden-
tes, attenuantes, resolventes, diu-
reticæ, stomachicæ.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA BALSAMICA

F. HOFFMANNI,

vid.

ELIXIR BALSAMICUM.

ESSENTIA BALSAMICA GMELINI.

REC. Corticum Aurantiorum,
 Citri *ana* *uncias*
duas,
 Cinnamomi,
 Nucis Moschatæ *ana* *drach-*
mas quinque,
 Caryophyllorum aromati-
 corum *drachmas duas,*
 Salis Ammoniacy *uncias quin-*
decim,
 Cinerum clavellatorum *tan-*
tundem,

Spiritûs Vini non dephleg-
 mati *libras quatuor.*

Destillentur ex cucurbita &

Spiritûs volatilis *libræ duæ*
semis

proliciantur, in quibus infundan-
 tur

Corticum Aurantiorum,
 Citri *ana* *uncia*
tres.

Digerantur post octiduum, postea cla-
rum à spisso per inclinationem va-
sis separetur. Residuum exprima-
tur & post filtrationem claro ad-
misceatur.

Stomachica & Carminativa est.

Dosis guttæ triginta, quinquagin-
ta.

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

REC. Balsami Peruviani optimi
unciam semis, cum

Spiritûs Vini optimè de-
 phlegmati *unciis tribus,*

per dies aliquot loco tepido di-
 gere, essentiam extractam
 per bibulam cola ac serva.

Balsamicum hoc & valde calefaciens
medicamentum non facile internè,
potius externè in vulneribus &
ulceribus tantum adhibendum est.

ESSENTIA BENZOES COM-
POSITA.

REC. Benzoës electæ pulverisatæ
unciam unam,

Styracis Calamitæ *unciam*
semis,

Balsami Peruviani *drachmam;*
 affunde

Spiritûs Vini rectificati *un-*
cias octo;

digerantur & post sufficientem
 solutionem filtrentur.

Nota. Balsamum Peruvianum cum
 pulvere Benzoës commi-
 fceri debet.

Usus externus est cosmeticus, inno-
cens. Aquæ calidæ instillata red-
dit eam lacteam, quæ nitorem gra-
tum cuti conciliat & eam mollem
servat.

Inter-

Internè pectorale præbet medicamentum non contemendi usûs.

ESSENTIA BENZOES SIMPLEX.

REC. Florum Benzoës drachmas tres,

Spiritus Anisi uncias tres.

Digere lenissimo calore atque solutio sive Essentia flavi coloris fervetur.

Pectoralis, stomachica, carminativa & alexiterica est.

Dosis guttæ octo ad viginti.

ESSENTIA CARDAMOMI.

REC. Cardamomi minoris in pulverem triti uncias tres, affunde

Spiritus Vini rectificatissimi uncias sedecim.

Digerantur, exprimatur & filtretur essentia.

Flatus potenter discutit, ventriculum & cerebrum confortat, urinam movet.

Dosis drachma semis ad drachmam unam cum vehiculo idoneo.

ESSENTIA CARDUI BENEDICTI.

Modo præparationis, dosi & virtutibus cum Essentia Absinthii simplice convenit.

ESSENTIA CARMINATIVA WEDEL.

REC. Radicum Zedoariae uncias quatuor,

Carlinae,

Calami,

Galangae ana uncias duas,

Florum chamœmeli Romani,

Seminum Anisi,

Carvi ana unciam unam,

Caryophyllorum aromaticorum,

Baccarum Lauri ana drachmas sex,

Macis unciam semis,

Corticum Aurantiorum unciam unam.

Concisa & contusa grosso modo macerentur in

Spiritus Corticum citri libris quatuor semis,

Nitri dulcis uncias duabus semis,

per sex dies, expressa & filtrata essentia usui fervetur.

Vires sunt stomachicae, carminativæ & diureticae.

Dosis drachma dimidia ad scrupulos duos.

ESSENTIA CASTOREI.

REC. Castorei orientalis veri, minutim incisi uncias tres, Spiritus Vini rectificati uncias quindecim.

Per octiduum macerentur, exprimantur & postea filtretur essentia.

Commendatur internè ad affectus spasmodicos, hystericos & colicos, etiam ad odoratum præbetur mulieribus atque clysteribus in colica hysterica ad drachmam integram addi potest.

Internè datur à guttis triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA CASTOREI CARMINATIVA.

REC. Castorei orientalis veri, minutim incisi unciam unam, Croci Austriaci unciam semis, Liquoris anodynii mineralis uncias sex.

Digerantur per viginti quatuor horas; exprimatur & filtretur Essentia.

Efficax est remedium antispasmodicum, anodynum, cardiacum, ubi nullus æstus est. Conducit imprimis ad vomitum, colicam, dolores menstruos, lipothymias & languores mulierum hystericarum.

Internè dari potest ad guttas triginta, quadraginta, in graviore casu cum quarta parte Laudani liquidi SYDENHAMI remixta. Prodest etiam externè naribus adstricta.

ESSENTIA CATECHU,

vid.

ESSENTIA TERRÆ CATECHU.

ESSENTIA CENTAURII
MINORIS.

Ut essentia Absinthii simplex spiritu vini optimè rectificato parari solet.

Stomachica est & anthelmintica atque in febribus intermittentibus conducit.

Ad drachmas duas data alvum movere compertum est.

ESSENTIA CEPHALICA.

REC. Radicis Calami aromatici
drachmas tres,

Herbarum Betonicæ,
Mari veri,
Salviae,

Florum Lavendulæ *ana*
drachmas duas,

Ligni Aloës ponderosi,
Santali citrini odoratissimi,

Corticum Culilawan *ana*
drachmas tres,

Cinnamomi acuti,

Nucis Moschatæ,

Cubebæ,

Cardamomi minoris,

Caryophyllorum *ana* *drachmas duas.*

Incisis & contusis superaffundantur

Aquæ apoplecticae spirituosæ,

Elixir vitæ Matthioli incompleti *ana* *uncia octo.*

Digerantur & sufficienter extracta exprimantur & filtrentur.

Senibus & phlegmaticis conducit, quibus cerebrum & ventriculum confortat; ad colicam flatulentam, eructationes & cardialgiæ valet atque essentiis vel elixiriis stomachicis admisceri potest.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis.

ESSENTIA CHINÆ CHINÆ,

five

CORTICIS PERUVIANI SIMPLEX.

REC. Corticum Chinae Chinae
pulverifatorum *uncias tres,*

Salis Tartari *drachmas duas,*
Spiritus Vini rectificati *uncias duodecim.*

Digerantur aliquamdiu, postea essentia benè saturata expressa filtretur.

Præfertur usus Corticis Peruviani in substantia, tam ad febres inprimis intermittentes sanandas, quam ad tonum partium roborandum.

Dosis interim, hujus essentiae guttae sexaginta ad octoginta cum vehiculo ad ægri circumstantias accommodato esse potest.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM SPIRITUOSA.

REC. Corticum Aurantium ab interiori albumine separatorum *libram unam;*

affundantur

Spiritus Vini rectificati *libra tres semis.*

Post sufficientem extractionem exprimantur & per bibulam filtrentur.

Egregium est stomachicum, carminativum & tonicum.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM, cum VINO MALVATICO.

REC. Vini Malvatici *libram unam semis,*

Flavedinis Corticum Aurantium ficatorum *uncias tres.*

Macerentur per biduum, colentur & filtrentur.

Stomachica, tonica & carminativa est.

Dosis uncia semis ad integram.

ESSENTIA CORTICIS CASCARILLÆ.

REC. Corticum Cascarillæ griseæ,
& resinosa uncias quatuor.
In pulverem grossum tritis affunde
Spiritus Vini rectificatissimi
libram unam semis.

Digere per quatrimum, filtra &
serva.

Tonum viscerum confirmare, fibra-
rumque dolentes constricturas miti-
gare potest.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta
cum julapio aut alio vehiculo ido-
neo.

ESSENTIA CULILAWAN

Carere possumus, inquilinis, æquè
præstantibus auxiliis contenti.

ESSENTIA CROCI.

REC. Croci optimi unciam unam,
Spiritus Vini rectificati li-
bram unam.

Misce & digere q. f. ut fiat tinctu-
ra saturata, ad usum servanda.

Virtutem habet subanodynam, hyste-
ricam, pectus & cor corroboran-
tem.

Dosis guttæ quinque, decem ad
duodecim in vehiculo conducibili.

ESSENTIA DULCIS.

REC. Salis Tartari partem unam,
Aceti acerrimi è vino gene-
roso partes tres.

Misce, destilla è retorta in cineribus
usque ad oleitatem; superfunde
rursus.

Aceti acerrimi partes tres,
& quidem quatuor aut quinque vi-
cibus procedendo uti supra, do-
nec acetum æquè acre transcen-
dat ac affusum fuerat. Tum af-
funde

Spiritus Vini rectificatissimi
partes sex.

Destilla lege artis, idque tribus vi-
cibus superaffundendo Volatilis
partes sex & serva pro usu.

Primâ fronte laboriosus occurret hic
Pars II.

processus sub eodem titulo traditus
à Pharmac. Wirt. sed minori la-
bore haud absolvendus, numerando
preparationem terræ foliatæ tarta-
ri. Ut ut menstruum Spiritus
vini cum Alumine ab aliis commen-
datur, tantæ securitatis esse non
videtur, ut pro menstruo venditari
possit; hinc è re visum fuit, datam
formulam substituere.

Omni ætati & sexui, medicamina nau-
seanti commendabilis hæc essentia
ob temperantissimam indolem suam
& virtutem analepticam.

Dosis guttæ duodecim ad triginta-
quingenta.

ESSENTIA FULIGINIS CLAUDERI.

REC. Cinerum clavellatorum pu-
rissimorum uncias sex,
Salis Ammoniaci unciam u-
nam.

Solve separatim & quidem Cineres
clavellatos in libris duabus & Sal
Ammoniacum in libra una aquæ
fontanæ puræ vel pluviae; li-
quores salinos separatim per
chartam emporeticam filtra, fil-
tratos commisce atque super-
funde

Fuliginis ex camino splen-
dentis pulverisatæ unciis
duabus.

Digere in vitro probè clauso, per
aliquot dies, postea liquorem
tinctum, per chartam bibulam fil-
tratum, serva.

Liquor salinus est, oleo fuliginis im-
pregnatus & præbet medicamen-
tum resolvens atque excretiones
omnis generis promovens. In mor-
bis chronicis, febre quartana, icte-
ro, cachexia, fausto cum successu
adhibenda.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexa-
ginta.

ESSENTIA FUMARIÆ.

Paratur ut Essentia Absinthii.

Ad sanguinis & lymphæ vitia com-
mendatur.

Dosis guttæ quinquaginta ad octo-
ginta.

ESSENTIA GALANGÆ.

REC. Radicis Galangæ minoris minutim incisæ *uncias duas,*

Spiritûs Vini rectificati *uncias octo.*

Extrahatur essentia leni calore, exprimatur & per chartam filtretur.

Commendatur internè ad ventriculûm confortandum & humores viscidos resolvendos : externè ad cariem osium, membra tabida & paraly sin linguæ.

ESSENTIA GENTIANÆ.

Fit eodem modo, quo Essentia Radicis Angelicæ.

Amarum quidem, præstantissimum tamen stomachicum, tonicum, anthelminticum & antifebrile est medicamentum.

Datur à guttis quinquaginta ad octoginta.

ESSENTIA HYPERICI.

REC. Florum Hyperici *uncias quatuor,*

Spiritûs Vini rectificati *libram unam & uncias tres.*

Digerantur per *triduum*, postea exprimantur & filtrentur.

Certior est virtus vulneraria hujus remedii, quàm antimelancholica & anthelmintica.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta, sexaginta in infuso aut decocto, aliòve congruente vehiculo.

ESSENTIA LEVISTICI.

REC. Radicis Levistici *uncias duas,*
Seminis ejusdem *unciam unam,*

Incisa & contusa infundantur in Spiritûs Vini *unciis decem.*

Digerantur & post sufficientem extractionem exprimantur atque essentia per chartam filtrata fervetur.

Vinû habet carminativam, alexipharmacam & diureticam in hydrope,

leucophlegmatia & flatulentis pro re nata in vehiculo conducibili.

Dosis guttæ viginti, triginta ad quatuoraginta.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS SIMPLEX.

REC. Corticum Ligni Sassafras *unciam unam semis,*

Spiritûs Vini rectificati *uncias octo.*

Macerentur per *triduum*, postea filtrentur & ferventur.

Anticatatarrhalis est & ad vitia lymphæ & sanguinis commendatur.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS COMPOSITA.

REC. Corticum Ligni Sassafras *uncias quatuor,*

Salviæ nobilis *uncias duas,*
Nucis Moschatae *unciam unam,*

Cinnamomi *unciam semis,*
Anisi stellati *drachmas tres,*

Spiritûs Vini rectificati *libras duas.*

Digerantur per *triduum*, exprimantur; expressum filtretur & fervetur.

Ad catarrhales frigidos affectus, arthritidem, flatulentias & scabiem humidam laudari meretur.

Dosis guttæ quinquaginta ad septuaginta quinque.

ESSENTIA LIGNORUM.

REC. Ligni Sassafras cum Cortice *uncias duas,*

Sancti *uncias tres,*
Rhodii *unciam semis,*

Santali rubri,
citriani *unciam unam.*

Incisa & in Spiritûs vini *libris duabus* infusa,

per *octiduum* digerantur; postea exprimantur & filtrentur.

Ad massam humorum purificandam, ad gonorrhœam etiam & luem veneream inservit.

Dosis

Dosis drachma semis ad integram,
in vehiculo conveniente.

ESSENTIA LUMBRICORUM
TERRESTRIMUM.

REC. Lumbricorum terrestrium
exsiccatum, in pulve-
rem tritorum *uncias qua-*
tuor,

affunde

Olei Tartari per deliquium
unciam unam.

Misceantur, addatur

Spiritûs Vini rectificati li-
bra una.

Digerantur & filtrentur.

Diaphoretica est & diuretica. Con-
venit in artbritide, scorbuto &
ictero.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexa-
ginta.

ESSENTIA MACIS.

REC. Macis *uncias quatuor,*
Liquoris Nitri fixi *uncias*
duas,
Spiritûs Vini rectificatissimi
libras duas.

Digerantur; filtretur essentia.

Vires exerit Carminativas; igitur
in cruditatibus acidis & viscidis,
colica inde nata, anorexia atque
dyspepsia propinari possunt in ido-
neo vehiculo guttæ viginti ad
quadraginta.

ESSENTIA MARTIATA APERITIVA.

REC. Radicum Galangæ,
Calami aromatici,
Zedoariæ,

Cinnamomi acuti *ana drach-*
mas duas,

Florum Hyperici,
Tanaceti *ana drach-*
mam unam.

Minutim incisus superaffundan-
tur

Spiritûs Vini rectificati *un-*
ciæ sex.

Digerantur leni calore & post suf-
ficientem extractionem expri-

matur & filtretur essentia.

Durante digestionem

REC. Spiritûs Vitrioli *drachmas*
sex,

Infundantur

Limaturæ Martis purissimæ
drachmæ tres.

Digere, filtra & misce cum præ-
cedente.

Ut Essentia hæc, Tinctura Martis
aromatizata sit, solvens solvendo
fortius esse debet. Lienosis &
atonîa viscerum laborantibus haud
inutile est remedium, nec non iis,
qui ad vermes proni sunt.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA MILLEFOLII.

REC. Millefolii *uncias tres,*
Spiritûs Vini rectificati *un-*
ciæ sedecim.

Infundantur & post digestionem
per *triduum*, exprimantur; in
expresso denuo

Millefolii *unciæ duæ*
macerentur & post sufficientem
extractionem expressa Essentia
per chartam bibulam filtretur.

Commendatur ad motus hæmorrhoi-
dales moderandos, ad menstrua im-
modica, nephriticorum vomitus,
cæterosque morbos viscerum cum
vena portæ connexorum. Cum
Essentia Croci mixta, dolores &
tormina, à quibus menstruata sæ-
pius vexantur, mitigat.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexa-
ginta quinque.

ESSENTIA MILLEPEDUM.

REC. Millepedum in pulverem fa-
tis tenuem tritorum *un-*
ciæ tres.

Irrorentur

Olei Tartari per deliquium
drachmis duodecim,

postea statim affundantur

Spiritûs Vini rectificati *un-*
ciæ decem.

In vase benè obturato digerantur
per

per triduum; Effentia filtrata fervetur ad usum.

Vires easdem, quas millepedes habent, possidet, potenter resolvit, urinam pellit; hinc in ictero, asthmate & obstructionibus viscerum utiliter adhibetur.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis.

ESSENTIA MYRRHÆ.

REC. Myrrhæ rubrae electæ un-
ciæ duas,

tritæ affunde

Spiritûs Vini rectificatissimi
unciæ decem.

Digere, filtra & ferva.

Alexipharma est, balsamica & anthelmintica: Sanguinem valde expandit, ejusque motum accelerat, datur igitur ad menstrua pellenda.

Externus usus est vulnerarius, ad ulcera purganda & consolidanda.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA MYRRHÆ ALCALISATA.

REC. Myrrhæ electæ in pulverem
tritæ libram dimidiam,
Salis alcali, five
Cinerum clavellatorum un-
ciæ octo,
Aquæ fontanæ libram unam
semis.

Digerantur per sex vel octo dies, postea aqua ex cucurbita, lento igne, ad mellis consistentiam abstrahatur; residuo autem unciæ viginti Spiritûs Vini rectificati affundantur, atque Effentia per digestionem extrahatur, quæ filtretur.

Myrrha magis recluditur ope alcali, quod & essentiam saturatiorem reddit. Cum præcedente ejusdem est virtutis; ad vulnera verò non facile adhiberi debet propter alcali, quod dolores excitat.

ESSENTIA PIMPINELLÆ ALBÆ.

Spiritu Vini optimè rectificato, Effentiæ Angelicæ instar, paratur.

Diaphoretica, alexipharmaca & di-

retica est, in torminosis, colicis affectibus & lymphæ vitii corrigendis convenit.

Dosis à guttis quadraginta ad septuaginta.

ESSENTIA PINI.

REC. Extracti turionum pini aquâ
fontanâ parati uncias tres,
Spiritûs Cochleariæ libram
unam.

Fiat digerendo essentia.

Scorbuticis convenit atque arthriticis commendatur.

Dosis guttæ sexaginta ad septuaginta quinque.

ESSENTIA POPULI VULNERARIA.

REC. Oculorum Populi arboris
recentium libram semis,
Spiritûs Vini rectificatissi-
mi libram unam semis.

Digerantur per aliquot dies, exprimantur & filtretur essentia, cui adde

Essentiæ florum Hyperici
libram semis.

atque post digestionem Spiritûs dimidia pars abstrahatur in balneo, liquor residuus fervetur.

Commendari meretur hæc Essentia, non solum externè in vulneribus, sed etiam internè in ulceribus pulmonum, renum, aliarumque partium, alvi fluxione diuturna, gonorrhœa & fluore albo conducit.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta & ultra.

ESSENTIA SCILLÆ.

REC. Salis tartari unciam semis,
Aceti scillitici per infusio-
nem aceto destillato pa-
rati & probè saturati un-
ciæ duodecim.

Misce & evaporetur acetum leni igne ex vase figulino probè vitreato ad mellis spissitudinem. Massa salina residua dissolvatur in Spiritûs Vini rectificatissimi
unciis sex.

Stent in digestionem per aliquot dies, postea clarum à spisso, per inclina-

clinationem vasis separetur & fervetur.

Censetur antasthmatica, resolvens & diuretica atque hydropicis commendari meretur.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ESSENTIA SCORDII HERBÆ.

Ad modum Essentiæ Millefolii paratur.

Egregium est alexipharmacum & diaphoreticum.

Dosis guttæ sexaginta.

ESSENTIA SERPENTARIÆ VIRGINIANÆ.

REC. Radicum Serpentariæ Virginianæ minutim incisarum *uncias duas semis,*

affunde

Spiritûs vini rectificati *libram unam,*

post digestionem & sufficientem extractionem exprime & essentiam per chartam filtratam serva.

Alexipharmaca, stomachica, sudorifera & diuretica est; in febribus tam malignis, quam intermittentibus atque catarrhalibus feliciter adhibetur.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA SPICÆ INDICÆ.

REC. Spicæ Indicæ *unciam unam semis,*

Spiritûs vini rectificati *uncias sex vel septem.*

Stent in digestionem ad sufficientem extractionem, exprimatur & filtretur essentia.

Alexiterica, carminativa, diuretica & uterina est.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ESSENTIA STOMACHICA.

REC. Extracti Gentianæ,
Chamædryos,
Flavedinis Corticum Aurantium recentis,

Pars II.

Elæosacchari citri *ana unciam semis,*

Seminis Anisi *scrupulos duos,*
Croci optimi *scrupulum semis,*

Salis Tartari *drachmam unam semis,*

Spiritûs vini Gallici *uncias decem.*

Post debitam digestionem & filtrationem fervetur usui.

Guttæ sexaginta vel plures paulo ante prandium & cœnam cum tantillo vino veteri bono vel jusculo assumptæ sensim coctionem ventriculi promovent ac restaurant, appetitum augent, flatibus resistunt, at tamen præfertur apud nos ob mentis mitius elixir Fr. Hoffmanni aut simile ad ejus mentem præparatum aliud.

ESSENTIA STOMACHICA POLYCHRESTA.

REC. Piperis nigri *uncias duas,*
Cardamomi minoris *drachmas decem;*

Tritis affundatur

Liquoris terræ foliatæ tartari,
Spiritûs falis Ammoniaci *vinosi ana libra semis.*

Digerantur, exprimantur & filtrentur.

Potenter resolvit atque cacheticis, hydropicis & phlegmaticis conducit; cholericis verò & sanguinei ab ejus usu abstineant.

Dosis guttæ viginti ad triginta quinque.

ESSENTIA SUCCINI.

REC. Succini citrini optimè triti *uncias duas,*

Spiritûs Vitrioli dulcis, sive
Liquoris anodynii *uncias septem.*

Digerantur in vase optimè clauso, lenissimo calore, & post sufficientem extractionem, clarum à spisso, per inclinationem vasis separetur & in vitro epistomio clauso fervetur.

Optimam & balsamicam partem succini,

Ee

cini hæc essentia continet, saporis est amaricantis, odoris grati & pauca guttæ aliquot uncias aquæ sapore & odore imprægnant. Vires habet anticatarrhales, nervinas, uterinas, & balsamicas. Dosis guttæ quindecim ad viginti in frustulo sacchari albi vel vehiculo aquoso.

ESSENTIA SUCCINI ALCALISATA.

REC. Succini flavi subtilissimè pulverisati *unciam unam*,
Liquoris nitri fixi *quantum satis.*

Subigantur probè, donec fit massa spumida, quæ per *viginti quatuor* horas sibi relicta denuo terenda est cum liquore nitri fixi, eidemque in phialam immisssæ affundantur

Spiritûs vini rectificatissimi *uncia octo.*

Digestionis sufficientis vel coctionis ope extrahatur tinctura. Spiritus sub coctione in receptaculum stillans rursus affundatur & solâ digestionem demum essentia perficiatur, eaque colatura asservetur.

Saturatior est priori, sed propter alcali in vulneribus non convenit.

Dosis guttæ viginti ad triginta.

ESSENTIA TERRÆ CATECHU five JAPONICÆ.

REC. Terræ Catechu, five Japonicæ *unciam unam*,
Spiritûs Cydoniorum *uncias quatuor.*

Solutione per digestionem peractâ filtretur.

In hæmoptysi atque nimis hæmorrhagiis, diarrhæa, vel ubi adstrictione opus est, utiliter adhibetur.

Dosis à guttis triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA THERIACALIS.

REC. Radicum Angelicæ,

Calami,
Serpentariæ Virginianæ,

Spicæ Indicæ,

Herbarum Scordii,

Dictamni Cretici
ana drachmas tres,

Cinnamomi acuti,

Cardamomi minoris,

Cubebæ,

Caryophyllorum *ana drachmam unam semis,*

Opii Thebaici,

Croci orientalis *ana drachmam unam,*

Spiritûs Vini rectificati *libram unam.*

Digerantur ad sufficientem extractionem, exprimantur & filtretur Essentia pro usu.

Abs tali non magnopere differt spiritus theriacalis infra suo loco occurrens. Bezoardica est & stomachalis.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta.

ESSENTIA TRAUMATICA W.

REC. Radicum Tormentillæ,
Herbæ Saniculæ *ana unciam semis,*

Rorellæ,

Florum Hyperici,

Rosarum rubrarum
ana drachmas duas,

Sanguinis Draconis purissimi,

Terræ Catechu,

Myrrhæ electæ *ana unciam semis,*

Santali rubri *drachmas duas,*

Nucis Moschatæ *drachmam unam.*

In pulverem redacta misce & affusis Spiritûs Vini *unciis sedecim*

triduanâ leni digestionem, vase optime clauso, elice essentiam, quam post modicam expressionem serva filtratam.

Vulneraria est, in hæmoptysi, hæmorrhagia, uteri profluviis & diarrhæa adhibetur.

Dosis

ESSENTIA. EXTR.

Dosis guttæ quinquaginta.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

Ad normam Essentiæ Absinthii, Spiritu proprio abstractatio paratur. *Antiscorbutica, stomachica & antifebrilis est.*

Dosis guttæ quinquaginta.

ESSENTIA VALERIANÆ COMPOSITA.

REC. Radicum Valerianæ,
Serpentariæ Virginianæ ana un-
ciam unam,

Camphoræ drachmam unam;
infundantur in

Spiritûs Vini rectificati un-
ciis octo;

post sufficientem extractionem ex-
primatur & filtretur essentia.

Vires sunt alexitericæ, uterinæ &c.

Dosis guttæ quadraginta ad quin-
quaginta,

ESSENTIA VINCETOXICI.

Paratur ut essentia Angelicæ.

*Viribus cum essentia Pimpinellæ con-
venit & in eadem dosi exhibetur.*

EXTRACTUM ABSINTHII.

REC. Summitatum Absinthii in
umbra ficcatarum li-
bram unam,

concisæ macerentur in

Aquæ fontanæ libris sex

per quatrimum in loco calido, po-
stea leniter ebulliant, exprimantur,
liquor inde expressus & co-
latus coquatur, igne lento, ad ju-
stam extracti consistentiam.

*Vires habet Absinthii stomachicas, to-
nicas, anthelminticas, Essentiâ mi-
nus calefaciens, ei ergo præfere-
ndum.*

*Pilulis hoc, aliâque extracta sunt de-
stinata, quibus pro necessitate ad-
duntur pulveres.*

Dosis à scrupulo dimidio ad unum.

EODEM MODO

quoque reliqua extracta simplicia,
quæ in officinis nostris haberi

EXTRACTUM.

III

possunt, præparari solent, uti
sunt:

EXTRACTUM ABROTANI,
ARTEMISIÆ,
BORRAGINIS,
BUGLOSSI,
CARDUI BENEDIC-
TI,
MARIÆ,
CENTAURII MINO-
RIS,
CHAMÆDRYOS,
CHAMÆPITYOS,
CHAMOMIÆ,
COCHLEARIÆ,
FUMARIÆ,
HEDERÆ TERRE-
STRIS,
LUPULI,
MARRUBII ALBI,
MELISSÆ,
MENTHÆ,
PLANTAGINIS,
RUTÆ,
SCORDII,
TANACETI,
TRIFOLII FIBRINI,
VERONICÆ,

aliâque plura,

ex Herbis Florescentibus.

EXTRACTUM BELLIDIS minoris,
HYPERICI,
PAPAVERIS,
VERBASCI,

ex Floribus.

EXTRACTUM PINI,

SABINÆ ex summita-
tibus.

*Vires habent simplicium, è quibus
parata sunt & inserviunt confi-
ciendis pilulis.*

EXTRACTUM AGARICI.

REC. Rasuræ Agarici albi & levis
libram unam,

affundatur

Spiritûs Vini quantitas suffi-
ciens,

digerantur in vase vitreo arctissimè
clauso, per triduum, in loco cali-
do; postea exprimantur, expres-
sum filtretur & in balneo maris

E e 2

lentâ

lentâ destillatione Spiritus Vini evocetur, ac residuum extractum fervetur.

Agarici *libra una* ut plurimum largitur

Extracti resinosi *uncias quatuor.*

Resinosum est extractum, vi purgante admodum debili præditum; hinc nunquam solum, sed fortioribus purgantibus mixtum præscribitur. Dicatur affectibus pectoris, tussi & asthmatis.

Dosis à scrupulo semis ad grana quindecim.

EXTRACTUM ALOES GUMMOSUM vel AQUOSUM.

REC. Aloës focotrinæ optimæ *uncias sex,*
in pulverem redactæ affunde in cucurbita vitrea,

Aquæ fontanæ *libras duas.*

In vase tecto, loco calido *duos* vel *tres dies* digere, ut solvatur; interdum agitando, ut resinosa substantia cum fæcibus subsideat, solutionem decanta, residuo novam aquam affunde & modo antè dicto procede; etiam tertiâ vice, sumendo tamen duabus ultimis vicibus tertiam tantum aquæ partem. Solutiones decantatæ, & colatæ lento igne evapora ad extracti consistentiam. Longè securius, promptius & minori quantitate sumpta alvum laxat, quàm sola aloë focotrina. Per hanc depurationem separatur illa resinosa substantia, hæmorrhoidalium motuum sæpius causa, qui frequentiore aloëticorum usum sequuntur. Tale aloës extractum basis est pilularum Cel. *STAHLII* & pro basi pilularum laxantium adhiberi potest.

Grana octo sufficiunt pro alvo stimulanda, pro laxanda verò dari possunt grana quindecim, ad scrupulum unum.

EXTRACTUM ANGELICÆ.

REC. Radicum Angelicæ siccarum *libram unam,*

Incisis superfundantur

Spiritûs Vini rectificati *libræ quinque vel sex.*

Digerantur ad sufficientem extractionem, exprimantur atque Spiritus tinctus, per filtrum colatus fervetur;

Radices verò

Aquæ fontanæ *libris tribus* denuo affundantur, digerantur & post unam alteramve ebullitionem exprimantur.

Expressum albumine ovi clarificetur & cum spirituofo commisceatur, lentoque igne, spiritu per alembicum abstracto, ad extracti consistentiam inspilletur.

Carminativas, anodynas, alexipharmacas & pectorales habet virtutes; additur pilulis catarrhalibus vel Laudano mixtum in colica adhibetur.

Dosis grana duodecim ad viginti.

Eodem modo etiam præparantur

EXTRACTUM
ARISTOLOCHIÆ CLEMATITIDIS,
longæ, rotundæ,

ASARI,
CALAMI AROMATICI,
CARYOPHYLLATÆ,
CORTICUM CASCARILLÆ,
CHINÆ CHINÆ,

COLOCYNTHIDIS,
HYPERICI EX FLORIBUS,
MECHOACANNÆ ALBÆ,
MEU,
TURPETHI,
ZEDOARIÆ.

EXTRACTUM ANODYNUM.

REC. Extracti Angelicæ,

Calami aromatici *ana unciam unam,*

Cardui benedicti *drachmas quinque,*

Opii aquosi *drachmas tres,*

Olei

Olei Caryophyllorum guttas
decem.

Misceantur & ferventur.

Vires sunt anodynæ, sudoriferæ, leniter adstringentes. Quælibet drachma grana septem semis habet opii.

A granis octo, quæ granum unum habent opii, ad grana duodecim dari potest.

EXTRACTUM BRYONIÆ.

REC. Radicum Bryoniæ incisarum
libram unam,

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis li-
bris sex.

Macerentur per triduum, postea leniter ebulliant, exprimantur & colentur, expressum leni igne ad extracti consistentiam evaporetur.

Utile est in pilulis hydropicis & uterinis.

Dosis scrupuli duo ad drachmam unam.

Eodem modo præparantur

Sequentia ex radicibus:

Extractum Enulæ,

Efulæ,

Cichorei,

Filicis,

Gentianæ,

Hellebori nigri,

Iridis Florentinæ,

Nostratis,

Pœoniæ,

Pimpinellæ,

Rhabarbari,

Sarsaparillæ,

Sassafras,

Symphiti majoris,

Taraxaci,

Tormentillæ.

Extracta fere quævis tametsi præparatione ipsâ, aliquid de efficacia sua amittant, frequentis tamen sunt usûs, præcipuè in forma pilulari. Pro diversis animalium, juxta ac vegetabilium partibus constitutivis diversa quoque requiruntur menstrua: ad

Pars II.

solvendas enim partes gummosas aquosum, ad resinosas spirituosum requiritur. Cæterum in genere retinent extracta quælibet virtutem simplicium, ex quibus confecta sunt.

EXTRACTUM CASTOREI.

REC. Castorei libram semis.

Per repetitam Spiritûs Vini affusionem extrahatur essentia; residuo addantur

Aquæ fontanæ libræ duæ,
& lento igne ad dimidias coquantur, decoctum exprimatur, coletur & clarificetur, atque cum superioribus per Spiritum Vini factis extractionibus commisceatur & Spiritu lento igne abstracto, in extracti consistentiam redigatur.

Specificum creditur esse Castoreum antihystericum & antispasmodicum, quas etiam vires habet ipsum extractum; admiscetur pilulis nervinis, antispasmodicis, narcoticis atque anticolicis.

Dosis grana tria vel sex.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

REC. Extracti Aloës focotrinæ a-
quosi unciam

unam,

Hellebori nigri

drachmas duas,

Colocynthidis

drachmam unam,

Resinæ Jalappæ,

Scommonii a n a

drachmam unam

semis.

Misce.

Secundum epigraphen universale alvum ducens venditatur.

Dosis scrupulus semis ad grana quindecim.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

Paratur fructum Colocynthidis Spiritu Vini extrahendo, postea aquâ fontanâ coquendo & am-

Ff

bas

bas extractiones clarificatas, leni calore, in extracti consistentiam evaporando.

Fortiter purgat & stimuli loco aliis purgantibus additur; hydropicis præsertim conducit.

Dosis grana tria ad octo.

EXTRACTUM CROCI.

REC. Croci Orientalis optimi *libram semis,*
Aquæ fontanæ puræ *libras duas.*

Digere loco tepido, vase optimè clauso *per biduum*, liquorem tinctum decanta, aliam aquam affunde, digere, idque continua, donec omnis vis & tinctura extracta sit; extractiones omnes commisce, ac in balneo abstrahere ad debitam consistentiam.

Easdem, quas crocus, vires habet anodynas, alexipharmacas, cordiales & antihystericas.

Dosis grana duo ad-quatuor.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

REC. Seminis Carthami excorticati *uncias quatuor,*
Rhabarbari veri *unciam unam,*

Polypodii querni *uncias duas,*

Zingiberis albi *drachmas duas,*

Turbith albi resinosi,
Foliorum Sennæ electorum *ana uncias duas semis,*

Myrobalanorum chebularum *uncias tres,*

Agarici albi *drachmas sex,*
Scammonii Aleppensis *drachmas decem.*

Agaricus, Scammonium & Turbith infundantur in

Spiritus Vini *libris duabus,*
& repetitâ affusione extrahantur; reliqua verò interim in

Aquæ ferventis *libris tribus* macerentur, leni igne coquantur ad tertiæ partis consumptionem & in fine coctionis adjiciatur re-

fiduum prioris spirituosæ extractionis; exprimantur & colentur, lentòque igne Spiritus evocetur; residuum verò ad extracti mollioris consistentiam inspissetur.

Ad vitiosos humores evacuandos accommodatissimum & multimodâ experientiâ comprobatum celebratur. Cachecticis, Scorbuticis & hydropicis convenit.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

Eodem modo, quo Agarici extractum, paratur, in fine resinam cum extracto diligenter miscendo, ut gummosæ partes resinosis interponantur.

Vires cum resina conveniunt & vix majori dosi dandum est extractum hoc; sufficiunt grana sex vel decem, extracto alii laxanti, aloës scilicet aquoso, scopo laxandi admixta. Utcunque extractum & resina jalappæ prædicentur, præplacet pulvis ejusdem mixtus cum syrupo quodam appropriato, habitâ ratione ætatis, sexûs & dosis.

EXTRACTUM LIGNI ALOES.

Paratur extrahendo lignum Aloës Spiritu Vini rectificatissimo, iterumque Spiritum abstrahendo in balneo.

Additur pilulis & pulveribus cephalicis & analepticis.

Sufficit granum unum vel duo pro dosi.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

Lignum Guajacum fortiter coquitur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ; decoctum lento igne in extracti formam redigitur.

Extractum exiguâ quantitate tali modo & ex libra una ligni vix drachmæ duæ obtinentur; Spiritu Vini autem rectificatissimo ex libra una ad minimum *uncie tres* extracti resinosi obtinentur.

Usus

Ufus est in pilulis arthriticis, catarrhalibus, antivenereis & ubicunque humorum depuratione opus.

Dosis grana octo ad duodecim.

Naribus exceptum sternutationes insignes citra capitis imbecillitatem efficit.

EXTRACTUM LIQUIRITIÆ GUMMOSUM, sive GLUTEN PECTORALE.

REC. Liquiritiæ rasæ & contusæ
unciam unam.

Infunde per *viginti quatuor horas* in
Aquæ tepidæ *libris quatuor* &
in colatura lento igne dissolve
Gummi Arabici electi,
Sacchari albi *ana uncias sedecim.*

Coque ad debitam consistentiam, postea modulis infunde & leniter sicca.

In tussi, raucedine acri, catarrho, frustula in ore liquefcere sinuntur ac deglutiuntur.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

REC. Limaturæ Martis purissimæ
libram unam,

Superfunde

Succi pomorum acidorum
recens expressi & depurati
libras quatuor.

Stent in digestionem, loco calido, in cacabo ferreo per *plures dies.* Postea coquantur, spatulâ propetuo agitata, lento igne, ad dimidiæ partis consumptionem; clarum à spisso colando separetur & ad extracti consistentiam inspissatum reponatur.

Tonicum excellens est atque hypochondriacis, cachecticis ac ubi suspicio vermium est, convenit.

Datur in forma pilulari, cum aliis, à granis quindecim ad scrupulum unum.

EXTRACTUM MYRRHÆ GUMMOSUM.

REC. Myrrhæ electæ *libram unam,*

Contusæ affundatur

Aquæ fontanæ puræ *libra una semis;*

Misceantur & sæpiùs per diem agitentur, liquidum decantetur, iterumque nova aqua affundatur, idque tam diu, donec aqua non ampliùs tinctâ sit. Tunc omnes solutiones invicem mixtas & filtratas lenissimo igne evapora ad extracti consistentiam.

Præstantissimum est antiphthysicum, balsamicum, anthelminticum, & pectorale. Myrrhæ uncia una in substantia dat extracti gummosi drachmas sex, ad sex semis.

Datur cuspidatim sæpiùs per diem sumendo extracti drachmam unam & miscendo ac terendo cum sacchari uncia una.

EXTRACTUM NICOTIANÆ.

Folia Nicotianæ integra exsiccata, per noctem in aqua fontana (scilicet *libra una nicotianæ in sex libris aquæ*) macerentur; manè infundantur cribro, ut aqua effluat; folia ita macerata atque aquâ abluta in *libris decem* aquæ fontanæ, magnâ ebullitione, ad dimidiæ partis consumptionem coquantur. Decoctum albumine ovorum clarificatum, valido igne & celeri ebullitione, ad extracti consistentiam inspissetur.

Maceratio & ablutio Nicotianæ instituitur, ut particulæ salinæ acres maximè in hac prima maceratione extrahantur; ebullitio fortis & coctio longa, cum multa aqua, eandem ob rationem præscribitur, ut volatiles & vomitum creantes particulæ cum vapore evolent.

Commendatur hoc extractum secundum hanc formulam paratum, in tussi pectorali & phthysica diuturna mitiganda & cohibenda, quod etiam præstare solet, si ejus grana tria vel quatuor, in aqua quadam vinosâ soluta, manè in lecto propinentur; & si fortè nauseam vomibun-

bundam excitaret, mox post vini calidi aromatizati & parum saccharati haustum cessabit; in febribus etiam diuturnis, tertianis & quartanis, nec non ictero & hydrope magni effectus est.
Ad grana quinque vel sex exhibitum, per secessum & superiora nunquam purgat.

EXTRACTUM OPII AQUOSUM.

REC. Opii Thebaici optimi uncias quatuor.

In frustra minutim scissum in cucurbita vitrea

Aquæ fontanæ puræ libris quatuor

solve, solutionem per bibulam filtra, balneoque moderato inspissa ad extracti consistentiam.

Decantatas habet vires anodynas, salutare in vigiliis nimis, hypemesis & hypercatharsi, hæmorrhagiis, malo hysterico, ac morbis spasticis.

Dosis grana duo vel tria pro adultis, soluta in Aqua, aut infuso Theæformi.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

REC. Scammonii Aleppensis unciam unam,

Rhabarbari veri,

Seminis Ebuli ana drachmas sex,

Agarici albi drachmas septem,

Turbith resinosi,

Hermodyliorum ana drachmas quinque,

Hellebori nigri unciam semis,

Foliorum sennæ electorum uncias duas,

Colocynthis drachmas decem.

Rhabarbarum, Hermodyli, Helleborus & folia Sennæ minutim incisa infundantur in

Aquæ fontanæ bullientis libris duabus.

Macerentur per viginti quatuor ho-

ras atque post unicam ebullitionem exprimantur, in expresso dissolvantur

Aloës focotrinæ unciae tres, atque seorsim servantur.

Reliqua verò, scammonium, semen Ebuli, Agaricus, Turbith & Colocynthis per repetitam affusionem Spiritus vini rectificati q. f. extrahantur extractiones per chartam bibulam filtratæ, cum solutione Aloës colata misceantur atque spiritus in balneo abstrahatur, residuum verò, leni igne, ad extracti consistentiam redigatur.

Creditur esse purgans universale, quod omnes vitiatos humores è corpore educendi virtute polleat.

Dosis scrupulus semis ad grana quindecim.

EXTRACTUM RHABARBARI SIMPLEX.

Seligitur optimæ notæ Rhabarbarum & aquâ simplici, ad modum aliorum, fit extractio.

Pro basi pilularum, ubi aloëtica locum non inveniunt, adhiberi solet.

Dosis scrupulus semis ad grana quindecim.

EXTRACTUM FOLIORUM SENNÆ.

REC. Foliorum Sennæ mundatorum libram semis.

Macera per viginti quatuor horas in Aquæ fontanæ libris tribus, loco calido:

Extractum tinctum exprime ac dein lenissimo igne & ebullitione vix conspicuâ evapora; alias enim fere omnem vim alvum laxandi perdit.

Inservit pro basi pilularum laxantium, ubi Aloë uti non licet.

Dosis grana duodecim ad scrupulum.

FLORES BENZOES.

REC. Benzoës, quantum lubet.

In pulverem trita injiciatur ollæ terreæ, superponatur conus chartaceus, in parte superiore perforatus,

tus, & lenissimo igne arenæ fiat sublimatio florum. Singulo semihorio mutandus est conus, & abstergendi flores plumaceolo, coloris nivei, elegantissimi, odoris & saporis penetrantissimi, in vitro clauso fervandi. Signum absolutæ sublimationis est, si conus oleo quasi madefactus apparere incipiat.

Residuum in olla terrea mitte in retortam vitream pro destillando Oleo Benzoës, de quo suo loco.

Alia & facilior methodus est flores copiosiores quidem, sed minus elegantes largiens, quando benzoë pulverisata retortæ cum excipulo commissa & cum æquali quantitate arenæ commixta, igne arenæ per gradus aucto destillatur. Oleum, quod prodiit, butyraceum, in aquæ fontanæ ferventis decuplo solvunt, solutionem adhuc ferventem per pannum aquâ calidâ madefactum, ut oleum remaneat, trajiciunt atque flores ex aqua refrigerata chartâ bibulâ imponendos & nullo vel lenissimo calore siccandos colligunt.

Proficui sunt ad asthma, & omnes pulmonum affectus; coagulum lymphæ mucido-serosæ solvunt & sudores movent.

Dosis grana duo ad quatuor ex ovo sorbili.

Scopo sternutatorio quoque inferviunt.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES.

REC. Salis Ammoniaci *quantum lubet.*

Solvatur in aqua calida, solutio filtretur, postea in locum frigidum mittatur & flores in liquore subfidentes exsiccentur; liquor verò remanens, pro ulteriori florum collectione, per exhalationem concentratur.

Sunt Sal Ammoniacum depuratum, atque easdem vires obtinent.

Pars II.

Dantur scopo incidendi & resolvendi in viscerum obstructionibus, præcipuè ad febres intermittentes à scrupulo uno ad drachmam dimidiam imò integram.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

REC. Limaturæ Martis, vel Lapidis Hæmatitæ subtilissimè triti *uncias quatuor,*
Salis Ammoniaci contusi *uncias octo.*

Optimè mixta & cucurbitæ vitreæ alembico & recipiente munitæ indita igne arenæ per gradus sursum pellantur; sic apparent in alembico flores pallecentes; inferius autem admodum tincti. Destillat insimul liquor salinus penetrantissimus. Poterit quoque hæc sublimatio in retorta vitrea institui.

Residuum in fundo vasis aëri liberiori humido expositum liquefit in oleum rubicundum sive liquorem martialem; quod itidem in cella fieri potest.

Incidendi & dissolvendi viscidum polent virtute, nec non plus, quam tonicas vires in solidas exserunt.

Teneriori ætati ad granum dimidium, aut integrum, adultiori ad quinque, vel septem dari possunt.

FLORES SULPHURIS.

REC. Sulphuris communis contusi *quantum lubet.*

Fiat igne lenissimo in capitellis sive aludel sublimatio, benè cavendo, ne incalcentibus aludel, flores liquecant in formam pristinam. Viliori autem pretio emuntur, quàm parantur.

Nota. Studio omissi hîc flores sulphuris compositi, quia nil aliud sunt, quàm flores perfumati; de aloë & croco nulla quæstio, utpote cum myrrha, sub sublimatione combustis.

Ad pectoris morbos, scabiem retro-
G g *pulsam,*

pulsam, ulcera fœtida internè assumpti valent.
Dosis à granis duodecim ad scrupulum unum.

GELATINA ANALEPTICA.

REC. Rasuræ Cornu Cervi *uncias*

quatuor,
 Eboris *drachmas duas,*
 Femora gallinæ junioris, vel
 Columbæ junioris
 contusa *Nº. tria,*
 Carnis vitulinæ posticæ concisæ *libras duas,*
 Aquæ fontanæ *mensuras duas cum dimidia.*

Coquantur, donec aqua ultra mensuram mediam remanserit, deinceps colaturæ addantur

Cinnamomi acuti *drachma una,*

Caryophylli aromatici *Nº.*

quatuor,
 Pomi citri cum succo *pars dimidia,*

Sacchari albi *uncia quatuor.*

Coquantur iterum per *horæ quadrantem,* clarificentur & iterum colando fiat gelatina, quæ grata admodum tabidos reficit, vires novat, sanguinem purificat, convalescentes brevè restituit, sæpiùs *cochleare unum* fumendo.

In juscule autem ubi quis eâ uti velit, gratior fit admixtione tantilli salis culinæ, loco sacchari, & tantillæ macis, loco cinnamomi. Sunt etiam, qui aquæ admiscent portionem vini albi.

GELATINA CORNU CERVI CITRATA.

REC. Rasuræ Cornu Cervi purissimæ *uncias sex.*

Lavetur aquâ tepidâ aliquoties, coquantur in

Aquæ fontanæ *libris sex* ad remanentiam *libræ unius,* sæpiùs coletur, ut clarificetur gelatina, cui adhuc calenti addatur

Syrupi ex toto Citreo *uncia una.*

Reponantur in locum frigidum.

Restaurat & humectat, in febribus malignis, ut & colliquativis, tabe &c. præscribitur.

GELATINA CORNU CERVI SIMPLICIOR.

REC. Rasuræ Cornu Cervi *uncias sex,*

Aquæ fontanæ *libras quatuor.*

Coquantur lento igne in vase terreo clauso q. f. ut perfrigerando fiat gelatina antè clarificanda, & colanda, *cujus cochleare unum* vel *unum cum dimidio* per se, vel cum juscule, intra *viginti quatuor horas* ad restaurandum, humectandum, demulcendum, temperandum in multis morbis ingeri potest.

Si ante refrigerationem cum *uncia una* amygdalarum dulcium recens excorticatarum, vel & seminum quatuor frigidorum majorum recens contusorum exprimatur & saccharo edulcoratur, à Gallis tunc dicitur *Blanc mangié* & magis lubricans atque refrigerans, in juscule verò tunc minùs grata, magisque per se & simul minori portione, at sæpiùs assumenda.

GLANDES

five

GLOBULI CARMINATIVI.

REC. Saponis Veneti *uncias duas,*

Fellis Tauri,

Seminis Cumini,

Sacchari albi *ana unciam unam,*

Nitri crudi *unciam semis.*

Fiant globuli diversæ magnitudinis. Vid. quoque *suppositoria.*

Ad alvum aperiendam, & flatus educcendos, oleo intincti, tanquam suppositoria adhibentur.

GLOBULI BEZOARDICI.

REC. Extremitatum pedum Cancrorum marinarum *uncias quatuor,*

La-

Lapidum Cancrorum fluvia-
tilium,
Margaritarum orientalium,
Coralliorum rubrorum ana
unciam unam,

Succini albi præparati,
Radicum Contrayervæ,
Serpentariæ Virgi-
nianæ ana *drach-*
mas sex,

Bezoar orientalis *drachmas*
tres,

Offium è Cordibus Cervorum
scrupulos quatuor,

Croci optimi *scrupulos duos,*
Trochiscorum de Viperis *un-*
ciam unam.

Fiat pulvis cum gelatina Cornu
Cervi miscendus, unde formen-
tur globuli *drachmam unam* vel
duas pendentes, post exsiccationem
deaurandi.

Vires Cardiacæ, alexiteriæ & sudo-
riferæ sunt; commendantur in va-
riolis, & morbillis, febribusque
malignis omnibus.

Dosis à scrupulo semis ad drach-
mam semis.

GLOBULI MARTIALES,
BOULES MARTIALES dicti.

REC. Limaturæ Martis purissimæ
in pollinem tritæ *libram*
semis,

Tartari Albi pulverisati *li-*
bram unam.

Invicem mixta indantur vasi vitreo,
quibus affundantur

Spiritus vini *libra semis* vel
uncia octo.

Massa vel solis, vel fornacis, vel bal-
nei calori exponatur, ut digera-
tur & leniter exsiccetur. Cui
dein rursus tritæ affundatur

Spiritus vini *tantundem.*

Digestionem & exsiccationem con-
tinuando, donec massa quasi re-
sinosa appareat. Ex qua globi
dein efformandi, ad ovi colum-
bini magnitudinem.

Eorum usus est externus ad vulnera,
hæmorrhagias, luxationes, sugilla-

tiones &c. Dissolvuntur in aqua
& spiritu vini, donec liquor bene
saturatus sit, quo tum imbuuntur
lintheamina, & applicantur.

GLOBULI MOSCHATI ALBI.

REC. Sacchari Canariensis *uncias*
duodecim,

Amyli albi *unciam semis,*
Radicis Ireos Florentinæ
drachmas duas,

Moschi optimi *grana qua-*
tuor,

Zibethi *granum unum.*

Cum mucilagine Gummi Traga-
canthæ fiant globuli diversæ ma-
gnitudinis.

Usus in suppositoriis notissimus.

GLUTEN AQUATICUM,
five
SPERMA RANARUM.

Gluten aquaticum ac mucago aqua-
tica est illa mucilago instar albu-
minis ovi, quæ ineunte vere
hinc inde circa lacus, paludes &
stagna invenitur, colligenda bre-
vè ante novilunium, vel in ipso
novilunio, mense Martio, quo
tempore collecta, ad annos mul-
tos, durare potest; econtra ea,
quæ in plenilunio colligitur, fa-
cilè putrescit; conservatur au-
tem beneficio aluminis, in dolio-
lis quernis, recenter fabrefactis,
nempe ad spermatis ranarum,
per laccum clarificati *uncias qua-*
draginta venit aluminis usti *drach-*
ma una ad *duas*, & sic citra peri-
culum corruptionis conservatur
in annos E. N. C. Dec. I.

Sub unguenti forma laudatur in can-
cro. Anodynum est, & refrige-
rans, ac egregiè se gerit in am-
bustis.

GLUTEN PECTORALE,
vid.

EXTRACTUM LIQUIRITIÆ
GUMMOSUM.

120 GUMM. GUTT. HEP.

GUMMI GUTTÆ PRÆPARATIO.

REC. Gummi Guttæ in pulverem triti *uncias tres.*

Solvantur in

Aceti vini albi *unciis novem.*

Post sufficientem digestionem clarum à spisso decantetur, atque leni calore in vase vitreo, ad extracti consistentiam evaporetur acetum.

Hâc præparatione acrimoniam & vim emeticam infringi atque in securius purgans abire perhibent.

Hydropicis ad scrupulum semis datur scopo serum valide educendi.

GUTTÆ ANGLICANÆ CEPHALICÆ.

REC. Spiritus volatilis Serici crudi, oleo empyreumatico liberati *uncias quatuor,*
Olei destillati Lavendulæ in Spiritus vini rectificati *uncia una,* soluti *drachmam unam.*

Misceantur & digerantur, postea è retorta fiat destillatio.

Effectus patet ex nomine: non solum verò cephalicæ sunt, sed & uterinæ & nervinæ.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta.

HELLEBORUM NIGRUM
DEPURANDI MODUS.

Radices Hellebori nigri recentes, non coriosæ aut à vermibus exsæ, probè ficcatae, grosso modo pulverisantur, in aqua bulliente infunduntur, & vase benè operato, *per viginti quatuor horas* digeruntur: infusum colatum evaporatur ad dimidias & relinquitur ità per noctem, quò fæces subsideant, dein defusus liquor clarus ad Extracti spissitudinem redigitur.

HEPAR ANGUILLÆ PRÆPARATUM.

Vino ablutum lento igne exsiccat.

Ad partum difficilem & secundinarum retentionem à scrupulo uno

HEP. HYDR. INF.

ad *drachmam semis* hepatis anguillæ locum indulgemus, pro satisfactione muliercularum nimis credularum.

HEPAR SULPHURIS.

REC. Florum vel Sulphuris flavi *uncias quatuor.*

Fluant in vase figulino vitreato, & per vices immittantur

Salis Tartari ficcissimi *uncia duæ.*

Optimè agitata & ab igne remota ferventur.

Inservit tinturæ & syrupo nec non lacti Sulphuris parandis.

HERBÆ VULNERARIÆ
vid.

SPECIES PRO DECOCTO VULNERARIO.

*

HYDROMEL SYMPLEX.

REC. Mellis despumati *uncias duas,*
Aquæ fontanæ *libras duas.*

Coquantur & despumentur simul ad *libræ unius semis* remanentiam, colentur.

Ad diversas in Dispensatorio obvias compositiones requiritur.

INFUSUM LAXATIVUM MANNA-GETTÆ.

REC. Foliorum Sennæ electorum *drachmas sex,*

Salis Sedlizensis *drachmam unam,*

Passularum minorum *drachmas tres,*

Zingiberis albi *scrupulum unum.*

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis *unciis quatuor.*

Post digestionem *per viginti quatuor horas* exprime, in colatura solve

Mannæ Calabrinæ *unciam unam,*

albumine ovi clarificata.

Datur pro una dosi eo effectû, quem inscriptio docet.

INFU.

INFUSUM LAXATIVUM
VIENNENSE.

REC. Foliorum Sennæ electorum
uncias tres,
Passularum minorum *un-*
ciam unam semis,
Radicum Polypodii querni
drachmas tres,
Seminis Coriandri *drachmas*
duas,
Salis Sedlizenfis *unciam se-*
mis.

Misceantur, & infundantur in
Aquæ fontanæ bullientis *li-*
bris duabus semis.
Post digestionem *per aliquot horas*
exprimantur, in expresso dissol-
vantur

Mannæ electæ *uncia octo.*
Clarificentur & ferventur.
Alvum leniter laxat, & ab unciis
duabus ad tres præscribitur.
Præstat recens paratum, quia diu-
tius asservatum facîle acescit.
Duobus his infusis tartaro sal Sedli-
zense substituimus.

JULAPIUM.

Julepus est medicamentum inter-
num dilutissimum, ordinariò gra-
tum & plerumque ex aqua & sy-
rupo compositum atque scopo
diluendi, humectandi, tempe-
randi &c. variis in morbis adhi-
beri solitum.

JULAPIUM ROSATUM,
sive

JULEPUS ROSARUM.

REC. Sacchari albissimi *libras duas*
semis;

solve in

Aquæ Rosarum *unciis vigin-*
ti.

Post unicam ebullitionem cola per
pannum & serva.

Utatur hoc & aliis julapiis ad edul-
corandas emulsiones & plerumque
scrupuli duo vel tres adduntur un-
ciæ aquæ vel emulsionis.

JULAPIUM SAMBUCINUM.

Paratur eodem modo, quo Julia-
pium rosatum.

Pars II.

JULAPIUM VIOLARUM.

Ex Aqua Violarum optima & sac-
charo, uti præcedens conficitur,
simili etiam modo Julapium pa-
paverinum ex infuso aut aqua
papaveris.

KERMES MINERALE,
sive

SULPHUR ANTIMONII RUBRUM.

REC. Nitri fixi *libras duas semis.*

Solve in

Aquæ fontanæ *libris quindecim;*

solutionem filtra & seorsim serva.

REC. Antimonii crudi Hungarici
in frustula grossiora con-
tusi *libras tres.*

Superaffunde

Liquoris Nitri fixi, modò
præscripti libras septem.

Coque in vase figulino, igne per u-
nam, alteramve horam leniter
continuato, postea liquorem ef-
funde & filtra.

Eidem Antimonio iterum affunde

Liquoris *libras quinque,*
& ut antea coque, liquorem effun-
de & filtra.

Tandem reliquam liquoris portio-
nem Antimonio affunde, coque
& filtra, uti dictum.

Liquor per filtrum ita colatus re-
quiescat *per viginti quatuor ho-*
ras, pluresve; sic pulvis rubi-
cundus fundum petet aquâ cali-
dâ affusâ sæpius edulcorandus
pro usu.

Est sulphur auratum Antimonii mi-
tigatum. Creditur sanguinem per
transpirationem mundificare &
diuresin promovere. Datur in fe-
bribus intermittentibus, hydropo,
asthmate, in cruditatibus prima-
rum viarum. Leniter agit ano
& cato.

Dosis à grano uno ad tria, quin-
que.

LAC SULPHURIS.

REC. Sulphuris Citrini purissimi
uncias duas,

Cinerum clavellatorum, vel
Salis Tartari *uncias sex,*

Aquæ fontanæ *libras tres.*

Hh

Co-

Coque in vase fictili ad consumptionem *tertiæ partis*. Residuo per chartam filtrato insperge aceti vini *quantum satis*, ad præcipitationem. Præcipitatum sæpius aquâ fontanâ tepidâ ablue & denique lenissimo calore exsicca. *Earundem est ac flores Sulphuris virium, & imprimis ad pectoris morbos adhibetur.*

LAC VIRGINIS.

REC. Lithargyrii subtilissimè triti *libram semis.*

Coque in
Aceti vini destillati *libra una semis,*

ad consumptionem *tertiæ partis* aceti, tunc filtra. Colaturæ affunde. Aluminis crudi in Aquæ communis *libris duabus* soluti, *uncias quatuor*, & albescet liquor, qui Lac Virginis vulgò dicitur.

Cosmeticum habetur, quod tenerioribus, à solis calore quasi ambustis, promptè succurrit, si faciem eo ilinant. Etiam lentigines & serpiginis delet. Sed minimè suadendus frequentior ejus usus.

Lac Virginis vulgò quoque vocatur aqua quæcunque Cosmetica, in cujus unciam unam instillantur guttæ circiter decem Tincturæ Benzoës.

LAPIDES CANCRORUM CITRATI

&

PRÆPARATI,

vid.

OCULI CANCRORUM.

*

LAPIS CALAMINARIS
PRÆPARATUS.

REC. Lapidis Calaminaris *libram unam,*

Candefac *ter* vel *quater* in crucibulo, atque toties in Aqua Plantaginis vel Rosarum extinguitur; postea siccatus in subtilissimum pollinem teratur atque super marmore lævigetur.

Usus est externus in Collyriis, unguentis & emplastris; siccatur & adstringit.

LAPIS DIVINUS,
five
OPHTHALMICUS.

REC. Vitrioli de Cipro,
Nitri purissimi,
Aluminis crudi *ana uncias tres.*

Optimè contusa & pulverisata liquefiant in vase vitreo, calore arenæ, quibus liquefactis addatur Camphoræ tritæ *drachma una semis.*

Mixta & refrigerata massa fervetur.

Adhibetur in collyriis ad oculorum affectus.

LAPIS DE GOA,
vid. Pharm. Wirt.LAPIS HÆMATITES
PRÆPARATUS.

Cum Aqua simplici lævigatur.
Usus potissimum pro scopo adstringendi.

LAPIS HYACINTHUS
PRÆPARATUS.

Paratur ut hæmatites.
Gaudet virtute adstringente & juxta quosdam alexipharmacâ. Inde confectio de Hyacintho paratur.

LAPIS INFERNALIS.

REC. Argenti purissimi *uncias duas,*

Solvantur in
Spiritus Nitri, vel
Aquæ fortis *unciis sex.*

Evaporetur solutio ad *quartæ partis* consumptionem atque ad crystallisationem reponatur. Crystalli colligantur, liquor denuo evaporetur, donec omnis liquor in crystallos vel sal abierit. Has crystallos crucibulo satis magno immitte, adhibe ignem primò lenem, tumebit materia, deinde subsidebit, tandem ignis gradu aucto olei instar fluet, quam effunde in modiolum seu canalem ferreum cylindricum, prius cale-

calefactum & sevo illitum. Massa nigra & compacta esse debet, aliàs denuo in crucibulo liquanda & effundenda, si successerit, in vitro probè clauso servanda. *Inservit loco cauterii potentialis ad absumendas carnosas excrescentias.*

LAPIS MARTIALIS,
vid.

GLOBULI MARTIALES.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

REC. Vitrioli albi *uncias quatuor*,
Salis Ammoniaci *unciam semis*,

Cerussæ,
Boli Armenæ *ana unciam unam*,

Aceti vini *libram unam*.

Coquantur in vase figulino ad siccitatem.

Commendatur ad ulcera omnis generis inveterata, scabiem, tineam, gangrenam, fistulas. Desiccatur, mundatur & partes relaxatas roborat. Modus utendi est, ut uncia una in aquæ pluvie libra solvatur; solutione filtratâ laventur partes, atque lintea illâ imbuta imponantur, vel ipse liquor, syringæ ope, injiciatur.

LAPIS NEPHRITICUS.

Paratur ut hæmatites.

Virtus ex nomine patet.

Datur à drachma dimidia ad integrum.

LAPIS PERCARUM.

Paratur ut hæmatites.

Pleuriticis, colicâ vexatis, & calculosis commendatur & diureticus creditur.

Dosis uti supra.

LAPIS PRUNELLÆ,

sive

NITRUM TABULATUM.

REC. Nitri Crudi *libram unam semis*;

Fundatur in crucibulo; dum fluit, injiciatur sensim

Sulphuris citrini *uncia semis*,

parum unâ vice inspergendo & expectando, donec deflagrârit; hoc facto in rotulas parvas effundatur.

Propter hanc cum Sulphure deflagrationem multum ad salium neutrorum naturam accedit, ingratius etiam & minus refrigerans, quam nitrum crudum deprehenditur. Magis album evadit, si loco sulphuris Sal Ammoniacum adhibetur.

Admiscetur pulveribus temperantibus & gargarismatibus.

Dosis scrupulus semis ad drachmam semis.

LAUDANUM DIURETICUM,

sive

URINARIUM MICHAEL.

REC. Succi Liquiritiæ inspissati *unciam unam semis*,

Extracti opii aquâ fontanâ parati *drachmas duas*,

Trochiscorum de Alkeken-
gi,

Terebinthinæ Venetæ *ana unciam semis*,

Camphoræ *drachmam unam*,

Croci *scrupulos quatuor*,

Tragacanthæ,

Mastichis *ana drachmam semis*.

Misce, fiat Massa.

Laudatur in stranguria, colica nephritica & difficultate urinæ. Grana tredecim continent opii granum unum.

Dosis scrupulus semis ad scrupulum unum.

LAUDANUM HYSTERICUM.

REC. Extracti opii *unciam dimidiam*,

Castorei *drachmam*,

Croci *scrupulum*,

Olei destillati Macis,

Menthæ,

H h 2

Rutæ

Olei destillati Rutæ *ana guttas sex,*
 Misce, fiat Massa pilularis.
In Colica hysterica, ubi opiatæ locus,
datur ad mitigandos dolores spasti-
cos.
Dosis granum unum ad duo.

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENH.
 vid.

ESSENTIA ANODYNA SYD.

*

LAUDANUM OPIATUM.

REC. Extracti Opii aquosi *uncias duas,*

Croci,
 Opobalsami Veri *ana drach-*
mam semis.

Non solum easdem, quas Extractum
opii, vires habet, verum etiam
reliquas mutuatur à virtute croci
& opobalsami.

Dosis à grano dimidio ad tria.

LAUDANUM OPIATUM CYDO-
 NIATUM.

Omittimus, credentes sufficere no-
 bis præparata opiata hic obvia,
 & statuimus opium nonnisi aquâ
 fontanâ ad suâ correctionem in-
 digere.

LIQUAMEN FLORUM VERBASCI,
 vide
 OLEUM VERBASCI.

*

LIQUOR ANODYMUS MINE-
 RALIS. H.

REC. Olei Vitrioli rectificatissimi
libram unam,
 Spiritus Vini rectificatissimi
libras sex.

Oleum vitrioli successivè instilla-
 tur spiritui vini, quod cum stre-
 pitu, non secus, ac si ferrum
 candens in aquam frigidam in-
 truderetur, fit, mixtura inca-
 lescit, colorem acquirit rubeum,
 odorem gratum. Digerantur in
 vitro probè clauso, per aliquot
 dies, postea instituatur destilla-

tio, igne arenæ, è cucurbita fa-
 tis alta; primò prodit spiritus
 vini, fragrantis odoris, quem
 fragrantior sequitur. Si mixtura
 in offam nigram, in fundo cu-
 curbitæ, abire incipit, aliud ap-
 ponatur receptaculum, lenissi-
 mo igne administrato; quæ cau-
 tela nisi observetur, omnis
 massa illa nigra subito & ex
 improviso totum transcendit a-
 lembicum; si verò leni igne
 institutum pergatur, phlegma
 exstillat sulphurei odoris, cum
 oleo, quod fundum petit, æ-
 thero, saporis & odoris gratissi-
 mi, aromatici; oleum hoc à
 phlegmate separatum, solvatur
 in spiritu vini prolecto. Resi-
 duo in cucurbita affunditur

Spiritus Vini rectificatissimi
libra una semis,

& post digestionem destillatur, qui
 spiritus prolectus, plerumque
 fragrantior est antecedente, nec
 viribus illi cedit, ideo cum illo
 miscendus & omnes vitro probè
 obturato servandi.

Sunt, qui Spiritus Vini rectifica-
 tissimi *libras* saltem *quatuor uni*
libræ olei vitrioli dephlegmatif-
 simi addunt atque non solum
 Spiritum fragrantiores, sed &
 majorem quantitatem Olei æthe-
 rei producant.

Liquor hic odore & sapore suo gra-
to, nec non virtute anodynâ, an-
tispasmodicâ sese commendat, atque
sudoriferum, alexipharmacum &
diureticum simul præbet medica-
mentum egregium.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta.
Diu verò vel improvidè asservatus,
acidum vitriolicum sistit evolutum
& quasi reviviscens, quod testi-
monio esse potest, oleum vitrioli &
Spiritum vini, tanquam extrema,
à se distantissima, non esse unita
intimâ miscibilitate.

LIQUOR

LIQUOR APERITIVUS

five

SALINUS LAXATIVUS.

REC. Salis Cathartici amari *uncias tres,*
 Tartari solubilis tartarifati
unciam unam,
 vitriolati *drachmas quatuor.*

Misce, solve in
 Aquæ fontanæ *unciis quindecim.*

Filtra per chartam.

Aperit, urinam ciet, alvum laxat.

Dosis drachmæ duæ ad tres.

LIQUOR CAMPHORATUS.

REC. Camphoræ subtiliter pulve-
 rifatæ *drachmas tres,*
 Nitri depurati, prius seor-
 fim pulverisati *uncias duas*
& drachmas quinque,
 Gummi Tragacanthæ *drach-*
nam unam.

Misce exactè in mortario lapideo,
 tum tritu continuato solve in
 Aquæ Naphæ *libra una.*

Ingratum, sed efficax remedium re-
solvens, antiphlogisticum, anti-
septicum, diaphoreticum, peruti-
le inprimis, post evacuationes de-
bitas, in arthritide acuta, cum co-
pioso potu seri lactis, aut infusi
pectoralis sumptum; tum in feбри-
bus exanthematicis & versus finem
morbis inflammatoriorum ad
reliquias stasium per diaphoresin se-
cure discutiendas, quo casu Infu-
sum Theæforme Scordii, Florum
Sambuci aut aliud simile diapnoi-
cum utiliter superdatur.

Internè sumi potest ad guttas quadra-
ginta vel dimidium circiter coch-
leare, tertiâ quâvis horâ, cum
Aqua Cerasorum nigrorum, vel
grato Julapio dilutus.

Externè in iisdem morbis inservit
iste liquor, locis pulsum, fronti
dolenti aut synicipiti raso in phre-
nitide cum splenio applicatus; tum
pro colluterio, in odontalgia san-
guinea incipiente, æquali portione
Aquæ vel Theæ dilutus.

Pars II.

LIQUOR CORNU CERVI
SUCCINATUS.

REC. Spiritus Cornu Cervi per re-
 petitas rectificationes
 oleo empyreumatico
 liberati *uncias sex,*
 Salis Volatilis Succini *un-*
ciam unam semis, vel quan-
tum sufficit ad punctum
saturationis.

Misceantur & digerantur per aliquot
 dies, in vase probè clauso, postea
 per chartam filtrata ferventur.

Virtutes ejus sunt diureticæ, dia-
phoreticæ, antispasmodicæ; adver-
sus motus convulsivos epilepticos
puerorum valet & hystericis hēmi-
craniâ vexatis convenit.

Dosis pro pueris guttæ tres, quin-
que, octo, adultis à guttis vi-
ginti ad quadraginta.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCI-
NATUS ALBUS.

REC. Salis Volatilis Cornu Cervi,
 Succini depu-
 ratorum *ana*
unciam u-
nam.

Solve in

Aquæ Cerasorum nigrorum
unciis octo.

Filtrata ferva.

Colore albicat, odoris est non adeò
empyreumatici, virium earundem,
ejusdemque doseos.

LIQUOR MYRRHÆ PER DELI-
QUIUM, vid. OLEUM
MYRRHÆ.

LIQUOR NITRI FIXI.

REC. Nitri depurati *quantum libet.*
 In crucibulo benè ignito ad fluo-
 rem perducatur & successivè par-
 ticula carbonum injiciatur, us-
 que dum flammam non amplius
 concipiat; tunc massa in morta-
 rium calefactum effundatur, at-
 que in cella per deliquium soluta,
 ac filtrata fervetur usui.

Ii

Li-

LIQUOR STIPTICUS WEBERI.

REC. Vitrioli Hungarici,
 Aluminis crudi *ana libram*
semis,
 Phlegmatis Vitrioli, vel in
 ejus defectu
 Aquæ Plantaginis *libras qua-*
tuor.

Coquantur, donec vitriolum & alumen soluta sint. Reponantur in locum frigidum, liquor frigefactus & à crySTALLIS subinde enatis separatus filtretur & *singulæ libræ* filtrati liquoris addatur

Olei Vitrioli *uncia una.*

Misceantur & servantur.

Externè ad vulnerum hæmorrhagiam compescendam adhibetur.

LIQUOR TARTARI

aliàs

OLEUM TARTARI PER DELI-
QUIUM.

REC. Salis Tartari *quantum placet.*
 Immittatur manicæ Hippocratis, reponatur per *aliquot dies* in cellam humidam, ut sal lique scat; decantetur liquor, &, si opus fuerit, filtretur.

Usus internus rarus est, externè interdum ad Cosmetica adhibetur; in chemicis frequentissimè.

LIQUOR TARTARI SPENETICUS.

REC. Tartari albi crudi puri,
 Nitri CrySTALLISATI *ana libram*
unam.

Detonentur, postquam exactè mixta fuerint, in crucibulo.

Massa salina in
 Aquæ calidæ *libris tribus*
 solvatur, coletur.

Lixivium hoc superfundatur
 Tartari albi crudi pulveri-
 sati *libræ uni;*

Digerantur per octiduum, postea clarum à spisso per filtrum separatur & servetur.

Liquor est salinus & cum Tartaro solubili convenit, nonnihil tamen de Oleo Tartari empyreumatico participat. Commendatur in mor-

*bis ex obstructione viscerum or-
 tis.*

Dosis drachma una ad duas usque.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ
TARTARI.

REC. Arcani sive Terræ foliatæ
 Tartari ficcissimæ *uncias*
duas;

superaffunde

Spiritûs Vini optimi & recti-
 ficatissimi *uncias octo.*

Digerantur per *aliquot dies*, spiritus lento igne aliquoties cohobetur, tandem liquor tinctus per chartam filtratus servetur.

Egregium est antihypochondriacum, antarthriticum atque in febre quartana & omnibus morbis ab obstructionibus ortis feliciter adhibetur.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta.
 Si loco Spiritûs Vini adhibentur

Aquæ fontanæ *uncie sex,*
 liquor inde emergens salinus audit, *Liquor Terræ foliatæ Tartari aquosus* sive limpidus ac in iisdem affectibus à *drachma una* ad *duas* dari potest.

Alvum promptè laxat & urinam expedit.

LIQUOR VISCERALIS.

REC. Extracti Chamædryos,
 Cichorii,
 Trifolii fibrini,
 Martis pomati *ana*
drachmas tres,

Spiritûs Nitri dulcificati,
 Essentiæ Corticum Auran-
 tiorum *ana uncias duas,*
 Aquæ Corticum Citri *uncias*
sex.

Digerantur mixta per *aliquot dies,*
 & filtrata servantur.

Commendatur in cachexia, hypochondriaco malo & flatulentia.

Dosis drachma una ad duas in vino.

LIQUOR

LIQUOR VULNERARIUS
MINERALIS

five

BALSAMUM VULNERARIUM
MINERALE DIPPELII.

REC. Lapidis Hæmatitæ in pulve-
rem triti *libram dimi-*
diam,

Tartari crudi *libram unam.*

Mixtis affundantur

Aceti vini destillati *libræ*
tres.

Digerantur in loco calido, postea
acetum per alembicum abstra-
hatur, bis vel ter cohobetur, at-
que ultimâ destillatione ad ficci-
tatem evocetur. Residuo super-
affundantur

Spiritûs Vini rectificati *un-*
ciæ viginti.

Digerantur per octiduum, clarum
à spisso separetur & fervetur.

Est Tinctura martialis adstringens &
tam internè, quàm externè, in ni-
miis hæmorrhagiis & vulneribus
adhiberi potest.

Dosis internè guttæ quadraginta ad
sexaginta.

LIQUOR VULNERARIUS
VEGETABILIS

five

BALSAMUM VULNERARIUM
VEGETABILE DIPPELII.

REC. Herbarum Nummulariæ,
Betonicæ,
Chærefolii,
Plantaginis,
Aristolochiæ cle-
matitidis *ana*
uncias duas,
Saniculæ,
Verbasci,
Sedi majoris,
Crassulæ, five
Telephii mino-
ris,
Vincæ - per - vin-
cæ,
Pimpinellæ albæ
ana unciæ tres,
Foliorum Quercûs,

Summitatum Millefolii *ana*
uncias duas.

Contundantur & exprimantur for-
titer; succum expressum cum

Aceti vini *æquali parte,* &
Salis Gemmæ pulverisati *un-*
ciis quatuor,

destilla ex cucurbita vitrea ad fic-
citatem, liquorem prolectum
ferva.

Ad vulnera recentia partium car-
nosarum externè adhibendus com-
mendatur.

Qui loco acetis, spiritum vini adhi-
bent, eundem effectum etiam in
vulneribus partium tendinosarum
sibi promittere & ad hæmorrhagias
sistendas adhibere possunt.

LOCH AD ASTHMA

five

DE SCILLA.

REC. Scillæ præparatæ *unciam se-*
mis,

Marrubii,

Hyssopi *ana drachmam u-*
nam,

Iridis Florentinæ *drachmas*
duas,

Myrrhæ,

Croci *ana drachmam semis.*

In pulverem trita excipiantur

Mellis despumati *unciis sex.*

Fiat Loch, five Eclegma.

Pituitam viscosam resolvit, indeque
natam tussim & respirationem dif-
ficilem levat.

Uncia una hujus eclegmatis conti-
net

Scillæ grana *triginta sex.*

Dosis drachma semis ad drachmam
unam semis.

Majori quantitate sumptum vom-
itus excitat.

LOCH DE FARFARA.

REC. Radicum Farfaræ recentium,
quantum lubet.

Coquantur ad mollitiem, contun-
dantur in mortario lapideo &
per cribrum trajiciantur.

Hujus pulpæ *libræ uni*

adde

Mellis despumati *libras duas* ;
Coquantur ad humidi superflui consumptionem, postea ferventur.
Acrimoniam humorum obtundit, simulque abstergit & mundificat, atque phthysicis & tussientibus confert.

Dosis uncia dimidia ad integram.

LOCH DE PULMONE VULPIS.

REC. Pulmonis Vulpis præparati,
Succi Glyzyrrhizæ,
Capillorum veneris,
Seminis Anisi,
Fœniculi *ana unciam unam,*
Sacchari clarificati *uncias quindecim.*

Omnia tenuissimè trita saccharo excipiantur & ad debitam formam redigantur.

Si ad hanc compositionem, loco pulmonis vulpis, pulmo agni aut vituli fumeretur, addendo Lichenem petræum officinalem verum, æquè efficax aut efficacior foret.

Pectori dicatum est, predest phthysicis & tussientibus, resolvit ac abstergit.

Dosis drachmæ duæ ad tres.

LOCH SANUM ET EXPERTUM.

REC. Aquæ Loch fani destillati *libram unam,*
Pinearum mundatarum,
Amygdalarum mundatarum,
Seminis Papaveris albi *ana unciam semis.*

Fiat Emulsio, in qua dissolve
Sacchari albi *uncias viginti,*
insperge

Pulveris Liquiritiæ,
Tragacanthæ albæ,
Gummi Arabici,
Amyli *ana drachmas tres,*
Iridis Florentinae *drachmas duas.*

Misceantur, agitentur diu & celeriter; quo albescant; postea reponantur.

Tussi sicca ab acri materia orta subvenit, expectorationem adjuvat.
Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

LOCH SAPONATUM, *Pharm. Edinb.*

REC. Saponis Medicati, vel Veneti *drachmam unam,*
Olei Amygdalarum *unciam unam,*
Syrupi Capillorum veneris,
vel Balsamici *unciam unam semis.*

Misceantur exactè.

Resolvit & non solum in asthmate, sed etiam in affectibus renum, calculo & nephritide cum fructu dari potest.

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

LUMBRICORUM TERRESTRIVM PRÆPARATIO.

Lumbrici terrestres vivi in fictili patina, satis magna reponantur, ut terram eructent; quo facto aquâ purâ abluantur & iterum reponantur, donec omnes fordes deposuerint. Deinde vinum album superfundatur & lumbrici per *quatuor horas* macerati in clibano, ne putrescant, citò exsiccentur.

Vires sunt aperientes, diuretici, diaphoretici & anodynæ; hinc in affectibus arthriticis, convulsivis & epilepticis bono cum successu adhibentur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

MAGISTERIVM CORALLIORVM.

REC. Coralliorum in pulverem tritorum q. v.

His affundatur

Acetum destillatum, forte,
ad supereminentiam
aliquot digitorum,

& in locum calidum reponantur ad solutionem; solutio filtratur & oleum Tartari per deliquium

quium instilletur, atque pulvis inde præcipitatus, aquâ fontanâ probè edulcoratus ficcetur.

Commendatissima olim fuerunt magisteria & huic coralliorum roborantes & cordiales virtutes attributæ sunt. Hodie à plurimis & experientissimis Medicis simpliciter præparata illis merito præferuntur.

MAGISTERIUM JALAPPÆ,

vid.

RESINA JALAPPÆ.

Eâdem methodo etiam

MAGISTERIA MARGARITARUM,

MATRIS PERLA-

RUM, &

OCULORUM CAN-

CRORUM,

conficiuntur.

MAGISTERIUM GUMMI GUTTÆ,

videatur

GUMMI GUTTÆ PRÆPARATIO.

*

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

REC. Aquæ fortis libram semis,
Bismuthi vel Marcasitæ un-
cias tres.

Marcasitæ grosso modo contusæ affunde primo

Aquæ fortis uncias duas;

Si inde nata effervescentia & solutio cessaverit, alias

Aquæ fortis uncias duas

affunde & hoc continua, donec omnem aquam fortem affuderis, quâ methodo marcasita omnis solvitur; solutionem aquâ fontanâ copiosissimè affusâ & sale Tartari parum alcalisatâ præcipita, præcipitatum edulcora & serva.

Usus est cosmeticus & admiscetur drachma una aquæ Liliorum alborum vel Nymphææ unciis quatuor; vel si placet unguentum, sumitur rosatum & uncia uni, drachma hujus magisterii additur.

Prostant exempla, quod nimis diuturno & frequenti usu faciem miserè defœdârît.

Pars II.

MAGISTERIUM SATURNI.

REC. Aceti Lithargyrii *quantum lubet,*

Instilletur solutio cinerum clavel-latorum aquâ fontanâ parata, præcipitabitur pulvis albus, qui affusâ aquâ tepidâ copiosâ edulcorandus & fervandus.

Usus est ad Cosmetica & Collyria.

MAGNES ARSENICALIS.

REC. Arsenici CrySTALLINI,

Antimonii crudi,

Sulphuris flavi *ana uncias duas.*

Fiat omnium pulvis subtilis, quem in vitrea retorta arenæ impone, ac in igne sensim aucto, tam diu detine, ab exhalante fumo sollicitè cavendo, donec omne deliquescat, quod stilo ferreo mundo explorari potest; tum refrigescat retorta, quâ fractâ, materiam, lapidis instar induratum, fusci caloris exime ac serva.

Est ingrediens Emplastri magnetici, & ita vocatur, quia credebant ab illo malignitatem bubonis extrahi, non secus ac à magnete ferrum.

A Sulphure vis caustica Arsenici mitigata est, ita ut ab ea timendum non sit.

MAGNESIA ALBA.

REC. Residui lixivii à crySTALLIFICATIONE nitri, quod omnem crySTALLIFICATIONEM respuit, & à nitrariis *mater nitri* vocatur, *quantum libet.*

Evaporetur in vase figulino vel ferreo, ad *dimidiæ partis* consumptionem; liquori instilletur solutio falis alcali, vel cinerum clavel-latorum, ad singulas libras lixivii ad dimidias evaporati, falis alcali *unciam unam* fumendo; præcipitabitur, sub quadam effervescentia, pulvis albicans; liquorem supernatantem, per inclinationem vasis, separa atque ulteriori coctione, ad ficcitatem evapora. Materiam griseam cru-

Kk

cibu-

cibulo candenti cochleatim immitte atque funde, & dum fumare definit, in laminam, vel marmor effundē, aquā tepidā dissolve & pulverem albissimum, qui levissimus esse debet, superfusā aquā fontanā copiosā, edulcora atque sicca.

Tanquam polychrestum & universale ad omnes morbos sub specioso Panaceæ titulo quondam fama ejus arcanum habitæ increbuit; hodie dum nitri-coctores magnesiā preparare sciunt & ipsis pharmacopolis vendunt.

Virtute gaudet absorbente & minori dosi exhibita, nonnunquam diureticā & diaphoreticā; si verò largiori dosi, ad drachmam unam, vel duas datur, & humores acidos in primis viis invenit, alvum laxat & evacuat.

Modus exhibendi est, vel drachmas duas cum emulsione amygdalarum manè propinare, vel salis Anglici Cathartici drachmis quatuor vel sex, unam drachmam Magnesiae addere & simul in aqua dissoluta exhibere. Quā posteriori methodo effectum satis laudabilem purgantem, absque ulla molestia, edit & præcipuè illis convenit, qui ardore ventriculi, quem sodam vocant, vexantur.

Prodest etiam teneris infantibus, ad lactis & pulmentorum acrimoniam in ventriculo subortam, contemperandam. Datur his à granis quinque ad scrupulum semis & ultra pro ratione ætatis.

MANDIBULÆ LUCII PISCIS PRÆPARATÆ.

A sordibus mundatæ, in subtilissimum pollinem tritæ & per linteam trajectæ ferventur.

Vulgo specificum antipleuriticum habentur.

A drachma semis ad scrupulos duos possunt dari.

MARGARITÆ ORIENTALES & OCCIDENTALES PRÆPARATÆ.

Antea in pollinem tritæ, super marmore, sicut corallia lævigantur.

Cordiales ipsis virtutes adscribuntur, nec non acidum absorbentes & præcipitantes, quæ etiam à matre perlarum expectantur.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis.

MASSA LIQUIRITIÆ ALBA, vid.

PASTA ALTHÆÆ.

*

MASSA LIQUIRITIÆ FUSCA Pharm. Paris.

REC. Extracti vel succi Liquiritiæ Hispanici *uncias octo,*
Gummi Arabici *libras duas,*
Sacchari albi *libram unam.*

Solvantur in

Aquæ fontanæ *sufficiente quantitate.*

Coquantur leni igne ad extracti solidi consistentiam, massam calentem supra tabulam marmoream oleo amygdalarum inunctam effunde & in bacillos leni calore ficcandos atque calido loco asservandos redige.

Humores acres temperat, atque in tussi sicca, & catarrhis commendatur.

MASSA PRO FORNACE ODORIFERA, five FUMALIS.

REC. Benzoës *uncias sex,*
Styracis calamitæ *uncias quinque,*
Ladani *drachmas sex,*
Terebinthinæ *unciam semis.*

Pulverifata immittantur sartagini, atque in vas aquæ bullientis demittantur, quò liquecant; liquatis adde

Olei destillati Ligni Rhodii,
Caryophyllorum,
Lavendulæ *ana scrupulum unum,*
Bal-

Balsami Indici nigri *drach-*
nam unam semis,
 Spodii nigri præparati *drach-*
mas duas.

Optimè misceantur & formentur
 ex massa cylindri, ceræ sic dictæ
 Hispanicæ instar.

Ad suffimenta inservit & fornaci
calidæ affricta totum conclave gra-
to odore replet.

MATERIA PERLATA,

five

MAGISTERIUM ANTIMONII
DIAPHORETICI.

REC. Antimonii diaphoretici, re-
 cens detonati, nondum
 edulcorati *libram unam,*
 coquatur in vase figulino, additis
 Aquæ fontanæ purissimæ *li-*
bris octo,

ad quartæ partis consumptionem.
 Aqua nitro antimoniato imbuta ca-
 lidè per filtrum trajiciatur &
 aceto instillato præcipitetur; pul-
 vis albus præcipitatus edulcore-
 tur; residuum verò Antimonium
 diaphoreticum ulteriùs aquâ te-
 pidâ ablui & servari potest.

Eadem sunt vires, quæ Antimonii
diaphoretici. Commodissimè addi-
tur emulsionibus, quibus se ob
subtilissimas particulas intimè com-
miscet.

Dosis est à granis duodecim ad scru-
pulum unum.

MEL ANTHOSATUM.

REC. Florum Rorismarini recen-
 tium, vel si deficient, her-
 bæ *uncias octo,*
 Aquæ fontanæ *uncias qua-*
tuor,

Mellis despumati calentis
libras duas.

Infundantur in vitro & post dige-
 stionem per *decem* vel *duodecim*
dies, in loco calido institutam, in
 balneo maris ebulliant atque mel
 expressum & colatum fervetur.

Cerebro & ventriculo roborando, fla-
tibus discutiendis, colicis & uteri-

nis doloribus leniendis, medetur.
Clysmatibus etiam addi potest.

MEL DESPUMATUM SIMPLEX.

REC. Mellis *libras quatuor,*
 Aquæ fontanæ *uncias octo.*
 Ebulliant, despumentur & per pan-
 num colatum mel fervetur.
Inservit ad incorporanda electuaria.

MEL MERCURIALE.

REC. Succı herbæ Mercurialis *li-*
bras tres,
 Mellis optimi *libras duas.*
 Misceantur & leni igne ad justam
 consistentiam coquantur, colen-
 tur & ferventur.
Additur enematis, ad alvum emol-
liendam & sollicitandam ab uncia
una ad duas.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

REC. Foliorum Rosarum recen-
 tium rubrarum *libras sex,*
 affunde
 Aquæ fontanæ ferventis *li-*
bras totidem.

Macerentur per *viginti quatuor ho-*
ras in vase figulino, exprimantur
 & colentur. Colaturæ adde
 Mellis optimi & purissimi
tantundem,

despumentur & coquantur ad con-
 sistentiam melle paulo liquidio-
 rem.

Usus est ad oris ulcera, gargarisma-
ta, collutiones, injectiones mundi-
ficantes & detergentes. Additur
etiam digestivis & quando ulcera,
à vesicatoriorum applicatione in-
ducta, purganda & detergenda sunt.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

REC. Succı Rosarum pallidarum
libras tres,
 Mellis optimi *libras duas.*
 Mixta dissolvantur, despumentur,
 & ad justam consistentiam, lento
 igne, evaporentur.

Rarus ejus usus est internus, ple-
rumque

rumque additur clysteribus, ab uncia una femis ad uncias duas.

MEL SAMBUCL.

REC. Florum Sambuci recentium decerptorum *libram unam;*

Macerentur in

Mellis despumati *libris duabus,*

in vase vitreo additis

Aquæ florum Sambuci *unciis sex,* per aliquot dies.

Ebulliant postea lento igne & exprimantur; expressum coletur & ad justam consistentiam evaporetur.

Usus est ad gargarismata resolutiva, ubi emolliendo, dolores ex inflammatione ortos, mitigat.

MEL VIOLARUM.

Paratur, sicut Mel Rosarum simplex, pro infusione florum rosarum, infusionem violarum sumendo.

Virtute & usu cum antecedente Rosarum solutivo convenit.

Dosis eadem.

MERCURIUS DULCIS.

REC. Mercurii sublimati corrosivi, Vivi, optimè purgati *ana libram semis.*

Terantur in mortario vitreo & sub tritura aquâ fontanâ paulum humectentur, atque sollicitè permisceantur, donec Mercurii vivi nil quidquam appareat, tum rursus exsiccata, è cucurbita vitrea, igne convenienti arenæ, in cupella ferrea sublima; fæces in fundo relictas, ut & materiam nigricantem, in collo altius sublimatam aufer. Mercurium sic sublimatum, in pulverem tritum, denuo sublima, sublimatumque serva, & si fortè restat metallici saporis aliquid, præstabit illum, aquâ fontanâ edulcorare, quàm sæpius sublimando, vi suâ laxativâ privare.

Egregium est & ex optimis, quæ in Medicina habemus, remedium;

accuratam verò & diligentem exposcit, tam præparationem, quàm rationem adhibendi circumspiciendam & providam.

Signum Mercurii rite præparati est, si insipidus & omnis metallici saporis expers est.

Caveant verò Pharmacopœi illum cum salibus, cujuscunque sint generis, terere & si cum salibus sit à Medicis præscriptus, illum seorsim pulverisatum, denuo commiscere meminere.

Reliquæ cautelæ è practicorum libris petendæ sunt; nimis longum enim foret, si omnes virtutes, adhibendi modos, & cautelas hîc inserere deberemus.

Paucis dicimus, Mercurium dulcem non solum vires laxandi, sed Janguinem etiam depurandi & minutissimos obstructos tubulos ac meatus referandi possidere.

In morbis igitur ab obstructione glandularum & visciditate lymphæ ortis, venerea lue, scabie pertinaci & ulceribus inveteratis remedium est, quod par sibi non habet.

Datur verò vel cum extracto quodam laxante, in forma pilulari, vel cum conserva rosarum, aut alia, in boli forma.

Dosis grana quinque, decem ad duodecim.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

ALBUS,

sive

COSMETICUS.

REC. Mercurii vivi *uncias quatuor.* Dissolve in

Aquæ fortis *unciis octo.*

Postea solutione salis communis, aquâ fontanâ factâ & probè saturatâ, in album pulverem præcipita, qui ab omni falsedine & acrimonia aquâ communi debite eluatur & lenissimo calore, ne flavescat, exsicceetur.

Adhibetur à nonnullis internè ad salivationem excitandam; sed se-
curius

curius externè ad lichenes, scabiem, & tophos venereos eo utimur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS
RUBER.

REC. Mercurii vivi purificati *libram semis.*

Dissolve in

Aquæ fortis sufficiente quantitate.

destilla ex retorta, in arenâ ad siccitatem, igne fortissimo, sub finem administrato, ut retorta ubique carbonibus obruatur. Post refrigerationem in fundo hærebit pulvis ruber, qui, nisi colore rubro pulchrè splendeat, leniter in patina ulteriùs calcinetur.

*Usu interno, cum corrosivus sit, nunquam adhiberi debet. Externè ad auferendas excrescentiâs carnosas, carnem luxuriantem & mundi-
ficanda ulcera maligna celebratur.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS
VIRIDIS.

REC. Mercurii vivi purissimi *uncias quatuor,*

Cupri unciam semis.

Solvantur singula seorsim in

Aquæ fortis sufficiente quantitate.

Misceantur soluta & Aqua fortis in vase vitreo, igne arenæ, evaporetur ad siccitatem.

Aceti destillati *libram unam* massæ salinæ affunde, digere & solve, atque acetum abstrahe, residuam massam viridem in pulverem tere atque serva.

Laudatur quidem tanquam specificum medicamentum, in gonorrhœa, aliisque morbis venereis, internè exhibitum; nos verò ejus usum internum dissuademus, ob vim emeticam & drasticam. Externè ad ulcera mundanda locum habet.

MERCURIUS SUBLIMATUS
CORROSIVUS.

REC. Mercurii vivi *libras duas,*
solve in

Pars II.

Aquæ fortis sufficiente quantitate;

solutionem ad siccitatem evapora; massæ albæ admisce

Vitrioli ad albedinem calcinati *libras tres,*

Salis marini decrepitati *tantumdem.*

Imple eâ cucurbitæ vitreæ *tertiam partem*, impone arenæ, ut cucurbita fundum cupellæ attingat. Orificium vasis sublimatorii apertum relinquitur, usque dum omnis humiditas exhalaverit, tum obturatur chartâ convolutâ; ignem adhibe primò lenem, quem per gradus auge, donec omnis mercurius sublimatus sit, quod circiter post *sex vel septem horas* continget; refrigeratum sublimatorium frange, & mercurium sublimatum exemptum serva.

Præstantissimum est ac fortissimum omnium venenum. Operationibus chemicis inservit; in medicina & chirurgia fere nullius usûs, nisi quod aquis phagedænicis addatur. A multis tamen ad tollendam luem veneream, ubi alia nil efficiunt, internè adhibetur.

MERCURIUS VITÆ.

REC. Butyri Antimonii *libram semis;*

Aquæ fontanæ purissimæ libras sex.

Misceantur, albescent & præcipitabitur pulvis subtilissimus albus ad fundum, qui sæpiùs, aquâ tepidâ affusâ, edulcorandus, & leni calore exsiccandus est.

Minimè est productum mercuriale, sed antimoniale.

Rarus est ejus in medicina usus. Vires sunt vomitoria, itâ, ut grana duo vehementes excitare soleant vomitus; præstat vini uncias duabus grana sex vel octo infundere & vinum per filtrum trajectum offerre.

Cum triplo nitri detonatum exhibet
LI BEZOAR.

BEZOARDICUM MINERALE.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Ab omni immunditie separati imprægnentur vino albo & leni calore exsiccati ferventur.

Egregiè resolvunt & aperiunt. Usus eorum est in febre quartana, ictero, asthma, hydrope, affectibus spasmodicis, urina pellenda.

Dosis scrupulus semis ad drachinam semis.

MIXTURA.

Mixturæ diffusæ julapiis sunt spissiores, ut plurimum cochleatim assumuntur; minore hinc quantitate præscribuntur & ex aquoso menstruo, syrupo & pulverulentis, maximam partem constant, quibus tamen alia subinde pro indicationibus variis, & ex tempore, secundum medici præscriptum adduntur atque in omni genere morborum adhibentur.

Mixturæ concentratæ sive contractæ, quia maximam partem sunt spirituosæ tam simplices, quam compositæ, vel ad essentias, vel spiritus, vel Elixir, vel tincturas, vel etiam balsama &c. referuntur, ubi etiam inveniuntur specimina varia.

MIXTURA SIMPLEX ALBA.

REC. Spiritus Tartari, è tartaro purificato destillati
uncias duodecim,
Vitrioli rectificati
uncias tres.

Misce & destilla per retortam ad ficcitatem; Spiritus, qui prodit volatilis, sulphureus & anodynus, commisceri debet cum Spiritus Theriacalis *uncias viginti,*

ac in vitro probè clauso servari.

NB. Spiritum Tartari cum spiritu Vitrioli separatim destillandum suademus, ut empyreumaticum spiritus Tartari principium ab acido vitriolico absorbeatur &

spiritus limpidior atque gratior, nec non principio vitriolico anodyno imbutus obtineatur.

Vires sunt alexipharmacæ, diaphoreticæ, carminativæ, anodynæ; datur in febris continuis, rheumaticis, variolis, ubi leniter transpirationem auget.

Dosis à guttis triginta ad quinquaginta vel sexaginta, vel sola, vel in potionibus cum pulveribus bezoardicis.

MIXTURA SIMPLEX
LUDOVICI.

REC. Tincturæ Bezoardicæ L. *uncias quinque,*
Spiritus Tartari volatilis rectificati *uncias quatuor,*

Vitrioli rectificati
unciam unam,

Camphoræ scrupulos duos.

Misceantur & digerantur.

Intercedit differentia inter mixturam simplicem ordinariam & hanc Ludovici; quod prior cum Spiritu theriacali; hæc verò cum tinctura bezoardica paratur, cujus singula uncia granum opii continet.

Vires sunt eadem ac mixturæ simplicis ordinariæ; magis tamen hæc anodyna & sudorifera est propter opium, quod Tincturæ bezoardicæ ingrediens est.

Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta.

MIXTURA SIMPLEX ORDINARIA.

REC. Spiritus theriacalis camphorati *uncias quinque,*

Tartari rectificati
uncias tres,

Vitrioli boni *unciam unam.*

Misceantur & digerantur aliquandiu, in vitro benè clauso.

Viribus cum præcedente convenit, atque eadem dosi exhibetur.

MIXTU-

MIXTURA TONICO-NERVINA
STAHLII.

REC. Spiritus Cornu Cervi recti-
ficati *unciam unam*,
Tincturæ Antimonii acris
uncias duas.

Misceantur & ferventur in vitro
probè obturato.

Optimi usus esse hanc mixturam ad
viscera roboranda, horumque to-
num debilitatum restituendum, Cl.
Author, aliique perhibent; unde
inprimis in morborum chronico-
rum declinatione, post graviores
quascunque excretiones & visce-
rum oppletiones, infarctum &c. eâ
utuntur.

Dosis bis in die ad guttas viginti,
usque quinquaginta.

MORSULI.

Morselli seu Tabulæ sunt præpara-
ta, quadratæ ut plurimum figuræ,
ex pluvibus & similibus sac-
charo & ad consistentiam tabu-
landi cocto exceptis, superque
tabulam ligneam, lapideam, cu-
preamque effusis, ut consoli-
dentur.

Delicioribus pulveres, aliæque nau-
seantibus præscribuntur; in ali-
quibus tamen morsulis, aromati-
corum gratia, saccharo ex parte
debetur, ac ubi ingrediuntur ama-
ra, amarities edulcoratur.

MORSULI AD ARDOREM
VENTRICULI

vulgo
SODAM.

REC. Testarum ovorum *drachmas*
novem,
Coralliorum rubrorum *un-*
ciam semis,
Nucis Cupressi *drachmam*
unam.

Subtilissimè pulverifata fiant cum
Sacchari in aqua Ceraforum
soluti & ad consistentiam
tabulati cocti *unciis duo-*
decim

Morsuli.

Usus patet ex titulo. Ex descripti-

one ordinaria diminuius absor-
bentia solis Ovorum testis, tanquam
tenerrimo absorbente contenti.

Dosis uncia semis ad integram quo-
vis tempore.

MORSULI ANTIMONIALES
KUNCKELII.

REC. Amygdalarum dulcium, mi-
nutim incisarum *unciam*
unam,

Cinnamomi acuti, minutim
incisi *drachmas duas*,

Cardamomi minoris *drach-*
mam semis,

Antimonii crudi purissimi,
subtilissimè pulverifati

unciam semis,

Sacchari albi, in Aqua rosa-
rum soluti, & ad confi-
sistentiam tabulati cocti

uncias septem.

Fiant morsuli.

Magnæ tribuuntur vires his morsulis
ad scabiem ulcerosam, reliquias à
variolis, gonorrhæam malè tracta-
tam, affectus convulsivo- & spa-
stico-arthriticos.

Uncia una continet Antimonii drach-
mam semis.

Dantur à drachmis duabus, ad un-
ciam dimidiam, singulis diebus
manè & vespere ante somnum.

MORSULI IMPERATORIS.

REC. Cinnamomi acuti *drachmas*
duas,

Specierum Imperatoris pro
morsulis grosso modo
incisarum *drachmas sex*,

Corticum Aurantium con-
ditorum,

Citri conditorum,

Carnis Citri conditæ ana
unciam unam,

Amygdalarum dulcium *un-*
ciam unam semis.

Condita & amygdalæ mundatæ
minutim incidantur & postea
cum

Sacchari, in

Aqua Rosarum soluti & ad
L 1 2 con-

consistentiam ta-
bulati cocti *unciis*
sedecim

Mixta, fiant Morsuli.

*Est medicamentum stomachicum ori-
gratum.*

*Datur inprimis aquas minerales hi-
bentibus.*

MORSULI PURGANTES.

REC. Magisterii, five
Resinæ Jalappæ *drachmam*
unam,

Optimè teratur cum
Amygdalarum dulcium
drachmis tribus,

his adde

Cardamomi minoris *scrupu-
lum unum,*

Cinnamomi acuti *scrupulos*
duos,

Sacchari, in

Aqua Rosarum soluti & ad
consistentiam tabulati
cocti *uncias septem se-
mis.*

Fiant morsuli.

*Uncia horum morsulorum grana cir-
citer octo continet magisterii.*

*Datur pueris alia medicamenta re-
spuentibus.*

Dosis pro ratione ætatis drachma
una, duæ ad sex.

MORSULI ad SCABIEM.

REC. Florum Sulphuris *unciam*
semis,

Antimonii crudi Hungarici,
subtilissimè pulverisati,

Specierum Imperatoris *ana*
drachmas duas,

Amygdalarum dulcium ex-
corticatarum, minutim
incisarum *unciam unam,*

Sacchari albißimi, in

Aqua Naphæ soluti, & ad
consistentiam tabulati
cocti *uncias octo.*

Misce, consperge

Flosculis variorum colorum
minutim incis, *demum*

demum

Olei de Cedro *guttis decem,*
& fiant lege artis morsuli æqua-
les *Nº. viginti.*

Quivis morsulus continet Florum
sulphuris grana duodecim & An-
timonii grana sex.

Commodè dispensantur infantibus sca-
bie affectis, si alia medicamenta
respuant; & præscripta portio un-
ciarum decem fere sufficit ad sca-
biem ordinariam persanandam, si,
præmisso purgante, sumatur unus
morsulus manè & vespere cum de-
cocto ligni Juniperini, vel alia pti-
sana appropriata, adhibitis simul
balneis & unguento ad scabiem
WERLHOFII vel ZELLEKI,
quâvis vespere, aliquot articulis
calidè infrieto. Pro infantibus
decem annos natis datur solum-
modo dimidia vel demum tertia
pars unius morsuli.

MORSULI seu TABULÆ STRUMALES.

REC. Pulveris lapidum Spongia-
rum testorum
drachmas sex,
Radicis Pyrethri,
Corticis Cinnamo-
mi *ana drachmas*
duas,

Sacchari Canariensis, in
Aqua Naphæ soluti, & ad
consistentiam tabu-
lati cocti *uncias*
quinque.

Misce, fiant morsuli *Nº. triginta.*
Usus titulus docet. Capitur unus,
*jeiuno stomacho, & dum cubi-
tum itur, per quindecim dies,*
subjuncto in media cura, & post
finem ejus, laxante phlegmagogo.
Eò certior effectus est, si eodem
*tempore Emplastrum ex æquali-
bus partibus Emplastri Saponati*
& de Cicuta alutæ inductum,
strumæ applicatur, tertio quovis
die renovandum.

MORSULI CONTRA VERMES.

REC. Seminis Cynæ,
Saccha-

Musci Corallini ana unciam
semis,
Æthiopis mineralis,
Jalappæ resinosæ ana drach-
mas tres,
Cinnamomi drachmas duas.
Omnia pulverisata commisceantur
cum

Sacchari albi, in
Aqua Rosarum soluti & ad
consistentiam tabulati
cocti uncis septem.

Fiant morfuli.

*Dantur infantibus medicamenta alia
anthelmintica reformidantibus.*

*Quælibet uncia habet Æthiopis mine-
ralis scrupulum unum & tan-
tundem Jalappæ.*

*Dosis igitur infanti à drachma una
ad duas.*

MUCHARUM ROSARUM.

REC. Florum Rosarum. Damasce-
narum recentium li-
bras octodecim.

Infundantur & macerentur horis
viginti quatuor, in

Aquæ claræ ferventissimæ
totidem libris;

postea exprimantur, & in vasis
angustioribus oblongorum col-
lorum, superaffuso oleo Oliva-
rum modico ferventur.

*Inservit conficiendis, etiam extra flo-
rendi tempus, Syrupis & melli ro-
satis.*

NITRUM ALCALISATUM,

vel

FIXUM.

vid.

LIQUOR NITRI FIXI.

*

NITRUM ANTIMONIATUM.

Fit aquam, in qua Antimonium
Diaphoreticum post detonatio-
nem solutum fuit, evaporando
ad siccitatem & sal ficcum asser-
vando.

*Ad naturam Salium mediorum acce-
Pars II.*

*dit, & calcis Antimonii particeps
est.*

*Datur ad humorum orgasmum con-
temperandum & pulveribus absor-
bentibus additur.*

Dosis ad drachmam semis & ultra.

NITRUM CRYSTALLISATUM,

&

DEPURATUM.

Solvatur Nitrum, in

Aquæ fontanæ quantitate suf-
ficiente,

leni calore, liquor per pannum
colatus, ad crystallisandum re-
ponatur. Crystalli longæ, py-
ramidales colligantur & ser-
ventur.

*Viribus præcellit hoc nitrum crysalli-
satum, vulgare, & divinum est
remedium in exæstuatione sangui-
nis, febribus ardentibus fere omnis
generis, in variolis etiam, pur-
pura, ubi sedtaivâ & antispasmo-
dicâ virtute eminet.*

*Dosis à granis sex ad triginta, in ve-
hiculo aquoso.*

NITRUM PERLATUM.

REC. Nitri Crystallisati puri un-
cias quatuor;

Matris Perlarum præparatæ
unciam semis.

Misce.

*Commendatur in febribus continuis,
& malignis, ac haud inferius est
illi, quod cum Margaritis para-
tur.*

*Dosis à granis quinque ad scrupu-
lum unum.*

NITRUM ROSATUM.

REC. Infusionis Rosarum rubra-
rum saturatæ libram
unam.

In hac dissolve

Nitri crudi Crystallini libram
semis;

Evaporet solutio, lento igne, ad
dimidias, postea ad crystallisan-
dum

M m

dum repone, crystallos ficcatas ferva.

Additur gargarismatibus, in faucium & tonsillarum inflammatione, cum absorbentibus, in dysenteria etiam maligna secure adhibetur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

NITRUM SATURNINUM.

REC. Nitri crudi crystallifati uncias tres,

Sacchari Saturni uncias duas.

Solvantur in

Aquæ Rosarum sufficiente quantitate,

& in vase vitreo, ad pulvis craffioris consistentiam, evaporentur, postea, leni calore, penitus siccentur.

Exulet pro usu interno absolutissime, ne post se trahat tabem saturninam incurabilem.

In magna faucium inflammatione, ac uvulæ laxitate, gargarismatibus & in oculorum inflammatione, collyriis additur.

NITRUM TABULATUM,

vid.

LAPIS PRUNELLÆ.

Hoc modo quoque

NITRUM PAPAVERINUM, VIOLATUM &c.

Confici posset.

NODULI.

Sicut Amuleta, ad superstitiosa auxilia pertinentia, jam dudum antiquata, in officinis non prostant, neque à Medicis rationalibus præscribuntur.

OCULI CANCRORUM CITRATI.

Parantur, ut conchæ citratæ, atque effectu diaphoretico, bezoardico & diuretico præcellunt præparatis.

OCULI CANCRORUM PRÆPARATI.

Lapilli Cancrorum crudi aliquoties aquâ fontanâ abluuntur, & rursus ficcati, in pollinem subtilem teruntur, atque per linteum trajecti servantur.

Absorbentes sunt, diuretici, & in omnis generis febris locum habent.

Dosis à scrupulo uno ad duos.

OLEUM

Est pinguedo quædam liquida, ad sensus homogenea, non tamen simplicissima, tota inflammabilis & aquæ non permiscibilis, in resinæ consistentiam condensabilis, tumque tenacissime adhærens. In officinis dantur Olea destillata, expressa, infusa & cocta.

OLEA DESTILLATA.

Essentialia quoque dicta sunt salia volatilia, in partibus resinosis concentrata, liquida tamen, quæ simplicium suorum virtute concentratâ gaudent. *Essentialia* dicuntur aut olea ætherea, ob summam volatilitatem, igneamque substantiam.

OLEUM ABSINTHII DESTILLATUM.

REC. Summitatum Absinthii, cum semine maturitati proximo, in umbra ficcatarum libras viginti quinque.

Incisæ & conquassatæ macerentur per triduum, in

Aquæ fluviatilis libris septuaginta quinque,

additis

Salis communis libris tribus; Destillentur postea è vesica ad tertiam partem repleta, & oleum aquæ innatans separetur & servetur ad usum.

Oleum Absinthii est stomachicum, hepaticum, splenicum, vermes necans

cans & sudoriferum, calefaciens tamen, ergo conveniens in dictis affectibus à causa frigida natis.

Eodem modo parantur olea destillata sequentia:

OLEUM ARTEMISIÆ, aperitivum, traumaticum, & cephalicum.

CHAMOMILLÆ, carminativum, resolvens, febrifugum.

CHÆREFOLII, vulnerarium, detergens, aperitivum.

HYSSOPI, roborans, sanguinem attenuans, diureticum, emmenagogum.

LAVENDULÆ, cephalicum, & in malo hysterico ac epileptico utile.

MAJORANÆ, anticolicum, carminativum, cephalicum.

MELISSÆ, nervis amicum, & stomachicum.

MENTHÆ, carminativum, stomachicum, in singultu, vomituque excellens, quod Oleo Nucis Mochatæ substitui potest.

MILLEFOLII, resolvens, traumaticum, adstringens, uterinum.

ORIGANI, stomachicum, incidens, hystericum, aperitivum.

PULEGII, hepaticum, emmenagogum, diureticum, bechicum, antasthmaticum.

OLEUM RORISMARINI, balsamicum, cephalicum, nervinum, & uterinum.

RUTÆ, diureticum, alexipharmacum, anticolicum.

SABINÆ, emmenagogum, foetum pellens, diureticum, antasthmaticum, ulceraque serpentia fanans.

SALVIÆ, nervinum, balsamicum, diureticum, uterinum, traumaticum.

SATUREJÆ, stomachicum, carminativum, uterinum.

SERPILLI, cephalicum, stomachicum, diureticum, cum oleo Thymi conveniens, sed odoris suavioris, minus penetrantis.

TANACETI, vulnerarium, anthelminthicum, nephriticum & uterinum.

THYMI, excellens in colica flatulenta, anticatarrhale, stomachicum, & nervinum.

* * *

OLEUM ANETHI.

REC. Seminis Anethi contusi libras quatuor,

M m 2

Infu-

Infusum

Aquæ fluviatilis *libris sedecim,*

ac *per triduum* additâ

Salis *librâ unâ,*
maceratum, destilletur è vesica,
& oleum, ut moris est, ab aqua
separetur.

Viribus gaudet carminativis & diureticis.

Eâdem encheiresi destillantur reliqua Olea ex Seminibus, uti

OLEUM ANGELICÆ, alexipharmacum, carminativum, diureticum.

ANISI, stomachicum, carminativum, pneumonicum.

CARVI, in colica, hydrope flatuoso & humoribus flatulentis utile.

CORIANDRI, stomachicum, antifebrile, carminativum.

CUMINI, diureticum, carminativum.

FOENICULI, stomachicum, & carminativum egregium.

JUNIPERI è BACCIS diureticum, sudoriferum, emmenagogum, aperiens & carminativum.

LAURI è BACCIS, emmenagogum, diureticum, anticolicum.

* * *

OLEUM ANIMALE
DIPPELIANUM.

REC. Olei Cornu Cervi foetidi, vel
Sanguinis Cervini *libras quatuor,*

Affundantur

Aquæ tepidæ *libræ sex.*

Conquassatione in hac aqua solva-

tur sal illud, quod oleum acre reddit, & quo separato mitescit. Oleum per tritorium aut vitrum hypoclepticum separetur; reliqua verò illi adhærens, per destillationem è cucurbita vitrea, calore bullientis balnei, donec aquæ nihil, inde amplius elici queat, abstrahatur.

Immittatur dein Cornu Cervi usti *quantitas sufficiens* retortæ vitreæ satis capaci, superfundendo oleum modò destillatum, per tubulum vitreum retortæ collo graciliorem, ne oleo sub infusione colli parietibus adhærente, collum inquinetur; applicetur excipulum majus, & calore moderato destilletur, sensim augendo ignem, usque ad supremum gradum, cujus arena capax est, donec nihil amplius ascendant.

Oleum transillatum indatur cucurbitæ vitreæ humili, superfundendo

Aceti vini *tripolum.*

Fiat destillatio aliquoties, aut toties cum *triplo aceti*, respectu olei rectificati repetenda, donec oleum animale limpidissimum, rectificatissimum & ab empyreumate summè liberatum obtineatur.

Hujus olei bonitas eruitur ex ejus limpiditate; sed adeò tenerum est, ut aëris commercio citrinum sensim sensimque colorem induat; hinc in vitris minoribus, eo plenissimis, optimèque clausis asservandum. Ergo iteratis destillationibus è vasis recentibus evadit fere spiritus instar tenuis, pellucidissimus, volatile, penetrantissimus, odore & sapore gratum ac quasi aromatizatum, miræ penetrabilitatis per omnes corporis vias ac præcipuè per angustissima cerebri vasa, existentes inibi obstructions reserans, anodynum, resolvens, febrifugum, antepilepticum, nervis amicissimum.
Dosis guttæ sex ad quindecim è vehiculo largiore.

OLEUM

OLEUM BENZOES.

REC. Residuum in olla à separatione Florum Benzoës.

Teratur & misceatur triplo arenæ; fiat destillatio per retortam vitream gradu ignis secundo vel tertio; Sic affurgit exigua florum quantitas, phlegma & oleum. Flores & oleum ab aqua separentur; oleum verò affusâ aliâ aquâ rectificetur, usuque fervetur.

Nota. *Melius est residuum supra dictum sumere, ne flores in destillando partim collum retortæ impleant, partim vas recipiens.*

Rubicundum hoc & fragrans oleum salutare est in nervorum affectibus; additur ergo unguentis & suffimentis, ut fragrantiam illis mutuetur.

OLEUM BUXI

è

LIGNO.

REC. Scobis Ligni Buxi subtilius rasæ quam um placet.

Impleatur hac scobe retorta vitrea fere ad collum usque, fiat destillatio ex arena per gradus, postquam agglutinatum fuit excipulum valde capax; sic prodit primò phlegma, postea aucto ignis gradu Spiritus acidus, auctiore acidior unà cum oleo rubro fat copioso; demum ad ollæ ferreæ candescentiam affurgit fumus, simulque oleum spillum, tenax, nigrum. Tum denique prunæ imponantur arenæ supra retortam, qui vocatur ignis suppressionis, isque protrahatur, donec nil olei amplius exstillet. Vasis refrigeratis oleum ab acido Spiritu separatum & rectificatum usui fervetur.

Nota. *Transstillato phlegmate excipulum mutari potest, quanquam id non opus, cum spiritus acidus, absolutâ olei crassioris separatione, poterit, è vase puro vitreo destillari, limpidiorque & purior haberi.*

Pars II.

beri cum oleo; quod occultum tenuit, manifestato. Oleum crassius empyreumaticum rectificetur primò cum calce viva mixtum, è retorta vitrea, dein è cucurbita humili semper recente, cum aceti vini triplo, donec evadat liquidum, limpidum, tenue, eoque labore aliquoties repetito accedat ad naturam oleorum essentialium. Poterit in rectificatione oleum destillatione è spiritu acido extricatum admisceri, postquam crassius oleum è calce viva tenuius evasit.

Septica sunt olea empyreumatica; hinc rectificatione opus. Oleum Buxi æquiparatur virtuti olei Ligni Guajaci; internè dari potest ad guttas tres vel quinque ut narcoticum in epilepsia utilissimum. Externè ad dentium cariem & inde ortos dolores.

OLEUM CAMPHORÆ LIQUIDUM

&

BUTYRACEUM.

REC. Camphoræ libram semis,
Boli rubri, vel
Terræ argillaceæ ficcæ libras duas.

Optimè permixta è retorta, lenissimo igne, destillentur; sic prodit cum phlegmate acidulo oleum Camphoræ liquidum, subtilissimum & in fine in collum retortæ sublimatur oleum, butyri instar, quæ singula seorsim fervanda.

Penetrantissimum hoc oleum, quod subtilissima pars camphoræ est, ad defluxiones catarrhales & dentium dolores, à causa frigida ortos commendatur, illòsque quasi in momento sedat externè applicatum. Adhibetur quoque ad condienda insecta.

OLEUM CARYOPHYLLORUM
AROMATICORUM.

REC. Caryophyllorum libras duas,
Tritis affundantur

Aquæ pluvialis libræ sedecim,
Addantur

N n

Salis

Salis communis *unciæ quatuor.*

Stent per *quinque* vel *sex dies* in loco calido, postea fiat destillatio è vesica; sic prodit unà cum aqua oleum Caryophyllorum, omnis odoris expers, quod fundum petit.

Nota. *Aquæ è destillationibus oleorum essentialium residuæ asservari possunt ad novas destillationes aliâ vice instituendas, quia oleosis particulis sunt prægnantissimæ.*

Pari modo parantur

OLEUM CARDAMOMI, *attenuat, flatus discutit, coctionem promovet.*

CINNAMOMI, *omnium aromatum princeps suppeditat præstantissimum cordiale, roborans, calefaciens.*

MACIS, *stomachicum, uterinum, carminativum.*

NUCIS MOSCHATÆ, *cephalicum, uterinum, stomachicum, & anodynum.*

PIPERIS, *calefaciens, incidens & resolvens.*

* * *

OLEUM CERÆ.

REC. Ceræ flavæ odoratissimæ *quantitatem sufficientem.*

Scindatur in frustula tam parva, ut retortæ orificio commodè possint immitti, eaque repleti ad dimidium. Tum infundatur arenæ purissimæ tantum, quantum capit venter retortæ. Calef-

cat tum lentè retorta, donec cera liquefscens arenam sibi permiscuerit, totàmque quasi inunxerit; imponatur furno arenæ, applicetur recipiens, fiat destillatio per gradus: adhibito primo leni ignis gradu, prodire solet aqua acidula, foetens, pauca, unà cum Spiritu. Ubi nihil amplius transtillat, mutetur recipiens & augeatur ignis, ascendet sensim oleum tenue, dum destillat, in excipulo concrefcens instar butyri, colore fere albescente. Ubi ultra prodire negat, major adhibendus est ignis, ac demum ignis suppressionis; tum ascendet satis subitò in excipulum tota ceræ massa, ubi formâ solidâ consistit instar butyri; sed amisit naturam ceræ duram: liquefcit enim pinguis hæc massa; arena autem tantâ copiâ admisceri debet, ut compescat ebullientis ceræ flatulentam expansionem aliter futuram.

Hoc Butyrum Ceræ liquefcât leni igne, sine ulla additione; infundatur per infundibulum, benè calefactum prius, in retortam vitream itidem calefactam, ut dimidiam partem sit repleta, cavendo, ne quid butyri collo retortæ adhærescat. Imponatur furno arenæ, agglutinato recipiente puro. Lenissimo ignis gradu fiat destillatio, ut guttatim solummodò destillet. Incitetur ignis, quàm primum stillare recusat, & quousque in retorta aliquid butyri superest. Ascendet hæc ratione omne butyrum fere sine ulla face. Si hoc oleum ceræ, novâ rectificatione, eodem modo tractetur, evadet semperliquidius, mollius, pellucidius, tenuius, adeoque mitius & penetrabilius.

Butyrum ceræ præbet unguentum molliissimum, anodynum, neuroticum, emollientissimum, laxans, illitu suo contracta membra juvans, cutim contra rigiditatem aridam, fissilem, frigidam, hybernâ, felicissimè

*liciffimè defendens ; hæmorrhoidum quoque asperos dolores pulcherri-
mè lenit.*

Oleum ceræ remedium præbet vix ulli alteri comparandum ad mala papillarum nervosarum , quæ in cute extrema denudata sunt , ad fissuras labiorum & papillarum in lactantibus , ad digitorum & manuum rhagades , ad tumores atque pernicioses à frigore inductos & tendines contractos ; hinc obrigescentes articulos cum balneis , fomentis , motu hoc oleum valet mirificè , flexilitatem restituendo. Abdominis crebra inunctio , facta de hoc oleo , adstrictæ alvo lubricitatem conciliat ; hinc in morbis infantum curandis abdomini illitum , nobile remedium constituit.

OLEUM CORNU CERVI.

REC. Cornuum Cervi in fragmenta majora sectorum,
quantum placet.

Committantur retortæ terreæ vel vitreæ lutatæ , & instituaturn destillatio in furno reverberii , observando ignis gradus ; sic prodibit adhibito primo gradu phlegma , secundo & tertio gradu spiritus & sal volatile , quod circa latera recipientis majoris in hastulis apparebit ; tandem prodibit , quarto gradu , oleum resinofum foetidum & empyreumaticum , in retorta verò manebit Cornu cervi ustum , nigricantis coloris , quod in furno figulino ulteriùs calcinatum , colorem induit niveum , adeoque uno processu haberi poterunt , quæ è cornu cervi desiderantur. Omnia modò dicta , finitâ destillatione , agitando confundantur in recipiente , ad dissolutionem salis , quæ à phlegmate obtinetur. Omnia liquida effundantur in filtrum chartaceum , priùs aquâ humectatum , sic per poros filtri spiritus & sal volatile penetrat , oleum verò manet in filtro usui servandum.

Rarò internè adhiberi solet , sed oleum animale Dippelii inde parari potest.

OLEUM CORTICUM
AURANTIORUM.

REC. Corticum recentium Aurantiorum , *quantum placet.*

Incisi cum

Aquæ fontanæ sufficienti quantitate

è vesica destillantur , absque maceratione , ac oleum , ut in reliquis , aquæ innatans , lege artis separetur. Signum absolutæ destillationis est , si aqua prodeat insipida , & nullum oleum supernatet , aut innatet.

Calefacit , spiritus animales excitat , lentorem attenuat , fibras nervosas stimulat in morbis ortum habentibus à frigido , aquoso , pituitoso , sub parca dosi , uti cum omnibus oleis essentialibus.

OLEUM CORTICUM
CITRI.

Eadem methòdo , quâ præcedens paratur.

Isdem gaudet viribus , quibus reliqua olea ætherea , circa quorum usum cautelâ practicâ opus.

OLEUM GALBANI.

REC. Gummi galbani libram unam ,
Arenæ lotæ & ficcatae libram unam semis.

Destillantur per retortam vitream , igne arenæ , liquor albus cum oleo prodiens separetur , oleumque aceto , vel aquâ rectificatum usui fervetur.

Umbilico illitum laudatur in doloribus colicis , hystericis & spasmodicis.

Eodem modo destillari & rectificari possunt,

OLEUM AMMONIACI , *digerens ,
resolvens ,
maturans ,
& emolliens.*

OLEUM MASTICHES , *calefaciens , subadstringens , roborans.*

MYRRHÆ , *aperiens , calefaciens , attenuans , discutiens .*
Et putredini resistens.

TACAMAHACÆ , *roborans , resolvens , maturans , emolliens , Et dolores leniens.*

De myrrha notandum, quod suavissimum quoque oleum , sed in exigua quantitate, destillatione cum aqua fontana largiatur.

OLEUM GUAJACI.

è
LIGNO.

REC. Ligni Guajaci compacti ,
 in scobem tenuem re-
 dacti, *quantum satis*
 ad implendam retortam vitream,
 fere ad collum usque, cavendo,
 ne in excipulum quidquam ejus
 incidere possit. Fiat destillatio
 ex igne arenæ per gradus, ex-
 actè glutinando commissuras
 colli retortæ & recipientis valde
 capacis. Eousque primo ignis
 gradu pergatur, quàm diu exi-
 bit aqua liquida, acidula, acri-
 ter odorata, seorsim, si lubet,
 fervanda. Aucto ignis gradu
 prodibit liquor satis adhuc lim-
 pidus, acidior, pinguis & sub-
 rubellus, satis fortis, odora-
 tusque, nidorem halecum fuma-
 torum quasi referens. Aucti-
 ore. & quadantenus sustentato,
 liquor ruber pinguis, valde aci-
 dus, unà cum oleo rubro, inna-
 tante liquori acido, quod satis
 copiosum est. Tandem intenda-
 tur ignis validissimè, ut olla fer-
 rea furni jam incipiat candescere,
 affurget fumus, simulque oleum
 spissum, tenax, nigrum fundum
 liquoris prioris petens. Demum
 adhibeatur ignis suppressionis,
 imponendo arenæ prunas vivas

supra retortam, eumque protra-
 hendo, donec nihil olei amplius
 exstillet; semper tamen fumus
 manebit in excipulo. Vasis spon-
 te refrigeratis, habebitur ultimâ
 hâc ignis torturâ, aliqua adhuc
 portio olei crassissimi, nigerrimi,
 ponderosi, picem æmulantis,
 quod per chartam humectatam
 ab acido separandum rectificetur,
 uti dictum de *Oleo Buxi è Li-
 gno*, usuique fervetur.

Manens in retorta scobs nigerri-
 ma, levis, insipida, fere ino-
 dora, valde friabilis audit *verus*
ille carbo Helmontianus, nullâ vi
 ignis ut ut constantis, vase clau-
 so, unquam in cineres albos cal-
 cinabilis, ideoque semper adhuc
 inflammabilis, admotâ prunulâ e-
 rumpit in ignem lucentem, spon-
 te quaquaversum sese expanden-
 tem. In cineres albos sic colla-
 psus, sale alcalino tunc omnino
 destitutus, ex scobe recenti au-
 tem combustus, eo sale dives.

*Cum aliis balsamicis mixtum, egre-
 gium est antivenericum ad guttas*
tres vel quinque.

OLEUM è LATERIBUS,

feu

PHILOSOPHORUM.

REC. Oleum Olivarum,
 Misceatur

Farinæ Laterum, vel

Pulveris Calcis vivæ qua-
druplo.

Hæc mixtura per retortam vitream,
 gradatim ignem augendo usque
 ad *tertium*, pellatur in vas re-
 cipiens amplum, sic assurgit
 oleum limpidum, empyreu-
 maticum tamen redditum, quod
 bis vel ter de recenti pulvere
 laterum aut calce viva rectifice-
 tur, magis magisque subtilise-
 tur, & in spiritum igneum,
 volatilem, subtilem, & pene-
 trantem transmutetur, quoni-
 am omnis viscositas resinæ cras-
 sior, in oleo olivarum delitescens,
 in terreo corpore remanet.

Simi-

Similis processus instituitur circa sebum, axungiam atque medullam animalium & tam diu cohobatio continuatur, donec febasea substantia transmutata sit in oleum subtile, spirituosum.

Hoc oleum, uti & illud sevi, axungiae & medullae, laudatur ut topicum externum nervinum, & anodynum in doloribus; antiparalyticum est, antarthriticum: resolvit enim tumores frigidos, fungosque articularum, scirrhus, strumas, scrophulas. Remedium egregium est in hernia; consolidat fissuras pedum, manuum, pudendorum. Traumaticum quoque est in vulneribus & ulceribus.

OLEUM LIGNI SASSAFRAS.

REC. Ligni Sassafras in scobem rasi quantum placet.

Misceatur cum

Aquæ vigecuplo
in vase destillatorio & ebulliat satis fortiter, ut aquam stillet lacteam, cum oleo fundum petente, pergendo in destillatione, quam diu oleum cum aqua adhuc valde lactea prodit. Tum in vase manet decoctum acidoustum. Separato oleo ab aqua.

REC. Decoctum prius, à destillato ligno Sassafras decantatum,

Misceatur cum

Aqua primâ vice egressa, infundatur dein nova scobs ejusdem ligni, fiat destillatio, sic plus ejusdem olei secundâ vice prodibit, & tertiâ vice adhuc plus, si nova cohobatio fiat; idem observando in tertia destillatione, quod in secunda.

Eodem modo

OLEUM LIGNI RHODII, mundificans, urinam
& sudorem
ciens.

SANTALI CITRINI, lymphæ vitia
corrigen.

Pars II.

OLEUM CALAMI AROMATICI,

alexipharmacum,
balsamicum, stomachicum,
resolvens,
carminativum.

ZEDOARIÆ, anticolicum, alexipharmacum, emmenagogum, et anthelminthicum.

ZINGIBERIS, incidens, attenuans,
roborans.

destillantur, postquam addito sale culinari per quatuor vel quinque dies in conclavi calido macerata fuerunt; quod intelligendum de iis, quæ ligneâ, durâ valde & ponderosâ compage gaudent.

Ut genuina habeantur hæc olea, pharmacopæis incumbit, ea proprio Marte destillare, quia omnia scire olea destillata, vel ex Batavia, vel aliunde allata, deprehenduntur adulterata.

Omnium modò recensitorum virtus petenda è simplicibus, unde destillata. Rarò internè præscribuntur, quia sanguinem temperamentorum calidiorum nimis commovent. Aliquot autem guttæ, saccharo instillatæ, & Eleosaccharum, quod pulveribus additur, vel ad gratum saporem conciliandum, vel ad vires augendas, nonnunquam præscribuntur. Externè adhibita, sunt cephalica, nervina, antispasmodica, carminativa & virtute suâ balsamicâ roborant.

OLEUM PETRÆ, album,
rubrum,
nigrum,

In materia medica occurrunt.

OLEUM SAPONIS.

REC. Rasuræ Saponis Veneti
libram unam,
Arenæ mundæ libras tres.

Mixta è retorta destillantur, igne arenæ, oleum super cineribus rectificetur.

Sugillationes & topbos resolvit, spasms & dentium doloribus medetur, septicum præbet ad ul-

O o

cera

cera mundificanda, atque pannos in oculis brutorum extirpandos; internè ob vim sanguinem commovendi, rarò vel nunquam datur.

OLEUM SUCCINI.

REC. Rafuræ Succini Borussici
partem unam.

Misce

Arenæ triplo,
pelle è retorta vitrea capaci, per gradus usque ad quartum, sic primò intrat in vas recipiens phlegma, sive spiritus, succedit dein oleum & sal volatile. Finitâ destillatione oleum & phlegma à sale volatili separa, aquam calidam in vas recipiens fundendo, idque eluendo, atque oleum,

Cinerum partibus duabus
mixtum rectifica è retorta, lento igne, sic impetrabis oleum limpidum primò exstillans album, & alterum subsequens flavum ac tandem rubrum, singula seorsim fervanda. Reliquus procedendi modus occurrit sub titulo salis volatilis succini.

Oleum succini multum convenit cum
Oleo Petræ, & egregium resolvens, diaphoreticum, diureticum & emmenagogum, calidum tamen & valde acre est; in parva igitur dosi exhibendum; sufficiunt guttæ quinque vel decem. Externè ad cephalalgiam & membra paralytica, nec non ad rheumaticos dolores adhibetur.

OLEUM SULPHURIS.

Est Spiritus Sulphuris per campanam, concentratus.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

REC. Terebinthinæ pellucidæ *partem unam,*

Aquæ fontanæ partes decem.
Destillantur lento igne, ex vesica, sicut alia olea destillata; sic affurgit, cum aqua, limpidissimum & subtile oleum, uno verbo, subtilis atque volatilis resina, salibus volatilibus remixta, ab aquositate separanda ac ser-

vanda. Craffior verò resina, in fundo vesicæ remanens, dicitur *Terebinthina cocta*, quæ ulteriore coctione, absque aqua institutâ, in *Colophoniam* reducibilis.

Sunt multæ species oleorum terebinthinæ, quò referri quoque potest oleum Spicæ, quod in officinis venditur, atque in arte pictoria, imò in mulo medicina in usum vocatur. Porro huc pertinet oleum *Heraclinum*, vel *Carpathinum*: hoc enim est oleum destillatum ex ligno abietino montium *Carpathiæ*. Qui verò in hisce locis olea destillata fragrantia falsificant, recipiunt lignum resinofum pini, pinastri, & vetegetabilibus addunt; sic oleum in illis contentum simul affurgit, & quantitas oleorum augetur, vis verò castratur & infringitur.

Oleum Terebinthinæ limpidum, leve, totum inflammabile, volatile, valde penetrans, amarum, multiplicis est usus in chirurgicis: nam membranis, nervis, tendinibus laceratis, punctis, sectis, semisectis, calidè infusum, est incomparabile anodynum, antispasticum, & consolidans. In hæmorrhagiis, ex artiarum & venarum vulneribus promptissimum; securissimum est stypticum, eò quòd simul nervis prospiciat, sistat putredinem, consolidetque; oportet tum valde calidum applicare & splenis appressis ad locum detinere. Tumores frigidos, lentos, mucosos, calidum hoc oleum affrictum sæpe discutit, partes defendit adversus frigus, laxat easdem, emollitque. Interno usu aperit, calefacit, sudores, urinam movet, hanc odore violaceo penetrabili inficit; cavendum, ne nimia ejus copia, caput petens, æstum ibi & dolorem excitet, lotium fortius urgeat, funesto eventu, ubi animus est gonorrhæam eo tollere. Circumspectus igitur esto ejus usus.

Dosis, guttæ sex ad duodecim, quindecim.

OLEUM

OLEUM TERRÆ.

In India orientali paratur, quod ad nos quoque advehi cæpit. Ex quo autem subjecto depromatur, hæcenus nondum constat. Quid quid tamen sit, gratissimum est oleum, eminentis odoris atque saporis, coloris rubri & diaphani.

Externè adhiberi solet in nervorum affectibus.

OLEUM VITRIOLI.

Per destillationem Spiritûs Vitrioli continuatam, ultimâ tandem ignis torturâ elicitur oleum acerrimum, concentratum, ponderosum, quod per retortam modo sequenti rectificatur.

REC. Olei hujus nigerrimi, acidissimi & ponderosissimi *quantum placet.*

Hoc destilla quoad integram suam substantiam per retortam vitream igne fortissimo & suppressionis: nam propter suam ponderositatem difficillimè ascendit; sic in retorta impuritates remanent, oleum verò in recipiente collectum, per novam vitream retortam denuo in arena destilla tam diu, donec oleum in retorta speciem aquæ limpidæ referat. Atque ex se dimisit spiritum suum sylvestrem, suffocantem & aquam. Tum ex nigro factum est limpidissimum, ponderosissimum, igneum. Aquæ est sitentissimum, quam trahit ex aëre instar magnetis; asservandum ergo in vitro densiori, epistomio vitreo probè clauso.

E centenario Vitrioli Goslariensis decem libræ olei prodeunt & circiter libræ viginti spiritûs & phlegmatis. Meliori pretio emitur oleum vitrioli nigrum, quàm paratur. Emptum modo dicto rectificari potest.

Usûs summi ubique fere in chemia & medicina: est enim acidum potentissimum, ponderosissimum, antisept-

ticum summum, ipsum verò causticum acidum.

OLEA EXPRESSA,
INFUSA & COCTA.

Insignis sunt usûs in re œconomica & medica. Usitatissima hæc occurrunt & externè ut plurimum adhibentur.

OLEUM ABSINTHII
EXPRESSUM.

REC. Olei Olivarum *libras tres,*
Comarum Absinthii recentis contusarum *uncias viginti tres,*
Rosarum rubrarum *unciam unam.*

Macerentur *per triduum* in loco calido, deinde leni igne coquantur ad humidam consumptionem, exprimantur & oleum colatum fervetur.

In doloribus ventriculi, diarrhæa & ad lumbricos, abdomini illitum prodest.

OLEUM AMYGDALARUM
AMARARUM EXPRESSUM.

REC. Amygdalarum amararum *quantum libuerit.*

Contundantur in mortario marmoreo pistillo ligneo in pastam & sacco inclusæ prælo modicè calefacto exprimantur.

Virtutis est resolventis & discutientis. Contra susurros & tinnitus aurium aliquot guttæ auribus instillantur.

Datur internè ab uncia semis ad unciam unam; in clysmatibus ab uncia una ad duas.

OLEUM AMYGDALARUM
DULCIUM.

REC. Amygdalarum dulcium non rancidarum *quantum libuerit;*

in pastam contusas & forti sacco cannabino inclusas prælo
O o 2 commit-

committe & primò lentè,
dein fortiùs exprime oleum.

Datur internè in pleuritide, nephritide calculosa, colica spasmodica ad stricturas dolorificas relaxandas. Ad dolores post partum leniendos adhibetur, nec non ad tormina infantum recens natorum & ad meconium educendum. Prodest in raucedine & tussi &c.

Dosis à drachmis duabus ad unciam semis, in clysteribus ab uncia una ad unciam unam semis, imò ad uncias duas.

EODEM MODO

Exprimitur
OLEUM

NUCLEORUM

ARMENIACORUM,
fedis & hæmorrhoidum dolores mitigat, & tumores earum partium digerit.

AVELLANARUM,
nervorum & articularum dolores fedat.

CERASORUM ad
dolores capitis, renumque demulcendos commendatur.

PERSICORUM, ad
sabulum, calculum & menstrua commendatur.

OLEUM ANAGALLIDIS.

*REC. Herbæ recentis Anagallidis conquassatæ,
Olei oliyarum ana partes æquales.*

Coquantur lento igne ad humidi consumptionem, exprimantur & colentur.

Pro præsentaneo habetur remedio ad puerorum morbos, colicos inprimis dolores, à flatulentia ortos, extus applicatum illinendo abdomen, vel in clysteribus.

OLEUM ANETHI.

Eodem modo paratur, ut modò

descriptum oleum Anagallidis. Vires sunt carminativæ & anodynæ; ad clysteres præscribitur, nec non ad tormina infantum cum unguentis & aliis carminativis.

OLEUM BEZOARDICUM
WEDELII.

*REC. Olei Amygdalarum dulcium recentis uncias duas,
Camphoræ drachmas duas.
Solvatur camphora in oleo per digestionem, oleum tingatur radicibus Alkannæ, atque cum Olei de Cedro drachma semis permisceatur.*

Commendatur in febribus malignis, inflammatoriis, pleuritide &c. nec non à multis pro sacra habetur ancora sub nomine: Dr. Wedels lezte tropfen.

Dosis guttæ tres, quinque ad octo.
OLEUM CAPPARUM.

*REC. Corticis radicum Capparum unciam unam,
Tamarisci,
Cyperi ana drachmas duas,
Ceterach,
Rutæ ana drachmam unam,
Seminis Agni Casti drachmas duas.*

Trita &

*Vini libræ semis
Infusa post biduum, cum
Olei Olivarum libra una
Coquantur ad humidi consumptionem, colentur & exprimantur ad usum.*

Vires sunt attenuantes & resolventes; in affectibus lienis potissimum commendatur.

OLEUM CARMINATIVUM.

*REC. Herbæ recent. Anethi,
Menthæ,
Absinthii,
Pulegii,
Florum Chamomillæ vulgaris ana uncias quatuor.
Incisa & contusa coquantur, cum
Olei Olivarum libris duabus
ad humidi consumptionem, exprimantur.*

primantur & colentur; oleo ad-
dantur

Olei laurini expressi *unciae*
tres.

*Egregium est Carminativum infan-
tum abdomen inungendo, quo
tormina flatulenta mitigantur.*

OLEUM CASTOREI.

REC. Castorei drachmas duas,
Cyperi,
Pyrethri,
Sabinæ,
Schoenanthi *ana drachmas*
duas semis,
Spicæ Indicæ,
Cassiae lignæ veræ,
Costi,
Cubebæ,
Crocii *ana drachmas duas,*
Piperis longi,
nigri ana drachmas
duas semis,

Vini albi generosi *libram se-
mis,*

Olei Olivarum purissimi *li-
bram unam semis.*

Omnia in pulverem redacta & vi-
no irrigata, oleo superfuso, di-
gerantur, in vase benè clauso,
igne arenæ, per plures dies, ad
humidi consumptionem; expri-
mantur, colentur & reponan-
tur.

*Commendatur ad nervorum & ute-
ri affectus, prodest membris, para-
lyticis & tabidis.*

OLEUM CHAMOMILLÆ.

Paratur ex floribus eodem modo,
quo Oleum Anagallidis.

*Carminativum est & anodynum,
ventris torminibus succurrit, nec
non in febribus intermittentibus
spina dorsi inungitur; ad colicos
dolores clysteribus additur.*

OLEUM CHEIRI.

REC. Florum Cheiri,
Olei Olivarum *ana libram*
unam.

Coquantur, post macerationem ali-
Pars II.

quot dierum, ad humidi consum-
ptionem; expressum & cola-
tum servetur.

*Usus, uti reliquorum oleorum per in-
fusionem paratorum, est externus;
virtute gaudet anodynâ & resol-
vente, præsertim ad uteri affectus,
ubi ad menses, lochia retenta &
dolores post partum commendatur.*

OLEUM COLOCYNTIDIS.

REC. Olei Absinthii per infusio-
nem parati,

Rutæ,
Fellis bubuli *ana libram se-
mis,*

Fructus Colocynthidis,
Radicis Hellebori nigri *ana*
drachmam unam.

Colocynthis & Helleborus niger
cum

Aquæ fontanæ *unciis dua-
bus*

in mortario, ad pultis formam con-
tundantur, atque oleis & felle
additis, ad humidi consumptio-
nem, leni igne, coquantur, ex-
primantur & oleum colatum per
lintheum servetur.

*Anthelminticum est, alvum solvit ab-
domini illitum.*

OLEUM COSTINUM.

REC. Costi amari, five
Corticis Winterani *uncias*
duas,
Majoranæ florescentis *uncias*
octo.

Contusis superfunde
Olei Olivarum clari, albi,
recentis libram unam
semis,

Vini albi *uncias duas.*

Digerantur in vase clauso, ad hu-
midi consumptionem, expri-
mantur & percolentur.

*Nervinum est & ad paralyticam re-
laxationem emendandam commen-
datur.*

OLEUM EUPHORBII.

REC. Euphorbii triti *unciam semis,*
P p *Olei*

Olei Cheiri *uncias quinque.*
Coquantur, addendo
Vini *uncias duas,*
ad humidi consumptionem.
Oleum coletur ac fervetur.

*Commendatur ad affectus nervorum
sic dictos frigidos; paralyticis &
atrophicis membris conducit.*

OLEUM FLORUM SLOANI.

REC. Olei Olivarum *libras sex,*
Catulorum juniorum *No.*
duos,
Ranarum viventium *No.*
duodecim,
Lumbricorum terrestrium
viventium *uncias quatuor,*
Aquæ fontanæ *libras tres.*

Coquantur lento igne, donec ca-
ro catulorum ab ossibus secedat
& fere omnis humiditas con-
sumpta sit. Coletur oleum &
addantur

Axungia Hominis,
Muris alpini,
Olei Amygdalarum dulcium,
Scorpionum *ana uncia*
sex,

Florum recent: Primulæ ve-
ris,

Tussilaginis,
Betonicae,
Genistæ,
Chamomillæ
Romanæ,

Violarum,
Liliorum
convallium,
Lavendulæ,
Sambuci,
Anethi,
Salviæ,
Cheiri,
Rutæ,
Serpilli,
Anthos,
Centaurii
minoris,
Veronicæ.

Origani,
Tanaceti,

Florum recent. Ligustri,
Agrimoniae,
Pulegii,
Meliloti,
Verbasci,
Absinthii vul-
garis,
Rosarum *ana*
uncia semis,
Hyperici *li-*
bræ quatuor.

Macerentur, & digerantur calore
balnei, postea oleum exprimatur,
coletur & fervetur.

Habetur pro anodyno, nervino, vulne-
rario, antispasmodico & antine-
phritico.

Nota. Flores seligi, & à calicibus
atque foliis, quantum licet, sepa-
rari debent; aliàs oleum, quod
rubrum esse debet, virescit.

OLEUM FORMICARUM.

REC. Formicarum *uncias quatuor,*
Olei *libram unam.*

Macerentur leni calore *diebus vi-*
ginti, postea colatum oleum
reponatur.

Laudatur ad partes genitales robo-
randas, & membra paralytica
confortanda.

OLEUM EX FRUCTU CACAO,
seu

BUTYRUM CACAO.

REC. Fructuum Cacao *libram unam.*
Leviter in sartagine torrefactos,
& à cortice mundatos, vel su-
per lapidem calefactum tere,
vel in mortario calido contun-
de; contusos, in

Aquæ communis *libris octo,*
bullire permitte, donec oleum
supernatet, quod concretum,
ex aqua refrigerata, colligatur.
Sevi iusto magis cocti colorem,
& consistentiam habet; qui
autem ablutione sæpiùs repeti-
tâ, per aquam calidam, albi-
cans redditur.

Habetur etiam alius parandi mo-
dus, per tostionem nucleo-
rum

rum lenem, & dehinc expref-
fionem; quale verò butyrum
coloris est magis fusci, sed vi-
rium æqualium, si non superi-
orum.

*Recens paratum præbet medicamen-
tum pectorale, antipleuriticum,
antinephriticum & antispasmo-
dicum egregium; gustu gratissi-
mum, & oleo amygdalarum sub-
stitui, quin præferri potest.*

*Sumitur à drachma una ad duas,
vel tres, cum potu calido lactis,
jusculi, Theæ vel Caffæ; exter-
nè ad fissuras labiorum, & mam-
marum, non sine fructu adhibe-
tur.*

OLEUM HYOSCYAMI.

REC. Seminum Hyoscyami quan-
tum placet.

Contundantur, torreantur & ex-
primantur.

*Est paregoricum, & affluxum ni-
mium cohibet; ad emplastrum de
Hyoscyamo requiritur.*

OLEUM HYPERICI.

REC. Florum Hyperici, ad matu-
ritatem feminis fere
accedentium, contu-
forum libras tres,

Vini albi libram semis,
Croci scrupulos quatuor,
Olei clari libras duas.

Post factam trium dierum mace-
rationem, bulliant ad humidi
consumptionem, postea expri-
mantur, expressum commiscea-
tur cum

Terebinthinæ claræ libra
una.

*Calefacit, siccatur, roboratur. Parego-
ricum præbet egregium in affecti-
bus nervorum à convulsione &
luxatione ortis, vulnera glutinat
maximè nervorum, & ambusta
sanat.*

OLEUM LAURINUM.

REC. Baccarum Lauri matura-
rum, recentium
quantum placet;

Tritæ in

Aquæ fontanæ *Sufficiente
quantitate*

coquantur & fortiter exprimantur;
refrigeratum oleum, pinguedi-
nis instar, aquæ supernatans
colligatur.

Rarè, vel nunquam, in officinis
parari solet, sed ex Insulis For-
tunatis advehi; cui verò volu-
pe erit, oleum hoc parare,
id poterit modo antè dicto fieri.

*Est carminativum, nervinum, &
ad affectus uteri, spasmos, coli-
cam flatulentam, tormina, &
lumbricos infantum, nec non ad
roborandos articulos valde profi-
cium. Laudatur etiam ad aurium
dolores, & auditus gravitatem,
auribus instillatum; ubi tamen
oleum amygdalarum amararum,
vel aliud minùs acre admisceri
debet. Sanat quoque achoras ca-
pitis, pthyriasis, tineasque.*

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

REC. Florum Liliorum alborum,
abjecto quod croceum
est, libras duas,
Olei Olivarum recentis albi
libras tres.

Macera, & digere per dies octo,
postea coque & exprime.

*Virtute gaudet emolliente, anodynâ
& lubricante.*

OLEUM LINI EXPRESSUM.

E semine Lini contuso & parum
tosto exprimitur, & per digestio-
nem in sole depuratur.

*Contra pleuriticos dolores, specifi-
cum habetur, tam internè, à di-
midia ad integram unciam,
cum jusculo exhibitum, quàm
externè, cum lana, vel panno,
calidè regioni dolenti, applica-
tum. Conducit etiam in aliis
affectibus pectoris; externè ad
ambusta, & hæmorrhoidum cæ-
carum dolores commendatur; pro-
dest quoque ad pterygia ocu-
lorum.*

Eodem modo parari possunt
OLEUM SEMINIS CANNABINUM,
ad ambusta
& tussim uti-
le.

CUCUME-
RUM,
CUCURBI-
TARUM, &
MELONUM,
nephriticis
doloribus,
stranguriæ,
& dysuriæ
subvenientia.

ERUCÆ, vene-
rem stimu-
lans, renes,
partesque ge-
nitales ca-
lesfaciens.

FOENICULI,
ad colicam
flatulentam,
tympaniti-
dem, dolo-
rem, inflam-
mationem-
que ventricu-
li, nucisque
Moschatæ o-
lei succeda-
neum opti-
mum.

RAPHANI,
calculosis &
nephriticis
doloribus
vexatis utile.

RAPORUM,
pernionibus
utile, partes-
que genitales
calesfaciens.

RICINI, ad
membra para-
lytica com-
mendatur,
aurium dolo-
res & tinnitus
dissipat, ma-
nantia capitis

ulcera, pforas,
foedasque ci-
catrices ex-
tergit, in clys-
mate aquas
educit, lumbrici-
cosque necat.

SINAPI, in ner-
vorum af-
fectibus fri-
gidis, ut pa-
ralysi, tre-
more &c.
utile.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIMUM.

REC. Lumbricorum terrestrium li-
bram unam.

Laventur in
Vino,
deinde immittantur, in
Olei libras duas;
Coquantur ad humidi aquosi con-
sumptionem, oleum coletur.
*Sunt, qui internè pro vulnèrario præ-
scribunt; externè est paregoricum,
nervinum & ad dolores spasticos
atque contracturas utiliter adhibe-
tur.*

OLEUM MAJORANÆ.

REC. Herbæ Majoranæ,
Olei Olivarum ana libram
unam.

Coque, post macerationem, per
aliquot dies, lenissimo igne,
& expressum serva.

*Resolvit, & roborat, & ad Em-
plastrum Meliloti requiritur.*

OLEUM MASTICHINUM.

REC. Olei Rosati libram unam,
in quo, leniter coquendo, dissolve
Mastiches uncias tres.

Fiat colatura.
*Vomitus & alvi fluxus sedat, par-
tèsque laxas roborat.*

OLEUM MENTHÆ.

Ex Mentha crispa &
Oleo Olivarum

Sicut

Sicut Anethi Oleum paratur.
Vires sunt stomachicæ & carminativæ.

OLEUM MOMORDICÆ.

REC. Fructuum Momordicæ maturorum, contusorum
libram unam.

Olei Lini libram unam semis.

In vase vitreato ponantur supra cineres calidos, per viginti quatuor horas, dein leni calore, per horam, ad humidi consumptionem coquantur, colentur & exprimantur.

Oleum expressum cum
Fructuum Momordicæ æquali quantitate,

Secundâ vice, coquantur præscripto modo, & fervetur.

Ad fissuras mamillarum, hæmorrhoidum dolores, ambustiones, & vulnera commendatur.

OLEUM sive LIQUOR MYRRHÆ
per
DELIQUIUM.

Ova recentia, ad duritiem cocta, per medium dissecantur, vitellis exemptis, cavitas pulvere Myrrhæ electæ repletur, duo hæmisphæria ovi iterum conjunguntur, atque filo leviter ligata, super craticulam locantur, atque in cella reponuntur. Sic dissolvitur Myrrha in liquorem rubrum.

Medicamentum est balsamicum, ad fissuras mammarum, ulcera oris, aliaque summè commendabile.

OLEUM NICOTIANÆ.

REC. Foliorum recentium Nicotianæ concisorum & contusorum libram unam.

Coquantur lento igne, ad humidi consumptionem, in

Olei Olivarum unciis sedecim.

Oleum expressum ferva.

Laudatur ad hypochondriorum inflammationes, membra paralytica fovenda & tumores discu-

Pars II.

tiendos; scabiosis & ambustis etiam convenit.

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM.

Conficitur, ut Oleum Amygdalarum.

Flatus potenter dissipat; in colico dolore præstantissimum, modò sit recens & non rancidum, tumores discutit, contractos nervos emollit, & scabiem antiquam sanat. Inveteratum verò expetitur à pictoribus.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ
EXPRESSUM.

Nuces Mochatæ contusæ, Aquæ calidæ vapore irrigantur, & dum adhuc calent, oleum exprimitur.

Rarò in officinis parari solet: ex India enim Orientali copiosè advehitur.

Vires sunt roborantes, & anodynæ.

Datur etiam internè, tam pueris, torminibus alvi vexatis, quàm adultis adversus vomitus, & alvi fluxum; externè ad capitis dolores, somnum conciliandum, ventriculum roborandum, flatus discutiendos &c. adhibetur. Inservit etiam pro balsamorum corpore.

Dosis internè pueris teneris, à grano uno ad duo, adultis ad scrupulum unum & dimidium.

OLEUM OVORUM
EXPRESSUM.

REC. Ova recentia, ad duritiem cocta, No. quadraginta, aut quantum libuerit,

Ex his vitellos exime, & comminutos, in sartagine terrea vitreata, igne moderato assa, movendo spatulâ, donec rubescant, & veluti pinguedinem exudent, ferventes, sacco forti cannabino, excipe, præloque calido commissos festinanter exprime, expressum oleum usui ferva.

Q q

Lauda-

Laudatur ad hernias, fissuras papillarum, & labiorum, ad ambusta, hæmorrhoidum dolores, implendas foveas post variolas, impetiginem, serpiginem & alia cutis vitia.

OLEUM PAPAVERIS EXPRESSUM.

Præparatur, ut Oleum feminis Hyoscyami.

Ad usus culinares & machanicos, præcipuè à pictoribus expetitur; in medicina habetur anodynum, ad somnum invitandum, & dolores leniendos.

OLEUM ROSATUM

REC. Rosarum rubrarum recentium contusarum libram unam semis.

Olei Olivarum libras tres.

Excipiantur vase idoneo obturato, & macerentur ad solem, vel loco calido per septem, aut octo dies, deinde coquantur leviter & fortiter exprimantur, expressis, & abjectis rosis novæ infundantur, ut prius, idque tertio, repetatur relictis ultimo rosis, usus demum tempore transcolandis.

Refrigerat, demulcet & ambustis medetur.

OLEUM RUTÆ.

E foliis Rutæ recentibus, & Oleo Olivarum, fumendo amborum partes æquales, coctione & expressione paratur.

Anticolicum, anthelminticum, & nervinum est; adhibetur externe, & clysmatibus additur.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

REC. Scorpiones vivos No. sexaginta,

Olei Olivarum libram unam.

Suffocentur, & macerentur scorpiones in oleo, viginti dies, in loco calido, dein in balneo fervente coquantur, colentur, & exprimantur, depuratum oleum ad usus fervetur.

Ad urinam, & calculum pellendos externe, regioni renum, & pubis illinitur, & ad ictus venenatorum animalium commendatur.

OLEUM SEPTEM FLORUM.

REC. Florum recent. Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ vulgaris, Liliorum alborum, Malvæ arborescæ, Verbasci ana libram semis.

Colligantur flores suo tempore, & quilibet seorsim infundatur, in Olei Olivarum libris sex.

E. G. Flores violarum infundantur, & macerentur ad solem, coquantur leni igne, ad humidi consumptionem, expressum oleum affundatur

Floribus recentibus Sambuci, Secundum normam præscripti, & sic de cæteris quinque floribus, donec omnes successivè collecti, macerati & cocti fuerint. Et sic tandem oleum anodynum, & verè balsamicum obtinetur, in omnibus tam frigidis, quàm calidis doloribus appropriatum, quod inunctum pleuritici, & tabidis conuenit, nimias tensiones relaxando.

OLEUM DE SPERMATE RANARUM.

REC. Olei communis, Spermatidis Ranarum ana partes æquales.

Coquantur simul, igne lento, ad humidi consumptionem, colentur, & oleum fervetur.

Ingreditur Emplastrum de spermate ranarum. Aliàs raro in usum vocatur; nec immerito, quia in coctione, cum oleo, glutinosum com-

comburitur, è quo virtus tamen anodyna, & refrigerans ad ambusta pendet. Consultius foret, scopo antè dicto sperma ranarum, cum oleo quodam miscere, de quo vid. sub titulo, Gluten Aquaticum.

OLEUM VERBASCI,

five

LIQUAMEN VERBASCI.

E Floribus Verbasci paratur, sicut Oleum Liliorum alborum superius descriptum.

Demulcet, dolores mitigat, ad hæmorrhoides, & ambusta laudatur.

OLEUM VIOLARUM.

REC. Florum Violarum,
Olei Olivarum partes æquales.

Coquantur ad humidi consumptionem & oleum expressum fervetur.

Refrigerans & anodynum est; magnopere laudatur ad dolorem hæmorrhoidum, altius sedentem, per syringam tepidè injectum.

OLEUM VULPINUM.

REC. Vulpem adultam pelle exutam, exenteratam & in partes dissectam,
Aquæ fontanæ libras sex,
Olei communis libras quatuor,

Salis uncias sex.

Coquantur, & inter coquendum adjiciantur.

Anethi,

Thymi ana libra una.

Coctionem continuando, donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur; dein coletur oleum.

Ad affectus nervorum frigidos, & articulos rigidos commendatur.

ORVIETANUM.

REC. Radicum Angelicæ,
Aristolochiæ utriusque,

Bistortæ,
Carlinæ,
Contrayervæ,
Fraxinellæ,
Gentianæ,
Imperatorix,
Pentaphylli,
Serpentariæ Virginianæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Zedoariæ,

Foliorum Cardui benedicti,
Pulegii,
Rutæ hortensis,
Sabinæ,
Scordii,
Succisæ,

Florum Hyperici,
Corticum Aurantiorum,
Citri,

Cinnamomi,
Baccarum Juniperi,
Lauri ana unciam unam,

Viperarum exsiccatarum uncias duas,
Crocii Orientalis drachmas duas.

Fiat omnium pulvis, qui excipiatur

Roob Juniperi,
Mellis despumati ana libris tribus.

Optimè mixtis addantur
Theriace Andromachi,
Mithridatii ana uncia duæ,
Olei destillati Rutæ,
Succini albi,
Caryophyllorum,
Juniperi ana scrupulus unus.

Reponantur in vase figulino probe vitreato.

Variæ circumferuntur hujus antidoti descriptiones. Hanc EMANUEL KOENIG suppeditavit, quam, utpote compendiosiore & optimam, paucis tamen immutatis, apponere placuit.

Nomen Orvietanum, ab inventore

circumforaneo , ex urbe Orvieto , cui , tradente B. SCHULZIO nomen fuit *Hieronymus Ferrantes* , & qui fiduciâ ejus primus ausus fuit , publico foro deglutire ignotum sibi quodlibet toxicum.

Ex simplicibus , alexiteriis virtutibus præditis , paratum est , atque à multis , Theriacæ , si non præfertur , tamen æquiparatur . Viliori etiam pretio constat , & quia Opio caret , securè in morbis contagiosis , dysenteria , febribus malignis &c. pauperibus , nec non pecudibus , exhiberi potest .

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis .

OXYMEL SCILLITICUM.

E mellis despumati libris quatuor , Aceti scillitici libris duabus , In vase figulino vitreato , ad justam consistentiam coquitur .

Ad pulmonum & ventriculi affectus pituitosos tollendos , nec non asthmaticis commendatur . Humores crassos viscidos , indeque ortas obstructions resolvit .

Dosis drachmæ tres ad drachmas sex .

OXYMEL SIMPLEX.

REC. Mellis despumati libram unam , Aceti Vini albi libram semis .

Coquantur in vase figulino probe vitreato , ad Syrupi consistentiam , ferventur in vase vitreato .

Usus est in gargarismis .

PANACEA MERCURIALIS.

Est Mercurius dulcis novies sublimatus atque optimè tritus , Spiritu vini rectificatissimo deflagrandus .

Iteratis sublimationibus magis attenuari & virtute majori salivante polleere creditur Mercurius dulcis . Etiam si omnem fere vim laxantem

deponat novies sublimatus , centenæ tamen sublimationes susceptæ , nec Mercurii , nec acidi salis indolem mutant . Verùm chemici non raro tædioso labore nihil agunt : vulgò credunt vires præparatorum augeri , aucto præparationis labore ac numero . Datur hæc Panacea delicatioribus in morbis lymphæ , & à visciditate humorum ortis .

Caveant Mercurialium præscriptores , ne ossium ille inimicus dentes cariosos reddat , sub forma liquida datus .

Dosis grana octo ad grana quindecim .

PANIS CYDONIORUM

cum

AROMATIBUS.

REC. Pulpæ Cydoniorum coctorum , per cribrum tractæ libras octo ,

Sacchari albi libras quatuor .

Evaporent ad justam consistentiam , adde

Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas ,

Cinnamomi acuti , minutim incisi ,

Flavedinis Corticum Citri recentium incisorum ana drachmas sex .

Misceatur & effundatur pasta in scatulas .

Leniter corroborat ; hinc ad ventriculum & intestina relaxata , atque inde ortas diarrhæas delicatulis exhiberi potest .

Dosis uncia semis ad integram .

Paratur etiam sine aromatibus , & calidis , biliosisquæ ad eisdem usus commendatur .

PASSULÆ & PRUNA

LAXATIVA.

REC. Foliorum Sennæ electorum unciæ quatuor ,

Zingiberis albi drachmam unam semis ,

Cinnamomi drachmas duas .

Infun-

Infundantur

Aquæ fontanæ ferventis *unciis decem.*

Digerantur in loco calido *per bi-
duum*, postea exprimantur, ex-
presso adde

Sacchari albi *libram unam.*

Solvatur Saccharum unicâ ebulli-
tione, & per pannum colatus
Syrupus superfundatur

Passularum minorum, vel
Prunorum Damascenorum
enucleatorum, in aqua
fontana ad mollitiem co-
ctorum, & à superflua
humiditate, modicâ ex-
siccatione, liberatorum
libræ uni.

*Alvum leniter subducunt & pueris
atque aliis medicamenta laxantia
reformidantibus exhiberi solent.*

Dosis uncia dimidia ad duas.

PASSULÆ RHABARBARINÆ.

REC. Passularum minorum lota-
rum, & à sordibus depu-
ratarum *libram unam.*

Decoquantur cum

Aquæ simplicis *quantitate
sufficiente.*

Colatura fervidissima infundatur
Foliorum Sennæ sine stipi-
tibus contusorum *drach-
mis sex,*

& *per horam* macerentur loco tepi-
do, dein ab his separatam bro-
dium passulis rursus affundatur,
sicque demum admisceantur

Pulveris Rhei finissimi
drachmæ tres.

Addi potest Syrupus Florum Per-
ficorum, & quid CrySTALLORUM
Tartari, atque Aquæ Cinnamo-
mi.

*Blandè alvum subducunt, teneriori-
bus pro usu quotidiano dentur ab
uncia dimidia ad integram &
ultra.*

*Compendiosius aliqui eas ex tempore
parant, Passulas à sordibus depu-
ratas & in aqua fervida probè
lotas cum æquali quantitate Sy-
rupi de Cichoreo cum Reo com-
miscendo.*

Pars II.

PASTA ALTHÆÆ,

Gallis

PATE de GUIMAUVE.

REC. Radicis Althææ recentis, in
taleolas dissectæ *uncias
quatuor.*

Bulliant in

Aquæ fontanæ *libris octo,*
ad dimidiæ partis consumptio-
nem; in colatura dissolvantur
Gummi Arabici albissimi &
purissimi *libræ
duæ semis,*

Sacchari albissimi *totidem.*

Colentur & igne lento, ad spissi-
tudinem extracti, continuo spa-
tulâ movendo, humor exhalet.
Ab igne remota agitentur mul-
tùm & celeriter, quò albescant
& subinde inspergendo

Albuminum, è *sex* ovis re-
centibus, in spumam
conquassatorum,

Aquæ Naphæ odoratissimæ
unciam semis,

lento calore, sub perpetua agi-
tatione, inspissetur, usque dum
manibus non adhæreat.

Formentur pastæ oblongæ quadra-
tæ, quæ pulvere sacchari vel
Amyli, ne chartæ adhæreant,
conspergantur.

Pari modo etiam ex

LIQUIRITIÆ RADICIBUS

paratur pasta, Gallis

PATE DE REGLISSE

dicta.

*Humores acres, faucibus imprimis
& pectori noxios, demulcent;
hinc in tussi sicca, asthmate, quin
ipsa phthisi commodè adhiberi pos-
sunt.*

PASTA REGIA

STOMACHALIS.

REC. Fructuum Cacao tostorum
& decorticato-
rum,

Amygdalarum dulcium ex-
corticatarum
*ana unciam
unam semis,*

Nucleorum Avellanarum
Rr rubra-

rubrarum decorticatarum *unciam semis*.
Contundantur minutissimè, ad pul-
tis formam, admiscendo paula-
tim & per intervalla

Tincturæ Confectionis Al-
kermes

per

Aquæ Cinnamomi *partem
unam &*

Rosarum fragran-
tium *partes duas*
paratæ *sufficien-
tem quantitatem*.

Puls cogatur per setaceum cras-
sum, addantur

Sacchari Canariensis sub-
tilissimè pulveri-
fati *unciae octo*,

Farinæ *unciae duæ*,

Marmeladæ simplicis, vel

Condit. Cydoniorum,

Corticum Citri,

Aurantio-
rum,

Nucum Indicarum

per setaceum tra-
jectarum *ana un-*

ciam semis,

Pulveris Cinnamomi *unciam
unam*,

Caryophyllorum
drachmas decem,

Macis,

Galangæ,

Cardamomi,

Seminis Anisi,

Coriandri,

ana drach-
mas tres,

Zingiberis *unciam
semis*.

Misceantur benè in mortario la-
pideo, ut fiat pasta, in orbicu-
los magnitudinis ad placitum
formanda, qui papyro impositi,
ad fornacem optimè exsiccandi
& in loco sicco scatulâ inclusi
sunt asservandi. In superficie
variis figuris ligno insculptis &
oleo Nucistæ madefactis possunt
insigniri.

Insignes habent virtutes in roboran-
do stomacho & multis aliis ven-

*triculi affectibus à causa frigida
natis. Gratissimi sunt odoris
& saporis.*

Dosis drachma una, duæ.

PASTILLI FUMALES.

vid.

MASSA ad FORNACEM.

*

PILULÆ.

Formæ Compendio & hinc facili
deglutitione se se commendant.
Dantur, quarum massæ diu
conservari possunt & jam para-
tæ in officinis prostare debent,
aliæ verò, quæ, quoties præ-
scribuntur, ex tempore parari
possunt; has in pharmacopœo-
rum commodum ita (*extemp.*)
notabimus, & in istarum com-
positione eam indicabimus quan-
titem, cujus consumptio ef-
fectum sensibilem habebit; quod
& de Pulveribus dictum sit.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

REC. Specierum aromaticarum
caryophyllatarum *un-*
ciam unam,

Myrrhæ electæ,

Mastiches *ana drachmas tres*,

Croci *drachmam unam semis*,

Extracti Aloes *uncias
duas*.

Misce, fiat massa, ex qua formen-
tur pilulæ.

Sunt aromaticæ, ventriculum robo-
rantes, appetitum excitantes at-
que concoctionem promoventes.

Subiectis phlegmaticis pituitosis,
vel serosis, minus sensilibus magis
conveniunt, quàm calidioribus,
sanguine turgentibus aut systemate
nervoso, valde sensili præditis.

Dosis est scrupulus unus. Dimidia
pars est extractum Aloes, hinc
præter supra laudatas vires, eti-
am alvum stimulandi vim habent.

PILULÆ APERIENTES

STAHLII (*extemp.*)

REC. Extracti Aloës gummosi
drachmam unam,
Panchy-

Panchymagogi *drach-*
mam semis,

Limaturæ Martis subtilissi-
mè pulverifatæ & purif-
simæ grana quindecim.

Fiant pilulæ.

Alvo segni reserandæ inserviunt in
serosis, hysteriis, hypochondriacis,
aliisque casibus. Earum usus non
sit indiscretus, nec facile præscri-
bantur, ubi fluxus menstruus fœ-
minarum contraindicatur. Aloë
rosata depurata non præstat.

Dosis grana quinque ad scrupulum
semis ante cubitum.

PILULÆ BALSAMICÆ,

feu

POLYCHRESTÆ BECCHERI

&

STAHLII (*ad exemplar.*)

REC. Extracti Aloës aquosi,
Myrrhæ aquosi *ana*
drachmas quinque,
Cardui benedicti,
Trifolii fibrini,
Cochlæariæ,
Centaurii minoris,
Fumariæ *ana un-*
ciam semis,
Rhabarbari,
Hellebori nigri *ana*
drachmas tres,
Gummi Hederæ arboreæ,
Juniperi,
Guajaci nativi *ana*
unciam semis,
Terebinthinæ Cypriæ ele-
ctissimæ, *drach-*
mas duas.

Misce, fiat lege artis massa pilula-
ris.

COMPOSITIO MASSÆ

PILULARUM.

Ultimò Terebinthina, in fartagi-
næ ferrea, leni calore funda-
tur, itâ tamen, ut paulisper
bulliat; cui extracta, quæ non-
nisi mellis consistentiâ gaudere,
aut si forsan nimis dura & ari-

da essent, in pulverem redigi
debent, successivè immissa, agi-
tatione exactè permisceantur,
& tandem Gummata, super
porphyrite in pollinem subtilif-
simum trita & cribrata, cochle-
atim injiciantur, agitando con-
tinuò, donec non ampliùs far-
tagini adhæreat massa, quæ
exempta, manibus trita, be-
nèque malaxata, chartæ cera-
tæ includatur.

Usus harum pilularum eximius est
in obstructionibus vasorum infimi
ventris; hinc scopo resolvendi,
incidendi, aperiendi, simulque
roborandi ad grana quindecim,
scopo verò alvum laxandi ad gra-
na viginti quinque aut drach-
mam dimidiam, usu continua-
to, vel per se, vel in liquore terræ
foliatæ tartari solutæ præscribun-
tur.

PILULÆ BALSAMICÆ

sive

EXTRACTIS ALOES

&

HELLEBORI NIGRI.

Parantur, uti præcedentes, omif-
fis tantum binis istis Extractis.
Usus earum idem est, nisi quod istæ
adhiberi possint, ubi scopus non est,
fluxum hæmorrhoidalem virorum,
aut menstruum fœminarum prori-
tandi, quem facile provocant Aloë
& Helleborus niger.

PILULÆ BALSAMICÆ

SIMPLICIORES.

REC. Extracti Hellebori nigri,
Massæ pilularum de tribus
Rufi *ana un-*
ciam semis.

Cum

Elixirii Proprietatis *quanti-*
tate sufficiente

Fiat lege artis massa pilularis, mol-
lioris consistentiæ.

Admirandæ à multis adscribuntur his
pilulis virtutes. Humores crassos
& tartareos purgant, caput, sto-
R r 2 machum,

*machum, aliæque viscera roborant
& commodissime dantur in obstru-
ctione lienis, mesenterii &c. quæ
stimulari possunt, in effectûs re-
tardatione, Salis Sedlizensis re-
fractâ dosi.*

*Dosis scrupulus unus ad drachmam
semis, vel scrupulos duos manè
& vespere.*

PILULÆ CACHECTICÆ.

(extemp.)

*REC. Gummi Ammoniaci purissi-
mi drachmam unam
semis,*

*Extracti Aloës gummosi
drachmam unam,*

*Chalybis in alcohol reda-
cti drachmam unam
& grana quindecim,*

*Olei destillati Caryophyllo-
rum,
Anisi ana gut-
tas tres.*

Misce cum

*Spiritûs Vini quantitate suf-
ficiente.*

Fiat massa.

*Incidendo humores stagnantes resol-
vunt, & ad motum idoneos red-
dunt, vasa stimulando & robo-
rando liquida propellunt, sic habi-
tum corporis emendant. Prosunt
cachecticis, ictericis, mensium vi-
tio laborantibus, atque hypochon-
driacis, alvum leniter stimulant.*

*Dosis grana quindecim ad drach-
mam semis.*

PILULÆ de CYNOGLOSSO.

*REC. Radicum ficcarum Cyno-
glossi,
Seminis Hyoscyami albi,
Opii depurati ana unciam
semis,*

Myrrhæ drachmas sex,

Thuris drachmas quinque,

Styracis Calamitæ,

Caryophyllorum,

*Cinnamomi ana drachmas
duas,*

Succi de Cynoglossi,

*Syrupi Violarum ana quan-
tum sufficit.*

Fiat massa pilularis.

*Humores serosos & acres incraissant,
catarrhos tenues sistunt, tussim
mitigant, somnum invitant, do-
lores sedant, in hæmoptysi & stran-
guria prosunt.*

*Hujus massæ drachma una continet
opii grana octo.*

Dosis grana tria ad quinque.

PILULÆ EMANUELIS.

*REC. Aloës Socotrinæ unciam u-
nam,*

Myrrhæ electæ drachmas duas,

*Croci orientalis drachmam u-
nam.*

Cum

Mithridatio Damocratis

Fiat massa.

*Alvum solvunt, ventriculum & in-
testina à flatibus & vitiosis hu-
moribus liberant.*

*Dosis scrupulus semis ad scrupu-
lum unum.*

PILULÆ FOETIDÆ

minores

SYDENHAMI

(extemp.)

*REC. Myrrhæ electæ,
Gummi Galbani electi ana
drachmam semis,*

Castorei scrupulum semis,

Alæ foetidæ grana septem.

Misce, cum

Balsamo Peruviano.

Formetur massa.

*Proprie mitigandis hysterici mali atro-
ciis destinatae sunt ab Autore.*

*Dentur ad noctem grana quindecim
cum vehiculo.*

PILULÆ de GUMMATIBUS

seu

SUCCIS.

*REC. Gummi Ammoniaci depu-
ratissimi drach-
mas sex,*

Galba-

Galbani purissimi
unciam semis,
 Pulveris Rhabarbari Alex-
 andrini finissimi,
 Salis mirabilis Glauberi *ana*
drachmas tres,
 Radicis Scillæ pulverifatæ
drachmam unam semis,
 Olei de Cedro Italico *guttas*
duodecim,
 Extracti Trifolii fibrini
quantum sat̃s.

Misce fiat massa pilularis.

*Efficacēs sunt in viscido, pituitave
 primarum viarum, ac hypochon-
 driorum incidenda, abstergenda,
 educenda; quocirca & viscerum
 obstructions reserant.*

*Detur ter vel quater de die scrupu-
 lus unus ad drachmam semis.*

*Supplent vices Pilularum de Ammo-
 niaco, Spleneticarum Mynsichti,
 & Tartarearum.*

PILULÆ HYDROPICÆ
 BONTII.

REC. Extracti Aloës gummosi
drachmas duas
semis,
 Gummi Guttæ vino His-
 panico soluti,
 Ammoniacy purif-
 simi *ana drach-*
mam unam
semis,
 Diacrydii fulphurati *drach-*
mam unam,
 Tartari vitriolati *drachmam*
semis.

Misce fiat cum

Syrupo laxativo

Massa pilularis.

*Serum potenter educunt, & obstru-
 ctiones resolvunt; conveniunt
 itaque, ubi justa est purgandi
 aquosa per ventrem indicatio.*

*Dari hydropicis possunt à minuta
 dosi, nempe scrupulo dimidio
 incipiendo, pro ratione effectūs in
 hac dosi subsistendo, vel eandem sen-
 sim augendo ad scrupulum inte-
 grum.*

Pars II.

*Scrupulus unus habet circiter Gum-
 mi Guttæ grana quatuor, ejusque
 tertiam partem.*

PILULÆ HYDROPICÆ
 STAHLII.

(extemp.)

REC. Massæ Pilularum Balsamica-
 rum Stahlīi *scrupu-*
lum semis,
 Pulveris Radicis Vincetoxici,
 Scillæ præ-
 paratæ *ana*
grana qua-
tuor,
 Gummi Guttæ *gra-*
na duo.

Misce formentur pilulæ No. *vigin-*
ti.

*Robusto unâ vice, manè exhiberi
 queunt & vesperi pulveris dige-
 stivi portio.*

PILULÆ ICTERICÆ.
 (extemp.)

REC. Cremoris Tartari,
 Coccionellæ *ana drachmam*
semis,
 Saponis Veneti *drachmas duas.*
 Misce, fiat contundendo massa.
*Incidendo & resolvendo bilem tena-
 cem & spissam, malum tollunt,
 nisi penitus jam indurata atque
 scirrhusa sit hepatis obstructio,
 Datur scrupulus unus, ad grana
 viginti quatuor, in die, usu con-
 tinuato, cum menstruo appropria-
 to.*

PILULÆ LUCIS MAJORES,
 seu
 OPTICÆ.

REC. Valerianæ radicy,
 Euphrasie *ana drachmas duas,*
 Seminum Fœniculi,
 Seseleos,
 Ligni Aloës,
 Santali Citrini,
 Cubebarum,
 Cardamomi,
 Agarici,
 S s Corti-

Corticum ligni Sassafras ana
drachmam unam,
 Succini præparati *drachmas*
tres,
 Trochiscorum Alhandal
drachmam unam,
 Extracti Aloës *uncias duas.*
 Misce, fiat massa.

*His pilulis attribuuntur vires, ex-
 crementa pituitosa è cerebro &
 oculis evacuandi, visum conservan-
 di & obfirmandi.*

*Dosis scrupulus semis ad scrupu-
 lum unum ante cubitum.*

PILULÆ MARTIALES

SYDENHAMI,

(extemp.)

REC. Limaturæ Ferri subtilissi-
 mæ, non rubiginosæ
- drachmas tres,
 Extracti Absinthii *quantum*
satis.

Misce, fiat massa pilularis.

*Commendantur in affectione hysterica,
 cachexia, chlorosi & atonia so-
 lidorum, indeque pendente obstru-
 ctione mensium, variisque sympto-
 matibus hypochondriacis.*

*Dari possunt ad scrupulum unum
 & ultra, manè & vespere, in-
 stituendo lenem corporis motum
 post earum assumptionem.*

*Scrupulus semis extracti sufficit
 fere ad excipienda grana duode-
 cim vel quindecim Limaturæ
 Martis.*

PILULÆ MASTICHINÆ.

REC. Mastiches electæ *drachmas*
quatuor,
 Agarici optimi *drachmas*
tres,
 Aloës electæ *drachmas de-*
cem.

Fiat omnium pulvis subtilissimus,
 & ex hoc,

Aquæ Menthæ *sufficiente*
quantitate,

Massa pilularis.

*Maximam partem ex Aloë constant;
 earum itaque effectus potissimum
 ab hac expectandus. Plerumque
 tamen ad affectus ventriculi com-
 mendantur, nec non ad oculorum
 aciem, humores subducendo, con-
 fortandam.*

*Dosis Scrupulus semis ad scrupu-
 lum unum.*

PILULÆ MERCURIALES.

(extemp.)

REC. Mercurii dulcis rite parati,
 Sulphuris aurati Antimonii
 tertiæ præ-
 cipitationis,
 Gummi Guajaci nativi ana
scrupulos duos,
 Extracti Fumariæ,
 Balsami Copaivæ ana *quan-*
tum satis.

Misce non triturando, fiat massa
 pilularis.

*Valent, alterante potissimum in-
 tentione, in morbis siphyliticis,
 aliisque rebellibus, à pituita &
 lymphæ impuritibus, per tempus
 assumptæ, ad grana, manè aut
 vespere, quinque fortè præmissis
 ac junctis ex therapeutice congruis.*

PILULÆ PECTORALES.

(extemp.)

REC. Millepedum præparatorum
drachmas duas,
 Gummi Ammoniaci purif-
 fimi,
 Pulveris Radicis Ireos Flo-
 rentinæ ana
drachmam u-
nam,
 Florum Benzoës albissimo-
 rum *scrupulos*
duos,
 Terebinthinæ Venetæ, vel
 Cypriæ opti-
 mæ *grana*
quindecim.
 Syrupi balsamici *quantum sa-*
tis.

Misce,

Misce, fiat massa pilularis.

*Præstant in tussi à viscido & acri;
asthmate humido, pituitoso, scro-
phuloso, recenti scirrhuso, grandi-
noso, rheumatico.*

*Dosis scrupulus dimidius ad inte-
grum, bis vel ter, in die, cum
apozemate.*

PILULÆ POLYCHRESTÆ
BALSAMICÆ.

REC. Extracti Aloës aquosi *unciam
unam semis,*

Abfinthii,
Centaurii minoris,
Scordii,
Cochleariæ,
Myrrhæ gummosi
*ana drachmas
tres,*

Gummi Hederæ,
Sandaracæ,
Mastiches electæ,
Benzoës *ana drachmam unam
semis.*

Misce, fiat massa, ex qua formen-
tur pilulæ foliis Lunæ obducen-
dæ.

*Pilulæ hæ, nisi easdem, tamen haud
multò inferiores cum illis celeberrimi
Stahlîi, vires habent; alvum
leviter exstimulant, aperiunt, in-
cidunt, & ventriculum, cum re-
liquis visceribus, roborant.*

Dosis scrupulus semis ad integrum.

PILULÆ SAPONATÆ
(extemp.)

REC. Saponis Veneti finissimi
drachmas duas,

Gummi Ammoniaci depu-
ratissimi,
Extracti Centaurii minoris
*ana drachmam
unam,*

Olei destillati Succini *guttas
tres.*

Misce, fiat massa pilularis.

*Ad mucositates in primis viis, hy-
pochondriis, urinæ locis inciden-
das, abstergendas, educendas ad-
modum idoneæ sunt.*

*Dari possunt, bis vel ter in die, ad
scrupulum unum.*

PILULÆ SCILLITICÆ
EDINBURGENSIUM.

(extemp.)

REC. Saponis Veneti optimi *drach-
mas duas,*

Gummi Ammoniaci depu-
rati,

Millepedum præparatorum,
Radici Scillæ præparatæ *ana
drachmam*

unam,
Balsami de Copaiva *grana
quindecim.*

Misce, fiat massa pilularis.

*Ad asthma humidum, pituitosum,
scrophulosum; nephritidem pitui-
tosam, sabulosam simplicem; dysu-
riam, ischuriam ex pari venien-
tem causa; ad cachexias; ad vi-
scera obstructa resolvenda &c. sunt
utilissimæ.*

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam
semis cum apozemate appropriato.*

PILULÆ STARCKEY,

seu

MATTHIÆ.

REC. Extracti Opii Thebaici, aquâ
fontanâ pa-
rati *unciam
semis,*

Olei Terebinthinæ

Cum

Sale Tartari, diligenti tri-
turâ, in Saponi-
formem substan-
tiam mutati *drach-
mam unam,*

Extracti Hellebori nigri a-
quosi *drachmas
duas,*

Pulveris Glyzyrrhizæ *drach-
mas tres.*

Misce, fiat massa pilularis.

*Præter virtutem anodynâ, resol-
vunt; faciunt ergo in contumaci-
bus molestiis catarrhalibus, rheu-
matismis, febribus quartanis, co-
lica*

*lica serosa habituali &c. alvum-
que apertam servant.*

*Dosis grana duo, tria aut ultra.
Pilularum grana quinque fortè ha-
bent Opii duo cum pauculo.*

PILULÆ de STYRACE

sine
AMBRA.

*REC. Styracis Calamitæ unciam se-
mis,*

*Succi Liquiritiæ inspissati
drachmas tres,*

Olibani electi,

Benzoës,

Mastiches,

*Extracti Opii ana drachmas
duas,*

*Croci orientalis drachmam u-
nam.*

Misce, fiat additâ

*Essentiâ Succini,
massa.*

*Vires sunt anticatarrhales, tussim,
aliasque molestias, sicut Pilulæ de
Cynoglossò, mitigantes.*

*Dantur ante somnum, commodè &
utiliter cum massæ pilularum de
succino anatica portione.*

*Grana sedecim hujus massæ conti-
nent Opii grana duo. Dosis ita-
que grana sex, vel ad duodecim
usque.*

PILULÆ de SUCCINO
AUCTÆ.

*REC. Massæ pilularum de Succino
Cratonis drach-
mas novem,*

Magisterii, vel

*Resinæ Jalappæ drachmas
tres.*

*Misceantur, & ex drachma una for-
mentur pilulæ sexaginta.*

*A longo tempore, sub titulo: Ver-
stärkte Augstein-Pillen, in offi-
cinis in usu sunt. Eisdem habent
effectus, quos sequentes; propter
resinam Jalappæ autem magis sunt
purgantes.*

*Jalappæ magisterium constituit quar-
tam massæ partem. Rarò ultra
quindecim grana dantur.*

PILULÆ de SUCCINO
CRATONIS.

*REC. Succini præparati unciam u-
nam semis,*

Mastiches unciam unam,

*Agarici trochiscati drachmas
sex,*

*Aristolochiæ rotundæ veræ
drachmas duas,*

*Aloës Socotrinæ uncias duas
semis.*

Misce, & additâ

*Essentiæ Succini quantitate
sufficiente,*

Fiat massa.

*Ad catarrhales affectus, oculorum,
aurium & dentium dolores, pi-
tuitam à capite revellendam com-
mendantur.*

*Dosis grana duodecim ad scrupu-
lum.*

PILULÆ TARTAREÆ
BONTII.

*REC. Aloës Socotrinæ electæ un-
nam semis,*

*Gummi Ammoniaci electi
drachmas sex,*

*Tartari vitriolati unciam se-
mis,*

*Aceti Scillitici, quantum suf-
ficit.*

*Viscidos humores resolvunt. Conve-
niunt hypochondriacis, viscerum
obstructiones tollunt, alvum leni-
ter subducunt.*

*Dosis à scrupulo semis ad scrupu-
lum unum.*

PILULÆ TARTAREÆ
SCHROEDERI.

*REC. Aloës Socotrinæ, succo fra-
gorum nutritæ un-
ciam unam,*

*Gummi Ammoniaci in gra-
nis drachmas
tres,*

Vitrioli Martis,

*Extracti Croci ana drach-
mam unam,*

*Terræ foliatæ tartari drach-
mas duas,*

Extra-

Extracti Gentianæ drachmam unam semis,
Tincturæ Tartari quantum satis.

Est purgans, quod secure ad biliosos humores & februm intermittentium fomitem expurgandum exhiberi potest. Dimidiam partem facit Aloë.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PILULÆ de TEREBINTHINA.

REC. Terebinthinæ coctæ unciam unam semis,

Succini præparati,
Mastiches,
Olibani,
Succi Liquiritiæ,
Rhabarbari veri,
Offis Sepiæ,

Boli Armenæ ana drachmas duas.

Fiat massa.

In gonorrhœa præscribuntur. Consolidant, urinam cient. Virtute gaudent balsamicâ.

PILULÆ TRAUMATICÆ.

(extemp.)

REC. Terebinthinæ Venetæ electissimæ,

Extracti Millefolii,
Succi Glyzyrrhizæ Hispanicæ ana drachmam unam,

Pulveris Mastiches electæ,
Olibani electi ana drachmam semis.

Misce, fiat lege artis massa pilularis.

Perutiles sunt ad sananda ulcuscula viscerum, asperæ arteriæ, pulmonum, laryngis, stomachi, intestinorum, vesicæ urinariæ, viarumque urinariorum. Sed semper febris habenda ratio, quæ si notabilis fuerit, terebinthinam non fert; jungi potest serum lactis dulce, superfusum recentibus plantis vulnerariis.

Pars II.

Dosis grana octo, decem, quindecim, ad scrupulum unum, vel manè, vel vespere, vel utroque tempore.

PILULÆ de TRIBUS RUF.

REC. Extracti Aloës gummosi uncias duas,
Myrrhæ gummosi unciam unam,

Croci unciam semis,
Syrupi Absinthii quantum satis.

Misce, fiat lege artis massa.

Hæc massa communiter ingrediens est pilularum balsamicarum simpliciorum.

PLUMBUM USTUM.

Liquetur plumbum in patina terrea plana, atque spatulâ ferreâ agitetur, & sine alterius rei additione, in calcem gryseam abibit, quæ pulverisata servanda est.

Inter agitandum caveatur, ne sub inspiratione, exhalationes saturninæ, pulmones afficiant.

Siccatur, & ad Emplastrum Saturninum requiritur.

POCULA EMETICA

sive

SCYPHI VOMITORII.

Parantur ex regulo antimonii stellato; quoniam verò regulus substantia metallica fragilis, ac minimè ductilis est, ideo regulinum corpus miscetur duplo Stanni Anglici: ita enim fit mixtura electrica, magis apta ad pocula exinde formanda. Si his poculis aut scyphis exinde formati vinum infunditur, illud, per digestionem, subtilissimas partes arsenicales recipit & emeticum evadit, atque materiam per vomitum ejiciendam radicitus aggreditur.

T t

PUL

PULMONES VULPIS
PRÆPARATI.

Coquuntur parum in vino, cum
Absinthii portione, postea ex-
siccantur.

*Paratur ex his Looch, quod habe-
tur specificum antasthmaticum, &
in tussi ac phthisi laudatur.*

PULPA,

Est caro fructuum, radicum, alio-
rumve corporum, quæ infusio-
ne, vel coctione vel contusione,
extrahitur, eam per setaceum tra-
jiciendo, & modò dicendis præ-
parationibus, pultis consisten-
tiam acquirit.

PULPA CASSIÆ.

REC. Fistularum Cassiæ pondero-
sarum *quan-
tum libet.*

Aperiantur, & pulpa seu medulla,
cum seminibus, diligenter exi-
matur, in

*Aquæ calidæ sufficiente quan-
titate,*

dissolvatur, & per cribrum tra-
jiciatur, lento igne ad mellis
consistentiam redactæ *libræ uni,*

Sacchari albi *tantundem*
addatur, & ad justam consisten-
tiam coquantur.

*Bilem & pituitam blandè educit, &
calculosis convenit; pueris recens
natis, ad educendum meconium da-
tur, à drachma semis, ad scru-
pulos duos; adultioribus autem
ab uncia una, ad unciam unam
semis.*

PULPA COLOCYNTHIDIS.

In substantia non datur, quia ob
levitatem adhæret ventriculo,
sed aliis mixta purgantibus,
stimuli loco, additur, cum
gummatibus in trochiscos for-
mata. Ejus vis drastrictæ corre-
ctor nux Moschata, vel macis.

PULPA PASSULARUM
&

PRUNORUM.

E passulis & prunis, in aqua
fontana ad mollitiem coctis,
pari modo paratur.

*Temperat, refrigerat, humectat &
alvum laxat, addito plerumque
alio purgante, magis stimulante.*

PULPA TAMARINDORUM.

Eodem modo, quo Cassiæ pulpa,
paratur.

*Magis acidula est, quàm pulpa Cassiæ;
hinc bilem temperat, & blandè
educit; humectat, & sanguinem
depurat; validorum medicamen-
torum vim refrænat, & corrigit.*

*Dosis scopo laxativo drachmæ sex,
ad unciam unam & ultra.*

PULTICULA MANNÆ.

REC. Mannæ electæ,
Aquæ Rosarum *ana uncias
quatuor.*

Post solutionem, colationem &
refrigerationem, adde

Sacchari Canariensis pul-
verisati *uncias*

quatuor,

Olei Amygdalarum dulci-
um recentis *unciam
unam.*

Misce exactè.

*Laxat alvum leniter, & absque
ullis fere torminibus. Adhibetur
præsertim in infantibus tenellis.*

*Dosis uncia dimidia ad integram
& ultra.*

PULVIS.

In officinis è corpore plus minùs
solido, fit triturâ vel læviga-
tione, quarum apparatus non-
nunquam exsiccatio, calcinatio
que antegressæ, imò quoque
præcipitatio.

PULVIS ABSORBENS.

REC. Chelarum Cancrorum præ-
paratarum,
Anti-

Antimonii diaphoretici *ana*
unciam unam
semis,
 Vitrioli Martis *drachmas tres,*
 Cinnabaris factitiæ *drach-*
nam unam,
 Laudani opiat *drachmam*
semis,
 Olei destillati Caryophyllo-
rum,
 Cinnamomi
ana guttas
quindecim.

Misce, fiat pulvis.

Vires diaphoreticas, absorbentes,
anodynas exerit; in malo hypo-
chondriaco & hysterico, palpita-
tione cordis, aliisque molestis symp-
tomatibus salutarem fert opem.

Drachma una hujus pulveris con-
 tinet Laudani opiat granum
 unum, Vitrioli Martis grana
 sex.

Dosis à granis octo ad duodecim.

PULVIS ALEXIPHARMACUS
 RUBER.

REC. CrySTALLORUM Nitri depura-
tarum unciā
unā semis,
 Lapidum Cancrorum, acido
 Citri saturato-
rum unciā
unā,

Boli Armenæ *unciā semis,*
 Camphoræ *drachmam unā.*

Misce, fiat pulvis in vitro servan-
 dus.

Hujus pulveris scrupulus unus con-
tinet nitri paulo plus, quam gra-
na novem, camphoræ paulo mi-
nus, quam granum unum: nam
drachma una habet camphoræ
grana duo semis. Hinc patet
eum cautissime adhibendum esse in
morbis, ubi sanguis est dissolutus,
licet camphora, in iisdem morbis,
egregiam opem ferat. Titulo re-
spondent vires.

Dosis scrupulus semis ad grana
 quindecim, & ultra.

PULVIS ALEXIPHARMACUS
 CAMERARII.

REC. Boli Armenæ,
 Terræ figillatæ,
 Radicum Dictamni albi,
 Tormentillæ *ana*
unciā semis,
 Angelicæ,
 Gentianæ,
 Petasitidis,
 Zedoariæ *ana*
drachmas
duas,

Cornu Cervi usti præparati,
 Rasuræ Eboris,
 Coralliorum rubrorum,
 Corticum Citri *ana scrupulos*
duos.

Misce, fiat pulvis.

Virtutes sunt, uti ex titulo cognosci-
tur, alexipharmacæ, & præsertim
in dysenteria epidemica adhibetur.
 Dosis scrupulus unus ad drachmam
 semis.

PULVIS ANODYNUS
 CAMERARII.

REC. Extracti Opii gummosi,
 Santali rubri *ana scrupulum*
unum,
 Coralliorum rubrorum præ-
 paratorum
scrupulos
quatuor.

Misce, fiat pulvis.

Effectus è titulo cognoscitur. Sex-
tam partem Opium constituit.
 Dosis grana sex ad scrupulum se-
 mis.

PULVIS ANODYNUS
 LUDOVICI.

REC. Extracti Opii aquosi *drach-*
nam unā,
 Coralliorum rubrorum præ-
 paratorum
drachmas
duas.

Misce.

Easdem, quas Laudanum opiatum,
vires habet, & commodè addi-
tur

tur aliis pulveribus, ubi anodynum desideratur.

Dosis grana tria ad sex. Tertiam partem facit opium.

PULVIS ANTARTHRITICUS.

(extemp.)

REC. Pulveris Lumbricorum terrestrium præparatorum drachmas

duas, Salis Polychresti, è Nitro & Sulphure parati drachmam

unam, Volatilis ficci Tartari, vel

Cornu Cervi, vel

Succini scrupulum semis,

Misce terendo, fiat pulvis.

Facit ad arthritidem & rheumatismum, tam sanguineum, quam serosum, resolvendo & dolores mitigando.

PULVIS ANTATROPHUS.

REC. Nucis Moschatæ, Baccarum Lauri ana quantum placet,

Sachari albi ad pondus omnium.

Misce, fiat pulvis.

Datur infantibus atrophicis, bis de die, quantum cuspis ordinarii cultri capit, in potu ordinario; & simul bis quotidie Unguentum antatrophum, suo loco describendum, tumido ventri calide infricatur. Hac duo remedia, à nobili quadam Alsatiæ Familia, à longo jam tempore, inter rusticorum infantes, cum magno fructu, gratis distribuuntur.

PULVIS ANTICACHECTICUS.

(extemp.)

REC. Chalybis cum Sulphure præparati drachmas sex,

Radici Ari,

Zedoariæ ana drachmam unam.

Misce, fiat pulvis, dividendus in viginti quatuor partes æquales.

Mane & vesperi sumenda dosis una cum vehiculo conveniente, in chlorosi, cachexia, post probè evacuatas primas vias.

PULVIS ANTICACHECTICUS

WEDELII.

(extemp.)

REC. Croci Martis aperitivi antimoniat Stahlii,

Pulveris stomachici Birkmanni ana unciam semis,

Olei destillati Cinnamomi genuini guttas duodecim.

Misce, fiat pulvis.

Velificatur chylicationi, incidit cruda, absorbet acidum, pellit flatus, deobstruit, roborat solida, reficit spiritus.

Dosis scrupulus unus vel duo bis in die.

PULVIS ANTISPASMODICUS,

feu

AD MOTUS IRREGULARES.

(extemp.)

REC. Radicis Valerianæ majoris, recens pulverifata,

Lumbricorum terrestrium pulverifatorum ana drachmam

unam,

Nitri depuratissimi scrupulum unum,

Castorei Russici scrupulum semis,

Salis volatilis Succini depurati grana octo.

Misce, fiat pulvis.

Habito respectu ad diversas motuum spasmodicorum aut convulsionum causas, varia huic pulveri addi possunt, sive absorbentia, sive roborantia, sive anthelmintica, & motibus spasmodicis periodum servantibus, Cortex Peruvianus.

Perbelle

Perbellè supplet locos pulverum antiepilepticorum, Specifici cephalici, sedativorum, specierum cordialium, de gemmis, aliorumque inutilium stomachi ponderum.

Dosis scrupulus semis ad scrupulos duos.

PULVIS ANTISPASMODICUS
NITROSUS.

REC. Nitri purissimi crystallifati,
Tartari vitriolati *ana uncias*

duas,
Cinnabaris purissimæ *drachmam unam semis.*

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

Commendatur ad motus spasticos & convulsivos præcavendos & sedandos, nec non æstum nimium sanguinis temperandum.

Dosis à scrupulo semis ad drachmam semis vel scrupulos duos.

PULVIS CONTRA
ACREDINEM.

REC. Antimonii diaphoretici simplicis *uncias*

duas,
Lapidum Cancrorum,
Concharum præparatarum
ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Acidum absorbet; commendatur ad ardorem stomachi, Sodam dictum, & acrimoniam in primis viis hærentem.

Dosis scrupulus unus, vel drachma semis.

PULVIS BEZOARDICUS
HALLENSIUM.

REC. Antimonii diaphoretici edulcorati,

Nitri depurati,
Concharum sine igne paratarum,
Tartari vitriolati *ana unciam unam,*
Cinnabaris nativæ præparatæ *drachmam unam semis.*

Pars II.

Misce, fiat pulvis.

Compescendo sanguinem rarefactum, solvendo humores lentos, vasa stimulando, diapnoën movere valet, ac solet. Bina absorbentia juvant, ubi acidum peccat in primis viis.

Dosis grana quindecim, scrupulus unus, ad drachmam semis.

PULVIS CACHECTICUS
QUERCETANI
INCOMPLETUS.

REC. Limaturæ chalybis sulphure præparatæ
unciam unam,

Radicum Ari præparatorum,
Coralliorum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ
ana drachmas

duas,
Cornu Cervi philosophicè præparati,

Succini præparati,
Cinnamomi *ana scrupulos quatuor,*

Sacchari ad pondus omnium,
five uncias duas, drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

In cachexia, leucophlegmatia, febre alba virginum, ictero & reliquis morbis, ex atonia viscerum ortis, bonam præstat opem.

Dosis scrupulus unus, vel scrupuli duo.

Grana triginta sex continent limaturæ chalybis grana octo.

Si completus expetatur, addatur Ambre griseæ *drachma una semis,* & loco Matris Perlarum, fuman-
tur Margaritæ præparatæ.

PULVIS CONTRA CASUM.
(extemp.)

REC. Arnicæ cum toto *drachmam semis,*

Sanguinis Draconis,

Hirci,
Rhabarbari electi,

Spermatis Ceti recentis *ana grana septem,*

Nitri depurati *grana quinque.*

Uu

Misce,

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus, *bis* vel *ter* de die repetendus, & fumen *as*.

Egregiè se gerit in laesù & contusione, & ubicunque sanguis con-grumatus est resolvendus.

PULVIS CEPHALICUS
CAMERARII,
cum
SACCHARO.

REC. Cornu Cervi sine igne præparati *drachmas sex,*

Cryſtalli montanæ præparatæ *drachmam unam semis,*

Succini præparati *drachmam unam,*

Sachari albi *unciam unam semis.*

Misce, fiat pulvis.

Ad spasmodicos dolores capitis, hemiplegiam, & epilepsiam, tam adultis, quam pueris datur.

Dosis scrupulus semis, ad drachmam unam.

PULVIS CONTRAYERVÆ
COMPOSITUS.

REC. Cornu cervi uſti præparati,
Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Succini albi *ana drachmas duas,*

Croci *drachmam semis,*
Coccionellæ *drachmam unam,*

Serpentariæ Virginianæ
drachmam unam semis,

Chelarum Cancrorum *drachmas quinque.*

Radiciſ Contrayervæ *unciam dimidiam.*

Misce, fiat pulvis.

Commendatur in febribus malignis, epidemicis, petechizantibus, variolis, morbillis.

Dosis scrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PULVIS CORDIALIS
CELLENSIS.

REC. Sacchari candi albi *uncias duas,*

Cinnabaris nativæ Hungaricæ *drachmas sex.*

Olei Cinnamomi *scrupulos duos.*

Misce, fiat pulvis.

Eximiâs possidet virtutes analepticas, cordiales & stomachicas.

Adhibetur cuspidatim.

PULVIS CORNACHINUS,
five

COMITIS de WARWICK.

REC. Diacrydii sulphurati *uncias duas,*

Antimonii diaphoretici *unciam unam semis,*

Cremoris Tartari cryſtallini *unciam semis.*

Misce, fiat pulvis.

Est universale quasi purgans, & utiliter in febribus, aliisque morbis, ad primas vias à vitiosis humoribus purgandas, exhibetur.

Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos.

PULVIS DENTIFRICIUS.

REC. Laccæ pictoriæ in globulis,
Oſſium Sepiæ,

Radiciſ Iridiſ Florentinæ
ana unciâ unam,

Cremoris Tartari *drachmas sex,*

Caryophyllorum aromati-
corum,

Myrrhæ,

Mastiches *ana drachmas duas.*

Misce, fiat pulvis.

Mundat & firmat dentes, quotidie fricandos.

PUL-

PULVIS DIAPHORETICUS.

(extemp.)

REC. Pulveris radice Contrayer-
væ,
Serpenta-
riæ Vir-
ginianæ
ana drach-
mas duas,
Nitri depuratissimi,
Sulphuris purissimi ana
drachmam

unam,

Camphoræ scrupulum unum.

Misce, fiat pulvis.

Verè bezoardicus est, facitque, ubi-
cunque resolvendum & diapnoë
ad artis leges procuranda; præstat
pretiosis illis pulveribus bezoardi-
cis, plurimum terreis, adeoque
putredini accelerandæ potius, quàm
arcendæ aptis.

Dosis à scrupulo uno ad duos.

PULVIS DYSENTERICUS.

REC. Radicum Contrayervæ un-
ciam se-
mis,
Tormentillæ,
Cornu Cervi usti præparati,
Terræ Lemniæ ana drach-
mas tres,
Gummi Arabici,
Mastiches ana drachmas
duas.

Misce, fiat pulvis.

Adstringens quidem est hic pulvis,
in dysenteria tamen epidemica cir-
cumspectus ejus usus non infeli-
cem edere potest effectum. Dari
etiam potest in diarrhœis, & ubi
adstrictione opus est.

Dosis drachma semis.

PULVIS ad DYSURIAM,

five

MITIGANS WEPFERI.

REC. Radicum Althææ unciam u-
nam,
Liquiritiæ unciam
semis,

Seminum Bombacis,
Papaveris albi,
Portulacæ ana
drachmas duas,
Hordei,
Boli Armenæ præparatæ ana
unciam semis,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ albæ
ana drachmam
unam,
Sacchari albi unciam dimi-
diam.

Misce, fiat pulvis.

Demulcet, & non solum dysuriâ
vexatis, sed & tussi siccâ, à ma-
teria acri, laborantibus prodest.

Dosis drachma dimidia ad integram.

PULVIS EPILEPTICUS
MARCHIONIS.

REC. Radicum Pœoniæ uncias
tres,

Visci querni,
Rasuræ Eboris,
Ungulæ Alcis,
Cornu Cervi,
Spodii,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Margaritarum præparata-
rum ana drach-
mas sex,
Foliorum Auri puri No. vi-
ginti.

Misce, fiat omnium pulvis subti-
lissimus.

Pulvis hic longo usu probatissimus,
non solum pueris, ab epilepticis,
convulsivis motibus & pavoribus
divexatis, datur, sed etiam adul-
tis porrigitur; lene præbet anody-
num, & antispasmodicum, in do-
loribus rheumaticis, arthriticis,
& cephalalgia commodè ac utiliter,
cum pulvere nitroso temperante,
exhibetur.

Cum Margaritæ præparatæ præ Ma-
tre Perlarum præparata in medi-
cina non valeant, hæc illis meri-
tò substitui potest. Superstitio un-
gulas Alcis & Cranium humanum

U u 2

ante-

antepileptica reddidit. Cur Pœonia planta adeò deprædicetur, tanquam specificum antepilepticum, non liquet. Debilis est ejus virtus nervina & adstrictoria; radix in pulverem tenuem redacta, simul acidum in primis viis nonnihil obtunderè potest, quæ de pulvere epileptico. Marchionis & Mynsichti, aliisque dicta sunt.

Dosis scrupulus semis ad drachmam semis.

PULVIS EPILEPTICUS
MIRABILIS MYNSICHTI.

REC. Cranii humani, finè igne præparati unciam semis,

*Visci querni,
Cinnabaris factitiæ,
Ungulæ Alcis ana drachmas duas.*

Misce, fiat pulvis.

Pulvis ob efficaciam mirabilem antepilepticam ab Autore ita vocatur.

Pueris statim post paroxysmum scrupulus semis, adultis scrupulus unus, ad drachmam semis exhibetur.

PULVIS ERYSIPELATODES
WEDELII.

(extemp,)

*REC. Farinæ Fabarum,
Pulveris Florum Sambuci*

ana manipulum unum semis,

Cerussæ unciam semis,

Myrrhæ drachmam unam,

Seminis Lycopodii unciam unam,

Camphoræ drachmam semis.

Misce.

Hic pulvis erysipelas minimè per se repellit, sed resolvit, humidum exhalans imbibit, effluviis balsamicis corruptioni resistit.

Applicetur in sacculis tepidè, non calidè.

PULVIS ad FLATUS.

*REC. Seminum Anisi,
Carvi,
Coriandri,
Fœniculi ana unciam unam,*

*Corticum Aurantiorum,
Zingiberis ana drachmas sex,
Lapidum Cancrorum præparatorum unciam semis,*

*Macis drachmam unam,
Sacchari albi uncias sex.*

Misce, fiat pulvis.

Vires ex nomine patent.

Dosis scrupulus unus ad drachmam usque.

PULVIS FUMALIS
HAUGII.

*REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ,
Herbæ Rorifinarini ana uncias quatuor,*

Florum Rosarum rubrarum uncias sex,

Lavendulæ uncias duas,

Seminis Coriandri drachmas sex.

*Rasuræ succini,
Baccarum Juniperi,
Ligni ejusdem ana libras duas,*

Aloës unciam unam semis,

Santali Citrini,

*Benzoës,
Corticis Thymiamatis,
Styracis, ana uncias quatuor,*

*Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum aromaticorum,*

Cinnamomi ana unciam unam,

*Mastiches libram unam,
Olibani libram dimidiam,
Sandaracæ,
Elemi,*

Lada-

Ladani ana uncias tres.

Misce, & grosso modo incisa fermentur.

A longo tempore multis in locis in usum trahitur, & in affectibus catarrhalibus & rheumaticis, humidâ tempestate contractis, hoc pulvere suffumigata lintea, parti dolenti imponuntur.

PULVIS FUMALIS
ODORATUS.

REC. Florum Lavendulæ,
Rosarum rubrarum
ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromati-
corum
unciam
unam,

Benzoës uncias duas,
Styracis uncias quatuor,
Succini uncias sex,
Olibani, five
Thuris uncias octo,
Mastiches uncias viginti.

Misce, fiat pulvis grossus.
Ad suffimenta inservit, & odore suavi, grato se commendat.

PULVIS GALACTOPOEUS.

REC. Seminum Anisi,
Fœniculi ana un-
ciam u-
nam,
Nigellæ,
Lactis Lunæ,
Lapidum cancerorum præ-
paratorum,
Matris Perlarum præparatæ
ana drachmas tres,
Lumbricorum terrestrium
præparatorum
drachmas
duas,

Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Datur lactantibus, ad augendum lac; acidum absorbet in primis viis, & chylificationem adjuvat, ac flatus discutit.

Dosis ad drachmam unam, bis quotidie.

Pars II.

PULVIS HYSTERICUS.

REC. Radicum Fraxinellæ,
Pœoniæ ana un-
ciam
semis,
Zedoariæ,
Corticum Citri,
Succini,
Matris Perlarum ana drach-
mas duas,
Castorei drachmam unam,
Anthophyllorum,
Crocii ana drachmam semis.

Misce, fiat omnium pulvis.

Ad hystericam passionem, menses & lochia pellenda, atque dolores demulcendos inservit.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS LENITIVUS
TARTARISATUS.

(extemp.)

REC. Cremoris Tartari,
Foliorum Sennæ electorum
ana unciam se-
mis,
Cinnamomi acuti,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana
drachmam
unam.

Misce, fiat pulvis, qui pro lubitu saccharo edulcorari potest.

Leniter alvum siccam & tardiore solvit, flatus pellit; hypochondriacis & alvi obstructione laborantibus commendatur.

Ante prandium, vel cœnam, ad drachmam unam sumendus.

PULVIS MASTICATORIUS
WEPFERI.

REC. Radicis Imperatoriæ,
Corticis medii Sambuci ana
unciam semis,
Foliorum Lauri drachmam
unam semis,
Seminis Sinapi,
Staphidis agriæ ana
drachmam unam,

Xx

Caryo-

Caryophyllorum aromaticorum scrupulos quatuor,

Mastiches electæ uncias sex.

Misce, fiat pulvis grossus.

Jejuno stomacho scrupulus unus, linteo obvolutus, & ori inditus, tam diu masticeatur, donec pituitam amplius nullam attraxerit.

Addi quoque potest radix Pyrethri & Pimpinellæ.

Utiliter adhibetur in morbis capitis serosis, v. g. hydrocephalo, hydroparotide, angina serosa, dyscoia serosa, item ab obstructa tuba Eustachii; paralyti linguæ, seu aphonia, à causa pituitosa, serosa &c.

PULVIS ad PARTUM.

REC. Boracis unciam semis,
Castorei veri,
Croci ana drachmam unam semis,
Olei Cinnamomi guttas octo,
Succini guttas sex.

Misce, fiat pulvis.

Præticorum multi credunt hunc pulverem conferre posse, ad partum facilitandum, nec non ad fœtum vivum & mortuum expellendum. Hoc scopo præscribitur à scrupulo uno, ad drachmam semis.

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

(extemp.)

RRC. Pulveris Radicis Ari,
Ireos Florentinæ,
Florum Sulphuris,
Sacchari Candi albi ana drachmas duas,
Millepedum præparatorum unciam semis.

Misce, fiat pulvis.

Ad tussim mucidam, asthma humidum, grandines pulmonum perutilis est.

Plus sacchari addi potest pro delicatulis & puerulis; itemque ubi convenit, admisceatur,

Olei destillati Anisi, vel

Fœniculigutta una vel altera.

Dosis scrupulus semis ad scrupulos duos, & ultra.

PULVIS PRÆCIPITANS STAHLII.

REC. Concharum marinarum præparatarum,
Matris Perlarum præparatæ,
Cornu Cervi usti præparati,
Lapidum Cancrorum præparatorum ana unciam semis,

Antimonii diaphoretici drachmam unam,

Cinnabaris nativæ præparatæ drachmam semis.

Misce, fiat pulvis subtilissimus. *Est absorbens & conducit illis, quibus ventriculus acido oneratus est; loco temperantis pulveris, etiam præscribitur illis, qui salia & nitrum ferre nequeunt.*

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS RESOLVENS STAHLII.

REC. Concharum sine igne præparatarum,
Antimonii diaphoretici,
Nifri crudi purissimi ana uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Conducit ad humores lentescentes resolvendos, in ipsis febribus.

Dosis à granis duodecim, ad octodecim, ne excessus dosis noceat ob nitrum.

PUL-

PULVIS RESOLVENS
COMPOSITUS.

REC. Pulveris præcedentis resol-
ventis *uncias*
tres,
Extracti Cascarillæ *unciam*
unam.

Misce, fiat pulvis.

*In morbis pectoris, peripneumonia,
pleuritide, egregias resolvendi vi-
res possidet; sic etiam in diarr-
hæis febrium acutarum, & dy-
senteria omnibus aliis palmam
præripit.*

*Dosis scrupulus unus, ad drach-
mam semis & ultra.*

PULVIS SCILLÆ
COMPOSITUS SLAHLII.

REC. Radicis Scillæ recentis li-
bram
unam,
Vincetoxici, sive
Hirundinariæ pul-
verisatæ
uncias
quatuor.

Scilla recens in mortario marmo-
reo, pistillo ligneo, in pulvem
contundenda, cui additur Vin-
cetoxici radix ficcata, & recens
pulverisatæ, impastetur; dein
impastata, leni calore exficcata
rursus pulverisetur.

*Hic pulvis est resolvens præstantissi-
mum in asthmate humido, catarrho
suffocativo, œdematibus & ca-
chexia. Potest pilulis laxantibus
commode misceri. Celeberrimum
Stablium clysteribus etiam indidisse
Clarif. Schulzius perhibet.*

*Dantur pauca grana, tria vel qua-
tuor, ad summum quinque.*

PULVIS STERNUTA-
TORIUS.

REC. Radicis Liquiritiæ *drachmas*
tres,
Hellebori albi *drach-*
mas duas,
Herbæ Majoranæ,

Basilici,
Foliorum Nicotianæ,
Florum Liliorum Conval-
lium,
Lavendulæ *ana un-*
ciam se-
mis,

Cinnamomi *drachmas tres,*
Styracis *drachmas duas.*

Fiat omnium pulvis subtilissimus,
cui adde

Olei destillati Lavendulæ,
Ligni Rhodii
ana gut-
tas duo-
decim,
Caryophyllo-
rum *gut-*
tas octo,

Sacchari albi *unciam unam,*
Coloris cœrulei Indici
drach-
mam se-
mis.

Moschi, in
Aqua Rosarum soluti *grana*
quinque.

Misce.

Usus omnibus notissimus.

PULVIS STERNUTATORIUS

ALBUS,

sive

ELÆOSACCHARUM CEPHALI,
CUM CAMERARII.

REC. Olei destillati Majoranæ,
Caryophyllo-
rum,
Ligni Rhodii
ana gut-
tas tres,
Cinnamomi,
Citri,
Fœniculi,
Lavendulæ
ana guttas
duas,

Moschi *grana tria,*
Sacchari albissimi *uncias tres*
semis.

Misceantur exactissime & in vitro
serventur.

X x 2

Non

Non solum naribus, loco pulveris sternutatorii, attrahi potest, sed etiam in affectibus spasmodicis ac paralyticis linguae adhiberi.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

PULVIS STOMACHICUS
BIRCKMANNI.

REC. Radicum Ari præparatarum
uncias duas,

Acori vulgaris,
Pimpinellæ ana
unciam unam,

Lapidum Cancrorum un-
ciam semis,

Cinnamomi drachmas tres,

Salis Absinthii,

Juniperi ana drachmam
unam,

Sacchari rosati ad pondus om-
nium.

Misceantur & in pulverem redigan-
tur.

*Magnis encomiis pulverem hunc lau-
dat Quercetanus: exhibetur, in-
quit, "non tantum ad ventricu-
lum roborandum, cui propriè con-
venit, sed etiam ad capitis affe-
ctus, ad hemicranias acutissimas,
vertiginem, melancholiam hypo-
chondriacam, cachexiam & simi-
les affectus; ad calculum etiam &
febrem quartanam porrigitur: ha-
bet enim facultatem deoppilandi
hepar, lienem & mesenterium,
& dissolvendi & liquefaciendi
tartarum glutinosum, qui pluri-
morum morborum causa existit."*

*Dosis drachma una, ad drachmas
duas & ultra.*

PULVIS STRUMALIS.

REC. Spongiarum ustrarum uncias
sex,

Lapidis Spongiarum uncias
tres,

Corticis Cinnamomi,
Zingiberis ana unciam unam
semis,

Salis Gemmæ uncias duas.

Misce, fiat pulvis, adde

Sacchari uncias quinque.

*Ad strumas & scrophulas abigendas,
lunâ decrescente, in usum voca-
tur, matutino tempore & circa
vesperam duos cuspides cultri, si
fieri possit, in forma sicca jumen-
do.*

PULVIS TEMPERANS.

REC. Lapidum Cancrorum, sub-
tilissimè pulve-
rifactorum,

Coralliorum rubrorum præ-
paratorum
ana uncias
duas,

Matris Perlarum præparatæ,
Tartari vitriolati ana uncias

quatuor,
Nitri purissimi crystallifati
uncias octo,

Cinnabaris factitiæ purissi-
mæ, in al-
cohol reda-
ctæ unciam

unam &
drachmas
duas.

Misce, fiat pulvis.

*Variae dantur hujus pulveris tempe-
rantis descriptiones. Modò data
nulli libertatem mutandi demit. In-
terim ad sanguinis æstum tempe-
randum, & acidum absorbendum
utiliter præscribi potest.*

*Dosis scrupulus unus, ad scrupulos
duos.*

PULVIS ad TORMINA
INFANTUM.

REC. Pulveris Radicis Valerianæ
majoris,

Ireos Flo-
rentinæ,

Glycyrr-
hizæ ana
drachmas
duas,

Rhabarba-
ri orien-
talis,

Seminis Anisi ana

drachmam semis,

Croci

Croci optimi *scrupulum semis*. Dosis *scrupulus unus*.

Misce.

Valet, ubi meconii retentio: aucta Rhei portiuncula, ubi mucositates, flatusque peccant; si autem acidum, quod plurimum est, simul subfuerit, jungi potest absorbens, vel oleum Tartari per deliquium.

Dosis *scrupulus semis ad scrupulum unum*.

PULVIS CONTRA VERMES.

REC. Seminis Santonici electi,
Elæosacchari Citri *ana drachmam unam semis*,
Rhabarbari orientalis electi,
Radici Mechoacannæ albæ optimæ,
Mercurii dulcis rite parati *ana drachmam semis*.

Misceantur exactissimè, fiat pulvis.
Vermes expellit.

Pro puero quadrienni destinari queunt grana triginta quinque, quæ continent Mercurii dulcis, Rhei & Mechoacannæ singulorum grana quinque.

Datur manè vel vespere; si verò utroque tempore dare placet, consultum erit dosin paululum minuire; effectus determinabit repetitiones, cum hac cautela, ne adeò nudè, sed involutus sumatur.

PULVIS VIENNENSIS ALBUS VIRGINEUS DIAPHORETICUS.

REC. Glaciei Mariæ *libram unam*,
Lapidis specularis *libras duas*.

A fordibus optimè purgata in crucibulo calcinentur, postea super porphyritem terantur, denique, affusâ copiosâ aquâ, pars subtilior, per inclinationem, separetur, quæ ficcata usui servetur.

Usus est in nimio æstu febrili, ad bilem infringendam, calorem minuendum, & sitim levandam.

Pars II.

PULVIS VITÆ IMPERATORIS.

REC. Radicum Calami aromatici,
Caryophyllatæ,
Enulæ,
Galangæ,
Liquiritiæ,
Pimpinellæ,
Zedoariæ *ana*

drachmas duas,

Herbarum Cardui benedicti,
Scolopendrii,
Veronicæ,

Florum Centaurii minoris *ana drachmam unam,*

Foliorum Sennæ electorum *unciam unam semis,*

Seminum Anisi,
Carvi,
Fœniculi,
Petroselinii *ana*
drachmam unam semis,

Baccarum Juniperi *drachmas tres,*

Cinnamomi,
Cardamomi,
Cubebarum *ana scrupulos quatuor,*

Macis,
Cornu Cervi usti *ana drachmas duas,*
Rhapontici veri *unciam semis,*

Rhabarbari electi *drachmam unam semis,*
Cremoris Tartati *drachmas tres,*

Sacchari Candi albi *uncias quatuor semis.*

Misce, fiat pulvis.

Ad ventriculum roborandum, flatus pellendos, nec non ad tussim senum, ab indigestione ortam, commodè adhibetur.

Datur à drachma una, ad drachmas duas.

Y y

RADI-

RADICIS ARI
PRÆPARATIO.

Colligenda est radix primo vere, dum germinare incipit, munda, & cultello eburneo in orbiculos dissecta, infundatur vino albo, & maceretur in loco frigido, per *viginti quatuor horas*, quibus elapsis, vinum per inclinationem separetur, & radix, in furno, vel clibano ficcata, in pulverem teratur, & usui asservetur.

Incidit & resolvit; ad pulverem stomachicum Birkmanni requiritur, & sæculis longè præferenda est.

Dosis scrupulus semis, ad scrupulum unum.

R E G U L U S.

In arte chemica vox usitatissima, qui in probatione aut fusione alicujus mineræ, illud, quod manet in crucibuli, aut coni fusorii fundo, *regem* vel *regulum* appellârunt veteres, & cum iis quoque recentiores, fortè quia est totius pars nobilissima, metallica, pura, splendens, mercurialis, ponderosa, solida, separata à scoriis impuris, levioribus, supereminentibus; quæ operatio fit partim per levem calcinationem, in qua partes sulphuræ, imò acidæ atque salinæ volatiles, separantur, & per ignis flammam comburuntur. Reguli officinales solummodò hîc inferentur.

REGULUS ANTIMONII
MARTIALIS.

REC. Frustorum ferri, vel Summitatum clavorum ferreorum *partem unam.*

Immitte in crucibulum operculo tectum, applica ignem sursum & deorsum in furno anemio. Quando omnia candent, injice per vices

Antimonii Hungarici *partes duas;*

tege iterum crucibulum, applica ignem fortissimum, dein optimè fufis tandem adde per vices & providè

Nitri purissimi, ficcissimi *partem dimidiam.*

Hanc cochleatim, & in exigua quantitate injice; aliàs oritur ineffabilis detonatio, ob sulphurum incendia. Ejusmodi pericula evitaturi, loco nitri recipiunt cineres clavellatos, uti in processu *Croci Martis aperitivi* dictum. Funde hæc omnia per horæ quadrantem & ultra, igne fortissimo, quò fluat mixtura instar aquæ. Hæc massa fusa haud commodè effunditur in conum fusorium. Ideo remotis carbonibus massa quiescat in crucibulo, quæ solida à frigore reddita, confracto crucibulo, separatur in scorias & regulum, qui denuo secundâ & tertiâ vice, additis semper

Nitri contusi *partibus antitoxicis*

igne fortissimo fundi, & in conum fusorium, sevo illitum & calefactum effundi potest, regulum semper à scoriis separando; sic mox secundâ aut tertiâ fusione obtinebitur *Regulus* plerumque *stellatus*.

Usibus chemicis potius, quàm medicis plerumque inservit. Interim ex hoc regulo Antimonii stellato funduntur pocula emetica, de quibus suo loco. Quoniam salia addita in scoriis Reguli Antimonii martialis delitescunt, ideo scorie sponte successivè, vel ab humido aëreo, vel per modicam asperersionem aquæ, in pulverem resolvuntur, pulvis verò deinceps, per aquæ affusionem, à salibus liberatur & edulcoratur; ex hoc autem lixivio etiam, per præcipitationem ab acidis factam, impetratur sulphur Antimonii auratum. Lixivium facit ad ulcera sordida, cacoëthea.

Notan-

Notandum adhuc crucibulum, quando nempe Regulus cum salibus præparatur, debere esse satis capax; aliàs massa fusa assurgit ultra margines & effluit. Adhæc crucibulum non debet habere arenulas martiales, per quas ab antimonio tunc perforatas, massa fusa effluit.

Scoriæ modò edulcoratæ & dein exsiccata, quando cum nitro detonantur, uti de Croco Martis aperitivo antimoniato dictum, nil aliud sunt, quàm crocus subtilissimus martis, copiosissimo sulphure gaudens, & quidem in majori copia, quàm mars in substantia. Hic crocus egregium est remedium aperitivum, febrifugum & in omnibus morbis acutis & chronicis salia maligna corrosiva citissimè absorbet & per alvum educit.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

*REC. Antimonii crudi optimæ notæ uncias quinque,
Salis communis ficcissimi
uncias quatuor,
Tartari unciam unam.*

Trita in pulverem tenuem & exactissimè inter se mixta in crucibulum candens per vices, ingerantur, ingesta fluant, instar aquæ per quadrantem horæ, postquam auctus fuit ignis; exemptum postea igne crucibulum quiescat & refrigescat; sic scoriæ cum salibus in superficie, regulus piceæ coloris splendens, fracto crucibulo, in fundo reperietur, quem à fragmentis & scoriis separatim, & subtilissimè supra porphyritem tritum, atque pulverem coloris puniceæ jam referentem, vase optimè clauso, in loco sicco ferva. Aliàs facilè vomitus in sensibilibus excitat, prout ex observationibus constat.

Laudatissimum est remedium in febribus intermittentibus, tertiana præcipuè, horâ unâ ante paroxys-

mus, stragulisque opertus sese ad sudores componat æger; in lymphæ vitis, scabie, ulceribus, hydrope, præsertim anasacra, ubi cum Mercurio dulci administratus, optimè evenisse visus est. Exhibetur insuper in obstructionibus quibusvis per sudorem curabilibus, ideo à nonnullis vocatur Antimonium diaphoreticum rubrum. Scopo medico plerumque eligitur massa inferior splendidissima & solidissima. Dosis à granis quinque, duodecim, quindecim ad scrupulum unum.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

REC. Antimonii puri partes quatuor,

Tartari partes tres,

Nitri optimi partes duas.

Benè ficas, seorsim redige in polinem, dein ficcissimæ misceantur intimè, & in crucibulum satis capax per vices ingerantur, ubi violenta fit incensio, magno cum strepitu, & scintillis quaquaversum diffilientibus. Singula pars ingesta perfectè sit incensa, quiescens & percandescens, antequam altera injiciatur, ne materies infra calidior, supra frigidior, ibi crustam formet elatam, sub qua coërcitus infra ignis subitam facit explosionem, sonoram, tonitruantem. Postquam ergo omnis materies ingesta detonuit, auge ignem, crucibulum tege, & totum funde, ut mixtura fluat, adinstar aquæ. Sit tum præsto conus fusorius calefactus, sevo illitus, in quem effundatur fluens materies omnis uno rivo, statim concute conum; fit tum subita flamma à sevo accenso; quiescat ibi per aliquod tempus, quantum requiritur ad solidescantiam; invertite conum, ictu mallei basin concute. Excidit regulus, cujus infima pars matallica, splendens; superior ex salibus

& sulphure aut scoriis sulphureis in aëre facile liquefcentibus, turgentibus. Hinc statim contundendæ ad parandam *Tincturam Antimonii tartarifatam*. Si verò scorix aquâ solvantur, per præcipitationem quoque *Sulphur Auratum* parari potest.

Commodissima autem & magis lucrativa methodus *Regulum Antimonii simplicem* parandi est, quando præeunte Kunckelio, Antimonium lenissimè calcinatum, acsi vitrum Antimonii parare animus foret, de quo ejusdem tituli processus consuli poterit, oleo vel butyro impastatur addito pauxillo pulvere carbonis; impastato in crucibulum misso, postquam pinguedo igne combusta est, & benè fuso additur per vices, nitri *uncia una*, ad *antimonii libram unam*, procedendo, uti superius dictum. Hâc ratione reguli *uncie septem & ultra*, obtinentur & quidem minoribus sumptibus, quàm modò præcedenti.

Simplex dicitur, quia fit sine additione alterius metalli. Variis laboribus chemicis inservit. Emeticus est ille regulus, ut vitrum Antimonii, & infusu suo facit vinum emeticum eadem lege.

R E S I N A

Est corpus in certo frigoris gradu durum, fragile, vel pellucidum, vel obscurum, ad calorem liquefcent & diffuens, in igne ardens instar olei, in aqua non solubile, sed in oleo & alcohole. Naturales, sponte elachrymantes resinæ alibi occurrunt; hîc autem de iis solummodò est quæstio, quæ in officinis extrahuntur & asservantur.

RESINA GUAJAGI

vid.

EXTRACTUM GUAJAGI.

* * * RESINA JALAPPÆ. seu MAGISTERIUM.

REC. Radicum Jalappæ grosso modo contusarum quantum placet.

Affundatur

Alcohol vini,

ut tres, vel quatuor digitos superemineat. Stent infusæ in loco calido, per aliquot dies, postea colentur, cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque alcohol vini non ampliùs tingatur; tandem conjunctis & filtratis extractionibus affundatur aqua fontana, postquam tres quartæ partes spiritûs vini abstractæ fuerunt. Affusâ aquâ liquores lactescunt; resinosa substantia descendit ad fundum vasis, nigro colore foeta; lavanda est aquâ clarâ, usque dum nova affusâ inde non ampliùs tingatur. Hæc aqua cum illa, quæ ad resinam præcipitandam adhibebatur, confusa & dein evaporata largitur extractum nigricans, gummosum resinâ mitius purgans, quod commodè aliis extractis scopo laxandi admisceri poterit. Resina autem in aquam ferventem immissa ad piceam consistentiam redigatur, atque, in cylindros contortos efformata fervetur.

Inter optima militat purgantia & tanquam stimulus additur aliis laxantibus. Huic resinæ inest vis acris, caustica, violenta, manifesta plerumque, tormina excitans, hypercatharses, nataeque inde inflammationes; hinc sola nunquam præscribenda. Si tamen id volupe est, prius in mortario vitreo, frigido teritur diu cum sacchari sicci partibus æqualibus, ut pulvis ita paretur minutissimus, qui dein ex syrupo quodam haustus, nunquam adhærescit viarum plicis.

si

si quoque cum amygdalarum & vitelli ovi pauco teritur, & tum, dissolutâ tenacitate suâ resinosa, optatum effectum exerit. Patet, quàm periculosum sit, illam exhibere in spiritu vini solutam, absque syrupi additione: mox enim è spiritu præcipitata, pristinam picream substantiam induit.

Dosis in pilulis grana quatuor, sex, vel septem; in forma pulveris, cum amygdalis vel vitello ovi triti, usque ad scrupulum semis, robustioribus ad grana duodecim ascendere licet. Quia compendiosum est purgans, pro infantibus ad annum ætatis octavum usque ad tot grana ascenditur, quot annos habent.

RESINA SCAMMONII.

Pari operâ & methodo, quâ Jalappæ refina, sive magisterium, paratur.

Apud complures suspectæ est fàmæ, credentes ab ea vim drasticam, inflammatoriam, cruciatus & tormina excitari. Cautè tamen, nec delicatulis, aut siccioribus temperamentis exhibita, egregiè se gerit. De reliquo easdem, quas refina Jalappæ, vires habet, & eadem exhibetur dosi & modo.

ROB, ROOB, ROHOB

Idem, quod apochylisma, succago, est succi cujuscunque ex vegetabilibus, cum saccharo, aut melle, in duriusculam Sapæ consistentiam coctio & inspissatio. Ergo Roob simpliciter dictum antonomasiâ quâdam, de sapa seu de fructu coctione inspissato intelligendum.

ROOB ACACIÆ
VULGARIS.

REC. Fructûs Prunorum sylvestrium quantum placet.

Coquantur ad mollitiem, trajiciatur pulpa per cribrum, trajectæ addatur

Pars II.

*Mellis duplum;
coquantur ad consistentiam
Roob.*

*Valet ad diarrhæam, dysenteriam
& fluxus omnes.*

ROOB BERBERUM.

*REC. Succi Berberum depurati
libras quatuor,*

*Sacchari albi libram unam.
Coquantur in vase figulino, ad mellis consistentiam.*

Additur julapiis & electuariis. Refrigerat, sitim sedat & bilem refrænat.

ROOB CERASORUM
ACIDORUM.

*REC. Succi Cerasorum acidorum
depurati
libras quatuor,*

*Mellis libras duas.
Coquantur lege artis.
Febricitantium ardorem & sitim
extinguit.*

ROOB CORNORUM.

*REC. Pulpæ fructuum Cornorum
libras tres,*

*Sacchari albi libras duas.
Evaporentur, ad justam consistentiam, lento igne.
Refrigerat, & in fluxionibus alvi
atque sitim sedandam commendatur.*

ROOB CYDONIORUM.

*REC. Succi Cydoniorum depurati
libras sex,*

*Sacchari albi libram unam.
Coquantur ad mellis spissitudinem.
Leniter adstringit, ventriculum roborat, sitim sedat, atque præprimis biliosis convenit.*

Dosis uncia semis, ad drachmas sex.

ROOB CYNOSBATI.

*REC. Pulpæ fructuum Cynosbati
maturorum lib.*

*ras tres,
Saccha-*

Sacchari albi *libras duas*.
Evaporentur, lento igne, ad justam
consistentiam.
Leniter adstringit, & ad nephri-
tidem calculosam commendatur.

ROOB EBULI.

Fit,
Succi granorum Ebuli depurati
libram unam,

Cum
Sacchari *unciis duabus*,
ad mellis consistentiam, co-
quendo, igne moderato.
Alexipharmacum censetur & est diu-
reticum; datur hydropicis, ubi
peralvum & urinam vires exerit.
Dosis uncia semis, ad integram.

ROOB JUNIPERI.

REC. Baccharum Juniperi matura-
rum, recentium, con-
quassatarum *libras*
quatuor,

Affundantur
Aquæ pluviae *libræ sedecim*,
digerantur per tres dies, in
loco calido, colentur & forti-
ter exprimantur, atque cum
Sacchari *libra semis*,
ad consistentiam mellis, lento
igne redigantur.

Valet ad colicam flatulentam, suffoca-
tionem uterinam, mensium reten-
tionem, hydropem, catarrhos fri-
gidos, præservativum item insigne
adversus pestem creditur, unde à
nonnullis panacea rusticorum &
theriaca Germanorum vocatur.

ROOB MORORUM.

REC. Succi Mororum Rubi humi-
lis non-
dum per-
fectè ma-
turatorum
libram u-
nam,
domestico-
rum,
Mellis despumati *ana libram*
semis,

Roob simplicis *uncias tres*.
Coquantur simul, donec fyrupi
consistentiam nanciscantur.

Contra depascentia oris ulcera, ad
dentium affectus & gingivarum
noxas, atque omnia oris vitia
gargarisatum valet.

ROOB NUCUM.

REC. Succi, è nucibus viridibus,
circa
Festum Baptistæ
extracti,
Mellis despumati *ana lib-*
ram u-
nam.

Coquantur ad justam consisten-
tiam.

Commendatur ad ulcera oris & lin-
guæ; item in angina & tonsillis
tumefactis, gargarismis additur.

ROOB OMPHACII.

REC. Succi Omphacii, *quantum*
placet.

Coquatur lento igne, ad tertiæ
partis consumptionem, cola &
quiescere sine, donec clarescat,
clarum deinde igne leni perco-
que ad justam consistentiam
cum

Mellis *parte dimidia.*

Adstringit, roborat, sitim extin-
guat, & vomitum cohibet.

ROOB RIBIUM.

REC. Succi Ribium depurati *partes*
quatuor,

Sacchari albi *partem unam*.
Coquantur igne lento, in vase fi-
gulino, ad mellis consisten-
tiam.

Easdem, quas Roob omphacinum &
Beberis, vires habet, sed palato
est gratius.

ROOB RUBI-IDÆI.

Paratur, ut Roob Ribium.
A nonnullis commendatur tanquam
cardiacum, confectioni Alkermes
equiparandum.

ROOB

ROOB SAMBUCL.

REC. Succi baccarum Sambuci maturarum partes sex,

Sacchari albi partem unam.

Coquantur igne moderato, cavendo, ne adurantur & empyreuma oleant, & reducantur ad justam consistentiam.

*Sudoriferum est egregium, & in affectibus uterinis assumptum prod-
est. Ebullio gratius est, & cum
eodem communes habet virtutes re-
liquas.*

ROOB SIMPLEX,

seu

SAPA:

REC. Succi recenter ex uvis albis, generosis & maturis expressi libras duodecim.

Coquantur igne lento, ad remanentiam librarum quatuor, vel ad mellis consistentiam, in vase fictili vitreato.

Commendatur potissimum ad morbos oris: abstergit enim & digerit. Alimenti loco quoque adhibetur, additis saccharo & cydoniis, aliisque.

ROTULÆ seu TABELLÆ.

Sunt medicamentum internum, solidum, ex pulvere & triplo vel quadruplo Sacchari, in liquore accommodato soluti, & ad spissam syrupi consistentiam cocti & supra lapidem marmoreum, in orbiculos effusi, confectum.

ROTULÆ BERBERUM.

REC. Sacchari albissimi libram unam.

In pulverem redactum, leni admodum igne, incalescat, cui tum addantur

Succi Berberum, per subfidentiam optime depurati, uncia duæ;

Sicque, absque omni coctione, in consistentiam tabulati reducatur, ac in rotulas, ut artis est, effundatur.

Cum syrupo Berberum conveniunt, & ad sitim, orisque siccitatem, præcipue in febribus locum habere possunt.

ROTULÆ DIAIREOS.

REC. Specierum Diaireos simplicium unciam unam,

Sacchari albissimi, in Aquæ Violarum sufficiente quantitate soluti & ad consistentiam tabulati cocti uncias duodecim,

Misce, fiant lege artis rotulæ.

Sunt pectorales; materiam acrem tenuem incrassant, & expectorationem promonent.

ROTULÆ MANUS CHRISTI,

five

SACCHARUM PERLATUM.

REC. Sacchari albissimi libram unam,

Aquæ Rosarum quantum satis, pro sacchari solutione.

Coquantur ad tabulati consistentiam & addatur

Matris Perlarum præparatæ uncia semis.

Effundatur in rotulas.

Absorbentes sunt & pulveribus analepticis ac emulsionibus addi solent.

ROTULÆ CONTRA VERMES.

REC. Sacchari albissimi, Aquâ Menthæ soluti & de-
nuo ad consistentiam tabulati co-
cti uncias quatuor.

Cui ab igne remoto & nonnihil refrigerato addatur

Mercurii dulcis rite parati,
Pulveris Mechoacannæ albæ
ana uncia semis,
Macis drachma una.

Zz 2

Exa-

Exactissimè mixta effundantur in rotulas.

Conducunt ad vermes infantum & adultorum. In febris diuturnis, lue venerea, podagra efficacissimè prædicantur, citra omne fastidium assumenda.

Dantur à drachma dimidia ad integram & ultra. Drachma habet fortè Mercurii dulcis grana sex, & totidem Mechoacanæ.

SACCHARUM CLARIFICATUM.

Fit,

Sacchari albi *libras duas*,
Solvendo, in
Aquæ fontanæ puræ *libra una*,
& percolando.

Adhibetur electuariis, conditis,

SACCHARUM GLYCYRRHIZATUM.

GALLIS REGLISSE.

REC. Radicis Glycyrrhizæ uncias, sex.

Coquantur in
Aquæ fontanæ *sufficienti quantitate.*

In decocto colato solvantur
Gummi Arabici *libræ duæ semis*,

Sacchari albi *libra una semis.*
Dein, adjecto ovi albumine, solutio clarificetur, & postmodum leni igne coquatur, donec spissior massa evaserit, instar mellis; posthæc ipsum vas in fervidam imponitur, & super igne detinetur, donec formis planis ac levibus, infundi tenacior jam facta queat massa. Tandem loco calido penitus exficcata in tabulas discinditur, usuique servatur.

Ad tusses & rauedines ex defluxione catarrhorum, congrua est, & grata medicina, sensim lingendo assumenda.

Convenit cum pasta de Althæa.

SACCHARUM LACTIS.

Optimè & quidem minimis expensis præparare sciunt Helvetiæ Alpicolæ, lactis analysin edocti; idque per totum fere orbem solent divendere. Meliori pretio à pharmacopolis emitur, quàm paratur; sed experimenti gratiâ fit modo sequenti:

REC. Lactis Vaccini recentis quantum placet.

Reponatur per *viginti quatuor horas*, auferatur cremor, & lac defloratum, lento igni exponatur, ut fiat lactis coagulatio, & cascosum præcipitetur. Serum verò, ne acefcat, colatum & sæpius filtratum, in vase fictili vitreato, lentissimo igne, evaporetur ad sextæ partis remanentiam, & ad crystallifandum reponatur. Ità in loco frigido, serum hoc evaporatum, brevi tempore, concrefcit in crystallos, dulciusculi & grati saporis, quæ dein collectæ & aquâ frigidâ ablutæ, in loco tepido, inter chartas, ficcantur, atque loco sicco, temperato, in vitro asserventur.

Tam scabiosis, hæcticis, nephriticis, quàm podagricis, imò in omni humorum acrimonia convenit, tanquam anodynum, demulcens, antispasmodicum. Semper eligendum est splendens & crystallifatum, & rejiciendum illud, quod plenariâ evaporatione paratum.

Dosis drachma una, ad drachmas duas, continuando per aliquod tempus.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

REC. Pulveris florum Rosarum rubrarum drachmas duas,

Sacchari albi, in
Aqua Rosarum dissoluti & ad consistentiam tabulati cocti *uncias quatuor.*
Fiat

Fiat confectio in tabulis.

Pulveribus, saporis gratiâ, additur.

SACCHARUM SATURNI
CRYSTALLISATUM.

REC. Minii quantum placet.

Affundatur in vase vitreo

Aceti Concentrati acerrimi
quantitas sufficiens,

ad eminentiam trium vel quatuor digitorum transversorum.

Stent in digestionem per aliquot dies, sæpius mixturam agitando, bacillo, aut spatulâ ligneâ, ne nimium in fundo dure scat; ita acetum dulcescit. Hoc facto, solutionem decanta & filtra, ac acetum acerrimum destillatum, uti antea, affunde, ad aliquot digitorum eminentiam, idque toties repete, nempe acetum destillati reafusiones, donec dulcescat. Omnia aceta hæc dulcificata & filtrata conjunge, atque in vase fictili vitreato, leni igne, evapora, ad apparentiam cuticulæ, & ad crystallisandum repone. Crystallinos dein, leni calore ficcatis, ad usum ferva. Residuum, quod in crystallinos abire recusat, leni igne evapora ad ficcitatem, inque pulverem tere, sed tale saccharum saturni magis est terreum. Lithargyrio, quia vix non semper cupro inquinatum est, & cerussæ, quia vix sincera habetur, minium præfertur. Citiùs quoque, leni decoctione, minium solvitur, quàm digestionem.

In externum solummodò usum trahatur; refrigerat, mundificat, adstringit & siccatur; conducit in oculorum inflammationem. Dantur, qui pessimo inducti consilio, interne id adhibent ad epilepsiam, gonorrhœam, hæmoptoën, hæmorrhagias, mictum cruentum, & similia, cum tamen vix dolosius habeatur, tetrumque magis venenum.

Pars II.

S A L I A.

In officinis obvia, sunt artefacta, nempe vel volatilia, vel media, neutra, vel acida, vel alcalina.

S A L A B S I N T H I I.

Duplici modo parari potest, quod & de aliis herbis, stipitibus & reliquis intelligendum, vel ficcatis vel recentibus combustis & elixatis.

1^o. *REC. Absinthii optimè ficcatis, quantum placet.*

Colligatur in fasciculos, incendantur per vices & redigantur igne aperto in cineres; injiciantur cineribus ignitis similes fasciculi successivè, donec omne Absinthium, quod ad manus est, flammis vivis, in cineres versum sit æquabiliter albus. Relinquantur, donec refrigeratis & cribratis, aqua fontana calida affundi possit. Digerantur igne modico per viginti quatuor horas, postea aqua inclinatione decantetur, filtratur, nova affundatur, idque repetatur eoque, donec aqua affusa, aliquandiu digesta, sapore lixivioso non amplius imbuatur. Tandem lixivium purum exhalando coaguletur, iterumque solutum & filtratum, ad plenariam humidi consumptionem, inspisetur; sicque habebitur sal albidissimum, quod in crucibulo mundo accensis carbonibus, paulo fortius reverberatum, in vitro benè clauso servari poterit. Sunt, qui id quoque crystallisatione parant, sed multum acidi in se adhuc continet, unde minus rectè alcalici nomen meretur. Quod de aliis quoque dictum sit. Ergo haberi poterunt vel alcalina vel crystallina. Poterit quoque sal Absinthii, è residuo aquæ Absinthii destillatæ ficcato parari dictâ methodo. Idem de aliis.

A a a

2^o. *REC.*

2°. *EEC.* Herbae Absinthii recentis, non penitus ficcae, sed marcescentis, *quantum placet.*

Immittatur in ollam majorem, operculo ferreo benè tectam. Augetur sensim ignis, donec vas, ab ignis vi, candescat. Fumat, olet, in carbonem nigrum vertitur, volumine minuitur. Superaddatur recens herba priori ustulata, tegatur & procedatur, ut prius, donec & hæc in carbonem versa. Sic pergitur, donec ejus habeatur desiderata quantitas. Auferatur tunc operculum, maneatque olla, cum hac ustulata herba, supra eundem ignem; tum ilico, accedente libero aëre, herba nigra incipiet igniri, facillimèque flammam capere, quod sollicitè prohibendum; sed ignitio, igne rite temperato, sustinenda erit. Tum partes superius ignitæ, virgâ ferreâ movendæ sunt, ut æqualiter mutantur in unam, homogeneam, albam, massam cineream, quæ unâ adhuc, alterâve horâ, supra ignem relinquatur ita, ut perpetuò candescat, interea agitando virgâ ferreâ. Adeoque habebitur perfecta calcinatio herbae, pro *sale Tacheniano*. Cinis hic immixtus puro vasi ferreo, cum *sextuplo* aquæ pluvialis, ebulliat ad ignem, cochleari ferreo, sæpe agitetur, liquor supernatans, acer, lixiviosus, salinus, fervidus per filtrum colatus, exhalet itidem, in vase puro ferreo, ad ignem, donec prorsus ficcum, in fine perpetuò movendo, ne nimium adhærescat fundo vasis, & notando, quòd residuo nova adhuc aqua affundi possit, ad perfectam elixivationem usque, & primo lixivio filtrato admisceri. Terra remanens pura conquassetur aquâ pluviâ, effun-

datur turbida, donec sola arena, in fundo manens, rite separata sit, à cinere aquæ admixto. Subsicens terra ficcetur, & erit *Terra vegetabilis* pura, elementalís, fere *Virgo*, aptissima ad cupellas docimasticas, inde parandas.

Hocce Sal Tachenianum igni undique cingenti, donec crucibulum candescat, impositum, satis facilè fluit instar aquæ; estque tum sal fixum, purum, vegetabile, purius reddendum dissolutione in aqua, filtratione, evaporatione & vel crystallisatione, vel inspissatione. Non adeò acre est, igneumve, sed falsum, compositum, ex oleo per ignem arctè mixto, cum illo alcali acri. Hæc secunda methodus plus salis largitur, quàm prima.

Omnia salia fixa plantarum multifarium habent usum, & in praxi medica fere universalem. Ubique tutissima sunt remedia sodæ, cardialgiæ, febrium intermittentium & continuarum. Humores crassos resolvunt, attenuant, incidunt, obstructions reserant, scirrhusitates destrüunt; urinam cient & alvum, saburram tartaream educunt. Vulneraria quoque sunt, intus & extus providè applicata. Etiam si in figuris crystallorum, à se invicem differant, si crystallisentur, evincendum tamen non est, unum præ altero majori virtutis specificæ, quàm incineratione perdunt, prærogativâ gaudere.

Præscribi possunt vel sola vel aliis mixta ad drachmam unam & ultra, in vehiculo largiore.

SAL VOLATILE ANGLICUM SICCUM.

REC. Salis Tartari *uncias duas,*
Ammoniaci *uncias sex.*
Terantur seorsim, atque immittantur cucurbitæ vitreæ, addantur

Olei

Olei destillati Lavendulæ
drachmæ tres,
 Spiritus Vini rectificatissimi
uncia una.

Superimponatur statim alembicus,
 atque lenissimo igne sublimetur
 sal, quod vitris parvis inclusum,
 atque operculis vitreis obtura-
 tis fervetur.

Ex tempore parari potest, si
 Salis Ammoniaci *partes duæ,*
 Tartari *pars una,* ad-
 ditis

Olei Lavendulæ, vel
 Alius odorati *guttis ali-*
quot,

Misceantur.

Ad olfaciendum offertur hystericis,
et à cephalalgia vexatis.

SAL APERITIVUM EXTEMPORANEUM HOFF- MANNI.

REC. Salis Polychresti è
 Nitro & sulphure,
 Mirabilis Glauberi,
 vel
 Tartari vitriolati,
 Tartarifati, vel
 Arcani Tartari *ana partes*
æquales.

Misce.

Commodum est hoc sal, ubique re-
solvendum, incidendum, stimu-
landum, aperiendum; in feбри-
bus ergo intermittentibus, obstru-
ctionibus viscerum, hypochondria-
corum, in dysuria, ischuria ex pi-
tuita, sabulo; cachexiis; alvo
segni. Usui pilularum balsami-
carum utilissimè combinatur.

Dosis est drachma una, quæ solvi
poteest in aquæ fontanæ purissimæ
vel soteriæ libra semis, quo ha-
betur liquor aperitivus.

SAL CORALLIORUM.

Solutio Coralliorum, aceto destil-
 lato facta, in vase figulino eva-
 poratur, materiæ residuæ sa-
 linæ, ut odore aceti privetur,
 aquæ fontanæ portio superfun-

ditur, atque denuo, leni co-
 ctione, ad ficitatem perducitur.

Pari modo etiam parantur

SAL MATRIS PERLARUM, OCULORUM CANCRORUM.

Sal Margaritarum sale Matre Per-
larum baud præstantius, ideoque
illud merito non solum hic expun-
gitur, verum etiam, ne præpa-
rantium fides periclitetur, sumpti-
bus malè locatis parcitur, quia
rarius, imò rarissimè præscribitur.
Salia hæc solutiones quidem sunt,
iisque virtus diaphoretica re-
solvens et diuretica adscribi-
tur, verum quoque consideran-
dum est, hæc salia non esse purè
talia, id est, merum sal vel Co-
ralliorum vel lapidum cancrorum
vel matris Perlarum, sed sal con-
cretum et compositum ex acido
aceti, terreis corporibus hebetato
et fracto. Virtutibus et usu
tituli, quos præferunt, sunt
citra dubium insigniores. Pla-
cuit tamen hæc desiderantibus,
non omnem locum denegare.

Dosis à scrupulo uno ad drach-
mam semis.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

REC. Spiritum Cornu cervi cum
 Suo Sale volatili,
 qui in destillatione olei Cornu
 cervi prodiit. Repleatur cucurbi-
 tæ venter, pulvere Cornu cervi
 ad albedinem calcinati; affun-
 datur spiritus, cum sale volati-
 li, applicetur capitellum rostri
 valde capacis, cum excipulo;
 commissuris lutatis, fiat destil-
 latio, ex arena, igne leni; sic
 oleum cum corpore terreo usto
 conjungitur & ab illo detinetur;
 sal volatile autem elevatur pu-
 rum, album, alcalinum; suc-
 cedit postea spiritus. Quando
 mutatur capitellum & vas reci-
 piens, singula seorsim impetran-
 tur, in vasis optimè clausis
 A a a 2 servan-

fervanda, quæ Cornu cervi usti quadruplo mixta, seorsim quoque sublimari & rectificari poterunt, adeoque ad puritatem desideratam & candorem gratum deduci.

Omnia salia volatilia animalia alcalinæ sunt naturæ, mirificè mobilia supra omnia corpora nota: sincerum enim alcohol, cæteraque omnia superant mobilitate. In vasorum nostrorum cavis recepta, ibique acta tam calore vitali, quam impetu sanguinis circumducta, acri, rodente, stimulante virtute, quam validissimè agunt in fibrillas irritabiles systematis nervosi; expansivâ ergo virtute suâ profundius in organa colatoria penetrant, sicque secretiones omnis generis promoveant, ubi nervosi generis languor id postulat. Conveniunt in aquosis, acidis, austeris humorum morbis; pessimè verò se gerunt in alcalicis, putridis, dissolutis humoribus, & ubi jam nimii sunt excitati motus.

Optimè rectificata dari possunt à granis tribus ad duodecim & ultra. Ea verò faciliùs perferunt senes, quam juniores; phlegmatici, quam sanguinei & plethorici.

SAL DIGESTIVUM

vel

FEBRIFUGUM

SYLVII.

REC. Capitis mortui,

In

Spiritus salis Ammoniaci,

Cum

Sale alcalino præparati, de-
destillatione, residui
quantum placet;

Solvatur, in

Aquæ communis puræ fer-
ventis *sufficiente*
quantitate.

Solutio filtretur per chartam, & evaporetur in olla terrea vitreata, ad ficcitatem usque, agitan-

do spatulâ, donec sal relictum fuerit ficcum & albissimum.

Vires sunt attenuantes, incidentes & resolventes. Prodest in febribus tertianis, nec non quartanis; diaphoresin & urinam movet, refrigeratque.

Dosis a granis quindecim ad scrupulum unum.

SAL ESSENTIALE ACETOSÆ

&

ACETOSELLÆ.

Herbarum Acetosæ, vel

Acetosellæ

Copiam ingentem, à fabulo adhærente ablutam, conscissam, in mortario lapideo contusam, inter lintea pura, Cannabina, prælo quam fortissimè exprime. Omnem succum, acidum valde, viridem & instar musti spissum, quem

Aquæ pluviae purissimæ
sextuplo

dilutum per manicam Hippocratis cola, & recola, donec limpidus, purus, tenuis transeat. Liquorem aliquali dein quiete defæcatum ex latis, vitreis vasis apertis, vel figulinis probè vitreatis, leni admodum ebullitione inspissa, ad consistentiam fere cremoris lactis recentissimi; est acidissimus. Inspissatum hoc liquidum infunde vitro cylindrico, aut urinali mundissimo, ut usque intra collum plenum sit; superfunde

Olei Olivarum puri paulum ad lineæ altitudinem & repone in cellæ pavimento quietum, per septem, vel octo menses. Ità sub oleo, fermentationem, putrefactionem, mucilaginis generationem prohibente, generatur & præcipitatur sal, speciem quandam Tartari referens, quam proximum sali naturali plantæ, effuso supernatante fluido, quod subitâ aquæ frigidæ affusione, paulum ablutum quam ocysimè ab adhærescente

te

te facce mucilaginea, leniterque exsiccatum, verum exhibet sal plantæ nativum.

Citiùs etiam hoc sal parari potest, succum Acetosellæ, vel per subfidentiam, vel addito albumine ovi, per ebullitionem clarificando, in vitro vel olla vitreata, ad tertiæ vel quartæ partis remanentiam, lenissimo igne evaporando, atque in locum frigidum reponendo; sic plerumque spatio viginti quatuor horarum, sal concrevit; & ad fundum vasis descendit, quod vel ficcari, vel in aqua fontana rursus dissolvi, coagulari, & tali modo depurari potest.

Id fieri potest in alia quacunque herba succulenta; sed aliud habebitur sal, pro varia plantæ adhibitæ indole. Si manifestâ acedine, aut austeritate acidâ gaudeant succi, sal inde natum exprimet, Tartari indolem, geniti de vino, vel acido vel acerbo. Subnitrosum largiuntur herbæ jusculis medicatis adhiberi solitæ; unde veteres obstructions solvit, piceum lentorem atræ bilis fundit, & morbos chronicos sanat efficacissimè. Nul- lum verò obtinetur è succis plantarum viscosarum, ut Portulacæ, Symphyti, & seminis Psylli, nisi prius fermentatio præmissa dissolverit lentorem. Inepti planè sunt hinc operi omnes illi succi, in quibus copia pinguis olei dominatur, quod impedit glebarum coitionem in crystallos. Omne sal plantæ nativum, essentiale dictum est pars ejus activior, repræsentans totius plantæ naturam, unde etiam saporem ejus & odorem prodit.

Sal Acetosæ & Acetosellæ est aquâ solubile, modicè fixum, facile mutabile, humoribus humanis miscibile, acidum gratum, penetrabile in vasa corporis satîs parva; hinc ibi vires suas exercere potens; julpis refrigerantibus additur. Maximè verò adhibetur ad maculas atramenti & fructuum è linteis & carbasis delendas.

Pars II.

Dosis scrupulus semis ad scrupulum unum in aliquo liquore.

SAL FEBRIFUGUM.

Elicitor ex Testis Ostreorum optimè mundatis & ad summam albedinem calcinatis, solvendo in aqua, filtrando ac coagulando.

Datur ante paroxysmum febrilem à scrupulo uno ad drachmam semis & ultra.

SAL MIRABILE GLAUBERI.

REC. Caput mortuum
In

Spiritûs Salis Glauberiani
destillatione re-
lictum.

Dissolvatur, in

Aqua fontana fervida.

Solutio filtretur per chartam, & evaporetur ad cuticulæ apparentiam. Tum quietum in loco frigido reponatur, ubi in massam glaciam coire solet. Si verò sal illud in aquæ fervidæ sextuplo solvitur, solutio parum inspissatur, & in vitro magno reponitur, tum concrevit in pulcherrimas crystallos, singularis formæ, satîs magnas, in aère non deliquescentes.

Hoc sal rite paratum & in pollinem redactum vim habet coagulandi diversos liquores, nempe cerevisiam, vinum, acetum, si una pars salis hujus misceatur cum tribus partibus liquoris, reponanturque per noctem. Sic liquor cum sale hoc abibit in glaciam. Addito carbonum pulvere & in crucibulo fusus, sine sulphuris additione, massam exhibet, Hepar sulphuris dictam, ex qua verum sulphur minerale præcipitari potest. Internè leniter stimulando, urinam pellendo, alvum movendo, resolvendo, laudem meretur.

Præscribitur scopo alterandi ad drachmam unam, cathartico ad unciam semis.

B b b

SAL

SAL LUMBRICORUM
VOLATILE.

Ad normam Salis Cornu Cervi
parari poterit.

Viribus etiam cum illo convenit.

*Sunt, qui vim magis antispas-
modicam ipsi adscribunt, quam
reliquis salibus volatilibus.*

Datur et eadem dosi.

SAL POLYCHRESTUM

è
NITRO & SULPHURE.

REC. Nitri purissimi, & ficcis-
simi,

Sulphuris purissimi ana par-
tes æquales.

Optimè commixta, in crucibulo
ignito, per vices detonentur,
non ultra *drachmam unam*, pro
una vice injiciendo. Cessante
deflagratione, detineatur in
igne per horam. Refrigerato
tunc crucibulo, sal eximatur,
in aqua solvatur, filtretur &
evaporatione debitâ in crystal-
los redigatur.

*Est resolvens, incidens, digestivum,
detergens, antifebrile, diureti-
cum optimæ notæ; corrigit pu-
trescentem bilem. Utiliter socia-
tur laxantibus vegetabilibus. Au-
dit plerumque SAL POLY-
CHRESTUM LEMERY,*

*Dosis grana quindecim, scrupu-
lus unus. Per se alvum ducit
ad drachmas duas, unciam se-
mis exhibitum.*

SAL POLYCHRESTUM

de
SEIGNETTE.

REC. Sodæ Hispanicæ, quæ est
Sal è planta Kali
paratum, *libram
unam,*

Dissolvatur in
Aquæ fontanæ ferventis
libris tribus.

Solutio per chartam filtretur, &
in vase fictili benè vitreato ebulli-
at, inter bulliendum insper-
gatur

Cremoris Tartari *tantum*,
quantum ad punctum satura-
tionis necessarium. Insper-
so per vices cremore tartari, ori-
tur effervescencia, quæ per in-
tervalla cessat & renascitur. Li-
quor perfectè saturatus filtra-
tur, ad cuticulam evaporatur,
denuo filtratur & crySTALLIFATIO-
ni exponitur.

*Denominatur hoc Sal à suo inven-
tore Seignette, pharmacopoeo Ru-
pellenfi. Respectu medico à tarta-
ro solubili, vel tartarificato vix
differt, atque easdem cum eo vi-
res habet. Urinam ciet, alvum-
que movet, absque ulla molestia.
Duri potest, in aqua solutum, à
drachmis duabus ad sex, loco
Salis Anglici cathartici.*

SAL SEDATIVUM
HOMBERGII.

REC. Boracis optimæ *uncias qua-
tuor.*

Pulverisata indatur in retor-
tam vitream, solvatur in

Aquæ fervidæ *quantitate
sufficiente.*

Huic lixivio affundantur cum cir-
cumspeditione

Olei Vitrioli summè recti-
ficati *drach-
mæ decem.*

Retorta ponatur in catino arenæ,
& ignis sublimatorius subjicia-
tur. Transít initio liquor aque-
us; postea sal volatile tenerri-
mum. Sal sublimatum, abso-
luto labore, plumâ colligitur.
Residuum teratur, & vel denuo
sublimetur, vel solvatur co-
quendo in *sufficiente* aquæ *quanti-
tate*, postea filtretur & evapo-
retur. Lixivium concrefcit in
crystallos, quæ à prioribus non-
nisi majori densitate ac gravi-
tate differunt. Crytalli ablu-
untur aquâ purâ & loco calido
ficcantur.

*Est sal naturæ mediæ, ammoniac-
alis. Exhibetur ad orgasmum in
febris acutis compescendum.
Valet*

Valet quoque in spasmodicis dolorificis, complectitur quippe sulphur vitrioli.

Dosis grana tria, sex, decem.

SAL SUCCINI VOLATILE.

Ab Oleo Succini, de quo suo loco videatur, ne inutilis fiat repetitio, separatum, suo autem oleo foetido adhuc inquinatum,

Salis decrepitati quantitate sufficiente

miscetur, in testam aut ollam terream, uti occasione *Florum Benzoës* dictum, mittitur, olla verò pyramide chartaceâ munitur, & mediocri igne sublimatio instituitur. Hâc ratione charta poris suis imbibit spiritum acidum, & sal volatile undiquaque lateribus adhærebit, instar florum, qui plumâ collecti in vitro obturato servantur ad usum.

Adhibetur ad Liquoris Cornu cervi succinati præparationem. Est verum sal volatile, oleosum, acidum acedine gratâ, pingui, balsamicâ, penetrabili, antisepticâ, nervos stimulante, spiritus commovente; hinc antihysteriæ & diureticorum princeps, ubi nempe dictâ methodo depuratum est.

Dosis à scrupulo semis ad integrum.

SAL TARTARI FIXUM.

Caput mortuum post destillationem Spiritûs & olei tartari, vel Tartarus crudus, albus in vase terreo non vitreato, igne reverberii calcinatur, ad albedinem usque; tum aquâ communi solutus, filtratur, & in sal coagulatur, quod repetitâ solutione & coagulatione, purius evadit.

Est salium alcalinorum omnium op-

timum ac purissimum. Inservit usibus chemicis & medicis. Sulphura aperit & sic præparat, ut cum spiritu vini tinctura genuina elici possit. Animam Rhabbari extrahit, purgantium debiliorum vires excitat, acidum potenter destruit, vina nimis acida eleganter dulcificat.

Dosis intra corpus esse potest à scrupulo semis ad integrum.

SAL TARTARI VOLATILE.

Fæces vini in umbra, super asseres effusæ, siccantur, ex retorta vitrea per gradus, sicut Spiritus Tartari, destillantur, sic prodit, unâ cum oleo & spiritu, sal volatile, quod aquâ fontanâ calidâ dissolvitur atque ab oleo extrahitur & separatur, è cucurbita sublimatur & depuratur.

Est sal volatile alcalinum, cum oleo empyreumatico intimè mixtum. Vires diaphoreticæ & diureticæ huic oleo empyreumatico adscribuntur. Igitur cum eadem cautela adhibendum, quâ reliqua salia volatilia animalium.

SAL TARTARI VOLATILE TACHENII.

REC. Salis volatilis urinæ uncias duas,
Aceti destillati fortissimi uncias octo.

Digerantur leni calore, per aliquot dies; postea leni igne acetum, per destillationem, evocetur, atque

Aceti nova quantitas

superfundatur & post digestionem, abstrahatur. Sali relicto

Salis tartari quarta pars
successivè addatur.

Misceantur exactè, tum cucurbitæ immixta sublimentur, sublimato residuum in cucurbita addatur,

Bbb 2

tera-

teratur, & denuo sublimetur, atque hæc cohobatio aliquoties repetatur, donec omnis quantitas salis tartari sublimata esse observetur.

Palmarum priorum eripit vi diureticâ, resolvente, aperitivâ & dictas indicationes adimplendo, suâ laude non caret.

Dosis scrupulus semis ad scrupulum unum.

SAL VOLATILE OLEOSUM

five

LIQUOR OLEOSUS

SYLVII.

REC. Olei destillati Anisi,
Caryophyllo-
rum,
Cinnamomi
ana drach-
mam unam
semis,
Macis scrupu-
lum unum,
Succini,
Zedoariæ ana
scrupulum
semis,
Spiritus Salis Ammoniaci
volatilis,
vinosi
uncias
novem.

Digerantur in vase optimè clauso, & ferventur.

In morbis capitis, ventriculi, lienis, uteri, &c. in colica & tremore cordis præstans est remedium.

Dosis guttæ decem ad quindecim & ultra.

SAL VOLATILE

URINÆ.

Fit ex urina fermentata, & in vase sat amplo, ad mellis consistentiam, incocta. Magma hoc vel è cucurbita, vel retorta, leni igne destillatur, sic prodit unâ cum spiritu & oleo foetido, sal urinæ, quod, uti in salis Cornu cervi præparatio-

ne, ab oleo & spiritu separandum atque depurandum est. Sal fixum verò elicitur è capite mortuo, more solito.

Insigne anodynum habetur in doloribus sedandis, mixtum cum liquore conveniente, & supra loca illitum. Internè datum reserat tartareas obstructions viscerum ac mesenterii, unde insignis ejus usus esse poterit in scorbuto, cachexia, ictero flavo & nigro. Atterit calculum renum & vesicæ, doloresque inde ortos sopit.

Dosis grana quindecim ad viginti quinque.

SANGUIS HIRCI

PRÆPARATUS.

Sanguis excipitur, atque, in cli-
bano ficcatus, fervatur.

Ab Helmontio ad pleuritidem tanquam specificum, commendatur, apud plebejos quoque in usu est, quoties lapsi, aut aliam contusionem, vel subluxationem passi sunt.

Dosis drachma semis ad integram.

S A P O

Est artefactum, ab arte mechanica mutuatum, in rei radice, concretum ex alcali & phlogisto, sibi æquilibrantibus, secundum artem unitis; estque aquosi & oleosi (pinguis,) discordium, in paciscendo vinculum.

SAPO MEDICATUS.

REC. Calcis vivæ recentis solidæ
libras duas,

Committantur ollæ magnæ, atque superponantur

Cinerum clavellatorum

libræ quatuor,

ita, ut calx cineribus clavellatis undique tecta sit; reponantur, linteo leviter tecta, tam diu, donec calx incipiat fissâ dehiscere; tum demum permisceantur, atque addantur

Aquæ

Aquæ fontanæ calidæ *libræ*
viginti qua-
tuor.

Coquantur in vase ferreo, ad *ter-*
tia vel *quartæ partis* consump-
tionem, transcolentur per lin-
teum densum. Lixivium ita
paratum debet ovum recens in-
jectum sustinere, & à Saponariis *Magistra* (Meister lauge)
appellatur, aquâ autem magis
dilutum, ita ut in illo ovum
recens ad fundum submerga-
tur, *secundarium* vocatur.

REC. Hujus lixivii secundarii,
Olei Olivarum puri & re-
centis *ana*
libras tres.

Misceantur accuratissimè, atque
leni igne, sub perpetua agita-
tione coquantur, donec, eva-
poratâ maximâ parte humidita-
tis, quàm optimè inter se coi-
re inceperint; tum affundan-
tur

Lixivii prioris, sive
Magistræ *circiter li-*
bræ no-
vem.

Coquantur lenissimo igne, continua-
tâ agitatione, usque dum mix-
tura pellucida & quasi mucila-
ginosa sit, atque gelatinæ in-
star, frigefacta, concreseat.
Tum

Salis communis *uncias ali-*
quot
adiiciendo, continuetur coctio,
donec pauculum hujus mixturæ
saponaceæ, lapidi frigido instil-
latum, formâ solidi debitâ con-
sistat. Tum removeatur vas
& semirefrigeratus sapo, in for-
mas fundatur, die postero ex-
cutiatur, atque in frustra disse-
ctus ad usum exsicceetur.

Verus sapo medicus appellari me-
retur, qui in frigore scissili du-
ritiè constans, in aqua perfectè
solubilis, ad linguam non alca-
lino-acris, in aëre non sponte
deliquescens.

Sed unus, alterve defectus subre-

Pars II.

pens corrigitur legibus sequen-
tibus observatis:

- 1^a. Si dicti saponis aliquam por-
tionem solvendo, vides, ali-
quam olei notam adhuc ap-
parere, *Magistræ*, seu *lixivii*
primarii adhuc pauculum
admisceto, simul coquito,
donec æquabiliter aquâ dis-
solvatur confectus sapo.
- 2^a. Si gustando saponem, gu-
stui acredinem, alcalinum
saporem imprimit, signum
est, alcali abundare; unde
tum *Olei* adhuc parum ad-
misceto, iterumque coctio-
nem protrahito, postea per-
fectum alcali & olei connu-
bium explorato.

Saponaceum hoc concretum, medica-
mentum nauseosum quidem est, sed,
ex quo in usum vocari cœpit, op-
timus rei eventus docuit, saponem
virtute egregiè aperiente, atte-
nuante, resolvente & dissolvente
nulli cedere. Aquâ solutus, vi
rodente alcali quidem exutus, sed
aliquem salis saponacei stimulum
conservans, calore, contritu, agi-
tatione, tam gummosa, quàm re-
sinosa, oleosa & pingua, atque
inspissata solvendo, iisque solubili-
zatem impertiendo, abluat, deter-
git, eluit, mundat, inveteratas
obstructiones referat, vias permea-
biles reddit, & calculosis conve-
nit. Ubi acida lac chylumve co-
gunt, mira præstat. Ergo acido
obstat, coagulationem impedit, inò
coagulata resolvit.

Externè adhibetur ad ulcera sinuosa,
aut fistulas, ad morbos articulares,
ad abscessus maturandos & ape-
riendos, ad tumores mucosos &
strumas, ad alvum referendam
sub forma suppositorii, in pertina-
ciori obstructione alvi ad uncias
aliquot sub forma clysmatis.

Datur vanco corpore benè solutus,
& propè dilutus, motuque adju-
tus ad drachmam unam & ultra
per intervalla temporis.

C c c

Exu-

Exulet in morbis, ubi vita periclitatur ob putredinem humores dissolventem & tabefacientem, in debilitatis primis viis, & morbis malignis.

SAPO TARTAREUS

five

CORRECTOR STARCKEY.

REC. Salis Tartari purissimi *libram unam.*

Fluat in crucibulo, forti igne, per *unam*, alteramve *horam*, sicut pro tinctura tartari paranda fieri solet, ut igneum quasi & acerrimum fiat. Hoc sal effunde in mortarium ferreum, probè calefactum, mundumque, tere in pulverem, quò tenuiorem, eò meliorem; adhuc ab igne fervidum, & tandem non candescentem immitte in cucurbitam ficcā, calidissimā, in loco valde calido & sicco, die serenā & ficcā; infunde confestim

Olei stillatitii Terebinthinæ
nullo modo adulterati,
purissimi, itidem calefacti *tantum*,

quantum alcali causticum ponderavit, itā quidem, ut guttæ cadant quā ocyssimè, *una* post alteram in medium sal fervens. Tum ingenti cum fumo, strepitu & sibilo, trahetur ilico illapsū oleum in sal sitientissimum, ad intima usque, seque per totam massam salinam diffundet.

Oleum sali quidem æquiponderans, sali supernatare debet, ut omnem aëris semper humidum contactum, à salis superficie præcludat & arceat. Cucurbitam benè tectam in loco frigido reponere, visurus postea, an oleum disparuerit, sali alcalino unitum. Tum rursus affunde oleum calidissimum, ut antè spatulā lignēā benè misce; reponere, ut prius continuādo, donec *triplum* ferme olei sal alcali igneum absorberit, aut nul-

lum amplius assumat; eritque massa æquabilis, saponacea, mirè penetrabilis, eò citiùs absolvenda, quò magis teritur & movetur. Hinc indita lagenæ forti, citissimæ rotationis rotæ molaris radio alligata, sicque diu ac noctu agitata, concussa-que, obtinebitur quā citissimè.

Audit quoque sapo chemicus & exactissimas desiderat manipulationes, quarum vel minima neglecta, operantem frustrabitur successu; quibus autem ad amissim observatis, optimum saponem habebis tartareum, cujus paucillum aquā misce, nec olei nota apparebit. Additur pilulis polychrestis Starckeyanis, suo loco descriptis. Etiam si Corrector vocetur, spem tamen fallit & expectationem, in drasticorum & narcoticorum correctione. Ex eo sic parato, diuque in cucurbita detento, sensim efflorescit, ad ejus latera, sal quoddam album, crystallinum, odorem haud ingratum spirans, saporis penetrantis, salini, blandi, non alcalini, mirè meabilitatis & facilis solubilitatis virtute præditum.

Abstergit, aperit, diureticus & balsamicus est, atque in gonorrhœa & hydrope feliciter adhiberi solet à multis à granis octo ad undecim, in vehiculo aquoso.

SCILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla integra involvitur pastæ è farina & aqua, ex qua panis pinfi solet; postea in clibano cocta, eburneo vel ligneo cultello squamæ à se invicem separantur, & filo tractæ, in umbra ficcantur.

Attenuat, incidit & resolvit potenter in affectibus pectoris, à viscida, crassa materia ortis, hydrope & cachexia commendatur.

Dosis in infuso scrupulus, vel drachma semis; in substantia vel pulvere grana tria, vel quinque.

SCY-

SCYPHI VOMITORII,

vid.

POCULA EMETICA.

SIEF ALBUM.

REC. Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Amyli ana unciam semis,
Cerussæ drachmas sex,
Sarcocollæ drachmas tres.

Misce, fiat pulvis, fervetur.

Additur Collyriis, adversus ophthalmiam, à sero acri ortam.

Si Sief cum opio expetitur, addatur scrupulo, opii granum dimidium.

SOLUTIO CORALLIORUM.

REC. Coralliorum rubrorum q. p.
Terantur in pulverem subtilissimum, tritis affundatur

Aceti destillati q. s.

Coralliis solutis, acetum per chartam emporeticam colatum, leni igne, evaporetur, & ad ficitatem inspissatum & coagulatum fervetur.

Eodem quoque modo paratur

SOLUTIO MATRIS PER-
LARUM,
OCULORUM
CANCRO-
RUM.

Omnes hæ solutiones cum sale coralliorum, &c. coincidunt.

Sunt quasi sal medium, ex alcali terreorum & acido aceti, plenissime infatuato. Creduntur aperitiva & diuretica. In aqua commodè dilui possunt. Sunt, qui ea in febribus, præsertim vulnerariis, adhibent.

SPARADRAPUM,

five

TELA GUALTERI.

REC. Emplastri Diapalmæ,
Diachyli simplicis ana libram unam semis.

Liquatis admisceatur

Radici Ireos Florentinæ pulverisatæ uncia una semis.

Immergantur lintea, aut telæ usu detritæ.

Fiat sparadrapum.

Commendatur ad ulcera inveterata, excoriationes à longo decubitu ortas, nec non ad fonticulos.

SPECIES

Dicuntur in officinis, semper paratæ mixtiones, pro magis compositis illico conficiendis coordinatæ. Sic dicuntur species decoctorum usualium, quæ in promptu habentur, ut absque mora parari possint. Præ reliquis tamen hoc nomen sibi vindicant pulveres nonnulli, tam aromatici, quàm cathartici, qui ordinati fuerunt olim, ut inde conficerentur electaria, morsuli &c. Præscribuntur quoque nostris temporibus.

SPECIES DIAMBRÆ.

REC. Doronici,
Galangæ ana drachmas tres,
Zingiberis drachmam unam semis,

Spicæ Indicæ drachmam unam,

Ligni Aloës,
Santali citrini,

Piperis longi ana drachmas duas,

Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi,
Macis ana drachmas tres,
Cardamomi majoris, minoris ana drachmam unam,

Misce, fiat pulvis, qui completus redditur, addendo
Ambræ drachmam unam,
Moschi drachmam semis.

Calefaciunt, caput & ventriculum roborant, concoctionem adjuvant, & in affectibus à causâ frigida ortis inserviunt, & dantur in trageis & morsulis.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SPECIES DIANISI.

REC. Pyrethri drachmas duas,

Ccc 2

Ga-

Nucis Moschatæ,
Cardamomi minoris ana
drachmam
unam,
Florum Rosarum uncias
duas.

Misce, fiat pulvis.

Redduntur completæ, addendo un-
ciis duabus,

Ambra griseæ grana octo,
Moschi grana tria.

Sunt roborantes, leniter adstringen-
tes, cephalicæ & carminativæ.

In trageis vel confectiōibus exhiben-
tur à scrupulo uno ad duos.

SPECIES de HYACINTHO.

REC. Hyacinthorum præparato-
rum,

Boli Armenæ,
Terræ Lemniæ veræ, vel
Strigenfis sigillatæ,
Coralliorum rubrorum præ-
paratorum
ana drach-
mam unam
semis,

Margaritarum occidenta-
lium,

Smaragdorum præparato-
rum ana
drachmam
unam,

Cornu Cervi præparati,
Rasuræ Eboris præparatæ,
Ossium de cordibus cervo-
rum præpa-
ratorum,

Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,

Santalorum omnium,

Rosarum rubrarum,

Granorum Kermes,

Seminum Acetosæ,

Citri decorticati,
Portulacæ,

Croci optimi,

Myrrhæ electæ ana scrupu-
los quatuor.

Misce, fiat pulvis.

Leniter adstringunt, ad fluxiones
& hæmorrhagias nimias moderan-

Pars II.

das, pulveribus temperantibus ni-
trofis utiliter admiscuntur.

Ex illis, cum syrupo Citri, paratur
confectio.

Dosis à scrupulo semis ad unum.

SPECIES DIAJALAPPÆ
MYNSICHTI.

REC. Radicis Jalappæ resinosæ
uncias duas
semis,

Cremoris Tartari scrupulos
undecim,

Olei Cinnamomi scrupulum
unum.

Misce.

Sine molestia purgant per inferiora.

Dosis à scrupulo uno ad drach-
mam unam.

SPECIES IMPERATORIS
PRO

MORSULIS & TRAGEIS.

REC. Cinnamomi optimi drachmas
decem,

Caryophyllorum aromati-
corum un-
ciam semis,

Macis,

Galangæ,

Nucis Moschatæ,

Cardamomi ana drachmas
duas.

Misce, fiat pulvis.

Sunt calidæ, stomachicæ, juvantque
incidendo, ac roborando, in fri-
gidis. Possunt supplere species
aromaticas caryophyllatas, rosa-
tas, diacinnamomi, diacalamin-
thæ, aliasque similes, de quibus
aliquas solummodò hîc retinere pla-
cuit.

Pro morsulis conficiendis incidendæ,
pro trageis pulverisandæ sunt.

SPECIES DIAIREOS
SIMPLICES.

REC. Ireos Florentinæ,
Sacchari Candi albi,
Specierum Diatragacanthæ
frigidarum
ana drach-
mas sex.

D d d

Misce,

Misce, fiat pulvis.

Serum acre ad fauces destillans demulcent, atque in tussi sicca commendantur.

Dosis drachma semis ad scrupulos duos.

SPECIES TABACI, pro FUMO,
CAMERARII.

REC. Styracis,
Mastiches,
Benzoës,
Succini *ana unciam semis*,
Olibani,
Seminis Anifi,
Fœniculi *ana drachmas duas*,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebæ *ana drachmas tres*,
Foliorum Tabaci *uncias octo*,
Majoranæ *unciam unam*,

Florum Calendulæ,
Cyani,
Rofarum rubrarum,
Damascenarum,
Lavendulæ *ana unciam semis*,
Liliorum convallium
drachmas duas.

Misceantur incisa & contusa grosso modo.

Commendantur ad dentium dolores & defluxiones rheumaticas.

Fistulâ tabacariâ hauritur fumus.

SPECIES TABACI, pro FUMO,
OFFICINALES.

REC. Foliorum Tabaci *uncias sedecim*,
Majoranæ,
Basilici *ana unciam semis*,

Florum Rofarum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium *ana drachmas duas*,

Seminis Anifi *uncias quatuor*,
Fœniculi *unciam unam*,

Styracis,
Afac dulcis *ana drachmas quinque*,

Ligni Rhodii,
Santali citrini,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebæ *ana drachmas tres*.

Incidentur & contendantur grosso modo.

Commendantur, cum præcedentibus, ad eodem affectus.

SPECIES DIATRAGACANTHÆ
FRIGIDÆ.

REC. Gummi Tragacanthæ albæ
uncias duas,
Arabici *drachmas decem*,

Amyli *unciam semis*,
Glycyrrhizæ *drachmas duas*.

Misce, fiat pulvis.

Serum acre demulcent; salutariter exhibentur tussientibus, cum calore lento exsiccativo, & in diarrhœa, à sero acri orta, bonum effectum præstant.

Dosis drachma semis & ultra.

NB. Semina frigida, quia brevi tempore species inficiunt rancore, omissa sunt; nonnisi addenda sub quolibet usu, si nempe iis opus fuerit.

SPECIES DECOCTI
ANTINEPHRITICI,
five

NEPHRO-CATHARTICUM
FORESTI.

REC. Radicum Liquiritiæ *unciam unam semis*,
Radi-

Radicum Petroselinii,
Foeniculi ana un-
cias duas,
Ireos Florentinæ
unciam unam
semis,

Florum Malvæ,
Althææ

Seminum Foeniculi,
Saxifragiæ ana
drachmas sex,
Cicerum rubro-
rum confracto-
rum uncias
sex,

Jujubarum,
Caricarum ana No. triginta,
Hordei mundati & prius
loti uncias tres.

Incisa & contusa grosso modo,
serventur ad usum.

In nephritide, ad urinæ ardorem
mitigandum & calculum pellen-
dum, utiliter decoctum adhibetur.
Ad aquæ libram unam, specierum
uncia una semis requiritur.

SPECIES pro DECOCTO
AVENÆ
five
BROMIO.

REC. Avenæ albæ electæ, sæpi-
us lotæ & ite-
rum ficcatae un-
cias sex,

Ligni Santali rubri unciam
unam,

Radicum Cichorei sylvestris
unciam semis.

Misce.

Paratur ex his speciebus celeberrimum illud decoctum *Lowerianum*: præscriptam quantitatem, in

Aquæ fontanæ libræ duo-
decim,

ad tertiæ partis consumptionem
coquendo, & post repetitam
colaturam,

Nitri antimoniati unciam
dimidiam,

Sacchari uncias duas
addendo.

Commendatur ad defluxiones acres,
salinas, scorbutum, arthritidem,
malum hypochondriacum, nephri-
tidem, hæticam; humorum acri-
moniam demulcet, humectat, &
partes nimium constrictas relaxat.
Dosis uncia sex, vel octo, quoti-
die, frigide vel calide, manè &
vesperè haustæ, usu per aliquot
septimanas continuato.

SPECIES DECOCTI
CARMINATIVI.

REC. Seminum Anisi,
Carvi,
Cumini,
Dauci,
Foeniculi ana un-
cias duas,

Glycyrrhizæ,

Florum Chamomillæ vul-
garis ana drach-
mas sex,

Passularum uncias sex.

Incisa & contusa misceantur.

Decocti usus est in clysteribus; tor-
mina à flatibus orta mitigat, al-
vum aperit & flatus educit; pro-
dest etiam nephriticis, cum deco-
cto specierum emollientium.

Pro adulto specierum uncia duæ,
in aquæ unciis quindecim co-
quuntur, ad libræ unius rema-
nentiam, pro clysmate.

SPECIES CEPHALICÆ
pro
CUCUPHIS.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ
ana unciam
semis,

Florum Lavendulæ,
Rorismarini,
Rosarum ana drach-
mas sex,

Ligni Rhodii,
Santali Citrini,
Aloës ana unciam se-
mis,

Caryophyllorum aromati-
corum,

Cinnamomi,

D d d 2

Nucis

Nucis Moschatæ,
Succini citrini,
Styracis ana drachmas tres.

Misce.

Incisa & contusa grosso modo fermentur, quibus pro lubitu addi potest

Olei ligni Rhodii,
Lavendulæ,
Majoranæ una, aut altera gutta.

Usum docet titulus. Vires sunt cephalicæ, nervinæ, roborantes.

SPECIES CEPHALICÆ
pro
EPITHEMATE.

REC. Herbæ & summit: Betonicæ,
Hyssopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Origani,
Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ,
Serpilli,
Florum Chamomillæ,
Meliloti,
Rosarum,
Sambuci,
Foliorum Lauri ana unciam unam,
Salis Ammoniaci unciam semis.

Incisa & mixta reponuntur.

A chirurgis pro fomentatione, in capitis & aliarum partium contusione, expetuntur.

Applicantur in sacculis vel epithematibus, cum vino calido.

SPECIES EMOLLIENTES.

REC. Radicum Althææ uncias quatuor,
Herbarum quinque emollientium ana uncias duas,
Florum Chamomillæ vulgaris uncias tres.

Incisa & contusa misceantur.

Inserviunt pro clysteribus, emolliunt alvum, & leniunt dolores, à materia acri in intestinis hærente profectos.

Cõquitur uncia una & dimidia, in aquæ libra una semis, ad remanentiam libræ unius, pro clysmate, adulto unâ vice injiciendo.

In pulverem tritæ, etiam cataplasmati conficiendo aptæ sunt.

SPECIES pro EPITHEMATE
CORDIS. & PULSUUM.

REC. Herbarum Rorismarini,
Majoranæ,
Melissæ,
Florum Cheiri,
Tunicæ ana unciam semis,
Lavendulæ,
Rosarum
Macis,
Nucis Moschatæ,
Ligni Aloës,
Rhodii
Cinnamomi, ana drachm. sex,
Corticum Citri,
Aurantiorum ana drachmas tres.

Incisa & contusa grosso modo misceantur

Usum ex nomine patet; applicatur in sacculis, aquâ carbunculi vel aceto madefactæ.

SPECIES DECOCTI FLORUM
&
FRUCTUUM.

REC. Radicum Liquiritiæ uncias duas,
Herbarum Capillorum Veneris,
Endiviæ,
Florum Lupuli ana drachmas duas,
Borraginis,
Buglossi,
Violearum,
Rosarum ana drachmam unam,
Jujubarum,
Sili-

Silicarum dulcium,
Prunorum Damascenorum
ana uncias
duas,

Tamarindorum unciam
unam.

Incidentur grosso modo & misceantur.

Sunt pectorales & pro decocto ordinario inservire possunt.

Sumitur specierum uncia una, pro decocti libra una. Pro decocto dilutiore verò requiruntur specierum unciae duae, ad aquae libras quatuor, ad consumptionem quartæ partis.

SPECIES PRO DECOCTO

ad

GANGRÆNAM.

REC. Herbæ Millefolii,
Absinthii ana drachmas sex,

Scordii,

Salviæ,

Hyssoyi,

Rutæ,

Florum Sambuci,

Hyperici ana unciam
semis.Rosarum unciam
unam,

Myrrhæ drachmas sex,

Aloës,

Alæ foetidæ ana unciam
semis,

Lithargyrii uncias sex.

Incisa & contusa servantur.

Non solum in gangræna & sphacelo nondum confirmato, sed etiam in inflammationibus, à contusionibus vel alia violenta causa ortis, & gangrænam minitantibus, bono cum successu adhibetur decoctum harum specierum, cum

Aquæ calcis vivæ libris
quinque,

Aceti vini libris duabus,
paratum, atque linteis quadruplicatis, singulis duabus vel tribus horis, calidè applicatum. Addi possunt, ante applicationem,

Pars II.

Spiritus vini camphorati
unciae quatuor,
vel sex.

SPECIES DECOCTI

pro

GARGARISMA ADSTRINGENTE.

REC. Herbarum Plantaginis
Prunellæ ana uncias
quatuor,

Salviæ nobilis,
uncias duas,

Florum Rosarum rubrarum,
Ligustri,
Balauftiorum ana
unciam
unam.

Incisa misceantur.

Virtutes ex nomine patent.

SPECIES DECOCTI

pro

GARGARISMA EMOLIENTE.

REC. Radicum Althææ,
Herbæ Malvæ,
Florum Papaveris erratici,
Malvæ arboreæ,
Sambuci ana unciam
unam
semis,

Seminis Psyllii unciam
semis,

Caricarum pinguium uncias
duas.

Incisa & contusa grosso modo servantur.

Usus titulus docet.

SPECIES DECOCTI

LIGNORUM.

REC. Ligni Guajaci libram unam
semis,
Sassafras uncias sex,
Juniperini, uncias
quatuor,

Radicum Sarsaparillæ
Chinæ ana uncias
duas,

E e e Liqui

Liquiritiæ *unciam*
unam semis,
 Seminum Anifi,
 Fœniculi *ana un-*
ciam se-
mis.
 Incisa & contusa ferventur.
Ad luen venereum, scabiem, ali-
osque lymphæ morbos conducit.
Dosis est diversa, pro diversitate
morborum.

SPECIES DECOCTI
 NIGRI.

REC. Radicum Tormentillæ *un-*
ciam unam
semis,
 Herbarum Sabinæ,
 Rutæ hortensis,
 Scordii,
 Salviæ,
 Absinthii,
 Foliorum Quercûs *ana*
drachmas
sex,
 Corticum Granatorum,
 Gallarum Turcicarum *ana*
uncias duas
semis,
 Aluminis crudi *uncias qua-*
tuor,
 Vitrioli viridis *uncias duas,*
 Viridis æris,
 Tartari rubri crudi *ana un-*
ciam unam.

Misce, incisa & contusa ferventur.
 Sumuntur harum specierum *uncia*
sex,

ad

Aquæ fontanæ,
 Vini *ana libram unam.*
Decocto pro intentione Chirurgi &
circumstantia morbi, Spiritus vi-
ni additur.
Usus externus ad ulcera inveterata
desiccanda; ut plurimum autem
ad profundas inflammationes &
gangrænam.

SPECIES DECOCTI
 PECTORALIS.

REC. Passularum minorum mun-

atarum unciam
unam,

Siliquæ dulcis,
 Jujubarum *ana drachmas*
sex,
 Dactylorum *uncias duas,*
 Caricarum pinguium,
 Hordei mundi *ana unciam*
unam,
 Glycyrrhizæ,
 Capillorum Veneris *ana un-*
ciam semis,
 Hyssopi *drachmas duas.*

Incidantur & misceantur.

Specierum *uncia una semis*

ad

Aquæ fontanæ *libras duas*
 additur & ad quartæ partis con-
 sumptionem coquitur.

Decoctum pectorale lentâ, molli, blan-
dâque dulcedine dotatum, partim
serum incrassando, acre corrigen-
do, partim phlegma pulmonibus
impactum maturando, bronchia
& trageam demulcendo, humec-
tando, & lubricando, egregiè
tussientibus convenit; sic etiam
in pleuritide, nephritide & vario-
lis, cum fructu adhibetur.

SPECIES DECOCTI

pro

POTU INFANTUM.

REC. Rasuræ Cornu cervi *libras*
duas,

Eboris
 Radicum Liquiritiæ
 Polypodii *ana lib-*
ram semis,

Caricarum pinguium,
 Siliquæ dulcis *ana libram u-*
nam,

Seminum Anifi,
 Fœniculi *ana li-*
bram semis,

Florum Tiliæ *uncias quatuor,*
 Cornu Cervi usti *libram u-*
nam.

Misceantur incisa & contusa.

Specierum *uncia una*

ad

Aquæ

SPECIES.

Aquæ fontanæ libras quatuor, vel quinque

sumitur & post unam, alteramve ebullitionem, colatur.

Usus cognoscitur è titulo. Inservit scilicet decoctum harum specierum pro potu ordinario infantum.

SPECIES pro DECOCTO VULNERARIO.

REC. Radicum Enulæ,
Symphyti majoris,
Tormentillæ,
Hirundinariæ ana unciam semis,
Liquiritiæ drachmas sex,
Herbarum Alchimillæ,
Saniculæ,
Plantaginis,
Auriculæ muris,
Hyperici,
Agrimonie,
Pimpinellæ,
Bugulæ,
Virgæ aureæ,
Florum Bellidis ana unciam semis,
Seminis Foeniculi drachmas sex.

Incisa ferventur.

Sumuntur loco infusi Theæ, in vulneribus tam internis, quam externis.

SPECIES PRO PTISANA REGIA.

REC. Foliorum Cichorei cum toto unciam semis,
Sennæ mundatorum unciam unam,
Seminis Anisi,
Coriandri ana drachmas duas,
Cremoris Tartari drachmas sex,

SPEC. SPECIF. 203

Liquiritiæ rasæ unciam semis.
Misceantur incisa & contusa.
Pro infuso laxanti ordinario præscribitur. Supra determinata portio pro tribus dosibus servire potest.

SPECIES PRO VINO ABSINTHIACO.

REC. Herbarum Absinthii unciam unam semis,
Carduibenedicti,
Centaurei minoris,
Scolopendrii ana unciam semis,
Radicum Helenii unciam unam semis,
Iridis Florentinæ unciam unam,
Calami aromatici unciam semis,
Corticum Aurantiorum drachmas sex.

Incisa misceantur.

Hæ Species sufficiunt pro

Vini mensuris sex, quod insigne exinde fit stomachicum. Qui majorem amarorem adamat, herbarum amararum dosin adaugere poterit.

SPECIFICUM JALAPPINUM

REC. Magisterii Jalappæ.
Scammonii ana drachmas tres,
Pulveris Jalappæ unciam unam semis,
Cremoris Tartari,
Tartari vitriolati ana unciam unam,
Olei Cinnamomi scrupulum unum,
E e e 2 Magi-

Magisteria optimè
cum

Amygdalarum dulcium
drachmis
duabus,

terantur, quibus additur pulvis
jalappæ, salia & tandem oleum
Cinnamomi.

Purgat satis commodè.

Dosis à scrupulo semis ad scrupu-
lum unum, usque ad drachmam
semis. Drachma una continet,

Magisterii Jalappæ grana
quinque, &
Scammonii toti-
dem.

SPIRITUS.

Quid sit, omnibus notum. Quot
quot dantur, è tribus regnis
eliciuntur, gradibus distincti;
generaliter dividuntur in *volati-*
les, semifixos & fixos, quorum
alii sunt *acidi*, alii *alcalini*, alii
mediæ quasi naturæ; simplices &
compositi, in re medica & che-
mica usûs multifarii.

SPIRITUS ÆRUGINIS

five

VIRIDIS ÆRIS & VENERIS.

REC. Aeruginis, five

Viridis Æris crySTALLINI aut
simplicis li-
bram unam.

In pulverem *trita* immittatur re-
tortæ vitreæ, instituatur destil-
latio ex arena, per gradus, in
fine ad incandescentiam retortæ
usque ignem augendo. Prodit
spiritus in nebulis, ac tandem
oleum rubicundum, corrosivum,
adinftar olei vitrioli. Per retor-
tam rectificari poterit & servari.

Nota. Majorem quantitatem purio-
ris spiritûs, ærugo in aceto de-
stillato soluta, & rursus leni igne
coagulata largitur.

Usibus chemicis plerumque inservit &

idoneum præbet menstruum, ad sol-
venda corpora terrea, & extra-
bendas tincturas. Sunt, qui hunc
spiritum venditant tanquam sim-
plex acetum destillatum concentra-
tum, eumque præscribunt internè
ad appetitum excitandum & bilem
fræmandam, sitimque mitigandam.
Alii econtra credunt in eo conti-
neri veneris animam, quia ab ea,
vitri funda tinguntur aureo colo-
re, in quo hæc destillatio institu-
ta fuit.

Dosis guttæ quinque ad decem in
vehiculo aquoso largiore.

SPIRITUS ANGELICÆ.

REC. Radicum Angelicæ uncias
quatuor,

Spiritûs Vini rectificati li-
bras duas,

Aquæ fontanæ libram unam.

Fiat lege artis destillatio.

Alexipharmacus est, & carminati-
vus habetur.

Dosis drachma una ad drachmam
unam semis.

SPIRITUS ANISI.

REC. Seminis Anisi contusi libram
semis,

Spiritûs Vini libras quatuor
semis.

Macerentur per octiduum, & lege
artis spiritus eliciatur.

Est pectoralis & carminativus; aquâ
& saccharo temperatus bibitur.

SPIRITUS ANTHOS.

REC. Florum Rorismarini recens
collectorum
uncias sex.

Macerentur & destillantur
cum

Spiritûs Vini rectificati li-
bris duabus.

Est cephalicus & nervinus; internè
raro, externè sæpius ad odoratum
præbetur.

SPIRI-

SPIRITUS BALSAMI PERUVIANI

juxta

HOFFMANNUM.

REC. Balsami Peruviani optimi
uncias duas,

Salis Tartari concentrati
unciam unam.

Exactissime tritis in mortario af-
 funde

Spiritûs Liliorum conval-
 lium, vel
 Rosarum, vel
 Melissæ citratæ

*ad eminentiam
 quatuor digito-
 rum, sive
 uncias quindecim.*

Fiat leni calore extractio, postea
 destilletur ex arena madefacta,
 in cucurbita vitrea per alembi-
 cum, ad siccitatem usque.

*Spiritus est fragrantissimus, in omni-
 bus nervorum & cerebri affecti-
 bus, à causa frigida & humida
 ortis, summe proficuum, interno
 & externo usu, vi resolvente,
 analepticâ & roborante.*

*Transit cum julepo rosato mixtus,
 in syrupum balsamicum, si nimi-
 rum hujus spiritûs scrupulus unus
 addatur julepi uncix uni.*

SPERMA RANARUM,

vid.

GLUTEN AQUATICUM.

*

SPIRITUS BEZOARDICUS

BUSSII.

REC. Spiritûs Cornu cervi volati-
 lis, vel

Eboris *uncias duas,*

Salis Ammoniaci *uncias qua-
 tuor,*

Cinerum clavellatorum *un-
 cias duode-
 cim,*

Succini flavi pulverisati *un-
 cias sex,*

Olei de Cedro *drachmas duas.*

Misceatur

Pars II.

Sal Ammoniacum

cum

Succino, &

Oleo,

quibus adde

Cineres clavellatos

in

Aquæ fontanæ *libra una*
 solutos,

Spiritûs Vini rectificati *li-
 bras tres,*

his adjunge

Spiritum Cornu cervi,
 & per ignem arenæ, è cucurbita
 probè lutata, destilla.

*Potenter sudorem atque urinam mo-
 vet, antispasmodicâ virtute pol-
 let & sicut reliqua alcalina, aci-
 dum infringit.*

Dosis guttæ triginta ad quadraginta.

SPIRITUS CARMINATIVUS

de

TRIBUS.

REC. Nitri crudi crystallini,
 Tartari albi puri *ana libras
 duas.*

Contusa misce; huncce pulverem
 ficcissimum in retortam tubula-
 tam ignitam injice per vices,
 tubulum claude & fumos pelle
 in vas recipiens maximum, in
 quod ante destillationem

Spiritûs Vini rectificatissimi
libræ duæ

fuerunt infusæ, hanc observan-
 do cautelam, ne unquam *ultra*
drachmæ duæ, unâ vice injici-
 antur per tubulum, nec repe-
 tatur injectio, nisi finitâ deto-
 natione. In hoc nitri & tartari
 incendio assurgit vapor obscu-
 rus, qui spiritum vini intrat,
 acidum verò nitri à spiritu tar-
 tari alcalico temperatur & sic
 liquor medius amaricans impe-
 tratur: nam tartarus cum nitro
 deflagrans, spiritus emittit al-
 calicos. Peractâ destillatione
 manet in retorta sal alcali, spiritus
 verò in recipiente probè agi-
 tando, ut solvatur id, quod ad
 Fff latera

latera ejus hæret ; qui effusus & filtratus, valde subtilis & volatilis est, coloris rubicundi & saporis amaricantis, è cucurbita vitrea humili rectificandus & fervendus ad usum.

Ad Clyssos referri potest hic spiritus, qui nil aliud sunt, quam spiritus acidi compositi, detonatione vel deflagratione parati. Efficacior reddi potest, si spiritus vini purissimus, prius de herbis & seminibus balsamicis & carminativis abstractus adhibeatur. Ex titulo patent vires, nempe carminativæ & antispasmodicæ, diaphoreticæ & diureticæ, atque in affectibus colicis, hypochondriacis & hystericis commendari meretur. Dosis guttæ triginta ad sexaginta usque.

SPIRITUS CASTOREI COMPOSITUS LONDINENSIS.

*REC. Castorei unciam unam,
Florum Lavendulæ drachmas sex,
Rorismarini,
Salviæ ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas duas,
Caryophyllorum,
Macis ana drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati libram unam semis,
Aquæ Lavendulæ libram semis,
Salis Ammoniaci uncias duas,
Tartari, vel
Cinerum clavellatorum uncias tres.*

*Misce, & post digestionem per triduum, destillentur & Spiritus uncie quindecim proliciantur, quibus adde Camphoræ drachmas duas,
Olei destillati Rutæ,
Succini ana guttas viginti.*

Usus est tam internus, quam ex-

ternus ; naribus admovetur in affectibus hystericis.

Datur interne in motibus convulsivis, colica hystérica & torminibus, à scrupulo uno ad drachmam semis, ex Aqua Melissæ, vel alio vehiculo.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

REC. Cerasorum nigrorum, maturorum quantum vis.

Contundantur unà cum nucleis, & doliolo querno, ad id accommodato, satisque capaci, indita, loco tepido, stent addendo Fæcum Cerevisiæ paucillum, donec fermentando acidiusculum, aut vinosum spirare odorem cœperint, tum è vesica destillantur & spiritus inde natus rectificetur.

In Helvetia à sexu utroque, tam è cerasis recentibus, quam siccatis, plerumque spontaneâ fermentatione paratur copiosissimè, inque regiones longinquas divenditur. E nucleis vires habet diureticas & præter reliquas cum spiritu vini communes cephalicus quoque censetur.

Dari potest à drachmis duabus ad unciam unam.

Simili quoque modo per fermentationem parantur,

SPIRITUS CYDONIORUM, roborans,

EBULI, diaphoreticus & alexiphar-
macus,

FRAGORUM, diureticorum præstantissimus,

**POMORUM RE-
DOLENTIUM**, stomachicus, & cardiacus, palpitationi
cor-

cordis & ly-
pothimiæ
succurrens,

*Dosis à scrupulo uno ad drach-
mam semis usque.*

SPIRITUS SAMBUCI è BAC- CIS,

alexipharma-
cus, cardia-
cus, diapho-
reticus &
uterinus,

quod & [de aliis fructibus &
baccis in foro medico usitatis
intelligendum.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

REC. Herbæ Cochleariæ florentis
libras sex,
Contunde, ac vesicæ immixtæ af-
funde

Spiritûs Vini non rectificati
libras quatuor,

Aquæ fontanæ *libram unam.*
Juncturis probè clausis ac muni-
tis, destilla igne moderato spi-
ritum, quem, recenti herbæ
rursus affusum, iterum destil-
la, rectifica, ac in vitro probè
obturato ferva.

*Magnæ efficacæ est adversus scorbu-
tum; pollet etiam virtute car-
minativâ & diureticâ, atque
ad ulcera oris & gingivas excul-
ceratas, melle rosato mixtus con-
venit.*

*Datur internè à drachma semis
ad unam, aquâ dilutus.*

Per fermentationem quoque para-
tur, minoris verò efficacæ ac
gratiæ.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Uno, eodemque labore, quo sal
volatile cornu cervi, obtinetur,
& ab oleo empyreumatico se-
parari ac rectificari debet.

*Est antispasmodicum longo usu proba-
tum, aperitivum, hystericum, dia-
phoreticum ac diureticum.*

SPIRITUS CORNU CERVI ad USUS EXTERNOS.

REC. Olei Cornu Cervi foetidi *un-
ciam unam,*
Cinerum clavellatorum *un-
cias duas,*

Misceantur & affundantur
Spiritûs Vini non rectifi-
cati *libra octo;*

destilletur spiritus ex cucurbita
vitrea ad dimidias, & fervetur
in vase probè clauso.

*Ut à titulo patet, usus est exter-
nus ad membra paralytica. In-
ternè sumptus, sudorem & uri-
nam movet; verum, ob oleum
empyreumaticum, sanguinem ex-
æstuat; hinc pariori dosi i. e. ad
guttas aliquot solummodò exhi-
bendus.*

Qui ex sale volatili Cornu cervi,
mediante spiritu vini rectifica-
to, oleum extrahunt, ut sal
purius habeant, eodem labore
spiritum, oleo Cornu cervi im-
prægnatum, nanciscuntur, qui
additâ salis alcali portione recti-
ficari potest.

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum Aurantium re-
centium *libram unam semis,*

Spiritûs Vini rectificati *li-
bras octo,*

Aquæ fontanæ *libras duas.*

Destillantur è vesica, lento igne,
&

Spiritûs Vini *libra octo*
proliciantur, qui

Aquâ fontanâ
dilutus &

Saccharo
edulcoratus, fervetur.

*Ad ventriculum confortandum, &
flatus pellendos, sumitur. Non
dilutus, nec edulcoratus inservit*

*pro menstruo Tincturæ Corticum
Aurantiorum.*

SPIRITUS CORTICUM CITRI.

Ad normam Spiritûs Corticum Au-
rantiorum, superius modò de-
scripti, conficitur.

*Eandem habet virtutes, & menstruum
præbet, pro Essentia carminativa.*

SPIRITUS CROCI.

REC. Croci orientalis *uncias duas,*
Spiritûs Vini rectificati *li-*
bras duas,

Aquæ fontanæ libram semis.

Misceantur, & stent, *per aliquot*
dies, in digestionem, postea de-
stillentur, leni igne, è cucur-
bita vitrea, atque

Spiritûs *uncia viginti*
eliciantur.

*Rarò in usum venit, nisi ad Elixir
Croci anticolicum parandum. Ex-*
terne, cum aliis spirituosus appli-
catus, virtute paregoricâ se com-
mendat.

SPIRITUS FORMICARUM.

REC. Formicarum, mensibus
Junio, vel
Julio capta-
rum *libram*
unam,

Spiritûs Vini rectificati *libras*
duas.

Misce, & destillentur ex maris bal-
neo ad ficcitatem.

Cum Aqua Magnanimitatis, quæ
spiritus Formicarum compositus
dici meretur, convenit. Adscri-
buntur ei virtutes aphrodisiæ,
antapoplectiæ, analeptiæ & diu-
reticæ.

Interne à drachma una, ad duas
usque præscribitur.

Externe commendatur ad rheumati-
cos & arthriticos dolores; para-
lyticis membris conducit.

Sunt, qui ex formicis, sine addi-

tione spiritûs Vini, per retor-
tam spiritum destillant volati-
lem, qui tamen, præ aliis ejus-
modi spiritibus empyreumaticis,
ex animalibus destillatis, vix
ullam prærogativam habet. Ad
externos usus, ejusmodi spiri-
tus cum spiritu vini maritatur,
ut de spiritu Cornu cervi, suo
loco dictum.

Sunt, quoque, qui residuum in
destillatione cum spiritu vini,
cum calce viva miscent, ite-
rumque destillant, ac tunc spi-
ritum *formicarum urinosum* impe-
trant, admodum foetidum & in-
gratum, qui laudatur in affe-
ctibus soporosis.

SPIRITUS FULIGINIS.

REC. Fuliginis nigerrimæ, com-
pactæ, pinguis-
simæ & splen-
dentis (*Spiegel-*
rus) *partem n-*
nam,

Arenæ partes duas.

Fiat destillatio è retorta vitrea,
juncturis optimè clausis, igne
arenæ, primum leni, & æqua-
bili, exit copiosa aqua pellucida,
cum impetu prodiens. Ab-
lata primâ hâc aquâ, applicetur
excipulum aliud, incitando
dein ignem; exhibit adhuc a-
qua copiosa, alba, lactea,
pinguis, satis impetuosè e-
rumpens. Pergatur lentè au-
cto igne, quamdiu iterum
hæc aqua prodit. Excipulum
rursus mutetur, & ignis inten-
datur; ascendit sal flavum, vo-
latile, copiosum, undique ex-
cipulo adnatum, urgeatur ille,
quàm diu prodire cernitur,
cum spiritu acri, alcalino, pin-
gui. Simul tum igne fortif-
simo arenæ & quidem suppres-
sorio, ascendit oleum foetidum.
Omnibus sponte refrigeratis, de-
prehenditur in collo retortæ sal,
verè ammoniacum non sublima-
bile,

bile, nisi extremâ hac ignis torturâ. Liquores transtillati cum suo sale volatili conjuncti, prius ab oleo separati, per filtrum rectificentur destillando vel de calce viva, vel de cineribus. Unde obtinetur spiritus volatilis, penetrans valde, urinosus.

Communiter destillatur sine additione, alit ita impetratur ingens olei resinosi copia, foetoris intolerabilis: tota enim fuligo est fere resina spissa, per ignem expulsa. Hinc consultius est arenam addere, ut sal volatile, in fuligine existens, magis à compedibus suis, acido nempe infimul conjuncto liberetur, oleum quoque crassum, resinosum poros terræ intrare valeat, ubi infimul ligatur & figitur, atque spiritus & salis volatilis major, minor autem copia olei crassi, empyreumatici, sed magis fluidi & subtilioris obtinetur, quod itidem rectificari poterit, uti dictum de oleis.

Spiritus & sal fuliginis in modum alcalium prosunt in omnibus morbis ab acido oriundis & humores solvunt. Laudantur ut egregium diaphoreticum diureticum & bezoardicum in morbis pestilentialibus. Externè humores stagnantes solvendo, & vasa irritando, egregias vires resolventes in tophis & tumoribus frigidis exerunt.

Dosis spiritus, guttæ viginti, tringenta sæpius, salis grana tria & ultra.

SPIRITUS JUNIPERI

è

BACCIS.

REC. Baccarum juniperi conquassatarum libras quatuor,

Spiritus Vini non dephlegmati libras octo.

Destillantur ad dimidias.

Pars II.

Paratur quoque è baccis contusis & conquassatis, affundendo aquam ferventem, & collocando, vase clauso, in fermentationem, atque addendo, si placet,

Fæcum cerevisiæ paucillum.

Remedium est carminativum, diureticum, sudoriferum, stomachicum, emmenagogum, aperiens, cephalicum. Usus est tam internus, quam externus, in affectibus colicis & rheumaticis.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

REC. Florum Lavendulæ recentissimorum, maturorum, tempore calido, sereno post meridiem carptorum libram unam,

Spiritus Vini non dephlegmati libras quatuor.

Digestione per triduum factâ destillantur, per serpentem ad dimidias. Prodit limpidus, pellucidus spiritus, odore & sapore proprio lavendulæ prægnans, servandus ad usum.

Spiritum Lavendulæ duplicatum desideraturus, accipere poterit florum Lavendulæ libram semis, his affundere spiritum prolectum & aquam, quæ exiverunt, destillando, ut antea, spiritum pellucidum, purum. Aqua additur, ne flores à spiritu ultimò prolecto adurantur; id quod aqua superstes præcavet.

Internè rarò; externè verò ad membra paralytica confortanda, sugillationes resolvendas, & ad odoratum adhibetur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

REC. Ligni Sancti, vel Guajaci compacti, in scobem tenuem redacti quantum satis

G g g

Ad

Ad implendam retortam vitream, fere ad collum usque, uti occasione Olei Guajaci è ligno, dictum fuit, qui processus hic consulendus; fiat igne arenæ destillatio, sic prodit primò phlegma, cujus vestigia premit spiritus, & tandem oleum nigrum, crassum, empyreumaticum. In modum spiritûs fuliginis rectificandus hic spiritus, usuique servandus.

Viribus cum spiritu fuliginis convenit & eâdem exhibetur dosi.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

REC. Florum Liliorum convallium *libram unam,*

affunde

Vini generosi albi

libras decem,

Spiritûs Vini rectificati *libram unam semis.*

Ad dimidias destilla è cucurbita, prolectam aquam spirituofam novis affunde floribus & destilla iterum ad dimidias, atque spiritum ferva ad usum.

Aquarum antapoplecticarum & epilepticarum ingrediens sunt lilia convallium. Adscribitur illis vis specifica, cordialis & nervina, nec non memoriam confortans; raro tamen internè datur spiritus; externè ad convulsiones, luxationes & dolores rheumaticos utiliter adhibetur; naribus attractus, adversus odontalgiam laudatur.

SPIRITUS LUMBRICORUM VINOSUS.

REC. Lumbricorum terrestrium vivorum, à fordibus lotionem purificationum *libras duas.*

Superfunde

Spiritûs Vni non dephlegmati *libras quinque semis.*

Per triduum in illo macerati & digesti, destillentur, leni igne, è vesica, ad dimidias.

Usus est externus, & ad rheumaticos & arthriticos dolores laudatur.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

REC. Lumbricorum terrestrium exsiccatorem *libras tres, vel quantum satis*

Ad retortam vitream plenissimè implendam. Adaptetur vas recipiens magnum & lutatis commissuris, in furno reverberii applicetur ignis, per *tres horas*, in primo gradu; sic exstillat phlegma. *Tribus horis* subsequentibus applicetur *secundus gradus*, sic prodibit spiritus vel modo invisibili, vel sub forma nebularum. Subsequentibus *tribus horis* augeatur ignis ad *tertium gradum*, sic sal volatile sublimabitur, in striis, spiculis & stelulis concretum ad latera recipientis. Si verò *ultimis tribus horis* urgetur ignis, ad *quartum gradum*, massa eructat oleum foetidum, empyreumaticum, quæ refrigerata separentur & sal, ut ab oleo foetido liberetur, ossium calcinatorum triplo vel quadruplo misceatur & sublimetur; quæ sublimatio *bis* vel *ter* repetenda, donec satis album appareat; spiritus verò ab oleo empyreumatico, ope chartæ bibulæ madefactæ, separatus, rectificetur, quando nempe cornu cervi ad albedinem usti triplo affunditur.

Rectificatus usitatus ubique remedium est in praxi: convenit in affecti-

affectibus uteri, capitis, nervorum; potenter sudorem movet & urinam, reserat obstructions; externe applicatus excitat apoplecticos, epilepticos, & hystericas; adhibetur quoque in contusionibus, rheumatismis & laxationibus parti affectæ illitus. Uno verbo in omnibus perfecte convenit cum cornu cervi spiritu & sale volatili. Interim dantur, qui spiritum Lumbricorum volatilem magis diureticum habent & antarthriticum. Fides sit penes autorem.

Dosis spiritus ad guttas triginta, salis volatilis ad grana sex vel octo.

SPIRITUS MASTICHINUS.

*REC. Mastiches uncias quatuor,
Cinnamomi unciam semis,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ ana drachmas tres,
Zingiberis,
Galangæ,
Cardamomi minoris,
Corticis winteriani ana drachmas duas.*

Pulverifata infundantur in

Spiritus Vini rectificati libris decem.

*Stent per aliquot dies in digestionem, postea, additis
Aquæ fontanæ libris duabus,
è vesica destillantur.*

Quodsi

Spiritus hujus prolecti libris duabus,

*Aquæ fontanæ,
in qua*

*Sacchari uncia decem,
solutæ sunt, libra una
additur, nominatur*

*ELIXIR MASTICHINUM,
quod loco aquæ vitæ hauriri solet.*

In morbis ventriculi, à causa frigida ortis, colica flatulenta & ructibus, cum insigni fructu datur.

Dosis aquâ diluti & saccharo edulcorati, est uncia semis ad integram.

SPIRITUS MATRICALIS.

*REC. Mastiches,
Myrrhæ,
Thuris,
Succini ana unciam unam semis,
Spiritus vini rectificati libras quatuor.*

Destillantur è balneo, ad ficcitatem.

Ad luxationes, sugillationes, & ubi paregorica, spirituosâ locum inveniunt, adhiberi potest.

SPIRITUS MELISSÆ.

REC. Sacchari Thomæ libram unam,

Solvatur in

Aquæ fontanæ calidæ libris sex.

Solutionem funde in cucurbitam sat capacem; semifrigeratæ aut tepidæ, ne fermenti viscosum comburatur, adde

*Fæcum cerevisiæ recentium cochleare unum,
aut paulo plus.*

Quàm primùm fermentare incipit, infundantur

Herbæ Melissæ manipuli quatuor.

Misceantur benè, applicetur capitellum cum excipulo, & fermentationi relinquuntur, donec sponte cesset, nec vesiculæ amplius eleventur. Fiat tum destillatio lenta, lento igne, continuanda ad striarum oleosarum in alembico apparentiam. Adeoque obtinetur spiritus fragrantissimus, herbæ odorem & saporem perfectè referens, è quo destillatus. Superlativa fit ejus virtus, quando spiritus supra herbam recentem, iterum iterumque cohobatur. Sanè spiritus fermentatitii omnium sunt subtilissimi, palmamque

eripiunt illis, qui consuetudine officinali parantur è simplicibus, quorum viscosum nondum extricatum, ante suâ destillationem fuit, addito spiritu vini, combustum. Etiam si qualitas non respondeat quantitati, tamen & reliqui deberent fermentatione dictâ parari, ex floribus & herbis fragrantibus, uti & feminibus & baccis.

Interim vulgo parari potest spiritus Melissæ, ut spiritus Lavendulæ.

Virtute nervinâ, cardiacâ, stomachicâ, carminativâ & uterinâ se se commendat & pro menstruo ad Tincturam castorei extrahendam, inservit.

SPIRITUS MENTHÆ.

Cum spiritu Vini, ad normam spiritus Lavendulæ, conficitur. *Vires sunt stomachicæ, nervinæ & carminativæ.*

SPIRITUS NERVINUS

ad

MENTEM HOFMANNI.

REC. Olei Cornu cervi rectificati
unciam unam.

Misce
cum

Aquæ Melissæ compositæ
Carmelitarum
spirituosæ
unciis octo.

Destillantur super calcem vivam, vel potius caput mortuum, ex destillatione spiritus Cornu cervi residuum & calcinatum, ex cucurbita vitrea, blandissimo igne, quam diu striatim exstillant. Serventur in vitro optime clauso.

Est medicamentum liquore Cornu cervi succinato spirituosum gratius, & accedit ad hunc aquosum.

In omnibus nervorum affectibus prope dari potest ad drachmam semis, scrupulos duos.

Externè quoque cum euphoria, in auxilium vocatur, scopo resolvente, paregorico.

SPIRITUS NITRI ACIDUS.

REC. Nitri purissimi, in pollinem contriti *partem unam,*

Terræ argillacæ, vel
Boli vulgaris, rubræ *partes tres.*

Misceantur satis accuratè, humectentur

Aquæ fontanæ *sufficiente quantitate,*

atque è massa formentur globuli parvi, qui rursus exsiccati immittantur retortæ vitreæ, probè loricatæ & igne gradatim administrato, in receptaculum valde capax, cui

Aquæ simplicis *portio aliqua* antea immissa sit, destillantur, donec rubri vapores cessent. In excipulo aqua esse debet, ut spiritus nitri sub forma nebularum rubicundissimarum apparens, inveniat corpus, cui inniduletur. Præter nitrum nulli dantur spiritus in forma rubicunda destillabiles. A phlegmate separatur rectificatione, & tunc erit spiritus nitri acidus, acer, causticus.

Ad usus chemicos ut plurimum; externè etiam à chirurgis ad verrucas, aliasque excrescentias præternaturales auferendas expetitur.

SPIRITUS NITRI CON- CENTRATUS seu FUMANS.

REC. Nitri crystallini, in furno digestorio exsiccati & ab omni humido liberati *uncias quatuor,*
Olei Vitrioli rectificatissimi *uncias duas.*
Immit-

Immittatur nitrum pulverisatum re-
tortæ vitreæ, recenti, siccissimæ,
fat capaci, antea calefactæ; su-
perfundatur

Oleum vitrioli,
& statim in arena instituatur
destillatio, igne leni, adaptato
recipiente siccissimo & ma-
jore, juncturis vasorum probè
clausis. Sic nebulæ rubicundif-
simæ assurgunt & guttæ destil-
lantur aurei coloris. Colliga-
tur hicce spiritus & in vitro
densiori, probè clauso fervetur
usibus physicis, medicis & che-
micis.

*Ad spiritus nitri mixtos pertinet,
estque acidum concentratum puris-
simum; ad spiritus nitri dulcis
præparationem inservit. Quando
spiritui huic fumanti nitroso olei
Carvi, vel Terebinthinæ, vel Ca-
ryophyllorum genuini, aliorumve,
guttæ aliquot instillantur, subi-
tum oritur incendium, flammaque
erumpit, finito incendio terra re-
linquitur vel carbo.*

SPIRITUS NITRI DULCIS.

*REC. Spiritus Nitri fumantis par-
tem unam,
Alcoholis Vini sincerissimi
partes decem.*

Spiritus Nitri concentratus vel flam-
mificus aut fumans successivè in-
stilletur spiritui Vini, & post
digestionem aliquot dierum, in
loco frigido, lentissimo igne, è
cucurbita destillentur.

*Cum vehiculo aquoso in colica flatu-
lenta egregium effectum anodynum
& carminativum exerit.*

*Scopo diuretico etiam à guttis qua-
draginta ad sexaginta, sufficien-
ti aquâ dilutus, dari potest.*

SPIRITUS PANIS.

*REC. Panis triticei bis cocti, op-
timè siccati, quan-
tum placet.*

In frusta comminutus immittatur
retortæ vitreæ, atque ex arena,
leni igne per gradus aucto, de-

Pars II.

stilletur. Spiritus, post destil-
lationem ab oleo separatus, re-
ctificetur.

*Adscribuntur huic spiritui vires sto-
machum confortando, appetitum
augentes. Inprimis verò ad coral-
liorum Tincturam extrahendam ad-
hibetur.*

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam
semis.*

SPIRITUS ROSARUM.

Pari ratione, ut spiritus Liliorum
convallium, destillatio peragi-
tur.

*Cor exhilarat, & cerebrum grato
odore recreat.*

SPIRITUS ROSARUM

per

FERMENTATIONEM.

*REC. Florum Rosarum, in mor-
tario contusa-
rum libras
duodecim,*

*Sacchari libras duas,
Fermenti panis libram semis,
Aquæ fontanæ tepidæ libras
triginta.*

Stent in vase ligneo, donec fer-
mentata, odorem vinosum spi-
rent; destillentur postea è ve-
fica, & spiritus rectificetur.

Vires cum præcedenti coincidunt.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
ANISATUS.

*REC. Salis Ammoniaci in pulve-
rem triti libram
semis,*

*Cinerum clavellatorum li-
bram unam,
Seminis Anisi uncias tres,
Spiritus Vini non dephleg-
mati libras
quatuor.*

Misceantur & destillentur è cucur-
bita vitrea, atque proliciantur
Oleosi Volatilis libras duas se-
mis.

Serventur in vitro probè clauso.

*Pectoris infarctu pituitoso resolvendo,
H h h tonum*

tonum pulmonum roborando , decubitus humorum prohibendo & flatibus discutendis , egregium est remedium.

Dosis guttæ decem ad triginta.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI AROMATICUS
PHARMAC. EDINBURG.

REC. Radicum Angelicæ,
Galangæ,
Summitatum Majoranæ,
Rorismarini,
Corticum Aurantiorum,
Citri,
Cinnamomi *ana drachmas sex,*
Caryophyllorum,
Nucum Moschatarum,
Macis *ana drachmas tres.*

Incisis & contusis affunde
Spiritus Vini non dephlegmati *libras tres.*

Digerantur *per triduum*, postea addantur

Cinerum clavellatorum,
Salis Ammoniaci *ana uncia quatuor.*

Destillantur leni igne, ex cucurbita vitrea, ad dimidias.

Vires celebrantur cephalicæ, stomachicæ, carminativæ, nervinæ. Externè etiam odoratui inservit, & spiritibus nervinis, pro frictione membrorum paralyticorum, additur.

Dosis à guttis quindecim ad triginta quinque, in vehiculo aquoso.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
SUCCINATUS,

five

ESSENTIA SUCCINI, SPIRITU
SALIS AMMONIACI
EXTRACTA.

REC. Succini flavi odorati *uncias duas.*

Pulverisato affunde

Spiritus Salis Ammoniaci vini *uncias sex.*

Digerantur in vitro probè clauso, in loco tepido, per aliquod tempus; postea clarum à spisso, per inclinationem vasis, separetur & fervetur.

Nobile ac egregium est cephalicum, anticitarrhale, stomachicum, antihystericum & diureticum.

Dosis guttæ quindecim ad triginta quinque.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
VOLATILIS VINOSUS.

REC. Salis Ammoniaci in pulverem triti *libram semis,*

Cinerum clavellatorum *libram unam.*

Immittantur cucurbitæ vitreæ, atque affundatur

Aquæ fontanæ *libra semis,*
Spiritus Vini rectificati *libra una.*

Alembico superimposito, & juncturis probè lutatis, destillantur lento igne, ex arena, & spiritus volatilis circiter *uncia decem vel undecim* colligantur.

Est sal volatile liquidum, urinosum, purissimum, & in morbis partium salidarum, ab atonia ortis, scopo tonico, bonam fert opem; egregium est diureticum & resolvens.

Datur internè à guttis viginti ad triginta; externè ad resolvendum cum aliis nervinis spiritibus mixtus, dolentibus partibus illinitur.

Additis oleis destillatis, varia falia volatilia, sic dicta *oleosa*, ex tempore parari possunt.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
VOLATILIS URINOSUS.

REC. Calcis vinæ recens calcinatae *uncias duodecim,*
Salis

Salis Ammoniaci *uncias*
quatuor,

Aquæ fontanæ *libras duas.*

Calci vivæ & sali Ammoniaci,
singulis seorsim in pulverem
reductis & cucurbitæ vitreæ
immissis, superfundatur aqua
fontana, & juncturis, imposito
alembico, probè lutatis, statim
leni igne instituatur destillatio &
Spiritus *uncie octo*
proliciantur, qui in vase optimè
clauso servandus.

*Penetrantior est illo, cum spiritu
Vini destillato & conservari vix
potest. Præcellit virtute diureti-
câ præcedentem vinosum.*

*Usus ut plurimum est externus, ad ex-
citandos sopore profundo sepultos;
naribus epilepticorum etiam admo-
vetur, sub ipso paroxysmo; ad-
ditur spiritibus nervinis, ad mem-
bra paralytica fricanda.*

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

REC. Salis communis, purissimi,
decrepitati *par-
tem unam,*

Florum sulphuris *partes
duas,*

Nitri purissimi *partes tres.*

Optimè mixta & missa in ollam
ferream accendantur &

Massæ refrigeratæ contusæ
instilletur per vices

Spiritus salis *quantum satis*
ad punctum saturationis; fiat fil-
trati evaporatio ad siccitatem in
vitro & productum vocatur spi-
ritus salis coagulatus.

*Etiam si ad salium mediorum naturam
accedere videatur, tamen singula-
ris quid præ aliis salibus mediis sibi
vendicat in calculo & hydropo
tanquam diureticum specificum:
omnes enim aquosas humiditates &
flatus, omnemque tartaream &
viscosam materiam per urinas po-
tenter educit. Præsentaneum quo-
que auxilium est in febribus, icte-
ro &c. ubi aperiendum & resol-
vendum est.*

*Dosis scrupulus unus ad drachmam
semis.*

SPIRITUS SALIS COMMU- NIS ACIDUS.

REC. Salis communis decrepitati
partem unam,
Argillæ *partes tres, vel qua-
tuor.*

Misceantur additâ

Aquæ sufficiente quantitate,
ut globuli exinde formari pos-
sint, qui exsiccati retortæ lori-
catæ indantur, & igne per gra-
dus adhibito, in vas recipiens
amplum, destillatio instituatur,
quousque nulli amplius spiri-
tus, sub nebularum forma
comparentes, egrediantur. Ne-
cesse est, ut in vas recipiens
tantillum aquæ infundatur, ut
incorporentur spiritus. Liqueur
destillatus effunditur in retor-
tam, igne arenæ separatur à
phlegmate, succedit deinceps
spiritus striatus, optimè rectifi-
catus, pro usu medico colligen-
dus; in fundo manet spiritus
salis gravissimus & concentra-
tus, sive oleum.

Notandum hic venit, nunquam
adhiberi debere terram nimis
absorbentem acidum, qualis
est pulvis laterum, sed terram
pinguem & saturatam, qualis
est bolus vel argilla. Alii lo-
co boli vel argillæ vitriolum
calcinatum adhibent.

In fundo manet bolus falsa quæ
cocta in aqua, & percolata ad
limpiditatem usque, dein inspisi-
fata dat sal flavum, non alca-
linum, sed sal stipticum, in copia
satis magna, valde commenda-
tum ab Helmontio ad lapidis
Butleri confessionem. Spiritus
verò est acidus, gratè fragrans,
viridi colore, & virtutes habet
cum sequenti communes.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS
CONCENTRATUS,

five

GLAUBERIANUS.

REC. Salis communis purissimi de-
crepitati *par-*
tes tres.

Humectentur

Aquæ pluviae purissimæ
partibus duabus.

Immittantur cucurbitæ vitreæ, &
Olei Vitrioli quàm optimi
pars una

Successivè admisceatur guttatim,
ne calore nimis subito, ex to-
tius commistu simul factò, vas
crepet. Incalescent omnia.
Tum superimposito alembico
& applicato recipiente sat amplo,
juncturis optimè clausis, leni
igne arenæ fiat destillatio lenta
primis quatuor horis, donec aqua
admista, lento gradu primo exi-
verit; quæ aliter cito actu sem-
per findit excipulum. His pe-
ractis, augeatur sensim ignis,
exstillabit spiritus salis concen-
tratus, fumans, volatilis, à
cujus halitu caveatur quàm sol-
licitissimè. Cognoscitur prodi-
re, quando striæ in vase inci-
piunt unitæ in serpentes strias
descendere. Auge tum liberè
ignem, sensimque urge ad ollæ
ferreæ candescentiam, donec
nihil amplius liquoris prodeat.
Frigescant omnia sponte, aufer,
excipulum & liquorem funde
in vitrum epistomio vitreo pro-
bè obturandum, qui è cucurbita,
leni igne, rectificatus dabit aquam
limpidam, gratissimè acidam op-
timi usûs interni, in vitro iti-
dem, ut ante rectificationem,
optimè clauso asservandam. Ma-
nebit tum in fundo spiritus
pinguis, ex aureo viridescens,
nihil exhalans, fixior, quietus,
quàm optimus, qui seorsim
servari poterit.

Residuum in fundo cucurbitæ sal
candidissimum, sistit acidum

vitrioli, terræ falis communis
inhærens, *sal mirabile* Glaubero
dictum, de quo suo loco actum.

*Adeò subtilis est, ut ex vitro aperto
omnis exhalet & conclave vapore
albo repleat. Hic spiritus salis
est maxime genuinus, saporis aci-
dissimi; stomacho gratus est, ap-
petitum excitat, mucosa attenuat,
digestionem promovet, putredini
resistit, bilem corrigit acri copiâ
peccantem, alvum movet & uri-
nam, calculo generando obstat,
generato resolvendo prodest, jula-
piis additus refrigerat, & stran-
guriâ senilem lenit. Si mera-
cissimus hic spiritus triplo alcoho-
lis optimi mistus, dein destillando
bis, terve, accuratè unitur, ob-
tinetur sal volatile, oleosum, aci-
dum, fragrantissimum, balsami-
cum, laudatissimæ virtutis, de
quo mox agetur. Contraindica-
tur, ubi suspicio ulceris renum
adeſt.*

*Dari potest à guttis tribus ad octo,
in vehiculo aquoso copioso.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

REC. Alcoholis vini purissimi &
rectificatissi-
mi uncias
sex.

Instillantur successivè

Spiritus falis concentrati
uncia duæ.

Digerantur, per aliquot dies, in
vase probè clauso, & postea
destillantur è cucurbita; destil-
latio autem tam diu continuan-
da, donec repetitis cohobatio-
nibus uniatur spiritus & tran-
stillans acido sapore linguam
feriat. Ejus acidum gravius in
fundo cucurbitæ manet, levius
ascendendo cum alcohole, al-
cohol notabili acido sapore in-
ficit. Aliter se res habet cum
spiritibus nitri & vitrioli, qui
transcendendo in alembicum,
cum alcohole volatilifari se fi-
nunt, sicque dulcificantur.

*Easdem habet cum reliquis acidis dul-
cificatis.*

cificatis vires ; ipsi tamen specificæ tribuuntur ad appetitum excitandum, & calculum vesicæ comminuendum.

Dosis à guttis triginta ad quadraginta.

SPIRITUS SAMBUCI FLORUM.

Vel ad normam spiritûs Lavendulæ, vel fermentatione, uti spiritus Melissæ, parari potest.

Est bezoardicæ & anodynæ virtutis.

Datur à drachma una ad unciam semis.

SPIRITUS SERPILLI.

Paratur ad modum Spiritûs Melissæ.

Virtute gaudet discutiente, anodynâ, & ut plurimum externè in affectibus rheumaticis commendatur.

SPIRITUS SULPHURIS

per
CAMPANAM.

Miserè se torquent, qui spiritum sulphuris per campanam parant: operatio hæc non solum tædiofa, sed & pretiosa est, & magno cum sulphuris, temporisque dispendio terminatur: *integra enim libra sulphuris, vix ultra drachmas duas acidi concentrati largitur.* Quoniam verò præparationis methodus hic requiritur, antesignanus sit ille per campanam, quem commodiores sequentur.

1º. Sulphur citrinum, vel si haberi potest, griseum,

in olla figulina *tres pollices* alta & *quatuor* lata fundatur; vasculum hoc, sulphure fuso, ponatur sub camino, fumum perfectè sursum emittente. Incendatur sulphur, atque statim superponatur campana magna vitrea, aquæ ferventis vapore intus humectata, alembicifor-

Pars II.

mis, rostrata, ut per ejus rostrum, spiritus in vas recipiens appositum, queat destillare. Campana, lateribus in triangulum positis, innitatur, ut tantum aëris admittat, ne flamma sulphuris suffocetur. Atque hoc modo multiplicatis campanis, & repetitis novi sulphuris subditi accensionibus, colligi poterit liquor acidus flavescens. Melius succedit operatio, noctu & tempore frigido pluvioso, quàm fereno.

2º. accende, in patina terrea, sulphuris pulverem contusum, ita ut successivè deflagret, supra fumum expande linteamina, lixivio quodam alcalico concentrato humectata; sic spiritus sulphuris acidus, ab alcali avidissimè attractus, intrabit lixivium alcalicum, ac ita saturabitur; postea mediante aquâ è linteis extrahuntur salia. Lixivium paratum, coctum ad spissitudinem salinam & cum dimidio circiter olei Vitrioli mixtum ac destillatum per retortam, leni igne, dabit spiritum acidum ac valde sulphureum, non adeò tamen acrem; è residuo autem Tartarus vitriolatus parari potest. Hæc methodus practicabilior in metallicolarum, quàm pharmacopœorum officinis.

3º. REC. Cinerum clavellatorum
libram dimidiam,

Calcis vivæ *uncias sex,*
Sulphuris *uncias quatuor.*

Mixtis affundantur

Aquæ libratione octo,

coquantur ad remanentiam aliquot librarum liquoris. Filtratus liquor evaporetur ad siccitatem. Siccato pulveri in retortam misso superfundantur

Olei Vitrioli uncias quatuor.

Excipulum allutetur quàm ocysimè & fiat destillatio, ignis gradibus observatis.

I i i

Cum

Cum sulphur & vitriolum unam agnoscant matricem, quæ pyrites vocatur, cum spiritu vitrioli, spiritus sulphuris convenit. Lege necessitatis statuitur hæc convenientia, quia omnem sulphuris vaporem, omnium penetrantissimum capere, desiderata est, desiderandaque encheiresis. Ad chemicos usus expetitur multum, eoque in officinis acidulantur tinturæ, julapia, potiones, ad sitim, nimiumque calorem temperandum, quod in defectu ejus, spiritu vitrioli potest fieri.

Dosis guttæ tres, vel plures, prout intensè vel remissè acidus est.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

REC. Tartari albi, lectissimi, purissimique quantum satis ad duas tertias retortæ vitreæ implendas. Imponatur furno arenæ, applicetur dein vas recipiens, vitreum, ingens, imò capacissimum, lutatis commissuris subdatur aliquamdiu ignis lenis, sat diu continuandus. Prodibit aqua limpida, tenuis, acidula, subspirituosa, subamarefscens, odorata aliquantulum, non copiosa, valde penetrans, & per lutum quàm facillimè perspirans. Capiatur seorsim. Igne tum aucto ad gradum ebullientis aquæ, ascendit vapor subalbus, atque in eo spiritus penetrantissimus, mirè flatulentus, incoercibilis, ut per omnia luta quasi flando exhallet; verùm luto sapientiæ coerceri tentatus, elasticitate suâ displodit vasa. Sequitur statim oleum subtilissimum, tenue, coloris flavi, odoris non ingrati, subaromatici, amarefscens, calefaciens. His seorsim collectis residuum urgeatur summo

ignis arenæ gradu; exhibit adhuc spiritus & oleum; sed insimul crassum, nigrum, foetidum, ponderosum, tenax valde, amarum, ac tandem violentissimo igne suppressionis, crassissimum, piceum cum fumo quodam. Remanebit in fundo massa nigerrima, acerrima, fuscissima, summè alcalina, quæ aëri liberiori, fracto vase, exposita deliquescit facillimè. Nudo calcinetur igne, & absolute solutione in aqua, filtratione & inspissatione dat sal tartari. Spiritus antea prolectus & ab oleo per chartam bibulam duplicatam & humectatam separatus, lege artis, rectificatur è cucurbita, usuique fervatur.

Spiritus tartari inter commoventia, solventia, diaphoretica, & diuretica refertur. Agit in corpus, non tanquam acidum, sed tanquam liquor salinus, oleo empyreumatico imprægnatus. Oleum stillatitium primum tartari, mirè penetrabile, commendatissimum est ad morbos ligamentorum, membranarum & tendinum, quos in contracturam usque protractos, eo curari posse, experti asserunt practici. Rectificando subtilius adhuc & penetrabilius redditum laudatur ad ipsa tubera, nodosque podagricorum. Idem valet de oleo Tartari foetido, crassiore & crassissimo, sed itidem, imò pluries rectificato.

Dosis spiritus à scrupulo uno ad drachmam semis. Olei ad guttas sex, & ultra.

SPIRITUS TARTARI VOLATILIS.

vid.

SAL VOLATILE TARTARI.

* * *

SPIRI-

*
SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

REC. Terebinthinæ claræ, opti-
mæ libras
duodecim.

Affusis, in vesica cuprea,
Aquæ pluvialis puræ

libris quadra-
ginta octo,

applicetur alembicus & fiat de-
stillatio prudenter, subministra-
to igne lenis ebullitionis; sic
prodit aqua acida, oleum leve,
purum, æthereum, clarum
terebinthinæ, destillatio pro-
tahitur, quamdiu oleum pro-
dit, quod ab aqua separandum
& propter subtilitatem, *spiritus*
Terebinthinæ, sed malè vocatur.
Residuum in vesica exhibet
terebinthinam coctam, quæ ulte-
riori coctione, absque aqua,
lento igne institutâ, brunnium
colorem induit & tunc *Colopho-*
nia nuncupari solet. Itaque in
hac operatione terebinthina di-
viditur in aquam, spiritum sa-
linum acidum, oleum volatile,
& colophoniam fixiorem.

Non inutilis censeatur hæc repetitio
processûs: de eo enim superius jam
actum fuit sub titulo olei terebin-
thinæ, qui ratione virium ibi
consuli poterit.

SPIRITUS THERIACALIS.

REC. Radicum Angelicæ,
Imperatoricæ,
Serpentariæ vir-
ginianæ,
Zedoariæ ana un-
ciam unam,

Herbæ Scordii uncias duas,
Corticum Citri,
Baccarum Juniperi,
Myrrhæ rubræ ana unciam

unam,
Crocī orientalis unciam se-
mis,

Theriacæ Andromachi
libram semis,

Spiritûs Vini simplicis
libras septem.

Radices, herba & reliqua, pul-
verifata, spiritu Vini infusa, di-
gerantur cum theriaca, & len-
to igne abstrahantur

Spiritûs libræ quatuor,
Cui pro libitu, ad unciam unam,
Camphoræ scrupulus unus
additur & tunc

SPIRITUS THERIACALIS
CAMPHORATUS,

vocatur.

Ingreditur mixturam simplicem. Vi-
res habet anodynas, diaphoreticas,
alexipharmacas. Externè rarò
adhibetur, ob caritatem aut pretium,
cum spiritus vini camphoratus ea-
dem præstet.

Dosis guttæ triginta ad quadra-
ginta.

SPIRITUS TRIFOLII

FIBRINI.

Eodem modo parari potest, quo
spiritus cochleariæ fuit evocatus.
Est antiscorbuticus & pro conficien-
da essentia servatur.

SPIRITUS VINI CAM-
PHORATUS.

REC. Spiritûs vini optimè rec-
tificati libram
unam,

Camphoræ drachmas sex.

Stent in digestionem, paucarum ho-
rarum spatio, atque sic à soluta
camphora spiritus vini impræ-
gnatus habebitur.

Usus est externus; roborat, conge-
stiones dolorificas dissipat, & in
affectibus spasticis bonum edit ef-
fectum. Quibus autem cautelis
in ambustione, erysipellate, &
lymphæ congestionibus adhiberi de-
beat, nimis longum foret, hîc
recensere. Igitur lectorem ad præ-
cticos ablegamus.

SPIRITUS VINI RECTI-
FICATUS.

REC. Spiritûs Vini vulgaris,
quantum placet.

Demitte in ahenum destillatorium ad *duas tertias* plenum; id ahenum immitte alii aheno capaciore, ut vas sit in vase, solâ aquâ mediante; en balneum maris! claude dein alembico in longam, erectam, angustam fistulam protracto, cujus recurvatæ extremitas, ori serpentis immititur; institue dein destillationem ita, ut aqua in balneo ebulliens, faciat fortius ebullire spiritum vini, unde tum solus spiritus, potens ab igne fugere tam altè, & per alembicum adeò angustum destillabit, quàm diu in liquore adest. Sed simul ac spiritus exhaustus, tum phlegma aquosum non ascendit, sed quiescit tum statim destillatio; sicque habebitur *primâ vice*, intra *duas, tresve horas*, alcohol vini, sed nondum phlegmate omnino liberum; hinc ut magis adhuc dephlegmetur,

REC. Alcohol modò abstractum, dictum ahenum imple ad *dimidias*, adjice

Salis communis decrepitati,
calidissimi,
ficcissimi *libram semis*;

Imposito alembico & clausis ac lutatis quàm sollicitissimè vasis, relinque sic mixta *horis duodecim* simul, in calore tam parvo, ut alcohol ebullire neutiquam possit; dein coge alcohol in recipiens, *primas uncias* seorsim ferva, quoniam fortè aquosi vaporis aliquid, in tractu serpentario & alembico, plerumque latet; id autem, primo hoc alcohole prodeunte, facile detergetur. Dein *duas tertias* alcoholis sequentes, vase purissimo, ficcissimo, vitreo optimè clauso ferva. Postmodum destillare perge residuum, ut priùs. Tum & ultimos hosce spiritus seorsim ferva. Manebit in fundo aheni sal madidum, quod in se attra-

xit aquam ex alcohole; hanc retinuit secum, neque calore ebullientis aquæ dimisit, ut cum alcohole posset ascendere.

Hâc methòdo quàm citissimè parare poteris alcohol sincerissimum, post aëra levissimum, pellucidissimum, tenuissimum, simplicissimum, totum inflammabile absque fumo ac fœtore ac facis remanentia, maxime volatile, dilatabile à calore, ad ignem facillimè ebulliens, odoris & saporis gratissimi, empyreumatis omnino expers, resinosorum menstruum; unde inprimis ad essentias & tincturas parandas inservit, & ad ambusta, sugillationes, luxationes & ad hæmorrhagias adhibetur externè, spiritus vini rectificatus, à rectificatissimo distinguendus.

Nota. Pharmacopœi duplicatum habentes ahenum sive vesicam cupream, cui una adhuc immitti potest vesica minor, ita ut aqua pro balneo sit intermedia, processum hunc sequi poterunt. Reliquis liberum, vulgarem pro vasis sequi methodum.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

REC. Alcoholis Vini modò descripti *libras duas*,
Salis Tartari probè depurati & ficcati
uncias quatuor.

Misce, & è cucurbita vitrea, juncturis exactè lutatis, igne arenæ moderato fiat destillatio.

Inservit extrahendis resinosis, Succini & Ambraë essentiis, nec non aliis usibus chemicis & pharmaceuticis.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Eâdem methòdo, quâ spiritus salis coagulatus, paratur, loco spiritûs salis, fumendo spiritum vitrioli.

Cum

Cum Tartaro vitriolato convenire, dicitur. Virtutes habet aperientes, resolventes, incidentes & diureticas.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS

vid.

LIQUOR ANODYNUS.

*

SPIRITUS VITRIOLI

SIMPLEX.

REC. Vitrioli cœrulei quantum placet.

Exponatur radiis solaribus, aut fornacis calori, ut fatiscat in pulverem tenuem; *ad duas tertias* impleatur retorta terrea Hassiaca, aut in ejus defectu, vitrea, benè loricata, allutetur rostrum intermedium, è vitro conflatum (*vorstosse*) adaptetur recipiens capacissimum, *ballon* appellatum, cui infusa sit aquæ *quarta pars*, respectu ponderis vitrioli, in retorta contenti; commissuris probè clausis, fiat destillatio, igne aperto, primùm lenissimo, donec primi spiritus subtilissimi, excipulum valde calefacientes, facileque cum impetu confringentes, cum phlegmate transtillarint. Ignis tum augeatur successive, ad propemodam retortæ candescentiam. Incipiet impleri recipiens nebulis albis; continuandus ergo hic ignis gradus, *per duos, tres, quatuorve dies*, donec nulli amplius vapores albi, sint conspicui. Sic transit spiritus vitrioli acidus. Tandem urgeatur ignis, ad extremum usque gradum, nempe suppressionis, aut flammæ reverberantis, transibit oleum vitrioli rubicundum, valde corrosivum. Foveatur summus hic ignis, *per horas viginti*, ad ultimam, plenariamque liquoris egressionem. Refrigescant omnia, amoveatur quàm cautissimè.

Pars II.

simè excipulum, ocyssimè obturandum. Quid quid verò destillatum est, rectificetur è cucurbita vitrea, in balneo maris; sic assurgit spiritus vitrioli sulphureus, volatilis, verus, *Mixturæ simplicis Paracelsi* verum ingrediens, violentâ calcinatione non castratus ante destillationem, in vase vitreo, arctissimè clauso asservandus; reliquum mittatur è cucurbita, in retortam vitream, fiat destillatio igne arenæ, surgit phlegma, igne mediocri, succedit spiritus vitrioli acidus, & in fundo manet oleum vitrioli, de quo rectificando, consulatur processus de *Oleo vitrioli*.

Pari modo tractandus est spiritus aluminis, qui à suo spiritu æquè facile, sine omni additione, liberatur, ac vitriolum. Secus se res habet cum nitro & sale communi, utpote quæ, igne utut violento fusa & detenta, nullatenus emittunt suos spiritus, eadem semper manentia: alcali enim adeò arctè eorum ligavit acidum, ut ignis gordium hunc nodum dissolvere nequeat, nisi quantitas principii alcalici aucta accedat, id quod præstatur, admiscendo bolum vel argillam. In retorta residuum à destillatione vitrioli, *Colcothar* Paracelsi dicitur, qui ex eo *sulphur vitrioli anodynum*, mediante proprio ejus spiritu, aut secundum alios vero menstruo, extraxit, adeò decantatum in morbis plurimis. Sanè medicamentum desiderii potius, quàm rei!

Spiritus vitrioli refrigerat, adstringit, bilem coagulat, partes roborat: valet ad extinguendos ardores febriles. Oleum adstringit potentius, quod maximâ aquæ quantitate diluendum, dilatandum & debilitandum, tuncque in omnibus morbis ab acrimonia alcalina oriundis egregios effectus exerit; ad gra-

K k k

tam

tam ergo aciditatem eo acidulanda est aqua. De reliquo præstantissimum est cathæreticum, inducit escharam, sive crustam, sistit sanguinis profluvium, in extremis hæmorrhagiis applicatum vasorum orificiis. Pro menstruo inservit in multis operationibus chemicis.

Dosis spiritus guttæ aliquot: oleum plerumque adhibetur externè; eoque multum utuntur mechanici.

SPIRITUS URINÆ.

Quomodo eliciatur, occasione SALIS VOLATILIS URINÆ, dictum fuit; qui verò spiritum urinæ igneum, penetrantissimum & concentratum desiderat, poterit eum calci vivæ affusum è retorta vitrea destillare igne arenæ, illam replendo ad dimidium, & ocysimè vas recipiens applicando; quod si repetatur aliquoties, habebitur purus, limpidissimus, summè volatilis, atque eminentissimi saporis.

Inservit nonnullis usibus chemicis, nec infimum est in praxi medica remedium; de reliquo virtutes habet spiritui Cornu Cervi communes.

Dosis guttæ quindecim ad triginta.

SPONGIARUM TOSTIO.

Fragmenta Spongiarum in vase fictili, operculo tecto, torrentur igne aperto, atque tosta in pulverem teruntur.

Expetuntur imprimis ad pulveres strumales, nomine potiores, quam omine; rarò vel nunquam præscribuntur solæ, nisi forsàn scopo urinæ ciendi.

SUCCINUM PRÆPARATUM.

REC. Succini quantum placet.

In impalpabilem teratur pulverem, atque addito

Aquæ fontanæ pauxillo, super marmore, lævigetur in modum reliquorum præparatorum.

Adscribitur ei lenis vis adstrictoria & calefaciens; commendatur quoque à multis ad capitis, uterique affectus, catarrhos & mensium vitia.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SUCCOLADA COMPOSITA.

REC. Fructuum Cacao, parum tostorum & à corticibus mundatorum libram unam.

Pinstantur diu & diligenter, in mortario calido, ut abeant in massam pultiformem, tenuissimam, addatur successivè

Sacchari albi subtilissimè triti libra una,

& in fine,

Vanigliarum optimè tritarum No. quatuor.

Misceantur, atque pro lubitu, tabulæ vel cylindri formentur.

Nonnulli etiam

Cinnamomi acuti, Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas duas,

Balsami Peruviani nigri guttas aliquot

addere solent.

Vires, usus & dosis cum succolada simplice pares sunt, sed magis aromaticæ & calefacientes, cum singulari fragrantia cardiaca.

SUCCOLADA REGIA.

REC. Succoladæ Indicæ in pulverem subtilissimum redactæ & cibratæ uncias quatuor, Sacchari Canariensis optimè pulverisati libram unam,

Amyg-

Amygdalarum dulcium ex-
corticatarum &
optimè contu-
farum & in maf-
fulam redacta-
rum No. duo-
decim,

Albuminis ovorum in spu-
mam craffiffi-
mam priùs con-
tusorum No. duo.

Omnibus, mixtis & in mortario
lapideo, pistilloque ligneo, pro-
bè agitatis fiat pasta satis trac-
tabilis; ubi & hoc advertendum,
ne spuma ovorum tota & uno
impetu simul statim admiscea-
tur, sed per intervalla & cochle-
atim, donec omnis spuma albu-
minis massæ sit admixta. His
peractis formentur quadratulæ
seu tabellæ planæ, magnitudinis
pollicis transversi, quæ papyro
superpositæ in fornacula ferrea
seu vase cupreo pistorio (*tarten-
pfanne*) coquuntur; sic magis
elevantur & triplo fiunt ma-
jores.

*Conveniunt ventriculo frigido ad ro-
borandam vim vitæ.*

*Dosis No. sex, octo, superbibendo
haustum vini malvatici.*

SUCCOLADA SIMPLEX.

*REC. Fructuum Cacao libram u-
nam.*

Torreantur leniter & cortice sepa-
rato, in minutissimum polli-
nem terendo, redigantur, dein
additâ

Sacchari albi librâ semis,
longâ & diligenti subactione,
fiat pasta, leni calore ficcanda;
oportet autem fructus cacao, ef-
se optimæ notæ, recentes, ca-
rie non vitiatos.

*Vires ejus sunt nutrientes, instau-
rantes, roborantes, demulcentes.*

Vires & gratiam augent

*Cinnamomi drachma una,
vel duæ,*

adjectæ.

*Ejus uncia una
cum*

Aquæ libra una, vel

Cremoris Lactis,

*Aquæ anatica portione,
ebulliendo paratur &*

*Sacchari novâ additione,
si lubet, dulcorata, vel etiam
Ovi recentis vitello,
efficacior reddita, calidè forbe-
tur, jejuno stomacho.*

*Ità senibus imbecillis, aut valetudi-
ne languidis, item à morbo con-
valescentibus; aliàs hecticis, phthi-
sics, marcescentibus, tussientibus,
moderato usu prodesse solet. No-
cet subjèctis calidis, cholericis, san-
guineis, febricitantibus, hæmorrha-
gicis &c.*

SUCCUS ACETOSELLÆ,
BERBERUM,
CITRI,
CYDONIORUM,
MORORUM,
RUBI JDÆI, &

Alii defæcati, in vitro, collo an-
gustiori prædito, asservantur in
loco frigido, oleum superaffun-
dendo, ad duarum, triumve
linearum altitudinem.

*Asservari solent pro Syrupis suo tem-
pore parandis.*

SULPHUR AURATUM
ANTIMONII.

Modo duplici potest parari, vel è
residuo Tincturæ Antimonii tar-
tarifatæ, de qua suo loco, vel
è scoriis Reguli Antimonii sim-
plicis, coquendo in

*Aquæ pluvialis quantitate
sufficiente,*

donec omnes solutæ. Liquori
inodoro, per chartam empore-
ticam filtrato instillatur acetum,
oritur momento citius, olidif-
simi stercoreis foetor, & liquor
antea dilutus fit, quàm spississi-
mus; unde præcipitatur ingens
sulphuris quantitas, per chartam
bibulam, à liquido separanda,
& est *Sulphur Antimonii primæ*

præcipitationis. Continuetur acetii instillatio, materiem movendo, & inde turbida reddita ad fundum mittet pulverem aurantii coloris, qui itidem filtratus fervetur, ut *sulphur Antimonii secundæ præcipitationis.* Denique novum, multumque acetum infunde, donec nil amplius præcipitetur, quiescat materies, subsidet sensim præcipitatum & redigitur in molem expectatâ longè minorem, coloris ex pallido aurantii; effunditur liquor supernatans; reliquum aquâ copiosè & sæpiùs affusâ edulcoratur in filtro, in quo manet exsiccandum *sulphur antimonii tertiæ præcipitationis*, quod etiam valet de duobus præcedentibus.

In hoc processu nonnisi hepar Antimonii est, aquâ solutum & coctum, vi cuius particule Antimonii sulphureæ, nexuque indissolubili aliquantibus regulinis plus minus junctæ suspenduntur; quàm primum verò acidum affunditur quaecunque, hepatis sal alcali vertitur in medium, adeoque sulphur descendit ad fundum. Prima præcipitatio dat sulphur grossius, & magis emeticum, coloris opacioris, & rarò adhibetur, secunda mitius, & adultioribus præscribitur, tertia verò tenerioribus. Deauratur argentum eo affricatum.

Laudabiliter se gerit in omnibus morbis cutaneis pertinacibus, ut scabie maligna & lue venerea, cum Mercurio dulci prudenter administratum, interposito lignorum decocto; item in febribus intermittentibus, catarrhis suffocativis, aliisque, in quibus ratione virium ad Kermes minerale accedit quàm proximè.

Dosis sulphuris tertiæ præcipitationis in tenera ætate à grano semis ad unum, duo; in adultiore à granis sex ad octo.

SULPHUR VITRIOLI
ANODYNUM,

five

ENS VENERIS BOYLEI.

REC. Vitrioli optimi Goslariensis,
quantum

placet,

Calcina radiis solaribus calidissimis, donec fatiscat in pulverem; dein exactè edulcora aquæ calidæ affusione; penitus sicca; postea in mortario conterendo, cum

Salis Ammoniaci depuratissimi, subtilissimè pulverisati *partibus æqualibus,*

Misce; mixturam hanc in retorta vitrea, ad *tertiam* saltem *partem* impleta, cum capitello vitreo cæco, sublima in arena, per ignem gradibus auctum, per *decem* aut *undecim horas.* Tandem sublimatum exime.

Ubi autem idem non fuerit coloris ex luteo rubentis, sed pallidi, secundâ vice cum residuo, exactiusque commixtum (ut plurimum enim ex neglecta intimiore commixtione accidere id solet) semel denuo sublimari potest, flavum etiam seu rubicundum sublimatum per se ipsum bis rectificasse licet.

Per sudorem, & ex parte per urinam operatur, ubi sensibiliter agit. Facit, ut resolvens, ad atrophiam, rachitidem, menses suppressos, febres intermittentes: ut sedativum, in capitis doloribus; ad agrypnias, maxime febre stipatas: ut salino-vitriolicum, lumbricos expellit, eâque virtute appetitum quoque provocat.

Dosis à granis quatuor ad duodecim.

SUPPOSITORIA.

Eorum usus vulgaris est ad alvum segnem stimulandam aut obstruatam

structam aliquammodo referendam.
Parantur ex melle ad duritiem
cocto, vel additur vitellus ovi
& sal culinare ante coctionem:
conficiuntur quoque ex saponis
frustulo in formam coni inciso,
item sebo, frusto candelæ, &
hyemis tempore, butyro; pro
majore stimulo addi potest Aloë,
Colocynthis, Jalappa, Nitrum:
cautè verò talia adhibenda in
subjectis hysterics, hæmorrhoi-
dariis, aut si abscessus intesti-
ni recti adest. In tenesmo dy-
senterico, absque inflammatio-
ne in intestino recto melli cocto
opium fociari potest.

SUPPOSITORIUM

CONTRA
ASCARIDES.

REC. Fellis tauri inspissati,
Succi Absinthii inspissati
*ana scrupulum
unum,*
Aloës,
Myrrhæ *ana scrupulum semis.*
Fiant cum
Melle cocto
Suppositoria variæ magnitudi-
nis.

SYRUPUS.

Est medicamentum internum,
fluidum, ex decoctis, succis,
vel infusione, cum addito sac-
charo vel melle, in eam con-
sistentiam coctum, ut gutta in
marmore non diffuat; estque
simplex vel compositum.

SYRUPUS de ABSINTHIO
COMPOSITUS.

REC. Absinthii pontici *libram
semis,*
Florum Rosarum rubrarum
uncias duas,
Nardi Indicæ *drachmas tres.*
Infundantur incisa
in

Pars II.

Vini albi,
Succi Cydoniorum *ana un-
ciis octo.*

Digerantur in loco calido per bi-
dium, postea exprimantur;
Colaturæ *unciis decem*
adde

Sacchari albi *uncias sedecim.*
Fiat syrupus per pannum colan-
dus.

*Ventriculi, aliorumque viscerum, à
causa frigida ortis vitiis auxilia-
tur; cachecticis prodest, appeti-
tum restaurat, flatus discutit, icte-
ricis convenit.*

Datur in potionibus & electuariis.

SYRUPUS ACACIARUM
FLORUM.

REC. Florum Acaciarum recen-
tium *libras
duas.*

Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis *li-
bris duabus.*

Stent in digestionem per noctem,
in vase fictili vitreato, probè
tecto, manè leviter exprimantur
& colentur.

Colaturæ *unciis novende-
cim*

adde

Sacchari albi *uncias trigin-
ta duas.*

Fiat unicâ ebullitione syrupus, qui,
per linteum colatus, fervetur.

*Vires habet alvum laxandi; lauda-
tur anthelminticus & antinephri-
ticus; datur etiam in epilepsia
& tussi.*

*Teneris à drachma una ad drach-
mas sex, ad unciam unam &
ultra datur.*

SYRUPUS ACETOSELLÆ
&
ACETOSÆ.

E Succi depurati *unciis decem,*
Sacchari *unciis sedecim,*
Semel ebulliendo, fiat syrupus.
*Commendatur biliosis, atque ad si-
tim, caloremque restringendos.*

LII

SYRU-

SYRUPUS ACETOSITATIS
CITRI.

REC. Succi Citri *uncias decem*,
Sacchari albi *uncias sedecim*.
Fiat unicâ ebullitione syrupus, in
vase vitreo fervendus.
*Julâpiis & potionibus additur ad
sitim & æstum mitigandos.*

SYRUPUS de AGRESTA.

REC. Agrestæ, five
Succi Uvarum, paulo an-
tequam matu-
ruerint, ex-
pressi *libram u-*
nam semis,
Sacchari albi *libras duas*.
Coquantur, in vase fictili vitreato,
ad justam syrupi consistentiam.
Usus est in febris malignis & vir-
tute cum syrupo citri convenit,
sitim tamen magis compescit; at-
que mixturis additur & julâpiis.

SYRUPUS de ALTHÆA
FERNELII.

REC. Radicum Althææ,
Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Herbarum Althææ,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Adianthi albi,
 nigri *ana*
 drach-
 mas tres,
Uvarum passarum, munda-
tarum,
Cicerum rubrorum *ana un-*
 ciam semis.

Incisa coquantur
ex

Aquæ libris quatuor,
usque dum uncia viginti octo
superfint, deinde cum
Sacchari albi *libris quatuor*
fiat lege artis syrupus.

Crassam, & obstruentem renum pi-
tuitam & lentam, purulentam-
que eorum saniem & arenulas
blandè & citra manifestum calo-

rem expurgat, urinæ ardorem de-
mulcet, & levat tussim à mate-
ria acri & salsa ortam.

Additur vel decoctis vel cochleatim
sumitur, ad unciam unam &
ultra.

SYRUPUS de AMMO-
NIACO.

REC. Gummi Ammoniaci electi
uncias duas.

Solvantur in
Vini albi *unciis decem*.
Solutioni admisceantur
Sacchari albi, ad consisten-
tiam tabulati
cocti *uncia*
sedecim.

Agitentur, usque dum refrigescant.
Affervetur syrupus.

Validissimè incidit, detergit &
purgat pulmones; eleganter confert
inveteratis affectibus, à crassa &
lenta pituita ortis; in asthmate
specificè se gerere perhibetur.

Dosis per se uncia semis, drachmæ
sex, ad unciam unam.

SYRUPUS de ARTEMISIA.

REC. Radicum Rubiæ tinctorum,
Rusci *ana uncias*
duas,
Herbarum Artemisiæ *unciam*
unam,

Pulegii,
Melissæ,
Dictamni Cretici,
Sabinæ *ana*
drachmas

Florum Hyperici *drachmas*
duas,

Seminis Nigellæ *unciam*
semis,

Cassia lignæ *unciam unam*.

Radices incisas infunde
in

Aquæ fontanæ *libris tribus*;
macerentur per noctem, manè
leniter ebulliant, ad colaturæ
remanentiam *librarum duarum*,
in qua infunde herbas & reli-
qua

qua ingredientia, minutim incisa; factâ digestionem per viginti quatuor horas, exprimantur; in

Colaturæ unciis novem dissolve

Sacchari albi unciis sedecim, & per pannum colatus Syrupus fervetur.

Suppressos menses potenter movet, uteri strangulatus sedat, lochia imminuta auget, & suppressa revocat.

Dosis drachmæ sex ad unciam unam.

SYRUPUS BALSAMICUS.

REC. Julapii rosati libram unam, vel unciis duodecim, addatur

Essentiæ Balsami Peruviani uncia semis.

Mixta ferventur.

Est stomachicus & verè balsamicus; prodest vulneratis & ubicunque suspicio ulceris interni est, junc notabili tamen calore febrili; tussientibus & asthmaticis conducit.

Dosis drachmæ tres.

SYRUPUS BELLIDIS

è

SUCCO.

REC. Succus è tota planta Bellidis minoris depurati & ad dimidias evaporati unciis novem,

Sacchari albi unciis sedecim.

Fiat, saccharum unicâ ebullitione solvendo, syrupus, qui, per pannum colatus, fervetur.

Prodest tussientibus, vulneratis, ad sanguinem coagulatum resolvendum ab alto lapsis, &c.

SYRUPUS BERBERUM.

REC. Succus Berberum depurati unciis decem,

Sacchari albissimi unciis sedecim.

Fiat syrupus.

Adstringit, cor & ventriculum roborat, æstum & sitim extinguit, refrigerat in febris calidis, & biliosas dejectiones & vomitiones sedat.

SYRUPUS BETONICÆ.

REC. Herbæ Betonice recens siccatæ unciis quatuor.

Incisa macerentur in

Aquæ Betonicæ destillatæ libra una.

Post sufficientem extractionem exprimantur, & in

Expressi unciis novem,

dissolve, unicâ ebullitione,

Sacchari albi unciis sedecim.

Syrupus per pannum colatus, fervetur ad ulum.

Ad morbos capitis frigidos præcipue commendatur Betonica, vulneraria est & diuretica; leniter adstringit, in calculo renum & vesicæ, nec non in lochiorum nimio, post partum, fluxu, ob vim adstrictoriam & vulnerariam adhibetur. Cum Syrupus iisdem virtutibus gaudeat, commodè portionibus medicis additur.

SYRUPUS BORRAGINIS.

REC. Florum Borriginis recentium libram semis.

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis libra una.

Digerantur per noctem, exprimantur, &

Infusi clarificati unciis novem,

adde

Sacchari albi unciis sedecim.

Fiat syrupus.

Pari modo paratur:

SYRUPUS BUGLOSSI.

Utrique adscribuntur vires cor roborantes, & exhilarantes, ejusque palpitationem & syncopem discutientes.

SYRUPUS BRASSICÆ
RUBRÆ.

REC. Succī Brassicæ capitatæ
rubræ lib-
ram unam
semis,
Sacchari libras duas & un-
cias octo.
Coquantur lege artis in syrupum.
*Laudem suam meretur in affecti-
bus pectoris, tussi præsertim &
asthmate.*

SYRUPUS BRYONIÆ.

REC. Succī radicū Bryoniæ de-
fæcati libram
unam semis,
Sacchari uncias triginta duas.
Fiat, unciâ ebullitione, post sac-
chari despumationem, syrupus.
*Serum expurgat, potenter resolvit;
hinc asthmaticis commendandus &
hydropicis; ob insignem amaritiem
etiam vermibus, aliisque insectis,
in corpore humano natis, adversa-
tur, menstrua pellit, & ad mor-
bos virginum laudatur.*
Dosis uncia semis ad unciam unam.

SYRUPUS CAPILLORUM
VENERIS SIMPLEX,
MONSPELIENSIS.

REC. Capillorum Veneris, parum
incisorum un-
cias tres.

Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis li-
bris tribus se-
mis.

Stent in digestionē per noctem,
manē leniter coquantur ad septi-
mæ partis consumptionem, co-
latura albumine ovorum clarifi-
cetur, & cum

Sacchari albi libris tribus,
Fiat syrupus, cui pro lubitu ad-
dantur, vel
Aquæ Rosarum, vel
Naphæ uncia una aut
duæ.

*Humores incidit, attenuat & resol-
vit; loco sacchari, pro edulco-*

*ratione infusi Theæ utuntur
multi, ad tussim & ad pectoris
morbos, à materia viscida ortos.*

SYRUPUS CAPILLORUM VENE-
RIS COMPOSITUS.

REC. Capillorum Veneris uncias
quinque,
Linguae Cervinæ unciam se-
mis,
Malvæ drachmas duas,
Radicū Asparagi unciam
unam,
Glycyrrhizæ un-
cias duas.

Macerentur in
Aquæ fontanæ simplicis li-
bris duabus,
& digerantur loco calido per
noctem. Manē coquantur ad
consumptionem circiter unciarum
sex. Residuo expresso & albu-
mine ovi clarificato, adde
Sacchari albi uncias triginta
duas.

Fiat, unciâ ebullitione, syrupus.
Non differt à viribus præcedentis.

SYRUPUS CARDIACUS.

REC. Vini generosi uncias octo,
Aquæ Rosarum uncias duas
semis,
Cinnamomi drachmas tres,
Caryophyllorum drachmam
unam,
Zingiberis drachmam semis.

Infusa digerantur, ac sufficiente
factâ extractione, exprimantur;
in expresso solvantur
Sacchari uncia sedecim.

Fiat syrupus.
*Est gratus, aromaticus, ventriculum
roborans; additur electuariis.*

SYRUPUS CARDUI
BENEDICTI.

REC. Succī Cardui benedicti, de-
fæcati & ad dimidias
evaporati uncias
octodecim,
Sacchari albi uncias triginta
duas.
Fiat

Fiat Syrupus.

Tribuuntur illi vires stomachicæ, alexipharmacæ, antifebriles; potionibus additur & electuariis.

SYRUPUS CENTAURII
MINORIS.

REC. Florum Centaurii minoris recentium *libram unam.*

Incisi infundantur in Aquæ fontanæ ferventis *libra una.*

Stent per noctem, manè exprimantur, & in expresso

Florum recentium *libra una* infundatur; post macerationem per noctem exprimantur,

Colaturæ, albumine ovi clarificatæ *unciis novem*

addantur

Sacchari albi *unciæ sedecim.*

Fiat Syrupus.

Autor, qui commendat, Quercetanus ait: "hoc Syrupus nunquam carere debent officinæ, ob summam ejus necessitatem ac utilitatem; februm ex bile ortarum ferociam compescit, biliosum illum succum benignè educit, ictericis conducit; proprium in se continet Rhabarbarum centaureum minus, fel terræ & febrifugum appellatur."

Additur electuariis.

SYRUPUS CERASORUM
ACIDORUM.

REC. Succu Cerasorum acidorum, per subsidentiam defæcati *unciis viginti,*

Sacchari albißimi *unciis triginta duas.*

Fiat Syrupus.

Convenit cum reliquis Syrupis acidiusculis, imprimis berberum.

SYRUPUS CHAMOMILLÆ.

REC. Florum Chamomillæ vulgaris recentium *libram unam.*

Pars II.

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis *libra una.*

Stent in vase probè clauso, per *duodecim horas*, postea exprimantur; infusio repetatur,

Chamomillæ florum *libram unam,*

adhuc fumendo, post extractionem exprimatur & clarificetur infusum, atque ex

Ejusdem *unciis novem,* cum

Sacchari albi *unciis sedecim*

Fiat Syrupus.

Multum valet hic Syrupus ad colicam, tam flatulentam, quam spasmodicam, in febribus, tertiana & quartana, cum aliis permixtus, bonum edit effectum; adhibetur in potionibus, vel electuariis; additur quoque clysmatibus.

SYRUPUS de CICHORIO
CUM

RHABARBARO.

REC. Radicum Cichorii *unciæ duas semis.*

Coquatur in

Aquæ fontanæ *libra una semis,*

ad remanentiam *libræ unius,* huic addatur

Rhabarbari minutim incisi *uncia una,*

Salis Tartari *scrupulus unus.*

Ebulliant lento igne, exprimantur, in expresso dissolvantur

Sacchari albi *unciæ sedecim.*

Clarificato & colato Syrupus addatur

Aquæ Cinnamomi spirituosæ *uncia una.*

Servetur.

Bilem leniter subducit; pueris recens natis & infantibus à drachma una, ad drachmam unam semis, usque ad unciam semis, ad educendum meconium, & in torminibus, indeque ortis motibus convulsivis, commodè datur.

M m m

SYRU

SYRUPUS CINNAMOMI.

REC. Cinnamomi optimi, craf-
fiusculè con-
tusi *uncias*
quinque.

Reponantur in cucurbitam vi-
tream, & addantur

Aquæ Cinnamomi optimæ
cum

Vino destillatæ *libræ duæ*,
Aquæ Rosarum odoratissi-
mæ *uncie duæ.*

Stent in loco calido, benè obtu-
rato vase, ne quid exspiret,
horis viginti quatuor, atque
cum

Sacchari albissimi clarifica-
ti, ad confi-
stentiam ta-
bulati cocti
libris tribus,
unciis qua-
tuor.

Fiat syrupus.

Virtute gaudet analepticâ, & ven-
triculum, nec non nervas robo-
rante.

Datur per se, vel cum aquis cordia-
libus.

SYRUPUS CITRI

è
TOTO,

REC. Corticum Citri exteriorum
recentium *un-*
cias duas se-
mis.

Incisos infunde in

Succi Citri recentis *unciis vi-*
ginti duabus.

Post digestionem exprimantur,
in expresso dissolvantur

Sacchari albi *uncia triginta.*

Servetur usui syrupus.

In febribus malignis exanthematicis,
additur potionibus; malignitatem
non solum arcere, sed & vires
restaurare compertus est.

SYRUPUS COCHLEARIÆ.

REC. Succi Cochleariæ recenter
expressi *libram*
unam semis.

Abstrahantur lento igne, in cu-
curbita vitrea, *uncie sex*; resi-
duum clarificetur & evaporetur
ad remanentiam *unciarum sex*,
in quibus dissolvantur

Sacchari albi *uncie octodecim*,
atque per pannum colato syru-
po addatur

Aqua abstractitia,
& fervetur.

Cochlearia vi gaudet antiscorbuticâ;
hinc syrupus inde paratus scor-
buto laborantibus præscribitur.

SYRUPUS CONTRAYERVÆ
COMPOSITUS.

REC. Pomorum Citri integrorum
numero sex.

Concisis & cucurbitæ vitreæ inje-
ctis addatur

Radicum Contrayervæ *uncia*
una semis,

Serpentariæ Vir-
ginianæ *un-*
cia una,

Seminum Cardui benedicti,
Mariæ ana
uncia se-
mis,

Granorum Kermes *drachmæ*
duæ,

Succi Granatorum dulcium
libræ duæ.

Digerantur per *viginti quatuor ho-*
ras, tum, factâ expressione,
ac additis

Sacchari albi *libris tribus,*

Fiat, in vase probè vitreato clau-
so, syrupus, qui colatus ferve-
tur.

Est alexipharmacus, malignitati &
putredini resistit, virtute analep-
ticâ & diaphoreticâ vi materiam
noxiam, tam per sudorem, quam
urinam, expellit.

SYRUPUS CONTRAYERVÆ
SIMPLEX.

REC. Radicum Contrayervæ mi-
nutim incisa-
rum *uncias*
quatuor.
Infun-

Infundantur per noctem in
Aquæ fontanæ ferventis
libris duabus.

Manè leniter ebulliant, ad cola-
turæ, expressione forti factæ
remanentiam *libræ unius*, ad-
dantur

Succi Citri *unciæ octo*,
Sacchari albi *unciæ triginta*
duæ.

Fiat, saccharum unicâ ebullitione
solvendo, syrupus, in vitreo
vase reponendus.

*Laudatur in febribus malignis, va-
riolis, morbillis, & aliis exan-
thematis, atque, ob vim blan-
dam alexipharmacam, non adèò
calefacientem, commendari mere-
tur, potionibus & mixturis ad-
miscendus.*

SYRUPUS CORTICUM
AURANTIORUM.

REC. Corticum Aurantium re-
centium & ex-
timorum *unciæ*
quatuor,

Vini albi generosi *libram u-*
nam.

Macerentur *per viginti quatuor*
horas, in loco calido, benè ob-
turato vase; postea vinum de-
cantetur, filtretur, & cum

Sacchari clarificati, atque
ad consistentiam
tabellarum cocti
unciis octodecim

permiscendo,

Fiat syrupus

Ventriculum roborat, flatus dissipat
& virtute gaudet analepticâ &
carminativâ.

Exhibetur in potionibus.

SYRUPUS CORTICUM
CITRI.

REC. Corticum Citri recentium &
extimorum *unciæ*
quatuor,

Granorum Kermes *drach-*
mas duas,

Vini albi generosi *libram*
unam.

Macerentur in loco calido, vase benè
tecto, *per viginti quatuor horas*;
postea vinum decantetur, fil-
tretur, atque
cum

Sacchari clarificati & ultra
consistentiam
tabellarum
cocti *unciis oc-*
todecim,

Fiat syrupus

Est cordialis, alexipharmacus &
carminativus, ad febres epidemicas
catarrhales, malignas laudatur.
Addi etiam potest potionibus.

SYRUPUS CORTICIS PERUVIANI
aut
CHINÆ CHINÆ.

REC. Corticis Peruviani in pul-
verem triti
unciæ qua-
tuor,

Cinnamomi electi *unciam*
unam,

Vini rubri generosi *libras*
duas.

Macerentur, in vitro probè clauso,
sæpiùs vitrum movendo, *per*
biduum; postea exprimantur ac
colentur, in colatura, unicâ
ebullitione, dissolvantur

Sacchari albi *unciæ triginta*
duæ.

Fiat syrupus, qui per pannum
colatus servetur.

Pueris, aliisque medicamenta refor-
midantibus dari potest; præter
vim antifebrilem, etiam tonicam
& stomachicam habet.

Dosis uncia semis ad integram.

SYRUPUS CROCI.

REC. Croci orientalis *drachmas*
sex.

Infundantur in

Aquæ ferventis *unciis decem.*

Stent vale clauso, in digestionem
per triduum, postea exprimantur
In colatura dissolvantur

Sacchari albi *unciæ sedecim*,
M m m 2 &

& post unciam ebullitionem, coletur syrupus per pannum.

Lene & securum præbet anodynum pueris; pectorale & alexipharmacum, in catarrhis utiliter adhibetur. Hujus syrupi uncia una, fere habet croci grana quindecim. Pueris tenerioribus pro una dosi ultra drachmam unam non dandus.

SYRUPUS CYDONIORUM.

REC. Succi Cydoniorum, ad tertie partis consumptionem evaporati libram unam semis, Sacchari albi libras duas semis.

Fiat dissolutione & despumatione, syrupus, unicâ ebullitione factâ.

Gratus est stomacho, leniter adstringit, & in nausea, vomitu & fluxionibus alvi, & ad abortum præcavendum adhiberi potest. Eleetuariis & potionibus additur.

Dosis ad unciam unam & ultra.

SYRUPUS DIACODION,

five de

CAPITIBUS PAPAVERIS,

sen

DIACODIUM LIQUIDUM MONTANI.

REC. Caput Papaveris, cum

Seminibus uncias duas, Siliquarum dulcium uncias duas semis.

Incisis affundatur

Aquæ fontanæ libra una semis.

Coquantur lento igne, ad colaturæ remanentiam unciarum decem, in fine coctionis addendo,

Liquiritiæ recentis minutim incisæ unciam

unam semis;

in colatura dissolvantur

Sacchari candi rubri uncie sedecim.

Despumatus & colatus syrupus servetur.

In tussi acri, ad materiam incrassandam, à veteribus valde laudatur.

Dari potest infantibus lingendus, ad drachmam unam; adultis ad unciam unam.

SYRUPUS, DIACODIUM CROCATUM.

Fit, syrupo antecedenti, five Diacodio simplici, addendo

Croci optimi drachmam unam.

Vires sunt eadem, propter crocum tamen, magis anodynæ & resolventes.

SYRUPUS DOMESTICUS,

five de

SPINA CERVINA.

REC. Baccarum fruticis, quam spinam cervinam vocant, circa finem Septembris, aut initio Octobris collectarum quantitatem sufficientem.

Conquassatæ & calefactæ exprimantur.

Succi hujus colati unciis viginti

addantur

Sacchari albi uncie triginta due,

solvantur & colentur, addendo, in petia ligatâ,

Seminis Anisi,

Mastiches ana drachmas tres,

Zingiberis,

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana drachmam unam

semis.

Fiat syrupus.

Commendatur ad hydropem, cachexiam, arthritidem. Flatu potenter expellit. Sunt, qui etiam recens

*recens natis, ad expurgandum me-
conium, dare solent.*

*Datur drachma una, ad unciam
unam & ultra.*

SYRUPUS EMETICUS.

*REC. Vitri Antimonii hyacinthini,
subtilissime
pulverisati
drachmas
duas.*

affunde

*Vini albi Rhenani uncias
duodecim.*

*Stent per triduum, leni calore,
in digestionem; postea per char-
tam bibulam filtratis, addantur
Sacchari albi unciae triginta
duae.*

*Sola dissolutione & unica ebulli-
tione, fiat syrupus, in vase vi-
treo reponendus.*

*Delicatulis propinatur, ad vomitum
ciendum.*

*Dosis à drachma una ad drachmas
quinque vel sex.*

*In apoplexia & catharrho suffoca-
tivo, etiam clysteribus, ab un-
cia una ad unciam unam semis
addi potest.*

SYRUPUS EMETICUS

ANGELI SALÆ.

*REC. Vitri Antimonii optimè tri-
ti unciam
unam.*

Cinnamomi electi,

Zedoariæ,

*Seminis Angelicæ ana drach-
mas duas,*

Santali rubri unciam semis,

*Croci orientalis drachmam
semis.*

Infundantur in

Aceti rosati uncis viginti.

*Macerentur per viginti quatuor ho-
ras, colentur & filtrentur, in
filtrato liquore dissolvantur*

Sacchari albi unciae viginti.

Fiat syrupus.

Vires sunt eadem, quæ præcedentis.

*Dosis drachma una ad unciam di-
midiam.*

Pars II.

SYRUPUS ENULÆ sive HELENII.

*REC. Succi radices Enulæ defæ-
cati libram un-
am semis,
Sacchari albi libras duas se-
mis.*

*Solvantur & fiat syrupus per pan-
num colandus.*

*Resolvit, & ad pectoris vitia adhi-
betur.*

SYRUPUS de ERYSIMO

LOBELII.

*REC. Erysimi totius recentis uncias
tres,*

Radicum Helenii,

*Tussilaginis ana
uncias duas,*

Herbarum Borraginis,

Cichorii,

*Capillorum Vene-
ris ana un-
ciam semis,*

*Florum quatuor Cordialium,
- Anthos,*

*Stœchadis Arabicæ
ana drach-
mas duas,*

Seminis Anisi drachmas sex,

*Passularum mundatarum
uncias duas,*

*Incisa & contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris duabus
semis,*

Succi Erysimi uncis sex,

*ad remanentiam unciarum octo-
decim, in expresso liquore dis-
solvantur*

*Sacchari albi unciae triginta
duae.*

Fiat syrupus.

*NB. Erysimum vel Irio illa est
planta, quæ Verbena femi-
na vulgo vocatur.*

*Efficacissimus est ad mucilaginem
pulmonum incidendam & educen-
dam in tussi & raucedine, &
multis jam amissam vocem resti-
tuisse, exempla prostant.*

*Datur ab uncia dimidia ad integ-
ram, ex infusis, decoctis, sero
lactis, aliisque vehiculis.*

N n n

SYRU-

SYRUPUS FARFARÆ

è

FLORIBUS.

REC. Florum Farfaræ, five
Tussilaginis recen-
tium libram
unam semis.

Affunde

Aquæ fontanæ ferventis
libras duas.

Macerentur per viginti quatuor
horas, exprimantur, & in

Colaturæ unciis novem
dissolvantur

Sacchari albi uncia sedecim.

Fiat syrupus.

Ad pectoris vitia inservit, materi-
am acrem, salsam incrassat, &
expectorationem adjuvat.

Datur in decoctis pectoralibus.

SYRUPUS FRAGORUM.

REC. Succī Fragorum depurati
uncias decem,

Sacchari uncias sedecim.

Fiat lege artis syrupus, ad normam
syrupi Berberum.

Est analepticus & diureticus.

SYRUPUS de FUMARIA.

Paratur è

Succi defæcati, & ad tertiæ
partis consumptionem in-
spissati unciis
novem,

Sacchari unciis sedecim.

Ad sanguinem & lympham corrigen-
dam, scabiem & alia cutis vitia
commendatur.

Addi potest electuariis & decoctis.

SYRUPUS GLYCYRRHIZÆ.

REC. Glycyrrhizæ uncias duas,
Capillorum Veneris unciam
unam,

Hyssopi unciam semis,

Aquæ libras duas.

Species prædictæ in aqua, prius
fervefacta, horis viginti quatuor,
macerentur, deinde decoquan-

tur ad dimidias, colaturæ ad-
dendo

Mellis despumati uncias octo,
Sacchari albi uncias sede-
cim,

Aquæ Rosarum uncias qua-
tuor.

Fiat syrupus, secundum artem.

Cum syrupo Capillorum Veneris con-
venit; pectoralis est, & pro
edulcoratione decoctorum pectora-
lium inservire potest.

SYRUPUS GRANATORUM.

REC. Succī Granatorum acido-dul-
cium depurati

uncias decem,

Sacchari albissimi uncias
sedecim.

Solvantur & colentur; syrupus
in vase vitreo fervetur.

Est analepticus & leniter adstrin-
gens; refrigerat, sitim sedat,
bilem refrænat.

Datur in potionibus, mixturis &
julapiis.

SYRUPUS GRANORUM

KERMES.

REC. Coccionellæ unciam semis.

Optimè trita in

Aquæ Rosarum,
Cinnamomi, fine
vino ana unci-
is duodecim,

Salis Tartari granis duode-
cim,

Infundantur per noctem, addan-
tur

Sacchari albi uncia triginta
duæ,

Succi granorum Kermes
uncia duodecim.

Unicâ ebullitione fiat syrupus liqui-
dus, qui per linteum colatus,
reponatur.

Analepticus est, diureticus & alexi-
pharmacus; datur in variolis &
morbillis, nec non febribus catar-
rhalibus. Cum confectio Alker-
mes convenit.

SYRU-

SYRUPUS HEDERÆ
TERRESTRIS.

Sicut syrupus Betonice ex aqua destillata & herba sicca paratur. *Hedera terrestris vulneraria est, & nephritica; syrupus ad abscessus internos, sputum cruentum sanio sum phthysicorum commendatur; consolidat & mundificat, urinam & menses promovet, ut & hydropicis utilis est.*
In potionibus & electuariis propinari potest.

SYRUPUS HYPERICI.

REC. Florum Hyperici recentium
*libram unam
semis,*
Aque fontanæ ferventis li-
bram unam.
Macerentur, per diem integrum,
in loco calido; postea expri-
mantur, & ex
Infusi clarificati *unciis no-
ven,*

Cum
Sacchari albi *unciis sedecim,*
Fiat syrupus.
Easdem vires habet, quas flores; vulneratis, calculosis, ac renum doloribus vexatis auxiliatur.

Docente Quercetano, instar balsami, omnibus resistit corruptionibus ventriculi; specificum est contra vermes.

SYRUPUS HYSSOPI.

REC. Hyssopi ficcatae *uncias duas,*
Capillorum Veneris,
Radicum Apii *ana unciam
semis,*
Helenii *unciam u-
nam.*

Coque radices & Capillum Veneris
in
Aque *libris duabus semis,*
ad colaturæ remanentiam *un-
ciarum sedecim,* in qua infun-
datur Hyssopus & post digesti-
onem in loco calido, infuso ex-
presso & clarificato adde

Sacchari albi *libras duas, un-
cias octo.*

Fiat syrupus.

Viscidos humores resolvit, pulmones roborat, tussientibus & asthmaticis commendatur, in potionibus & electuariis.

SYRUPUS de JUJUBIS.

REC. Jujubarum recentium *un-
cias tres,*
Liquiritiæ *drachmas sex,*
Capillorum Veneris,
Florum Violarum *ana drach-
mas quinque,*
Seminum Malvæ,
Cydoniorum,
Papaveris albi *ana
drachmas
tres.*

Incisa coquantur in
Aque fontanæ *libris dua-
bus semis,*
ad colaturæ remanentiam *un-
ciarum octodecim,* in qua dis-
solve

Tragacanthæ albæ electæ
*drachmam u-
nam,*
Sacchari albi *uncias trigin-
ta duas.*

Fiat syrupus, qui per colatorium
trajectus, sevetur.

*Commendatur ad tussim siccam, spu-
tum tenue suo lentore maturat,
incrassat, glutinat & expectora-
tionem adjuvat, idemque ad uri-
næ vitia confert.*

*Propter mucilaginosam semina & tra-
gacantham, est consistentiæ spis-
sioris, & potius Linctus, quam
Syrupus, vocari deberet; præstat
etiam, illum per linctus, quam
haustus, assumi, aut aquis dilu-
tum hauriri.*

SYRUPUS LIGNI
SASSAFRAS

Eodem modo paratur, quo syrupus
Corticis Peruviani, quod etiam
de *Corticibus Cascarillæ* intelligen-
dum, scilicet

N n n 2

Corti-

Corticum Cascarillæ, vel
Ligni Sassafras
uncias tres,

in

Vini albi *unciis viginti dua-*
bus,

infundendo, &

cum

Sacchari *unciis triginta dua-*
bus,

in syrupum redigendo.

Vires easdem habent, quas cortices,
è quibus parati sunt.

SYRUPUS LIQUIRITIÆ

vid.

GLYCYRRHIZÆ.

*

SYRUPUS de MANNA LAXATIVUS.

REC. Radicis Polypodii *unciam*
unam semis,
Specierum Florum & Fru-
ctuum,
Passularum minorum *ana*
uncias duas.

Macerentur, per noctem, in

Aquæ ferventis *libris dua-*
bus semis,

manè coquantur *ad tertiæ partis*
consumptionem, colentur, in
colatura infunde

Foliorum Sennæ electæ *un-*
cias quatuor,

Seminum Anisi,
Fœniculi,

Galangæ,

Macis,

Zingiberis *ana drachmam*
unam.

Digerantur *per viginti quatuor ho-*
ras, in loco calido, exprimantur,
expressum albumine ovi
clarificetur, atque cum clarifi-
cato dissolvantur

Mannæ Calabrinæ *uncia sex,*
Sacchari albi *uncia viginti*
duæ.

Fiat syrupus.

Datur pueris, scopo laxativo, ad
humores à pectore derivandos, &
recens natis, ad meconium educen-
dum.

Dosis scrupuli duo ad unciam se-
mis.

SYRUPUS MASTICHINUS.

REC. Mastiches electæ, parum
contusæ *uncias*
duas;

Infunde in

Aquæ Mastichinæ *unciis*
duodecim.

Stent in vase probè clauso, in
digestione, *per triduum;* postea
colentur; in colatura dissol-
vantur

Sacchari albi *uncia sedecim.*

Syrupus in vase vitreo probè mu-
nito fervetur.

Ad ventriculi vitia, à frigido orta,
catarrhos, & ad cerebrum robo-
randum convenit.

Potionibus & electuariis additur;
vel etiam, pro libitu, ab uncia
dimidia ad integram, exhibetur.

SYRUPUS MENTHÆ.

REC. Herbæ Menthæ siccæ *uncias*
quatuor,
Aquæ Menthæ *libram u-*
nam.

Digerantur in vase clauso, *per*
biduum, exprimantur, & in
colatura, unicâ ebullitione, dis-
solvantur

Sacchari albi *uncia sedecim.*

Ventriculum roborat, cardialgiam
impedit, vomitus & nauseam
tollit; carminativus est & hy-
stericus.

SYRUPUS MELISSÆ.

Eodem modo paratur.

Ascribuntur ei vires cordiales, ner-
vine & uterine.

SYRUPUS MERCURIALIS,

sive

PROPHYLACTICUS.

STROP DE LONGUE VIE DICTUS.

REC. Succorum Mercurialis *libras*
quatuor,
Borra-

Succorum Borraginis,
Buglossi ana lib-
ram unam,
Mellis optimi albi libras sex.
Coquantur & despumentur, po-
stea

REC. Radicum Gentianæ uncias
duas,
Iridis nostratis
uncias tres,
Vini albi libram unam semis.

Radices incisæ macerentur in vi-
no, per viginti quatuor horas;
postea exprimantur; cum succis
& melle permisceantur, lenique
igne ad syrupi consistentiam
coquantur, atque per pannum
colatus syrupus servetur.

Adscribitur huic Syrupo virtus sin-
gularis prophylactica, ad vitam pro-
longandam, cum tamen credulorum
spem fallat & opinionem. Com-
mendatur quoque ad podagræ, hy-
dropis, calculi, aliorumque mor-
borum insultus arcendos & miti-
gandos. Alvum liberiores ser-
vando, ob amaritiam vires exerit
roborantes. Frigidioribus conveni-
entior, quam calidioribus.

Dosis, jejuno stomacho, quotidie
uncia dimidia, vel integra,

SYRUPUS MORORUM.

REC. Succi Mororum maturorum
uncias vi-
ginti,
Sacchari albißimi uncias tri-
ginta duas.

Fiat syrupus.

Cum Syrupo Cerasorum convenit;
præcipue autem ad oris & linguae
asperitatem & inflammationem,
aphthas & anginam laudatur.

SYRUPUS de MUSCO QUERNO, ad

TUSSIM CONVULSIVAM.

REC. Musci querni barbati,
Bryon dicti,
uncias tres,

Pars II.

Herbæ Botryos, five
Atriplicis Mexica-
næ suaveolen-
tis,
Passularum minorum ana
unciam unam
semis,
Radicum Symphyti majoris
unciam unam,
Liquiritiæ unciam
semis.

Infundantur
in

Aquæ fontanæ ferventis li-
bra una
semis.

Digerantur per noctem, coquan-
tur lento igne, ad colaturæ re-
manentiam unciarum decem, in
qua clarificata dissolvantur
Sacchari uncia sedecim.

Fiat syrupus, cui refrigerato ad-
datur

Balsami Tolutani drachma
una semis,

cum

Sacchari albi uncia una se-
mis

triti.

Misceantur exactè & servetur.

Celebris in Anglia & efficax est con-
tra tussés clangosas & convulsivas
puerorum, si cochlear unum vel
duo propinentur, sæpe in die, an-
te & post singulos tussendi cona-
tus.

Dari etiam potest in aqua Hyssopi,
vel decocto pectorali, per aliquot
dies.

SYRUPUS MYRTILLORUM.

E Succo, sicut syrupus Mororum,
paratur.

Refrigerat & leniter adstringit; in
fluxionibus alvi & sanguinis com-
mendatur.

S Y R U P U S de

N I C O T I A N A.

REC. Succi Nicotianæ libras duas,
O o o Hydro-

Hydromellis simplicis *libram unam semis,*

Oxymellis simplicis *uncias quatuor.*

Digerantur in balneo, aut alio loco temperato, *per duos vel tres dies*, ut defæcetur; clarum, per inclinationem vasis, à fæcibus separaturn denuo, *per viginti quatuor horas*, digere, donec ab omni fæculentia succus depuratus fit, addantur

Sacchari albi *libræ tres.*

Permisce, & in fyrupi consistentiam redige.

Nota: ad vehementiam Nicotianæ corrigendam, opus est, ut digeratur & quasi fermentetur, succus; quæ vehementia postea per longiorem coctionem magis diminuitur; igitur secundum descriptionem præparanda est.

Ad affectus asthmaticos, ubi pulmones pituitâ crassâ ac viscosâ infarcti, & ad tussim humidam, ubi expectoratio difficulter succedit, commendatur; cerebrum à catarrhis & fluxionibus serosis & frigidis liberari ejus usu perhibent; præter quòd pectus mirificè per superiora evacuet, per inferiora etiam potenter educit.

Pectorali scopo, modicâ quantitate, quæ vomitum excitare nequeat, sed potius resolvendo & anodyno effectû juvet, syrupus hic exhiberi debet; quòd si verò vomitus vel nausea excitatur, hausto vino calido aromatizzato mox conquiescet.

Dosis drachma una ad duas, tres, vel quatuor.

SYRUPUS NUCISTÆ.

REC. Nucis Moschatæ *uncias duas.*
Pulverifatis affunde

Vini generosi Burgundiaci *libram unam.*

Digerantur in vase clauso, *per tres dies*; postea exprimantur, & in colatura dissolvantur

Sacchari albi *unciæ sedecim.*

Servetur syrupus.

Est carminativus & stomachicus, alvi fluxiones & vomitus sedat.

Datur in mixturis & electuariis.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

REC. Capitem Papaveris albi, cum

Seminibus *uncias octo,*
Aquæ *libras quatuor.*

Decoquantur ad dimidium, clarificato decocto addantur

Sacchari albi *libræ tres.*

Fiat syrupus.

Adhiberi solet in tussi acri, à materie tenui, humores inspissat, demulcet, anodynus est, & somnum conciliat; datur etiam in ardore urinæ; exhibetur in emulsionibus, vel solus.

Dosis à drachmis duabus ad sex.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

REC. Florum Papaveris erratici *libras duas;*

Infundantur in

Aquæ ferventis puræ *libris tribus.*

Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur &

cum

Sacchari albissimi *libris quinque & uncis quatuor,*

Fiat syrupus.

Specificum habetur in pleuritide: blandissimum est anodynum & demulcens; additur julepis & electuariis, nec non decoctis.

SYRUPUS FLORUM PARALYSEOS,

sive

PRIMULÆ VERIS.

REC. Florum Paralyseos mundatorum recentium *libram unam.*

Affundantur

Aquæ

Aquæ fontanæ ferventis un-
ciæ decem.

Post sufficientem macerationem
exprimantur, in colatura, ebul-
litione unicâ, dissolvantur

Sacchari albi unciæ sedecim.

Servetur fyrupus per pannum co-
latus.

*Speciales floribus Paralyseos adscri-
buntur vires nervinæ; datur igitur
etiam syrupus convulsis tremu-
lis, & paralyticis; ulcera oris per-
sanare & tussientibus auxiliari
creditur.*

SYRUPUS PERSICORUM

è

FLORIBUS.

REC. Florum Persicorum recen-
tium libram
unam.

Macerentur, horis duodecim,
in

Aquæ calentis libra una;
postea exprimantur, &
in

Colaturæ depuratæ unciis
novem,

solvendo

Sacchari albi unciæ sedecim,
Fiat fyrupus.

*Infantibus teneris vomitum movet;
provehentioris ætatis laxat alvum,
bilem & lumbricos educit, ac me-
senterium ab infarctu liberat.*

*Datur à drachma una ad unciam
dimidiam & integram.*

SYRUPUS POEONIÆ

è

FLORIBUS.

REC. Florum Pœoniæ recentium
libras tres semis,

Aquæ fontanæ ferventis li-
bras quatuor.

Fiat infusio per horas viginti qua-
tuor, postea exprimantur.

REC. Expressi hujus unciæ octode-
cim,

Sacchari albi unciæ trigin-
ta duas.

Fiat fyrupus.

*Epilepticis dicatus est, & vi suâ ano-
dynâ motus sedare valet.*

*In mixturis datur infantibus ad
drachmas duas vel tres.*

SYRUPUS RHABARBARI

CHALYBEATUS.

REC. Rhabarbari veri electi,
Limaturæ Martis ana unciæ
duas,

Nucis Moschatæ unciam se-
mis,

Vini albi libras duas.

Digerantur per tres dies, sæpe con-
cutiendo lagænam; tum in co-
lato vino, unicâ ebullitione fol-
vantur

Sacchari albi unciæ triginta
duæ.

*Utiliter adhibetur in infantum mor-
bis à saburra acida & pituitosa
ortis, vomitu, colica, alvi flu-
xu, incipiente atrophia.*

*Dosis uncia semis, vel modicum
cochlearé, ter de die.*

SYRUPUS de RHABARBARO

DEODATI.

REC. Rhabarbari veri,
Foliorum Sennæ ana unciam
unam semis,

Cinnamomi drachmam unam
semis,

Salis Tartari scrupulos duos,
Zingiberis drachmam semis.

Infunde incisa

in

Aquæ Cichorei unciis decem,
Rosarum unciis qua-
tuor.

Stent in digestionem, per triduum,
in loco calido, donec, unicâ
ebullitione factâ, exprimantur.

In

Colaturæ, albumine ovi
clarificatæ
unciis no-
vem

dissolvantur

Sacchari albi unciæ sedecim.

Fiat fyrupus.

*Alvum leniter subducit, bilem eva-
cuat,*

cuat, & præcipuè recens natis, ad educendum meconium utiliter datur.

Dosis tenerrimis drachma semis, scrupuli duo, ad drachmam unam; adultioribus ad unciam unam.

SYRUPUS RIBIUM.

REC. Succi Ribium depurati uncias decem, Sacchari albissimi uncias sedecim.

Fiat, lege artis, syrupus.

Acidus est, & mitior syrupo Berberum; sitim & æstum sedat, & biliosis convenit.

SYRUPUS ROSELLÆ.

REC. Herbæ Rosellæ uncias duas, Erysimi drachmas sex, Pulmonariæ quercinæ unciam semis,

Florum Farfaræ,

Radicum Curcumæ ana drachmas duas,

Liquiritiæ unciam unam,

Passularum minorum uncias duas,

Croci orientalis drachmam unam.

Incisa perfundantur

Aquæ fontanæ bullientis libris tribus.

Coquantur parum, exprimantur; in expresso dissolvantur

Sacchari albi libræ duæ.

Redigantur ad justam fyrupi consistentiam.

Commendatur ad raucedinem inveteratam, asthmaticis, & tussim ferinam.

Dosis uncia semis ad integram.

SYRUPUS ROSARUM SICCARUM.

REC. Florum Rosarum rubrarum ficcorum, finissimorum libram semis,

Aquæ fontanæ ferventis libram unam semis.

Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur; & in

Colaturæ uncis novem, dissolvantur

Sacchari albi uncia sedecim.

Fiatque Syrupus.

Leniter adstringit, atque in alvi fluxionibus utiliter adhibetur.

SYRUPUS ROSARUM SIMPLEX.

REC. Muchari Rosarum libram unam semis, Sacchari albi uncias triginta duas.

Solvantur unicâ ebullitione, & per pannum colatus syrupus fervetur.

Alvum laxat leniter; aphthis medetur, ac non sine fructu additur decoctis pectoralibus.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

REC. Florum Rosarum pallidarum libras quatuor.

Infundantur in

Aquæ fontanæ calidæ libris octo.

Stent per viginti quatuor horas in digestionem, postea colentur & exprimantur. In colatura denuo

Rosarum eadem quantitas infundatur, idque ter repetatur; tandem in

Infusi uncis novem, solvendo

Sacchari albi uncias sedecim, Fiat syrupus.

Alvum blandè subducit, & neonatis atque tenerrimis ad drachmam unam datur; adultioribus ab uncia semis ad drachmas sex porrigi potest.

SYRU-

SYRUPUS RUBI
IDÆI.

REC. Succī baccarum Rubi Idæi
depurati *un-*
cias viginti,
Sacchari albi *uncias triginta*
duas.

Fiat syrūpus.

Sapore & odore delectat, analepti-
cus & refrigerans est; admisce-
tur julapiis & mixturis cordialibus,
& in febris tam intermitten-
tibus, quàm continuis malignis,
non sine fructu exhibetur.

SYRUPUS SCORDII.

REC. Herbæ Scordii, in umbra
ficcatae *uncias*
quatuor.

Infunde in

Aquæ fontanæ ferventis li-
bra una.

Digerantur per noctem, postea
exprimantur, & in

Expressi clarificati *unciis*
novem,

dissolvantur

Sacchari albi *uncia sedecim.*

Fiat syrūpus.

Alexipharmacus & anthelminticus
est.

SYRUPUS de SCILLA,

sive

OXYSACCHARUM SCIL-
LITICUM
LONDINENSE.

REC. Aceti scillitici *libram unam*
semis,

Cinnamomi acuti,

Zingiberis *ana unciam unam.*

Post digestionem *per triduum* colen-
tur, addantur

Sacchari albi *uncia triginta,*
& fiat unicâ ebullitione, in
vase fictili probè vitreato, sy-
rupus, qui colatus, in vitro,
vel vase porcellaneo, servandus.

Prodest asthmaticis, resolvit, atque
easdem, quas oxymel scilliticum,
vires habet; gratior tamen est,

Pars II.

& pro illis, qui mel tolerare ne-
queunt, parandus.

Dosis drachmæ duæ, uncia dimidia
ad drachmas quinque.

SYRUPUS SEDI MAJORIS,
sive

SEMPERVIVI.

REC. Succī Sempervivi majoris,
ad dimidiæ par-
tis consumpti-
onem, in vase
terreo vitreato,
evaporati *un-*
cias decem,

Sacchari albi *uncias sedecim.*

Misce, fiat solvendo, ebulliando
& colando syrūpus.

Febrium æstus potenter extinguit;
præcipuè verò ad linguæ & fau-
cium ariditatem, aphthas, & in-
flammationem valet.

Datur cum mucilagine cydoniorum.

SYRUPUS de STOECHADE.

REC. Florum Stœchadis Arabicæ
uncias duas,
Rorismarini *drach-*
mas duas,

Calaminthæ montanæ,

Origani,

Thymi *ana drachmas tres,*

Betonicæ,

Salviæ *ana drachmas duas,*

Seminum Anisi,

Pœoniæ *ana*

drachmas duas

semis,

Calami aromatici,

Cinnamomi,

Zingiberis *ana drachmam*
unam.

Incisa infundantur
in

Aquæ ferventis *libra una.*

Macerentur *per biduum*, in loco
calido, postea exprimantur, &
in

Expressi *unciis novem,*
dissolve, unicâ ebullitione,

Sacchari albi *uncias sede-*
cim.

Ppp

Per

Per pannum colatus syrupus servetur.

Cerebri, atque nervorum morbis, à causa frigida, medetur, ventriculum corroborat, & concoctionem adjuvat.

Additur electuariis & potionibus.

SYRUPUS SULPHURIS,

five

ARCANUM BECHICUM WILLISII.

REC. Hepatis sulphuris *unciam semis,*

Solve in

Aquæ Fontanæ

Fœniculi *ana uncias quatuor semis.*

Adde

Sacchari albi *uncias sedecim.*

Unicâ ebullitione coquantur in syrupum, qui, per pannum colatus, fervetur.

Laudatur à celeberrimo Autore ad asthma, tussim, phthisin. In scabie duri commodè potest infantibus.

Dosis uncia semis ad integram.

SYRUPUS à SYMPHYTO FERNELII.

REC. Radicum, &
Foliorum Symphyti majoris *manipulos sex,*

Rosarum rubrarum,

Betonicæ,

Plantaginis,

Pimpinellæ,

Polygoni,

Scabiosæ,

Tussilaginis *ana manipulos duos.*

E contusis omnibus recentibus exprimatur succus, cujus

Despumati, vel

Defæcati *unciis novem*

adde

Sacchari *uncias sedecim.*

Fiat syrupus.

Efficacissimus prædicatur ad visciditatem pulmonum incidendam & educendam in tussi & raucedine. Subadstringens est, & non minus ad omnis generis fluxus, tam alvinos, quàm sanguineos, utiliter adhiberi potest.

Additur electuariis, potionibus & decoctis.

SYRUPUS TUSSILAGINIS,

vid.

FARFARÆ.

*

SYRUPUS TUNICÆ FLORUM.

REC. Infusi florum Tunicæ saturati *uncias novem,*

Sacchari *uncias sedecim.*

Fiat, lege artis, syrupus.

Analepticus, ventriculo & nervis gratus est, leniterque adstringit.

SYRUPUS VERONICÆ.

REC. Herbæ Veronicæ recentis ficcatae *uncias sex.*

Macerentur
in

Aquæ Veronicæ

cum

Vino destillatæ *libra una.*

Post sufficientem extractionem, in loco calido, fortiter exprimantur, in expresso dissolvantur Sacchari albi *uncie sedecim.*

Fiat syrupus.

Abstergit & consolidat, pulmonibus & renibus præcipuè convenit.

Datur cum decoctis & electuariis; in tussi pulmonali etiam solus, vel per se, ad unciam dimidiam vel integram, sumi potest.

SYRUPUS VIOLARUM.

REC. Florum Violarum recentium, mundatorum *libram unam.*

Contundantur in mortario lapideo,
&

STRUPUS.

& superaffundantur in vase figulino, optimè vitreato,

Aquæ fontanæ ferventis purissimæ *uncie octodecim.*

Post digestionem, *per aliquot horas*, exprimantur & colentur.

REC. Infusi hujus colati *uncias viginti*, addantur

Sacchari albissimi Canariensis *uncie triginta duæ.*

Leni ac unicâ ebullitione, in stanneo vel figulino vase factâ,

Fiat syrupus, qui, per pannum colatus, servetur.

Teneræ ætati potissimum dicatus est, & ad aphthas, tussim, pectoris infarctus, ardorem urinæ, & calorem præternaturalem temperandum, commendatur. Usibus quoque physicis & chemicis inservit, ad explorandam acidorum & alcalium naturam: acida enim tenerrimum hunc syrupum rubro, alcalia autem viridi colore tingunt.

Cum Aqua cerasorum plerumque adhibetur, vel cum Oleo Amygdalarum dulcium lingendus propinatur.

SYRUPUS VIOLARUM SOLUTIVUS.

REC. Florum Violarum recentium mundatorum *uncias quatuor*,

Foliorum Sennæ electæ *uncias duas.*

Infundantur in

Aquæ fontanæ ferventis *libra una.*

Digerantur per noctem, in loco calido, manè exprimantur; ad

Expressi *uncias novem*, addantur

Sacchari albi *uncie sedecim.*

Colata ferventur.

Leniter alvum subducit, & pueris delicatioribus, alia medicamenta respuentibus, datur.

TARTAR.

243

Dosis à drachmis duabus ad sex, vel unciam unam.

TARTARI OLEUM

per

DELIQUIUM.

Fit, sal Tartari, in manica, aëri humido, in cella exponendo; ut sensim in vitrum suppositum destillet; liquor salinus, per chartam filtratus, servetur.

Citiùs autem parari potest, Salis Tartari *libram unam*, in

Aquæ calidæ fontanæ *uncis quatuor*, vel *quinque*,

Solvendo & filtrando.

Usibus pharmaceuticis & chemicis inservit.

Interne aquâ multâ dilutum, exhiberi potest, si acidum in ventriculo & primis viis hæret, tum & in diætâ lactea, ne lac aceſcat.

TARTARI TERRA FOLIATA.

vid.

ARCANUM TARTARI.

*

TARTARUS CHALYBEATUS.

REC. Tartari crudi, pulverisati *libram unam*,
Limaturæ Martis purissimæ *uncias quatuor.*

Coquantur cum

Aquæ fontanæ *libris duodecim.*

ad remanentiam *quartæ partis*; liquorem colatum per chartam emporeticam filtra, atque ad crystallisandum, in cella vel loco frigido repone.

Crysallos à liquore salino, rursus evaporando, & ad crystallisationem reponendo, separa ac sicca.

Est cremor Tartari Vitriolo martis aliquantillo imbutus.

Ventriculo flaccido emendando, ciborum

borum digestionem & alvi excretioni juvanda operam ferre potest; hinc ictericis, cachecticis & hypochondriacis, febre quartana laborantibus utilis.

Dosis à scrupulo semis ad grana quindecim: nam majori dosi exhibitus, sæpe nauseam & vomitum excitat.

TARTARUS EMETICUS.

REC. Croci Metallorum,
CrySTALLORUM Tartari *ana*
uncias sex.

Affundantur.

Aquæ fontanæ libræ duæ semis.

Stent per unum, alterumque diem, pro lubitu.

Dein leni igne, in vase figulino, probè vitreato, coquantur, ad sufficientem solutionem & imprægnationem tartari. Liquor fervens filtretur, filtratus evaporetur lenissimo igne, sub perpetua agitatione, fere ad siccitatem; & postquam leni calore tartarus penitus exsiccatus fuerit, in pulverem teratur, non ita quidem albidum futurum, ac ille crystallatus, sed efficacior.

Est emeticum universale, & datur tenerioribus à grano dimidio ad unum semis; robustiores grana duo, tria vel quatuor perferre possunt. Optimus modus, tartarum hunc exhibendi est, cum grana tria, in aquæ uncias tribus solvantur, hujusque solutionis hauriat æger dimidiam partem vel duas tertias; si effectus voto non respondeat, post aliquod temporis spatium, reliqua portio dari potest. Ità hyperemesis periculosa evitatur.

TARTARUS TARTARISATUS,

sive

SOLUBILIS,

SAL VEGETABILE

quoque dictus.

REC. CrySTALLORUM Tartari *uncias*
sedecim.

Diffolvantur
in

Aquæ fontanæ bullientis,
purissimæ libris
decem, vel
duodecim.

Instilletur, inter bulliendum,
Solutionis salis Tartari,
quantum ad
saturationem
acidi tartari

sufficit,

donec ab illapso alcali, inter bulliendum, nulla amplius effervescentia excitetur.

Liquor saturatus per chartam bibulam filtretur, atque ad siccitatem evaporetur.

Ex hac combinatione acidi & alcalini tartari, resurgit novum salis medii genus, quod virtute gaudet leniter purgante, resolvente & diuretica.

Dari potest scopo laxandi, à drachmis duabus ad unciam semis, in aquæ sufficiente quantitate dilutus; scopo digestivo & diuretico sufficit drachma dimidia vel integra.

Externè ad ulcera sordida blandè repurganda adhibetur, ut consolidationi apta fiant.

Cl. MUZELL Tartarum tartarissatum cum melle in aqua simplici solutum, ægris melancholicâ hypochondriacâ laborantibus valde proficuum expertus est.

TARTARUS VITRIOLATUS.

REC. Salis Tartari, per deliquium, vel in aqua fontana soluti & purificati *uncias quatuor.*

Huic spiritus Vitrioli guttatim tantum instilletur, donec cesset effervescentia, & gustu nec alcalinus, nec acidus sapor percipiatur; liquor hic jam affusâ plurimâ aquâ calidâ diluatur, ut omne sal penitus dissolutum sit; dein adhuc fervidus percoletur, lento calore ad pellicu-

TARTARUS.

liculam inspissetur & ad cryſtallifandum reponatur.

TARTARUS VITRIOLATUS TACKENII.

REC. Cinerum clavellatorum,
Vitrioli Hungarici *ana libras*
duas.

Utrumque ſeparatim,
in

Aqua calida
ſolvendum eſt; deinde ſolutiones ſucceſſivè confundantur & quidem tam diu, donec non ampliùs efferveſcant, vel ſibilent. Præſtat autem plus ſalis alcali, ut omne vitriolum ſaturetur, addere. Reponantur commixti liquores ad ſubſidentiam, à qua limpida humor decantetur; maſſæ verò ſubſidenti ſuperfunditur denuo aqua calida & ſpatulâ agitatur; poſt ſubſidentiam rurfus limpidiôr humor decantandus, atque hoc modo omnis falſedo extrahenda eſt.

Poſtea in vaſe vitreo humor, *ad tertiam partem*, evaporandus, & in loco frigido ad cryſtalliſationem reponendus. Cryſtallis ſupernatans humor, decantatus, rurfus evaporetur & ad cryſtallifandum reponatur; cryſtalli collectæ probè exſiccandæ ſunt.

Minùs pretioſus ac præcedens eſt, bonitate tamen nihil inferior, modo in præparatione juſta fuerit adhibita diligentia.

Uterque conſtituit ſal medium, ex acido vitrioli & alcali enatum, & reverà digeſtivum nobile ad ſolvendos, & attenuandos ſpiſſos, lentosque humores. Putredini reſiſtit, ſtimulat, aperit, menſes aut hæmorrhoides ſuppreſſas ſæpe reſtituit, diureſin movet. Conducit hypochondriacis, lienosis, cachecticis, ictero, hydrope, viſcerumque obſtructione laborantibus; in febris maximi eſt uſus, tum & in iſchuria & dysuria, &c.

Pars II.

TEL. TEST. THER.

245

Dari poteſt à ſcrupulo uno ad ſcrupulos quatuor, imò, ſcopo laxativo & diuretico, ad drachmas duas, in aqua dilutus.

TELA GUALTERI,

vid.

SPARADRAPUM.

*

TEREBINTHINA COCTA.

Coquitur Terebinthina Veneta
in

Aquæ fontanæ *ſufficiente*
quantitate,

ad ſpiſſitudinem, quæ, cùm refrigeret, duritiem acquirit.

Eadem obtinetur in præparatione Spiritus & Olei Terebinthinæ. Inſervit pro conficiendis pilulis de Terebinthina. Oleo ſuo æthereo, ex parte orbata, ſecurè internè datur, in gonorrhœa, ulceribus internis; &c.

Datur drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

TESTES EQUI PRÆPARATI.

In uſu eſſe deſierunt.

THERIACA,

vid.

ELECTUARIA.

*

THERIACA COELESTIS.

Hujus compoſitio in *Pharmacopœa Wirtenbergica* ceu arcana retinetur; nobis verò, cùm omnis Theriacæ cœleſtis vis medendi & dolores ſopiendi, omnium conſenſu, unicè ab opio pendeat, & remediorum, quæ opium continent, amplius numerus ubique ſuperſit, eam conſultò omittere lubet.

THERIACA DIATESSARON.

REC. Radicis Ariſtolochiæ rotundæ,

Qq q

Gentia.

Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ electæ *ana uncias*
duas,
Mellis despumati *libras duas.*

Fiat, lege artis, electuarium.

Jumentis propriè dicata est, & pro his potissimum parata prostat. Opium non habet, sed continet remedia alexipharmaca, carminativa, stomachica, secretiones per sudorem, urinam &c. promoventia, circulum humorum augentia.

Sed & hominibus convenit, si temporibus, locisque humidis capiant drachmam unam vel alteram. Venter & intestina flatibus divexata juvat.

Ad præcavendas febrium intermittentium recidivas suadet Ill. van SWIETEN.

T I N C T U R Æ.

Hoc nomine in officinis venit medicamenti liquidi genus, colore pellucido qualicunque præditum, interno usui dicatum, & uno vel pluribus simplicibus, cum aqua, vino, spiritu Vini, vel & aceto, salibusque variis, nunc solâ infusione, aliàs & coctione, quin & majori ignis toraturâ, arte chemicâ, ex mineralibus paratum; cujus vires adeò pro diversa indole ac natura specierum, & menstruorum adhibitorum, tum & pro diverso parandi modo, quàm maximè diversæ sunt.

Tali artificio paratæ Tincturæ, sæpe *Essentiarum* & *Elixiriorum* nomine insigniri solent, ut horum terminorum acceptio, promiscua atque vaga valdesit. Tincturæ in officinis adeò copiosæ occurrunt, ut earum numerum restringere, atque ex omnibus selectum facere, rationes medicæ utique suaderent; sed & hîc, ut alibi, *opinio* & *consuetudo* recepta, tantum juris sibi vendicant, ut ab ea pro arbitrio recedere, minùs liceat.

TINCTURA ALOES.

REC. Aloës socotrinæ *uncias duas,*
Spiritus Vini rectificati *uncias decem.*

Stent in leni digestionem, ad sufficientem extractionem; postea filtrata tinctura servetur.

Excellens est vulnerarium & mundificans, ac à chirurgis expetitur.

Usus internus quidem rarus, scopo tamen laxandi exhiberi potest ad drachmam unam.

TINCTURA AMARA LONDINENSIS.

REC. Radicum Gentianæ *uncias duas,*
Flavedinis Corticis Aurantiorum *unciam unam,*
Cardamomi minoris *unciam dimidiam,*
Spiritus Vini *libram unam semis.*

Digerantur, & post extractionem sufficientem exprimantur & filtrentur.

Stomachica & tonica est.

Dosis guttæ quinquaginta & ultra, in vehiculo aquoso, vel vino.

TINCTURA ANODYNA, vid.

ESSENTIA ANODYNA.

*

TINCTURA ANTIMONII ACRIS HOFFMANNI.

REC. Reguli Antimonii martialis, Nitri purissimi *ana libram unam.*

Pulverisata & mixtâ detonentur in crucibulo, & operculo tecta, fortiter *per horam* calcinentur, atque, dum adhuc calet materia, in mortario calefacto, illico contundatur, vitroque digestorio, itidem calefacto, immitatur.

Affundatur

Spiri-

Spiritus Vini rectificati
libra una semis,

atque, opè caloris, tinctura rubicunda extrahatur.

Est spiritus Vini, particulis salino-alcalinis Nitri imbutus, cum paucis particulis sulphureis atque regulinis ex Antimonio.

Resolvens est potentissimum, & in affectibus lymphæ rebellibus, tumoribus hydropicis, suppressione urinæ, & lue venerea, non sine insigni fructu datur.

Dosis propter acrimoniam, non temerè nimis larga sit; in vehiculo etiam aquoso exhibeatur; sufficiunt guttæ triginta ad quadraginta quinque.

TINCTURA ANTIMONII
TARTARISATA.

REC. Salis Tartari libram unam,
Antimonii electi libr. semis.
Pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per horam; postea massa in mortarium calidum effunditur citissimè, & ignita adhuc, in pulverem contunditur.

Pulveri in phiala,
Spiritus Vini rectificatissimi
libra una

affunditur, & ad digestionem reponitur. Liqueor, rubineo colore tinctus, à facibus separatur, atque residuo

Spiritus Vini rectificati
libra semis

denuo affunditur, qui tinctus, uti prior, decantetur.

E residuo sulphur Antimonii parari potest.

Tinctura hæc alcalina nobilissimi in medicina usus est. Resolvit, aperit, sanguinem purificat, attenuat, urinam movet, ictericis, hypochondriacis, & lienosis prodest.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

TINCTURA ANTIPHTHISICA
GRAMANNI.

REC. Sacchari Saturni unicam semis,

Vitrioli Martis drachm. tres,
Aceti Vini boni non destillati,

Spiritus Vini rectificati ana
uncias duas,

Aquæ Rosarum drachm. sex.

Solvatur Saccharum Saturni aceto, in vase ferreo, leni igne, admisceatur Vitriolum Martis tritum, invicem solutis addatur

Spiritus Vini rectificatus

Aquâ Rosarum permixtus; reponantur in loco temperato.

Aqua Rosarum additur, ut phlegma spiritui Vini, aliàs huc non rectificato expetito, restituatur, præcipitatio evitetur, tinctura saturatior, atque ideo gratior obtineatur, simulque foetor empyreumaticus, qui spiritui vini non rectificato inhæret, evitetur.

Est mixtura saturnino-martialis, valde adstringens; hinc vix in phthisi, nisi symptomatibus urgentissimis, sudoribus scilicet colligativis, suadenda est; laudatur etiam ad sistendam gonorrhæam, & pollutiones nocturnas; cautè tamen ubique, imò nusquam, & nunquam adhibendam esse conscientia & religio suadeant.

TINCTURA AROMATICA
LONDINENSIS.

REG. Cinnamomi acuti drachmas
sex,

Cardamomi minoris drachmas tres,

Piperis longi,

Zingiberis ana drachmas
duas,

Spiritus Vini libram unam.

Misceantur, atque post digestionem exprimantur & filtrentur.

Datur ad ventriculum roborandum, atque phlegmaticis convenit.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta usque.

TINCTURA ASÆ
FOETIDÆ.

REG. Asæ foetidæ uncias duas,
Qqq 2 Spiriti-

Spiritus Vini rectificati li-
bram unam.

Fiat, lege artis, tinctura, quæ fil-
trata, usui servetur.

*Vires Asæ fœtidæ fere integras con-
tinet; hinc uterina est, ad spas-
mos hystericarum sopiendos valde
efficax.*

*Dosis guttæ decem ad viginti, cum
frustulo sacchari, aut in vehicu-
lo aquoso.*

TINCTURA BELLIDIS FLORUM.

REG. Florum Bellidis hortensis,
colore rubro, à
capitulis suis
deceptorum &
exsiccatorem
unciam semis,

Spiritus Vitrioli drachmam
unam,

Aquæ florum Bellidis un-
cias quatuor.

Stent in digestionem, per diem &
noctem; postea exprimantur &
filtrentur.

Pari modo parantur

TINCTURA FLORUM AQUI- LE- GIÆ, PAPA- VE- RIS, ROSA- RUM.

*Est tinctura aquosa, spiritu vitrioli
acidulata; flosculi additi colorem
tradunt, vires pendent à spiritu
vitrioli.*

*Ad fervorem & æstum sanguinis
compescendum, & ad sitim sedan-
dam commendatur.*

*Infunduntur drachmæ duæ, vel &
uncia semis,*

*Potus ordinarii, aut
Iulapii mensuræ uni,
sicque bibenda porrigitur.*

TINCTURA BENZOES Vid.
ESSENTIA BENZOES,
five
ASÆ DULCIS.

*
TINCTURA BEZOARDICA
OFFICINALIS.

REG. Radicum Angelicæ,
Pimpinellæ,
Serpentariæ Vir-
ginianæ,
Zedoariæ,
Herbarum Scordii,
Dictamni Creti-
ci,

Baccarum Juniperi,
Corticum Citri,
Myrrhæ ana drachmas sex,
Santali rubri unciam unam.

Incisis & contusis affunde
Spiritus florum Sambuci
rectificati libram
unam.

Post sufficientem extractionem ex-
primantur; expresso adde
Spiritus Tartari uncias sex,
Vitrioli uncias duas,
Camphoræ unciam semis.

Misce, post digestionem filtren-
tur, & ad usum reponantur.

*Est species mixturæ simplicis compo-
sita. Vires sunt alexiteriæ, su-
doriferæ; hinc in erysipellate, feb-
ribus, quas vocant, malignis &
continuis, bono cum effectu, sed
debitis cum cautelis adhiberi po-
test; flatus etiam dissipat, & uri-
nam movet.*

*Dosis à scrupulo uno ad drach-
mam semis.*

TINCTURAM BEZOARDICAM
LUDOVICI,
MICHAELIS,
WEDELII

consultò omittimus.

TINCTURA CANTHARIDUM PHARM. EDINBURG.

REG. Cantharidum drachmas duas,
Coccionellæ drachmam di-
midiam.

In

In pulverem tritis superaffundantur

Spiritûs Vini rectificatissimi
uncia octo-
decim.

Digerantur lenissimo calore, per
biduum, addantur

Resinæ Guajaci *uncia di-*
midia,

Balsami de Copaiva *uncia*
una,

Camphoræ *drachmæ duæ,*

Olei Juniperi *drachma una.*

Post sufficientem digestionem ad
solutionem resinæ & balsami,
clarum à spisso, per inclinatio-
nem vasis separetur.

Commendari solet ad gonorrhœam per-
tinacem; circumspeditione tamen
summopere opus est, propter can-
tharides, quarum usus internus
inflammationem in viis urinæ,
mictum cruentum, ischuriam,
dysuriam; &c. producere solet.

Dosis guttæ viginti ad viginti quin-
que.

TINCTURA CORALLIORUM.

REC. Coralliorum rubrorum, pul-
verifatorum
uncias duas,

affunde

Aceti destillati *libram u-*
nam.

Stent in digestionem, per *triduum*,
ebulliant aliquoties,
ad

Coralliorum *sufficientem so-*
lutionem;

refrigerata solutio per chartam
bibulam filtretur, atque in vase
figulino, vel vitreo, ad ficcita-
tem evaporetur.

REC. Solutionis hujus ficcæ *un-*
ciam unam;

Solve in

Aquæ Cinnamomi cydonia-
tæ *unciis*
tribus,

Solutioni adde

Spiritûs Vini rectificati *un-*
ciam unam
semis,

Pars II.

Tincturæ Sacchari *unciam*
semis.

Digerantur per aliquot dies; po-
stea, per chartam bibulam fil-
trata tinctura fervetur.

Quidquid hæc tinctura virium ha-
bet, non à Coralliis, sed aliunde
accipit; lenite, adstringit, robo-
rat, sudorem & urinam movet.
Dosis scrupulus unus ad drachmam
semis.

TINCTURA CASTOREI.

vid.

ESSENTIA CASTOREI.

*

TINCTURA CROCI.

vid.

ESSENTIA CROCI.

*

TINCTURA CROCI

VINOSA.

REC. Croci Austriaci *unciam u-*
nam,

Micæ panis similaginei *un-*
cias duas.

Contundantur simul in mortario
lapideo, sensim affundendo

Vini Canariensis optimi

quantita-
tem suffi-
cientem,

ut fiat puls mollis, omniaque
stamina Croci sint comminuta.

Pulti huic porro affunde

Vini ejusdem *uncias sex,*

& in vitro probè clauso aliquan-
diu relinque ac digere.

Tinctura sanguinis instar rubicun-
da à fæcibus separetur & loco
frigido fervetur.

Roborare, excretionem sine violentia
stimulare, animum exhilarare, li-
thiasin cohibere, & ad vitam lon-
gam ac sanam procurandam, uti-
lissimè adhiberi, censet B. Schul-
zius.

Dosis guttæ decem, viginti, tri-
ginta, usque ad quinquaginta.

NB. Essentiæ & Tincturæ, men-
struo vinoso paratæ, vel ace-
scunt, vel mox situ corrumpun-
tur.

R r r

tur. Igitur vel in parva quantitate parandæ, vel parum spiritûs Vini rectificati addi debet.

TINCTURA GINGIVALIS
BALSAMICA.

REC. Terræ Japonicæ,
Myrrhæ electæ *ana unciam unam.*

In pulverem trita irrorentur
Balsami Peruviani *drachmâ unâ.*

Superfundantur
Spiritûs Cochleariæ,
Vini rectificati *ana uncie tres.*

Digerantur & per chartam filtrata tinctura servetur.

Commendatur ad stomacacem, seu scorbutum oris, laxitatem & purulentam affectionem gingivarum, atque, cum melle rosato mixta, applicari solet.

TINCTURA HELLEBORI
COMPOSITA

vix amplius in usu est.

TINCTURA LACCÆ.

REC. Gummi Laccæ, quod baculis adhæret, & cui tinctura nondum extracta, *unciam unam,*

Aluminis crudi *drachmam unam semis,*

Aquæ Salviæ,
Rosarum,
Cochleariæ *ana unciam unam semis.*

Lento igne, in vase fictili, ebulliant, & colata usui asserventur.

Ad laxitatem & cruentationem, à scorbutica ulceratione gingivarum adhibetur; melle rosarum temperatum, penicillo illinitur linteo. Locum etiam invenit in tonsillarum & uvulæ relaxatione, quæ sub

salivatione, à Mercurio excitata, oriri solet.

TINCTURA MARTIS
ADSTRINGENS.

REC. Limaturæ Martis purissimæ *uncias quatuor,*

Aceti vini albi *uncias novem.*
Stent in digestionem ad sufficientem extractionem; postea in vase ferreo acetum, ad *quartæ partis* remanentiam, sub continua agitatione, spatulâ ferreâ, evaporetur, & residuo magmati, in vitro,

Spiritûs Cydoniorum *uncia quatuor*
affundantur & per digestionem probè unitis, clarum à spisso, per chartam bibulam colando, separetur.

Omnes quidem tincturæ martiales sunt adstringentes, pro ratione verò menstrui, quo extractæ sunt, plus aut minus. Hæc tinctura aceto parata, magis adstringit reliquis, & in fluxionibus quibuscunque inhibendis, & ubi adstrictione opus est, adhibetur.

TINCTURA MARTIS
APERITIVA,

sive

AROPH PARACELSI

REC. Florum Salis Ammoniaci martialium *unciam unam,*

Spiritûs Vini rectificatissimi *uncias quatuor.*

Misce exactè & lentissimo igne tincturam, aurei coloris, extrahe, quæ filtrata reponatur.

Hæc tinctura præ aliis se commendat, quod, sine alteratione pelluciditatis, cum aliis essentiis & tincturis spirituosus commisceri possit. Suavitate odoris & virtute leniter adstringente ac anodynâ alias præcellit;

lit; in atonia viscerum, & ex illa natis morbis, cachexia, hypochondriaco malo, ictero, & post febres intermittentes, eâ, bono cum successu, uti licet.

Dosis guttæ triginta quinque ad quadraginta.

TINCTURA MARTIS APERITI-
VA, TARTARISATA
LUDOVICI.

REC. Vitrioli Martis,
Cremoris Tartari *ana uncias quatuor.*

Coquantur, in vase ferreo,
cum
Aquæ fontanæ *libris sex,*
sub continua agitatione, fere ad
ficcitatem.

Massa grisea solvatur denuo
in
Aquæ Cinnamomi, sine vi-
no *unciis quatuor,*

& diluatur
Spiritus Vini rectificati *un-
ciis octo.*

Stent in digestionem; liquorem
tinctum, per filtrum, à facibus
separa & serva.

*Tonica est, roborat, & appetitum
excitandi gratiâ, post diuturnos
morbos, in refracta dosi exhibe-
tur.*

Dosis guttæ triginta, ad quinquaginta.

TINCTURA MARTIS
cum

ARCANO TARTARI.
vid.

TINCTURA MARTIS
è

VITRIOLO ZWELFERI.

*

TINCTURA MARTIS COERULEA
ETTNERI.

REC. Limaturæ Martis purissimæ,
Salis Ammoniaci *ana quan-
tum pla-
cet.*

Probè mixta destillentur, & si
flores ascendere incipiunt, desi-
statur à destillatione. Massa
verò relicta stet adhuc, per
tempus, supra fornacem hypo-
causti calidi, ut hoc fotu magis
magisque aperiatur limatura
Martis.

Tunc adde
Salis Tartari,
vel

Cinerum clavellatorum *par-
tes ana-
ticas,*

Aquæ fontanæ *tantundem.*

Inde destilletur spiritus.

E residuo verò sal elixivetur, & ad
ficcitatem iterum evaporetur,
cui sali affundatur spiritus pro-
lectus, qui, colore cœruleo in-
de tinctus, fervetur.

*Magis curiosa, quàm utilis est hæc
tinctura. Eam omittere nullum
nefas.*

TINCTURA MARTIS
CYDONIATA.

REC. Limaturæ Martis purissimæ
*libram u-
nam,*

affunde

Succi Cydoniorum, recens
expressi *li-
bras tres.*

Stent *per aliquot dies,* in digestio-
ne, postea lento igne, in ca-
cabo ferreo, ad *dimidiæ partis*
consumptionem, coquitur; ab
igne remotis, adde

Aquæ Cinnamomi spirituo-
sæ *unciis
tres.*

Probè mixta filtrentur & serven-
tur.

NB. Aqua Cinnamomi additur,
ut gratior stomacho existat, &
ne situ corrumpatur tinctura.

Eodem modo paratur,

TINCTURA MARTIS
POMATA.

Vires sunt, cum aliis martialibus,
R r r 2 *ad.*

Fundantur violento igne, fusa effundantur.

REC. Reguli hujus, in pulverem redacti *uncias duas,*

Nitri optimi, crySTALLISATI, siccissimi, pulverisati *uncias duodecim.*

Commisceantur exactè, & paulatim in crucibulum probè candens injiciantur, detonatione peractâ, tegatur crucibulum tegulâ, ignisque adhibeatur vehemens, in quo detineatur, donec massa in scorias cœruleas, viridescentes redacta sit. Tum in mortarium effundatur calefactum, pulverisetur statim, & vitro immissæ, superaffundatur

Spiritûs Vini rectificatissimi *libra una semis.*

Digerantur, donec tinctura sit extracta pulcherrimè rubens.

Cum Tinctura Antimonii acri convenit, & ad viscidos, lentosque humores resolvendos efficax; adeoque in humorum impuritatibus, obstructionibus, & infarctibus viscerum & glandularum adhibetur.

Dosis & propter acrimoniam, parca sit, & sufficiente vehiculo aquoso diluta exhibeatur; sufficiunt guttæ triginta ad quadraginta.

TINCTURA MYRRHÆ.

vid.

ESSENTIA MYRRHÆ.

*

TINCTURA ODONTALGICA

MAURIT. HOFFM.

REC. Rasuræ Ligni sancti *uncias duas,*

Corticum Ligni Sassafras *unciam semis,*

Seminis Hyoscyami,

Radici Pyrethri *ana drachmas duas,*

Caryophyllorum,

Piperis longi *ana drachmam unam,*

Pars II.

Camphoræ,

Opii *ana drachmam semis,*

Santali rubri *drachmas duas,*

Spiritûs Vini rectificati *uncias quinde-*

cim.

Digerantur & post sufficientem extractionem filtrentur.

Efficacissimum dicitur esse remedium contra dolores dentium, vel gossypio denti dolenti impositum, vel parum calefactum in ore detentum. Juvare potest in odontalgia serosa & resolvendo, & apoplegmatismi vice; forsan & nervos ineptos faciendo ad sensum, & constringendo solida laxa.

TINCTURA PROPRIETATIS

MYNSICHII.

REC. Spiritûs Anisi *uncias sedecim,*

Elixirii Proprietatis *unciam unam,*

Confectionis Alkermes *unciam semis,*

Florum Tunicæ rubrorum *drachmam unam.*

Stent in digestionem, donec perfectè tingantur, postea spiritum tinctum & filtratum ad usum ferva.

Est remedium stomachicum, carminativum & pectorale satis egregium.

Dosis drachma una ad drachmam unam semis.

TINCTURA RHABARBARI,

five

ANIMA RHABARBARI.

REC. Pulveris Rhabarbari optimi *unciam unam,*

Salis Tartari *drachmas duas,*

Aquæ Cichorei,

Cinnamomi Buglos-

faræ *ana un-*

cias sex.

Infusa stent loco calido, per horas viginti quatuor; postea per chartam bibulam colentur.

S s s

NB.

NB. Situi valde obnoxia est hæc tinctura; nunquam igitur, nisi in casu necessitatis, parari debet, quod ex tempore, in vase figulino, igne leni fieri potest.

Est remedium resolvens, deobstruens, quod hypochondriacis & ictericis inprimis conducit, & majori dosi exhibitum alvum laxat, quo scopo ad unciam integram, imò duas, dari potest; scopo alterante sufficiunt drachmæ duæ.

TINCTURA RHABARBARI COMPOSITA.

REC. Rhabarbari *unciam unam,*
Gentianæ *drachmam unam*
semis,
Serpentariæ Virginianæ
drachmam
unam,
Spiritus Vini,
Vini generosi *ana libram*
semis.

Misceantur, & extrahatur Tinctura.

Laudatur in affectibus biliosis, febribus & ipsa dysenteria. Vires possidet roborantes & alexipharmacas.

Dosis guttæ quinquaginta ad octoginta.

TINCTURA STOMACHICA AROMATICA.

REC. Cinnamomi acuti *unciam*
unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucum Moschatarum,
Crocii orientalis *ana unciam*
semis,
Calami aromatici *drachmas*
sex,
Macis *drachmas duas,*
Corticum Citri recentium,
ex duobus
ponis,
Aurantiorum recentium *ex*
uno pomo.

Incisa & contusa infundantur in

Spiritus Vini rectificati *libra una*
semis.

Post digestionem exprimantur, & per chartam filtrentur.

Vires & odorem continet aromaticum præstantissimorum; hinc ori & ventriculo grata est, vel sola, vel cum aliis Essentiis amaris mixta.

Dosis à guttis quinquaginta ad octoginta exhiberi potest.

TINCTURA STOMACHICA LIPSIENSIS.

REC. Spiritus Salis Ammoniaci
vinosi uncias duas,
Vini rectificatissimi *unciam*
unam,

Olei destillati Absinthii
genuini
drachmas

tres,
Caryophyllorum aromaticorum
drachmam
semis.

Misceantur & digerantur; addatur

Tincturæ Santali rubri *uncia una.*

Efficacissima est in ventriculi affectibus, sic dictis frigidis. Tonum restaurat, digestionem promovet, flatus discutit & anthelmintica censetur.

Dosis guttæ viginti ad triginta.

TINCTURA STOMACHICA MARTIALIS EDIN- BURGENS.

REC. Radicum Calami aromatici,
Galangæ,
Gentianæ,
Zedoariæ,
Corticum Aurantiorum,
Peru-

Peruviani ana
unciam
semis,

Herbarum Abfinthii,
Centaurii mino-
ris,

Florum Chamomillæ Roma-
næ ana drach-
mas duas,

Limaturæ Martis purissimæ
unciam unam
semis,

Vini albi generosi uncias
sedecim,

Spiritûs Vini rectificati un-
cias duas.

Digerantur, & post extractionem
sufficientem exprimantur, atque
filtrentur.

*Amara, calefaciens, incidens, ro-
borans: ad tonum ventriculi &
viscerum restaurandum post febres
diuturnas, imò in febribus inter-
mittentibus, cachexia, ictero,
mensium vitiis, commendabilis.*

Dosis drachma semis ad integram.

TINCTURA SULPHURIS.

REC. Sulphuris citrini unciam
unam semis.

Fluat lento igne, in patina terrea,
admisceantur successivè

Salis Tartari,
vel

Cinerum clavellatorum
ficcorum un-
cie tres.

Augeatur ignis, ut materia fluat,
cui, in mortarium calidum effu-
sæ atque pulverisatæ, in vitro,
Spiritûs Vini rectificatissimi
affundantur, & extrahatur tin-
ctura.

*Ad pectoris affectus, scabiem, ulcera
scorbutica commendatur; sed re-
cens parata esse debet; præterea
omne, quod præstat, simplicium
florum sulphuris usu æquè licet con-
sequi. Schulz.*

Dosis guttæ quadraginta ad sexa-
ginta, in vehiculo idoneo.

TINCTURA TARTARI.

REC. Salis Tartari depurati libram
semis.

Fundatur in valido crucibulo, igne
intenso, atque in fluore tam
diu conservetur, donec in colo-
rem è rubro cœruleum transie-
rit; effusum in mortarium cale-
factum, citò pulverifetur, &
calens, ne aërem attrahat, in
phialam siccam, itidem priùs
calefactam, immittatur, super-
fundatur

Spiritûs Vini rectificatissimi
libra una;

digerantur, per aliquot dies, in
arena, interdum agitando, do-
nec spiritus Vini rubicundo co-
lore tingatur, qui decantatus,
pro *Tinctura Tartari*, servetur.
*Est tinctura alcalina, ideo, quæ de
tinctura Antimonii & metallorum
dicta sunt, huc referenda. Re-
solvens est, & egregium diureticum;
illis etiam utiliter adhibetur, in qui-
bus acidum in primis vis peccat.
Sic in infantibus, dum valde tor-
minibus excruciantur, guttæ sex
vel octo, multâ aquâ dilutæ, ve-
rè anodynâ virtutem exercent.*

Dosis guttæ triginta ad septuaginta,
in vehiculo aquoso.

TINCTURA TARTARI ACRIS.

REC. Salis Tartari uncias sex;
Fundantur in crucibulo: super sal
tartari fusum, per vices, inji-
ciatur

Pulvis Carbonum è farmen-
tis;

in continenti è nigro cœruleum
& viridem induet colorem, præ-
mera tinctura. Instar pulticu-
læ fluens, citò effundatur in
mortarium priùs calefactum,
contundatur in pulverem, mit-
tatur in cucurbitam itidem ca-
lefactam, &

Spiritûs Vini rectificatissimi
libra una

superfundatur, leni calore, diu

& noctu digeratur; atque vera ac saturatissima extrahetur tinctura, quæ è residuo decantata, usui fervetur.

Nota. Justo diutius fusio non protrahenda est, ne massa in crucibulo fluens, colorem coeruleum à sulphure carbonum injecto mutuatum, denuo perdat, & uti prius albescat: carbones enim à sale tartari consumuntur, & cum eo per calcinationem violentam in sal vertuntur, sicque tinctura, loco veræ tincturæ, in sal transfiguratur. E solo carbonum sulphure, non autem sale alcali tinctura acris nascitur.

Magis ignea est Tinctura præcedente, atque cum Tinctura Antimonii acris convenit & eadem exhibetur dosi.

TRAGEA.

Ita vocari solet pulvis rudior, crassioribus particulis constans, plerumque ex aromaticis & carminativis, & multo saccharo compositus. Juvat communiter ciborum concoctionem, & cruditatem in primis viis corrigit. Exhiberi solet per se, sæpissimè tamen Panis saccharatus, vel tostus, vino generoso imbutus debitâ Trageæ quantitate inspergi solet. Assumitur vel matutino tempore, vel statim post prandium & coenam.

TRAGEA AROMATICA GABELCHOVERI.

REC. Cinnamomi drachmam unam,
Zingiberis drachmam semis,
Caryophyllorum aromaticorum,
Galangæ minoris,
Granorum Paradisi,
Macis,
Nucis Moschatæ ana grana quindecim,
Santali albi,
rubri ana drachmam semis,

Sacchari albi uncias octo.

Misce, fiat pulvis.

Est pulvis aromaticus & carminativus cum

sedecuplo Sacchari; adjuvare potest ciborum concoctionem, & tam grato sapore, quam virtute roborante, stomachicâ & carminativâ se commendat.

Sumitur cum pane tosto & vino, vel per se, ad drachmas sex.

TRAGEA AROMATICA OFFICINALIS.

REC. Cinnamomi acuti unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis Moschatæ
Zingiberis ana drachmas tres,
Macis drachmas duas,
Santali rubri unciam semis,
Sacchari albi uncias triginta duas.

Misce, fiat pulvis.

Vires sunt eadem, ac præcedentis. Sacchari ratio ad aromata in hac decupla est.

TRAGEA GRANORUM ACTES.

Hanc consulto omittere lubet.

TRAGEA OPHTHALMICA.

REC. Euphrasie drachmas decem,
Millepedum præparatorum unciam semis,
Macis,
Cubebæ ana drachmam unam,
Foeniculi drachmas tres,
Cinnamomi acuti drachmam unam semis,
Sacchari albi uncias tres.

Trita ferventur.

Visus debilitatem emendare, & ad capitis dolorem conferre potest, quatenus urinam movet & ciborum concoctionem adjuvat.

Dosis

Dosis à drachmis duabus, ad unciam semis, bis de die sumenda.

sunt, si acidum infestat, aut ante usum lactis.

Sumatur unus atque alter.

TROCHISCI.

Hoc nomine insignitur in officinis medicamenti solidi genus, pilulâ haud majus, quod in ore liquefit, & instar linctûs, seu eclegmatis sensim deglutitur. Præcipuè ad mala faucium, pharyngis, laryngis, asperæ arteriæ &c. tum & ad foetorem spiritûs, ad prophylaxin à contagio, adversus acidum ventriculi, ad sitim fallendam, & in infantibus ad vermes necandos & expellendos exhibetur.

Trochiscorum in Dispensatoriis ingens occurrit farrago, quorum plurimis tutò careret ars medica; ob consuetudinem verò & morem receptum neque hîc, ut alibi jam dictum, licet superfluos restringere. Omissis ergo maximè obsoletis, qui adhuc in usu esse solent, hîc apponentur.

TROCHISCI ADVERSUS
ACIDUM
VENTRICULI.

REC. Lapidum cancrorum præparatorum,
Coralliorum rubrorum præparatorum
ana drachmas tres,
Nucis Moschatæ *drachmam semis,*
Saponis Veneti,
Extracti radicis Helenii, vel
Enulæ *ana drachmam unam,*
Balsami Peruviani *quantum sufficit,*
ut fiant, lege artis, Trochisci, pisi magnitudine.

Ex absorbentibus, amaris aromaticis, & saponibus constant; hinc pro-

Pars II.

TROCHISCI ALBI
RHAZÆ.

Fiunt ex Sief albo
in

Aquâ Rosarum
soluto & in trochiscos formato.

Præstantiores evadunt, si
Sief albi *drachmis sex,*
admiscetur
Camphoræ *scrupulus unus.*

Laudantur in ophthalmia, tum & in lippitudine humida, catarrhoja & acri, ope
Aquæ Rosarum, vel
Plantaginis
in pulticulam redacti, cujus pauxillum externis oculorum canthib; crebrò immittatur.

TROCHISCI ALHANDAL.

REC. Pulpæ Colocynthidis albæ,
levis, à feminibus purgata, minutim incisæ *uncias decem.*

Macerentur
cum

Mucilaginis gummi Tragacanthæ,
Arabici

Aquâ Rosarum extractæ
quantitate sufficiente,

ut tantum madescant; & contundantur in mortario; postea massa, leni calore exsiccata, in pulverem teratur, & vel in forma pulveris fervetur, vel in trochiscos, ope mucilaginis gummatum, formetur: ficenim melius vires integræ conservari creduntur, quam si aër omnes pulveris atomos subire & vires auferre, vel alterare potest.

Ttt

Sunt

Sunt vehementer purgantes, & pilulis, pro stimulo, adduntur; haud verò tuto, & absque metu hypercatharses dari possunt. Adduntur quoque lotionibus in alvo obstinatiore, ob pituitam, vel fibræ inertiam.

Dosis grana duo ad quinque.

TROCHISCI ALIPTÆ
MOSCHATI.

REC. Styracis calamitæ uncias quatuor,

*Ladani,
Benzoës ana unciam unam,
Ligni Aloës, subtilissimè
pulverisati
drachmas
sex,*

*Sacchari albissimi unciam unam semis,
Moschi orientalis scrupulum unum,
Ambraë griseæ drachmam unam.*

*Omnibus subtilissimè pulverisatis,
fiat, cum
Mucilaginis Tragacanthæ,
Aquâ Rosarum paratæ quantitate sufficiente,*

Massa, ex qua formentur trochisci minores.

Trochiscorum horum usus plerumque est ad suffitus, vel suffumigia pretiosa, cucuphas, aliasque res odore imbuendas. Rarus est usus internus; commendantur pueris asthmate & constrictione pectoris laborantibus & lac revomentibus, quibus pauca grana unum, duo, vel tria sufficiunt.

In quavis drachma fere integrum granum Ambraë & tertia grani pars Moschi inest.

TROCHISCI ALKEKENGII
cum & sine
OPIO

Obsoleti.

TROCHISCI ALKERMES
COMPLETI.

REC. Confectionis Alkermes completæ unciam unam semis,

Laccæ Florentinæ drachmas tres,

*Ambraë,
Moschi ana scrupulum semis,
Sacchari albi uncias sedecim,
Mucilaginis Tragacanthæ,*

cum

Aqua Rosarum factæ, quantum satiss.

Fiant trochisci minores.

Ad bonum halitum conciliandum, & caput confortandum, sumuntur.

TROCHISCI
de
AMBRA.

*REC. Ambraë griseæ scrupulum semis,
Olei Cinnamomi destillati guttas sex,
Moschi grana quatuor,
Sacchari albissimi uncias sedecim,
Mucilaginis Tragacanthæ, quantum satiss.*

Fiant trochisci minores.

Sunt cephalici & inserviunt ad fetorem spiritûs occultandum; quo scopo unus vel alter, pro necessitate, ore volutetur.

TROCHISCI ANTHELMINTICI,
five

HERMETICI SCRETÆ.

*REC. Mercurii dulcis unciam semis,
Cornu Cervi philosophicè præparati scrupulos duos,
Cinnamomi acuti scrupulum unum,
Diacry-*

Diacrydii fulphurati *drach-*
nam u-
nam,

Sacchari albi *unciam unam,*
Conservæ Rosarum rubra-
rum drach-
mas duas.

Cum

Mucilagine Tragacanthæ

in

Aqua Rosarum solutæ,

Fiant trochisci, *numero sexaginta*
quatuor.

Pendet trochiscus *grana quindecim,*
& continet,

Mercurii dulcis *grana qua-*
tuor,

Diacrydii *granum unum.*

Adversus vermes & inde ortos mor-
bos, utiliter adhibentur, & in-
fanibus commodè, vel integri, vel
soluti propinantur.

Dosis pro ratione ætatis, unus vel
duo.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

REC. Sacchari albissimi *libram u-*
nam, un-
cias octo,

Radicum Ireos Florentinæ
unciam u-
nam se-
mis,

Amyli *uncias duas semis,*
Mucilaginis Tragacanthæ
albissimæ

Aquâ Rosarum paratæ, *quan-*
tum satis.

Fiat massa, ex qua formentur tro-
chisci parvi.

Moschum & Ambram addunt non-
nulla Dispensatoria, sed præter
necessitatem aut usum.

Obtundunt acrimoniam & aliquan-
tum resolvunt.

TROCHISCI BECHICI CITRINI.

REC. Sacchari albi *libram unam,*
Radicis Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ *ana un-*
ciam unam,

Croci *scrupulos duos,*
Mucilaginis Tragacanthæ,
quantum
sufficit.

Fiat massa in trochiscos formanda.

TROCHISCI BECHICI MAJORES.

REC. Succi Glycyrrhizæ inspissati,
quantum sa-
tis.

Solvatur
in

Aquæ Looch fani, aut al-
terius cujusdam
pectoralis *quan-*
titate sufficiente.

Solutum per manicam Hippocratis
coletur & rursus inspilletur ad
mellis consistentiam.

Tandem admixto

Saccharo Cando, aut fal-
tem albo Ca-
nariensi,

Fiat, lege artis, massa, è qua
formentur justæ magnitudinis
trochisci.

Sunt succus Glycyrrhizæ depuratus
& saccharo mixtus. Nostro tem-
pore celebratur sub Gallico nomine,
La Reglisse, idem succus Gly-
cyrrhizæ
cum

Saccharo

&

Gelatina Cornu cervi;
cujus insignem fructum in tussi
acri, & defluxionibus acribus
toties experiri licet.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

REC. Pulveris Radicum Ireos Flo-
rentinæ,
Liquiri-
tiæ,

Seminum Anisi,
Fœniculi
ana un-
ciam u-
nam,

Succi Liquiritiæ

T t t 2

in

in

Aqua Hyssopi soluti *uncias*
quatuor,
 Sacchari albi *uncias sedecim*,
 Mucilaginis Tragacanthæ

in

Aqua Rosarum solutæ,
quantum
sufficit.

Misce, fiant ex arte trochisci.

TROCHISCI BECHICI RUBRI.

REC. Specierum Diatragacanthæ,
 Boli Armenæ *ana unciam*
unam,
 Sacchari albi *libram unam*.

Cum

Mucilagine Tragacanthæ

in

Aqua Rosarum solutæ,
 Fiat massa, ex qua formentur trochisci minores.

Trochisci tam citrini, quàm nigri, & rubri, ad tussim acrem, raudedinem, & defluxiones acres, catarrhales inserviunt, & tam resolvendo, quàm demulcendo opem ferunt. De reliquo sunt satis noti usûs, ut & plebeji homines haud raro iis abutantur.

TROCHISCI de CARABE.

Obsoleti quidem usûs sunt; quia verò ad unguentum Comitissæ requiruntur, hic locus iis concedendus.

REC. Carabe, id est,
 Succini *drachmas sex*,
 Cornu Cervi usti,
 Corallii rubri,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ,
 Laccæ,
 Mastiches,
 Succi Acaciæ,
 Hypocistidis,
 Balauftiorum,
 Seminis Papaveris nigri *ana*
drachmas
duas,

Thuris,

Crocî,

Opii *ana drachmam unam*,
grana quindecim,

Mucilaginis Psyllii, *quantum*
satis.

Formentur trochisci.

Sunt adstringentes & opiiati. Commendantur ab Autore Mesue ad hæmorrhagias, & in specie ad spiritum cruentum & uteri fluxum; diarrhæas & hæmorrhoides nimium fluentes siliunt.

Drachma continet opii grana tria; hinc in dosi, nisi urgente necessitate, non ultra scrupulum excedendum.

TROCHISCI CATECHU; five MUSCERDÆ.

REC. Terræ Catechu *unciam unam*,
 Sacchari candi albi *uncias*
duas,

Ambra griseæ,
 Moschi orientalis *ana scrupulum semis*,
 Mucilaginis Tragacanthæ,
quantum
satis.

Fiant trochisci, instar muscerdarum.

Ad laxitatem gingivarum corrigendam, & bonum halitum conciliandum, vel potius fætorem oris occultandum, in ore detinentur.

TROCHISCI de CREMORE TARTARI.

REC. Cremoris Tartari *unciam unam semis*,
 Sacchari albissimi *uncias sex*,
 Mucilaginis Tragacanthæ,
quantum
satis.

Fiat massa, ex qua formentur trochisci.

Ad æstum febrilem temperandum, & sitim mitigandam, in ariditate linguæ commendantur: ductus enim referando, salivam proliciunt,

unt, dum in ore, lingendo, circumvolvuntur.

TROCHISCI ESCHAROTICI.

REC. Mercurii sublimati corrosivi *unciam semis,*
Amyli albi,
Panis triticei *ana unciam unam,*
Minii rubri *unciam semis,*
Mucilaginis Tragacanthæ, *quantum sufficit.*

Fiant trochisci.

Inserviunt chirurgis, ad mundificanda ulcera, & carnem luxuriantem extirpandam.

TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ.

REC. Ambræ gryfæ *drachmas tres,*
Ligni Aloës *drachmas quinque,*
Moschi *drachmam unam,*
Sacchari albi *unciam unam,*
Mucilaginis gummi Tragacanthæ, *quantum sufficit.*

Misce, fiant trochisci.

Gallia, Arabum sermone, denotat pretiosum; cumque plures in usu essent tales compositiones, hæc distinctionis causâ, cognomen moschatæ accepit, cum præter odorata nil habeat. Itâ cl. Schulz in Prælect.

Adduntur speciebus & pulveribus, aliisque medicamentis, ut odorem gratum ipsis tribuant.

TROCHISCI de MYRRHA.

Ceu obsoleti, consultò omittuntur.

TROCHISCI de SCILLA.

REC. Scillam albam ponderosam: Cortice exteriori detractò, & parte inferiore duriore, cui fibrosæ radices adhærent, abjectâ,
Pars II.

Massæ panis

è

Farina

&

Aqua, involve, atque in clibano, donec massa panis in crustam abierit, coque; quam separabis, atque medullofam vel carnosam scillæ partem in mortario marmoreo, pistillo ligneo, quàm optimè in pulvem contunde;

ad

Scillæ *libram unam, vel uncias duodecim,*

adde

Farinæ Orobi, vel
Lupinorum *uncias octo,*

atque contundendo in massam redige, ex qua

Formentur trochisci, pondere *drachmarum duarum,* qui leni calore ficcandi.

Sunt ingrediens Theriacæ; vim habent resolvendi, alexipharmacam, diureticam, & in majori dosi, emeticam.

Dosis grana quinque, ad octo.

TROCHISCI SUBLINGUALES

ad

PROPHYLAXIN

à

CONTAGIO GAUBII.

REC. Theriacæ Andromachi *drachmas duas,*
Myrrhæ electæ *drachmam unam,*
Olei stillatitii Corticum Citri *guttas duodecim,*
Succi Citri recentis *unciam semis,*
Pulveris corticum Auranti-
orum *quantum sufficit,*

Ut fiant, lege artis, trochisci, singuli *scrupuli unius.*

De quibus exiturus manè, capiat unum; alterum autem sub lingua detineat.

U u u

TRO-

TROCHISCI
de
TERRA CATECHU
ad
SPUTUM CRUENTUM.

REC. Terræ Catechu pulverifatæ
unciam
unam,
Succi Liquiritiæ uncias tres,
Specierum Diatragacanthæ
unciam semis.

Misce, fiant trochisci minores.
*In ore liquefacti, acrimoniam falsam
involvunt, & hæmoptoicis mire
profunt.*

TROCHISCI
de
VIPERA.

REC. Viperas, detractis exuviis,
capitibus &
caudis, trunca-
tas & exentera-
tas, quantum pla-
cet.

Coquantur
in

Aquæ fontanæ quantitate suf-
ficiente,

Sale

&

Anetho conditæ,
donec caro à spinis secedat.

REC. Carnis hujus, aliquantum
à nimia humidi-
tate ficcatae un-
cias octo,

Panis triticei albissimi,
bis cocti & in
pollinem reda-
cti uncias duas.

Contundantur in mortario marmo-
reo, in massam, ex qua trochi-
sci formentur tenues, in umbra
ficcandi, &, ne situm contra-
hant, sæpius vertendi, postea
in vitro fervandi, in loco tem-
perato, sicco.

*Quamvis trochisci de Viperis plerum-
que ex Italia petantur, tamen de-*

*scriptionem præparationis appone-
re libuit: nam dubium non est,
quin viperæ nostræ indigenæ, ean-
dem fere virtutem habeant, &
cum ad Theriacæ confectiorem ex-
petantur, præstaret, istos recen-
ter confectos adhibere, quam in-
veteratos ex Italia conquirere. Ra-
rò præscribuntur, sed potius pulve-
re viperarum ex Italia allato, vel
nostrarum viperarum utimur.*

TURPETHUM MINE-
RALE.

REC. Argenti vivi puri uncias
quatuor,
Olei Vitrioli rectificati
duplum,
i. e.
uncias
octo.

Ponantur in vase vitreo supra pru-
nas, ut ebulliant, atque mer-
curius dissolvatur. Continuetur
ignis, donec ad ficcitatem per-
veniat, & non amplius fumet
materies, sed in massam albam
salinam abeat. Quæ aquâ cali-
dâ solvenda, & pulvis citrini
coloris residuus, qui est Turpe-
thum, multâ aquâ tepidâ edul-
corandus.

*Apud veteranos nonnullos chirurgos
in usu est, ad salivationem exci-
tandam; exhibent grana tria, ad
quinque*

*cum
conserva Rosarum,
pro dosi. Non rarò sursum ac
deorsum purgat; præstat igitur ab
ejus usu abstinere, cum alia mi-
nùs violenta & securiora mercu-
rialia prostent.*

*Noviter tanquam specificum ab An-
glis commendatur in hydrophobia,
vel rabie canina.*

Dosis grana tria.

TUTIA PRÆPARATA.

*Tutia aliquoties, vel ad minimum
ter, in crucibulo candefiat, sin-
gulis*

gulis vicibus in aqua extinguitur, tum demum trita in marmore lævigetur.

Usus est in collyriis, unguentis & emplastris exsiccantibus.

VENTRICULORUM GALLI-
NARUM
PRÆPARATIO.

Mundatæ pelliculæ vino laventur, & leni calore exsiccatae ferventur.

Commendantur ob vim leniter adstringentem, ad ventriculum roborandum, alvi fluxum, & vomitus compescendos, præcipuè in infantibus. Sed omnes hæ virtutes merè imaginariæ sunt.

Dantur in trageis à drachma dimidia ad integram.

VINUM BERBERUM,
CYDONIORUM,
GRANATORUM,
RUBI IDÆI.

Adæquata proportio est, ut in
Succi *libra una*,
dissolvantur

Sacchari *uncia tres*.

Colentur, ferventur.

Julapiis & mixturis adduntur.

VINUM HIPPOCRA-
TICUM.

REC. Cinnamomi optimi *drachmas sex*,

Caryophyllorum aromaticorum,

Granorum Paradisi *ana drachmam unam*,

Macis *scrupulos duos*,

Sacchari *libram unam*.

Incisis & contusis affundantur
Vini albi, vel

rubri, veteris optimi
mensuræ duæ.

Stent in loco tepido, per plures horas, vel in loco non tepido, per plures dies; postea coletur & in vitro clauso servetur.

VITRIOLUM MARTIS.

REC. Limaturæ Martis *libram unam*.

Superfundatur

Spiritûs Vitrioli,

Aquæ fontanæ *triplâ quantitate diluti libra una*.

Digerantur in loco calido, usque dum effervesceere desinant, liquor filtratus *ultra dimidium*, vel eò usque, dum in summitate pelliculam contrahat, lento igne exhalet; sic in frigido concrenent crytalli viridiusculæ, quæ exsiccantur; remanens verò liquor ulterius, pro vitriolo exinde colligendo, debite exhallet.

Ad nonnullas præparationes pharmaceuticas requiritur, datur verò etiam in substantia, aliis pulveribus mixtum, uti in Pulvere Absorbente.

Adstringit, roborat, lumbricis, præsertim latis, adversatur; utiliter datur cachecticis, & mensium vitiis laborantibus; specificè iaudatur ad vias lymphaticas iterum consolidandas, in hydropicis, post aquarum evacuationem, ubi, pro singulis diebus, granum unum vitrioli martis, in pauxillo sacchari, ex vino vel aqua, horâ unâ ante prandium, præbere jubent, & per triginta, vel quadraginta dies usum continuandum suadent.

Dosis sit parcior, sufficiunt grana duo, vel tria.

VITRIOLI ROS,

five

PHLEGMA.

Est phlegma acidulum, primò in destillatione vitrioli destillans.

Adscribitur illi vis roborans ventriculum, & expellendi lumbricos.

Dosis guttæ viginti ad triginta.

VITRIOLI TERRA
DULCIS.

Est edulcoratum caput mortuum,
à destillatione olei vitrioli, in
retorta relictum.

*Vires sunt exsiccantes; usus in em-
plastris.*

VITRUM ANTIMONII
HYACINTHINUM.

REC. Antimonii crudi pulverisati,
*quantum
libet.*

Calcinetur in patina terrea non
vitreata, rutabulo vitreo, vel
fistulâ tabacariâ Colonienfi, per-
petuò, ne in grumos abeat,
agitando, lenissimo igne, donec
fumare cesset; si forsan in gru-
mos concreascit, denuo pul-
verisandum est Antimonium,
atque iterum, sub agitatione
perpetua, in calcem grisei co-
loris, quæ sulphur non redolet,
redigendum.

Hæc calx Antimonii crucibulo in-
ditur, atque igne forti, in fur-
no anemio, liquatur, &, ubi
colorem pellucidum, hyacinthi-
num acquisiverit, paucillum
antimonii crudi, vel sulphuris
adjicitur, & in pelvim vel la-
minam cupream effunditur. Et
hæc operatio chemica plerum-
que instituitur cœlo sereno.

*Rarò vel nunquam interno usu vi-
trum hoc præscribitur; consultius
est, integra frustula*

Vini, vel

*Cerevisiæ uncix uni, vel ad
summum uncis*

duabus semis,

*per noctem imponere, & infusum hoc
colatum propinare, unde vomitus
satè frequens consequetur.*

Ex Vitro Antimonii, &

Crystallis Tartari

*nonnulli parare solent tartarum
emeticum, qui efficacior illo, è
croco metallorum parato, credi-
tur.*

VITRUM ANTIMONII
CERATUM.

REC. Vitri Antimonii pulverisa-
ti *unciam
unam,*

Ceræ flavæ unciam semis.

Liquefiat cera in cochleari ferreo,
igne modico, cui statim pulve-
rem admisce; spatulâ agitentur,
per dimidiæ horæ spatium, do-
nec exsiccata materia fuscum
colorem acquisiverit. Tum in
pulverem redige & serva.

*Novum hoc remedium à Cel. Me-
dicorum Edinburgensium Societate
publicatum, contra dysenteriam,
pares cum ipsa Ipecacuanha, quin
& magis specificas exerere vires
traditur. In nimio quoque fœmi-
narum fluxu, tam rubro, quam
albo, plurimum prodesse perhibe-
tur: leniter enim per inferiora
purgare; interdum tamen & vo-
mitum ciere dicitur. Sed ipsius
effectus celebrantur blandi; inter-
dum tamen vehementissimè & sur-
sum & deorsum purgare observa-
tum est.*

*Exhibetur vel in substantia, vel
cum aliqua conserva à granis duo-
bus, ad octo, aut ad summum
duodecim.*

UNGUENTA.

Sunt medicamenta externa, Em-
plastris & Ceratis molliora, E-
lectuarii fere consistentiâ, quæ
cuti immediatè applicantur, vel
illita, vel plumaceolis, linteis,
aut alutâ excepta. Ex oleosis,
pinguibus, mucilaginosi, ma-
ximam partem constant; hinc
calore liquecunt. In genere,
utî Emplastra, vario medendi
scopo adhibentur, scilicet emol-
liendi, discutiendi, maturandi,
detergendi, roborandi, demul-
cendi, acre corrigendi &c. Non
externas solum partes, sed &
internas afficiunt, & majore
plerumque penetrabilitate præ-
dita sunt, ac Emplastra, ut Mer-
curia-

curialia, purgantia, opiata, salivam, alvum movendo, vel compescendo satis testantur. Cæterum in officinis tanta prostat unguentorum copia, ut eorum maximâ parte tutò careret ars medica, sed in gratiam & chirurgorum & plebejorum hominum, etiam plures horum compositiones retineri debent, quibus planè non indigeremus.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

REC. Æruginis uncias tres,
Mellis puri uncias octo,
Aceti Vini acerrimi uncias quatuor.

Ærugo in pulverem teritur, aceto diluitur, mellique permixta, lento igne, ad mellis consistentiam reducitur.

Vim habet cathæreticam, antiputredinosam, abstergentem; hinc ad ulcera mundificanda, carnem luxuriantem, callositates fistularum, &c. absumendas & gangrænæ, sphacelique progressum cohibendum adhibetur; cavendum tamen, ne ad ossa admoveatur, quia ærugo, quam secum fert, promptè cariem iis inducit; hinc & cautè gingivis, quibus putridis & ulcerosis, cum melle rosaceo conducere solet, inungatur.

UNGUENTUM AGRIPPAE.

REC. Radicum Bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram unam,
Ebuli,
Filicis,
Ireos nostratis ana uncias tres,
Scillæ libram semis.

Pars II.

Tribulorum aquaticorum uncias duas.

Radices omnes recentes, concisæ & contusæ, cum tribulis macerentur, per octiduum, in

Olei Olivarum libris sex; postea lento igne coctis & expressis, addantur

Ceræ flavæ uncia duodecim. Colliquata & mixta colentur; fiat unguentum.

Coquitur ex purgantibus sat validis, quæ externo usu, fiunt resolutiva; hinc confert lienosis, alvi obstructione & duritie laborantibus, hydropicis & œdematosis, tumoribus duris, scirrhis. Noxium est, ubicunque inflammatio, aut calor adest. Perinaeo & femoribus calidè infricatum creditur in venerem sequioribus prodesse.

Est ex numero quatuor unguentorum Calidorum. Recens paratum veteri præstat.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

REC. Flor. & Herb. Chamæmeli,
Rutæ ana uncias tres,
Rosarum,
Sambuci,
Betonicæ ana unciam unam semis,

Radicis Althææ uncias duas,

Olei rosati libram unam semis.

Contundantur, & ad humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur, & exprimantur. E colatura cum

X x x

Ala.

Alabaſtri puri , optimè
lævigati un-
ciis tri-
bus,

&
Ceræ albæ unciis quinque,
Fiat unguentum.

*Temporibus , fronti , ſpinæ dorsi , &
plantis pedum illinitur , & lintea,
illo imbuta , imponuntur ; refri-
gerat , dolores mitigat , & ſom-
num conciliat.*

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

REC. Axungia porcinæ libram
unam,
Ceruffæ Venetæ pulverifa-
tæ uncias
oſto,
Camphoræ drachmas ſex.

Miſce.

*Præſtantius eſt ſequenti. Deſiccat,
refrigerat , & levioribus inflam-
mationibus medetur. Caveatur
autem, ne in eryſipelate applicetur.*

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

REC. Axungia porcinæ libram u-
nam,
Ceruffæ albæ ſubtiliſſimè
pulverifatae
uncias oſto.

Miſceantur exactè & agitentur
piſtillo ligneo.

*Deſiccat atque refrigerat ; ad ſca-
biem & reliqua cutis vitia , à
ſero acri enata , ut & ambuſta
conducit.*

*Eſt è quatuor unguentis frigidis ,
primum & ſimpliciſſimum.*

UNGUENTUM ALBU- MINUM.

REC. Olei Roſarum uncias duas.
Albuminum Ovorum uncias
quatuor.

Miſcendo exactiſſimè , fiat, lege
artis, unguentum.

Ad ambuſta , inflammationes , &c.

*eſt egregium , licèt ſimpliciſſimum
remedium.*

UNGUENTUM ALTHÆÆ.

REC. Mucilaginis Radicum Althææ
libram u-
nam,

Fœni Græci,
Lini ana libram
ſemis,

Butyri libras quatuor,
Ceræ libram unam,
Terebinthinæ uncias duas,
Reſinæ uncias ſex.

Mucilagineſ coquantur
cum

Butyro,
& , cùm aquoſum conſumtum
fuerit, addatur
Pulveris Radicum Curcumæ
uncia una ;

denique

Cera & reſina.

His liquatis & colatis, terebinthi-
na admiſceatur , unguentum
ſervetur.

*Inter unguenta calida temperatiſſi-
mum ac uſitatiſſimum eſt. Emol-
lit , calefacit & reſolvit ; com-
mendatur in pleuritide , nephriti-
de , retentione urinæ , ad mam-
marum tumores reſolvendos , &
membra rigida.*

UNGUENTUM

ad

AMBUSTA.

REC. Corticum Sambuci medio-
rum ſuccu-
lentorum,
Tiliæ ana unciam
unam ſe-
mis,

Succi Plantaginis recèns
expreſſi
uncias
duas,

Sempervivi majoris,
Sevi Cervini ana unciam u-
nam,

Olei Lini expreſſi uncias
ſex.
Bul-

Bulliant leni igne, ad humidi consumptionem, oleo colato immisceantur exactè, in mortario plumbeo,

Cerussæ Venetæ, minutissimè tritæ,

&
Aquâ Rosarum lotæ *uncia una,*

Sacchari *drachmæ duæ,*

Olei Ovorum recens parati *uncia semis.*

Fiat, secundum artem, unguentum.

Poregoricum & refrigerans est; ad ambusta, uti titulus docet, adhibetur; tum & partibus erosis aut cuticulâ denudatis.

UNGUENTUM ANODYNUM.

REC. Florum rec. Chamomillæ *libras duas,*

Malvæ,

Meliloti,

Verbasci,

Anethi,

Foliorum rec. Hyoscyami

ana unciam unam,

Radicum rec. Althææ *uncias duas,*

Seminis Fœni Græci,

Lini *ana drachmas tres.*

Flores, herbæ & radices recentes, cum feminibus probè contusis, macerentur in

Olei Olivarum *libris duabus,* per diem & noctem, postea leni igne coquantur, ad omnis humiditatis consumptionem, in colatura colliqua

Ceræ flavæ *uncias quatuor.*

Fiat sic, lege artis, unguentum.

Dolores à rigida fibrarum tensione mitigat; convenit in cephalalgia, & lumborum doloribus ex nephritide & febre.

UNGUENTUM ANTATROPHUM.

REC. Herbarum rec. Chærefolii, Hederæ terrestres,

Nummulariæ,

Ceparum albarum concissarum *ana manipulos octo.*

Incisa & contusa frignantur cum

Butyri recentis *libris quatuor,*

donec fere siccescant herbæ, tum butyrum viridescens per linteam expressum fervetur ad usum.

Celebratur à nobili quadam Alsatiæ familia ad atrophiam infantum, quotidie ventri infriktum, cum adjuncto interno usu pulveris antatrophici, quem videsis suo loco descriptum.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

REC. Terebinthinæ, Resinæ,

Ceræ citrinæ *ana uncias duas,*

Aristolochiæ longæ,

Thuris,

Bdellii,

Myrrhæ,

Galbani *ana unciam semis,*

Opopanacis præparati,

Æruginis *ana drachmas duas,*

Lithargyrii *unciam unam,*

Olei communis *libras tres.*

Oleum cum Lithargyrio coquatur, lento igne, inter coctionem

Aceti vini albi *uncias duas* addendo; postea immisceatur cera, cum resina, liquefacta & colata, atque his, ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis, terebinthina ac reliqua in pulverem contrita addantur.

Fiat unguentum.

Nomen habet à numero duodecim simplicium, quæ ad hoc unguentum assumuntur, non computato oleo. Mundificat, detergit, maturat, consolidat; ut plurimum ad ulcerum curam adhibetur.

UNGUENTUM

de

ARTHANITA.

REC. Succi radicum Cyclaminis, vel in ejus defectu,

Bryoniæ libras tres,

Cucumeris agreftis,

Butyri recentis ana libram unam,

Olei Olivarum libras duas,

Polypodii querni uncias sex,

Pulpæ Colocynthis uncias quatuor.

Polypodium & Colocynthis, minutim incisa, contundantur cum succo, & macerentur per viginti quatuor horas; postea, additis oleo & butyro, coquantur, ad humiditatis consumptionem, exprimantur & colentur, in colatura dissolvantur

Ceræ flavæ uncia quinque; refrigescant, & sub continua agitatione, pulverem è sequentibus insperge:

*Pulveris Aloës hepaticæ
Baccarum Meze-
rei,
Colocynthis, vel
Trochiscorum Al-
handal,*

*Scammonei,
Turpethi ana un-
ciam unam,*

*Euphorbii drach-
mas septem
Salis gemmæ,*

*Florum Chamo-
millæ,*

Myrrhæ,

Piperis longi,

*Zingiberis ana un-
ciam se-
mis.*

Tandem adde,

*Fellis tauri, ad mellis con-
sistenti-
am in-
spissati,*

Sagapeni

in

Aceto soluti ana unciam unam.

Exactissimè uniantur, & reponatur unguentum.

Ob multa, quæ ad hoc unguentum concinnandum accedunt, purgantia fortissima, abdomini illitum, alvum clausam referandi virtutem accipit, tumores œdematosos discutit, aquas hydropicorum expellit, menses retentos & suppressos provocat, vermes, abdomini applicatum, expellit; sed cave sis, ne pueris delicatioribus, sub specie emplastri, imponas: euphorbium enim rubefaciendi vim habet, & excoriationem excitat. Diarrhœam quoque ipsis, imò nauseam & vomitum tale emplastrum concitare solet.

Sufficit, inunxisse abdomini unguentum semel in die.

UNGUENTUM AUREUM.

REC. Olei communis libras duas semis,

Ceræ citrinæ libram semis,

Terebinthinæ uncias duas,

Colophonix,

*Resinæ pini ana unciam se-
mis.*

Lento igne colliquatis, colatis, & nonnihil refrigeratis, inspergantur

Pulveris Mastiches,

Thuris ana uncia una,

Croci drachma una.

Misce, fiat unguentum.

Parum

Parum differt ab unguento Basilico, adèoque jure omitti posset. Vulnerarium est & conducit in vulneribus, ubi nulla adest inflammatio, & præsertim membranosarum partium vulneribus sanandis inservit.

UNGUENTUM BASILICUM.

REC. Cerae flavæ,
Sevi arietini,
Resinæ pini,
Picis navalis,
Terebinthinæ ana uncias
tres,
Olei communis Olivarum
libram unam.

Fundantur, lento igne, cera, fenum, resina & pix cum oleo, quibus liquatis additur terebinthina, & per stupam colatis, adde

Pulveris Olibani unciam unam semis.

Misce.

Digerit, maturat, suppurationem promovet. Itidem conducit in vulneribus, ubi nulla adest inflammatio, & præsertim membranosarum & nervearum partium.

UNGUENTUM CALENDULÆ
FLORUM.

REC. Florum Calendulæ recentium, excerptorum uncias quatuor,
Butyri recentis, non saliti
libram unam.

Incisi flores coquantur cum butyro, ad humiditatis consumptionem, expressum, & colatum unguentum reponatur.

Emolliente & discutiente vi pollet, tumores mammarum lactantium resolvit, & mulierculis ad ambusta aliasve leves inflammationes adhibetur.

Pars II.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

REC. Florum rec. Chamomillæ
uncias tres,
Meliloti,
Herbarum rec. Abrotani,
Hederæ terrestres,
Rutæ,
Herbarum rec. Menthæ crispæ,
Tanacetæ ana unciam unam.

Contusis & conquassatis addatur
Olei Olivarum,
Adipis porcini recentis ana
libram unam.

Macerentur per dies aliquot, dein leniter ebulliant, ad humiditatis consumptionem, exprimantur & colentur, adde

Cerae citrinæ uncias duas,
Olei destillati Anisi,
Carvi,
Menthæ

ana drachmam unam,

Lauri expressi uncias duas,

Misce pro unguento.

In colica, torminibus infantum & flatulenta distensione abdominis, utiliter abdomini illinitur, vel & clysmatibus additur.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

REC. Radicum Althææ recentium,
Liliorum alborum ana uncias duas,

Herbarum Parietariæ,
Mercurialis,
Her-

Y y y

Herbarum Malvæ *ana un-*
ciam unam
semis,

Althææ,
Violariæ,
Florum Chamomillæ,
Meliloti, omnium
recentium *ana*
unciam unam.

Coquantur in
Butyri recentis, non faliti
libris duabus,
ad humiditatis consumptionem,
exprimantur & colentur.

Abdomini illitum emollit, & cly-
steribus, eodem scopo, additur ad
unciam semis, usque ad uncias
tres. Potest tamen & externe
scopo emolliendi adhiberi.

UNGUENTUM COMI- TISSÆ.

REC. Corticum mediorum Glandi-
um,
Castane-
arum,
Quercûs
arbo-
ris ju-
nioris,

Baccarum Myrti,
Gallarum,
Acinorum uvarum,
Calicum glandium,
Sorborum immaturorum
ficcorum,
Mespilorum acerborum fic-
catorum,

Foliorum Plantaginis,
Quercûs,
Equiseti,

Pruni sylvestris,
Radicis Tormentillæ *ana*
unciam
unam se-
mis.

Contundantur aliquantulum, co-
quantur
in

Aquæ fontanæ
&
Vini rubri *ana libra una,*

donec *dimidia pars* consumpta
fuerit.

Colatura ulteriùs coquatur
cum

Myrtillorum *libra una semis,*
ad humiditatis aquosæ consum-
ptionem; postea in ea dissolvantur

Ceræ novæ *uncie octo semis;*
ab igne repositis addatur

Olei mastichini *libra una se-*
mis,
atque inspergatur sequentium
tenuissimus pulvis.

REC. Corticum Quercûs arboris
unciam
unam,

Sanguinis Draconis,
Nucis Moschatæ,
Gallarum,
Succi Hypocistidis,
Baccarum Myrti,
Acinorum uvarum,
Sorborum immaturorum

ana unciam

semis,

Trochiscorum de Carabe
uncias
duas.

Misce, fiat unguentum.

Unguentum hoc è meris adstringen-
tibus & siccantibus paratum,
laudatur ad abortum prohibendum,
uteri, alvi & renum laxitatem,
ad hernias, ani & uteri proci-
dentias.

Applicatur lumbis, abdomini, & fe-
moribus, vel illinendo, vel linteis
illitum imponendo.

UNGUENTUM DEFEN- SIVUM, aliàs

BASAMUM UNIVERSALE DICTUM.

REC. Ceræ albæ *uncias quatuor,*
Olei Olivarum *libram unam,*
Saturni, feu
Aceti Lithargyrii

ad

Mellis Consistentiam eva-
porati *uncias*
tres,
Cam-

Camphoræ *unciam unam semis.*

Ceræ ad ignem liquatæ, reliqua, secundum artem, admisceantur, ut fiat unguentum.

Siccat, refrigerat, inflammationem arcet; idoneâ consistentiâ præ multis aliis commendabile unguentum. Conducit linteo illitum pro unguento ad ambusta & ad persanandas exculcerationes, crustasque cutaneas, uti à Variolis in facie, naribus, alibi relictas, dum crebrò illis illinitur.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

REC. Terebinthinæ Venetæ *libram semis;*

Solve ac misce cum

Vitellis Ovorum, *numero quatuor;*

adde

Olei Hyperici *unciam unam semis,*

Pulveris Olibani,
Myrrhæ *ana drachmas tres;*

Misce.

Digerit, & suppurationem promovet, in vulneribus ac abscessibus.

UNGUENTUM DIGITALIS.

REC. Florum Digitalis purpureæ vulgaris *uncias quatuor,*

Adipis Suilli *libram unam.*

Macerentur, per aliquot dies; postea coquantur, lento igne, ad humiditatis consumptionem, coletur & fervetur in vase vitreo unguentum.

Commendatur ad ulcera scrophulosa humida, pure manantia. De digitali, Itali dicere solent: Aralda tutte le piaghe falda, i. e. Omnia persanat Digitalis vulnera.

UNGUENTUM ENULATUM.

REC. Radicum Enulæ recentium *libram unam,*

Pinguedinis porcinæ *libram semis,*

Olei Olivarum purissimi *uncias quatuor.*

Pinfantur in mortario lapideo, coquantur leni igne, ad humiditatis consumptionem, exprimantur & colentur; colaturæ adde Ceræ flavæ,

Terebinthinæ puræ *ana unciam unam.*

Optimè commixta, fiant unguentum, quibus nonnulla Dispensatoria addunt mercurium & sulphur.

Laudatur ad scabiem & tineam, & bono cum effectu adhibetur, ubi mercurio & metallicis præparatis mixta unguenta locum non habent.

UNGUENTUM EPISPASTICUM.

REC. Axungię porcinæ,

Terebinthinæ Venetæ *ana uncias tres,*

Ceræ flavæ *unciam unam,*
Cantharidum *drachmas tres.*

Axungię & ceræ simul liquefactis, adde Cantharidum pulverem, dein Terebinthinam.

Misce, fiat unguentum.

Est rubefaciens, ad derivationem ab affecto loco aptum; facit quoque ad fluxum ulcerum, à vesicatorio excitatorum, revocandum.

UNGUENTUM EPISPASTICUM MITIUS.

REC. Cantharidum *unciam unam,*
Aquæ fontanæ bullientis, *quantum sufficit.*

Infunde per noctem, in vase clauso, & colaturam fortiter expressam coque in

Axungię *unciis duabus,*
ad humiditatis consumptionem, dein adde

Resinæ albæ,

Ceræ flavæ ana unciam unam,
Terebinthinæ Venetæ uncias duas.

Fiat unguentum.

Viribus & modo utendi convenit cum præcedente.

UNGUENTUM FUSCUM.

REC. Olei communis libram unam semis,

in quo dissolve

Ceræ flavæ recentis uncias quatuor,

Colophoniam,

Picis navalis ana uncias duas,

Mastiches electæ,

Terebinthinæ ana unciam unam.

Colentur, atque colaturæ refrigeratæ admisce

Gummi Galbani,

Sagapeni,

Thuris electi ana unciam unam,

Aristolochiæ rotundæ unciam semis.

Misce, fiat unguentum.

Est vulnerarium, emolliens & mundificans; digerit & carnem generat.

UNGUENTUM

de

HYOSCYAMO.

REC. Foliorum Hyoscyami recentium libram unam.

Contundantur cum

Axungie procinæ unciis decem.

Coquantur ad humiditatis consumptionem, exprimantur & expresso addantur

Olei Hyoscyami,

è

Semine expressi uncie duæ.

Mixta ferventur.

Anodynum est, & egregium emolliens; cum unguento Linariæ, hæmorrhoidum dolores sedat.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

REC. Olei rosati libram unam, Ceræ albæ uncias tres.

Cera liquetur, & oleo permisceatur, ut fiat unguentum.

Est ex quatuor Frigidis unguentis. Commendatur nephriticis & hæmorrhoidibus, dorso & renum regioni inunctum.

UNGUENTUM

de

LINARIA.

REC. Herbæ Linariæ, cum

Floribus,

Pinguedinis porcine ana libram unam.

Contundantur, coquantur ad humiditatis consumptionem & exprimantur.

Specificum creditur esse ad hæmorrhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur.

UNGUENTUM

de

LIQUIRITIA.

REC. Radicum Liquiritiæ recentis & succulentæ, incisarum,

Butyri recentis ana libram unam.

Pinstantur simul in mortario, postea frigrantur in sartagine, ad humiditatis consumptionem, & prælo exprimantur, expresso adde

Pompholygos drachm. sex, Cerussæ subtilissimè tritæ uncias tres,

Camphoræ scrupulos duos.

Fiat unguentum.

Inflammationes partium leviores, vel potius excoriationes, à sero salso productas, ut & fissuras papillarum in mammis lactantium, sanat.

UN-

UNGUENTUM
de
LITHARGYRIO
aliàs
NUTRITUM.

REC. Lithargyrii libram semis,
Cerussæ unciam unam semis,
Aceti libram semis,
Olei rosati libram unam.

Fiat in mortario plumbeo, optime agitando, unguentum.

Præstantius erit unguentum, si lithargyrium & cerussa cum

Aceti sufficiente quantitate, prius coquantur & ad pultis formam inspissentur, quibus dein oleum addatur.

Epuloticum & sarcoticum est; adversus scabiem, pruritus & alia cutis vitia, utiliter adhibetur; sed & partibus inflammatis, in gangrænam tendentibus superpositum, mirè prodest.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

REC. Herbæ recentis Majoranæ,
Butyri recentis ana libram unam.

Contusa & probè mixta coquantur lenissimo igne, ad humiditatis exhalationem, exprimantur & colentur, colaturæ adde

Olei destillati Majoranæ,
guttas triginta.

In narium infantum obstructione, à muco viscido, expetitur; loco unguenti carminativi, etiam abdomini illini potest.

UNGUENTUM MALVÆ.

REC. Herbæ Malvæ recentis libram unam semis,

Butyri recentis libras duas.

Contundantur insimul, & coquantur leni igne, ad humiditatis consumptionem, colentur cum

Pars II.

expressione, & unguentum ad usum reponatur.

Cum Unguento Clysmatico convenit & iisdem usibus inservit.

UNGUENTUM MARTIATUM.

REC. Foliorum Lauri recentium libram unam,

Rutæ hortensis uncias decem,

Majoranæ uncias octo,

Foliorum Rorismarini uncias sex,

Myrti veræ,

Ebuli,

Menthæ,

Basilici ana uncias duas.

Herbæ & folia recentia, mirutim incisa, macerentur in

Vini albi libra dimidia,

&

Olei Olivarum libris duabus, per aliquot dies digestis adde

Butyri recentis,

Axungiae Ursi,

Gallinæ,

Medullæ Cervi ana unciam unam semis.

Coquantur lenissimo igne, ad humiditatis consumptionem, colentur & exprimantur, in expresso dissolvantur

Ceræ flavæ uncia quindecim.

Refrigerato unguento admisceantur

Styracis drachmæ decem,

Mastiches uncia una,

Thuris drachmæ quinque,

Omnia in subtilem pulverem trita.

Cum unguentum hoc, cum Unguento Nervino conveniat, omitti hic deberet; ne verò defectuosi quid in unguentis appareat alibi, desiderantibus id apponere placuit.

Ad nervorum resolutionem, tumores

Zzz

à causa frigida ortos, infantum tormina & hydropem commendari solet.

UNGUENTUM de MINIO
CAMPHORATUM,

aliàs
RUBRUM.

REC. Olei rosati libram unam *se-*
mis,

Lithargyrii uncias duas,
Minii uncias tres,
Cerussæ unciam unam semis,
Tutiæ præparatæ,
Camphoræ ana drachmas

tres,

Ceræ albæ uncias duas.

Liquatam lento igne ceram oleum,
& reliqua tenuissimè trita, ad-
ditis,

Aceti destillati unciis tribus,
commisce, sub finem addendo
Camphoram,

in

Spiritu Vini solutam.

Refrigerantis & exsiccantis naturæ est, & ad ulcera, quæ ob humorum acrimoniam serpunt, conducit, & ambustis medetur. Temporibus cum linteo aut corio applicatum, in odontalgia & cephalalgia rheumatica sæpe prodest.

UNGUENTUM MUNDIFI-
CANS STAHLII.

REC. Mercurii vivi,
Saturni ana unciam unam.
Fluat plumbum in tigillo, cui adde
mercurium, & spatulâ agita,
quò uniantur, & fiat amalga-
ma, quod
cum

Terræ Tripolitanæ uncia
una,

subtilissimè teratur. Qui pulvis
Unguenti albi camphora-
ti unciis

octo

optimè permisceatur.

Ad efflorescentias cutis scabiosas, præsertim siccas & pruriginosas,

præmissis præmittendis, utile est, si vel immediatè loco affecto inducatur, vel articulationibus manuum & brachiorum subinde affricetur.

UNGUENTUM NEAPO-
LITANUM

five

GRYSEUM.

REC. Mercurii crudi uncias qua-
tuor,

Terebinthinæ claræ unciam
unam
semis.

Probè misceantur, ut mercurius
extinguatur, adde

Axungię porcinae lotæ un-
cias de-
cem,

Olei Spicæ drachmam unam.

Usus est in lue venerea, ad salivationem excitandam; modus applicandi è practicorum libris petendus.

UNGUENTUM NERVI-
NUM.

REC. Herbarum Salviæ,
Chamæpityos,
Majoranæ,
Rorismarini,
Menthæ,
Rutæ,
Lavendulæ,
Hyperici,
Paralyseos,
cum flore,
Florum Chamomillæ,
Meliloti,
Hyperici,
Summitatum Anethi,
Baccarum Lauri,
Juniperi viridi-
um ana
drachmas
sex.

Incisa & contusa macerentur,
in

Olei Olivarum libra una,
per aliquot dies; postea lento
igne

UNGUENTUM.

275

igne, ad humiditatis consumptionem, coquantur, exprimantur, & colentur. Colaturæ adde

Terebinthinæ Venetæ *uncias duas,*

Ceræ citrinæ *uncias quatuor semis,*

Olei Terebinthinæ *unciam unam,*

Lumbricorum cocti,

Laurini *ana uncias duas,*

Benzoës,

in

Spiritus vini rectificatissimi *uncis tribus soluti*

unciam unam.

Fiat unguentum.

Ad frigidos nervorum affectus, paralyfin & similes commendatur.

Inungitur membris paralyticis, articulis debilitatis, spinæ dorsi &c.

UNGUENTUM

de

NICOTIANA.

REC. Foliorum Nicotianæ *libras duas,*

Succi Nicotianæ *libram semis,*

Axungia,

vel

Pinguedinis porcinæ *libram unam.*

Herba incisa & contusa, cum succo & adipe suillo, per noctem macerentur; manè lento igne, ad humiditatis consumptionem, coquantur, exprimantur, & colentur, addantur

Resinæ *uncia dua,*

Ceræ *uncia una,*

Aristolochiæ rotundæ, subtilissimè trita *uncia dua.*

Fiat unguentum.

Autor Laurentius Joubertus miram huic unguento, in scrophulis dissipandis, vim adscribit; laudatur etiam ad ulcera, ad morphæam &

tineam capitis; tum & ad scabiem.

UNGUENTUM NIHILI

ad

OCULOS.

REC. Tutiae præparatæ,
Nihili albi *ana unciam unam,*
Coralliorum rubrorum præ-

paratorum,

Matris Perlarum *ana unciam semis,*

Camphoræ *drachmam unam,*

Pinguedinis porcinæ *mundatæ libram unam.*

Fiat miscendo unguentum.

Ad ophthalmiam, à sero acri salso & dolores inde natos, conducit.

UNGUENTUM NUTRITUM.

vid.

UNGUENTUM

de

LITHARGYRO.

*

UNGUENTUM OPHTHALMICUM

HANS SLOANE.

REC. Tutiae præparatæ *unciam unam,*

Lapidis Hæmatitis præparati *scrupulos duos,*

Aloës lucidæ præparatæ *grana duodecim,*

Margaritarum præparatarum *grana quatuor,*

Pinguedinis Viperinæ *genuinæ, quantum sufficit.*

Terantur sedulò super porphyrite, ac subigantur ad impalpabilem quasi pulverum subtilitatem, ut fiat unguentum molle.

Tantillum hujus unguenti, cum penicillorum, oculo affecto applicetur, clausisque mox palpebris aliquandiu retineatur, manè & vespere.

ZZZ 2

Egre-

Egregias planè virtutes in plerisque oculorum morbis curandis, huic unguento attribuit Illust. Autor, experièntiâ multiplici edoctus.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM RUBRUM,

feu

BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM,

REC. Butyri recentis cum

Aqua Rosarum loti *unciam semis,*
Mercurii præcipitati rubri subtilissimè triti *scrupulos duos.*

Misceantur exactè in mortario lapideo.

Inservit non solum ad lippitudinem, & Corneæ ulcuscula, post varias inprimis relicta, oculis quotidie illitum, sed & ad impetiginem & varias exulcerationes cutaneas.

UNGUENTUM

ad

PARALYSIN.

REC. Axungiae porcinae,

Olei Laurini *ana uncias duas,*

Vitrioli *unciam unam.*

Titulus vires indicat, & vices unguenti nervini supplere potest.

UNGUENTUM

PECTORALE.

REC. Olei Amygdalarum dulcium *uncias quatuor,*

Chamomillæ,

Violarum *ana uncias tres,*

Butyri recentis *uncias sex,*

Pinguedinis Gallinae,

Anatis *ana uncias duas,*

Ireos Florentinae *drachmas duas,*

Croci *drachmam semis,*

Cerae albæ *uncias tres.*

Cerâ & pinguedine in oleis liquatis, postea addito Ireos & Croci pulvere, fiat unguentum.

Commendatur in pleuritide, ad tussim & difficilem respirationem infantum. Agit emolliendo & leniter discutiendo.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

REC. Seminis Staphidis agrinae *uncias duas,*

Hellebori albi *unciam unam,*

Argenti vivi *uncias duas,*

Pinguedinis porcinae *libras tres,*

Olei Laurini *uncias sex,*

Saponis Veneti *uncias tres.*

Sapo in lixivio solutus, cum pinguedine coquatur, ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea oleum laurinum & pulveres, tandem mercurius cum

Terebinthinæ Venetæ *uncia una,*

extinctus addatur.

Fiat unguentum.

Usum titulus indicat; cautè tamen hic procedendum, inprimis ubi caput ulcerosum, aut fœdis crustis oblitum est; & quarum præmaturâ exsiccatione, sæpe atrocissima mala oriuntur.

UNGUENTUM POMATUM,

five

FLORUM

NAPHÆ

Phar. Paris.

REC. Adipis suilli, puri *libras quinque,*

Florum Aurantiorum recentium & integrorum *libras sex,*

Indan-

Indantur vasi fictili, probè vitreato, atque balneo maris, per unam alteramve horam, ad digestionem, committantur. Expressantur, & ut citò citiùs refrigerant, & adeps concrecat, in cellam reponantur.

Repetatur processus tertiâ vice, adipi flores recentes addendo; ultimâ tamen

Florum *uncie quatuor*, sufficiunt. Tandem fæces ab unguento vel pomato separentur, &

Aquæ Florum Naphæ fragrantissimæ *uncie octo*,

addantur, liquatum cum aqua unguentum supernatans, cautè separetur, atque ab omni humiditate liberum, reponatur.

Pari methodo ex aliis floribus odoratis, Jasmino, Lavendula, Rosis &c. unguenta fragrantia parari possunt.

Usus omnibus est notus, cosmeticus, & ad capillamenta & capillos inungendos.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

REC. Olei Rosarum *uncias sex*,
Ceræ albæ,
Succi baccarum Solani *ana uncias quatuor*,
Cerussæ optimè tritæ *uncias duas*.

Plumbi usti,
Pompholygos, sive
Nihili albi,
Thuris electi *ana unciam unam*.

Oleum Rosarum, cum succo baccarum Solani, ad humiditatis consumptionem, coquitur, & in colatura cera dissolvitur, quibus refrigeratis, reliqua, in subtilissimum pollinem trita, admiscuntur.

Commendatur ad ulcera exsiccanda, atque consolidanda. A nonnullis
Pars II.

etiam ad ophthalmiam adhiberi solet.

UNGUENTUM POPULEUM.

REC. Oculorum, seu
Gemmarum Populi arboris recentium *libram unam semis*,
Pinguedinis porcinae depuratae *libras quatuor*.

Oculi contundantur & macerentur in pinguedine, donec sequentes herbæ per æstatem colligi queant, scilicet

Cymarum Rubi tenerrimarum,

Foliorum Papaveris albi,
Hyoscyami,
Bardanae, cum radicibus,
Solani,
Lactucæ,

Herbarum Violarie *ana uncie tres*,
Sempervivi majoris *uncie quatuor*,
Sempervivi minoris *uncie tres*.

Herbæ contundantur & misceantur cum Oculis Populi & pinguedine, deinde coquantur lento igne, ad humiditatis aqueæ consumptionem, colentur & exprimantur.

Est paregoricum, refrigerans & emolliens; commendatur ad hæmorrhoidum dolores, ambusta, lac in mammis coagulatum dissolvendum, linteis impositum, & in febribus, si temporibus, plantis pedum & pulsibus manuum applicetur, somnum conciliare perhibent.

UNGUENTUM PURPUREUM
seu

FUSCUM WURZII.

REC. Terræ Vitrioli dulcis *uncias duas*,
A a a a Viridis

Viridis Æris *drachmas decem*,
Aceti vini,
in quo

Radices Scrophulariæ,
Folia Plantaginis,
Chelidonii majoris,
recentia ana
drachmæ tres,

per aliquot dies, macerata, ac
postea expressa fuerint, *uncias*
quinque,

Mellis despumati *uncias*
octo.

Inspissentur leni igne, continuo
agitando, ad mellis consisten-
tiam.

Convenit cum Unguento Ægyptiaco;
Et vulgo ad ulcera detergenda,
atque nonnihil exsiccanda, nec
minus ad carnem luxuriantem Et
callositatem fistularum absumendam,
adhibetur.

UNGUENTUM RESUMP- TIVUM.

REC. Seminum Lini,
Althææ,
Fœni græci,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana
drachmas duas.

Macerentur & bulliant
in

Aquæ simplicis *libra semis*,
eliciatur mucilago, quæ
cum

Butyri recentis *libra di-*
midia,

Pinguedinis Suillæ,
Gallinæ,
Anseris,
Anatis ana *un-*
ciis duabus,

coquantur ad humiditatis aquo-
sæ consumptionem, postea ad-
dantur

Sevi hircini *uncia semis*,
Olei Olivarum,
Chamomillæ,
Amygdalarum dulcium
ana *unciæ duæ*,

Medullæ vituli *libra semis*.
Fiat, secundum artem, unguen-
tum.

Vires possidet summè emollientes, re-
laxantes, si recens est. Hæctis,
pleuriticis, Et tabidis, è longo
morbo resurgentibus, membris à
luxatione, vulnèratione Et fra-
ctura rigidis, vel Et post suturam
tendinum conducit.

UNGUENTUM ROSATUM.

REC. Axungię porcine albissimæ
libram u-
nam.

Lavetur aliquoties,
Aquâ Rosarum fragrantissi-
mâ,

adde
Florum Rosarum albarum,
contusarum
uncias quin-
decim.

Coquantur lento igne, ad humi-
ditatis consumptionem, colen-
tur & addantur

Olei Rosarum veri destilla-
ti *grana-*
tria.

Misce, fiat unguentum.

Ad hæmorrhoidum dolores laudatur,
Et unguento infrigidanti Et ano-
dyno substitui potest.

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

REC. Axungię porcine albissimæ
libram u-
nam.

Lavetur sæpiùs
Aquâ Rosarum odoratissi-
mâ,

donec albissimum & odoratum
fuerit unguentum; adde

Olei ligni Rhodii *guttas duo-*
decim.

Usus est ad capillos Et capillamenta
inungenda, quò pulvis ex amylo
faciliùs adhæreat.

UNGUENTUM RUBRUM

ad
LABIA ORIS.

REC. Radicum Alkannæ *unciam unam semis,*

Ceræ albæ *drachmas sex,*
Olei Amygdalarum dulcium
recens expressi uncias duas,

Vini rubri *uncias tres.*

Radices minutim incisæ in vino rubro macerentur, his adde oleum amygdalarum, & lenissimo igne, ad humiditatis consumptionem, in vase terreo vitreato coquantur; addatur sub finem cera alba, exprimantur, & in aquam rosarum effundantur. Refrigerata denuo, lenissimo igne, liquentur,

Olei Cinnamomi *guttæ decem*

addantur, & in capsulas papyraceas, sicut ceratum citrinum, effusa, in vitro probè clauso, ferventur.

Ad fissuræ labiorum à calore nimio interno, vel à frigore ortas, mulierculæ utuntur, & noctu, ante cubitum, labia oris eo illinunt.

UNGUENTUM RUBRUM
POTABILE.

REC. Radicum Alkannæ *libram unam,*

Vini rubri odorati *libram semis.*

Macerentur *per dies aliquot,* in loco frigido,
cum

Butyri majalis recentis,
non saliti
libris sex.

Coquantur leni igne, ad consumptionem humiditatis, colentur & exprimantur.

Commendatur iis, qui ex alto ceciderunt, sanguinem spuentibus, & rursi ferinâ vexatis, atque ad sanguinem intus coagulatum, à

contusione, ruptura, &c. denuo resolvendum; nec non ad vulnera consolidanda.

Datur ad unciam unam, cum jussulo calido, aut cerevisia calida.

UNGUENTUM SANTALINUM.

REC. Santali albi,
citriani ana *drachmas sex,*
rubri *drachmas decem,*

Florum Papaveris erratici
recentium *unciam unam semis,*

Rosarum rubrarum recentium *uncias duas semis.*

Macerentur
in

Olei rosacei *libra una,*
Vini albi *unciis quatuor,*
per biduum; postea, ad humiditatis consumptionem, coquantur leni igne, exprimantur & colentur.

Expressis adde,
Boli Armenæ, in pulverem subtilissimum tri-
tæ,

Ceræ albæ *uncias tres,*
Camphoræ *drachmas duas.*

Fiat unguentum.

Vires exerit nervinas, refrigerantes, & subadstringentes; adeoque etiam contra ruborem dolorificum faciei, ab æstu inprimis solari contractum commendatur. Hepati & lieni à veteribus dicatum est.

UNGUENTUM SAPONATUM.

REC. Saponis Veneti rasi *uncias quatuor.*

Solve ebulliendo
in

Aaaa 2

Aquæ

Aquæ fontanæ *libra una.*
Colaturæ expressæ & pene refrige-
rata admisce

Camphoræ subtiliter pulve-
rifatæ *un-*
ciam se-
mis,

Excellit unguentum vi discutiente, in dolore articulorum & claudicatione ex lapsu orta, anchylosi, ischiade, dum magnitudine nucis juglandis in cochleari ferreo tepesactum, articulis bis quotidie infricatur.

Idem cum quarta parte salis volatilis oleosi Sylvii remixtum efficax constituit unguentum nervinum.

UNGUENTUM

ad

SCABIEM.

REC. Terebinthinæ,
in

Aqua Rosarum lotæ *uncias*
duas semis;

Solvantur

Vitellis ovorum *Numero*
tribus,

adde

Butyri recentis *uncias sex,*
Olei laurini *unciam unam,*
Styracis liquidæ *unciam se-*
mis,

Mercurii præcipitati albi
drachmas
duas,

Cerussæ Venetæ optimè
pulverifatæ
unciam u-
nam.

Misceantur exactè, ut fiat unguen-
tum.

Usus titulus indicat. Inungantur hoc unguento vel articulationes in brachiis, manibus & pedibus, vel pustulæ scabiosæ ipsæ; sufficit pro una vice drachmam omnibus inungere.

At prospiciendum est, ne intempestivâ inunctione, materiæ impuræ retropulsio efficiatur, præprimis, si laxantia, aliaque purificantia nondum fuerunt præmissa.

UNGUENTUM ad SCABIEM
ZELLERI.

REC. Unguenti rosati *uncias tres*
semis,
Mercurii præcipitati albi
unciam se-
mis.

Misce.

*Proximè antecedentis usum & vi-
res æquat; odore verò gratius est.*

UNGUENTUM SOMNI-
FERUM.

REC. Unguenti alabastrini,
rosati *ana unciam*
semis,
populei *uncias*
duas,

Olei Nucistæ expressi *drach-*
mam unam semis,

Hyoscyami,
Ceræ albæ *ana unciam semis,*
Opii Thebaici

in

Aqua Rosarum soluti *drach-*
mam unam,
Croci orientalis *drachmam*
semis.

Fiat unguentum.

*Vires hujus unguenti titulus docet;
temporibus & carpis, non sine
fructu, linteis illitum applicatur.*

UNGUENTUM SPLE-
NETICUM.

REC. Radicum Filicis,
Ari, cum herba
ana uncias
duas,

Foliorum Afari
Hyoscyami,
Cicutæ,
Nasturtii aquatici
ana unciam
unam semis,
Nicotianæ *drach-*
mas tres,

Florum Chamomillæ,
Hyperici,
Genistæ,
Sambuci *ana unciam*
unam.
Omnia

Omnia contusa macerentur
cum

Axungiae suillae libra una
semis,
postea coquantur lento igne, ad
humiditatis consumptionem ;
expresso colato adde

Cerae citrinae unciam unam
semis,
refrigeratis adjunge.

Gummi Ammoniacy
Galbani subtilissi-
mè pulverifa-
ti ana drach-
mas sex,

Olei destillati Cumini,
Anethi,
Cerae ana
drachmam
unam.

Reponantur ad usum.

Utiliter adhibetur ad inflationes ab-
dominis, duritiem & infarctum lie-
nis, & hepatis ; prodest hypochon-
driacis, ictericis & flatibus vexa-
tis. Hypochondria, lumbi &
totum abdomen, hoc unguento
inungi debent.

UNGUENTUM STOMA-
CHALE.

REC. Herbæ Absinthii,
Menthæ,
Salviæ ana uncias
duas,
Florum Rosarum unciam
unam,
Olei Olivarum uncias decem.

Herbæ & flores, recentes con-
quassati, coquantur lento igne,
ad humidi exhalationem, ex-
primantur, in expresso dissol-
vantur

Cerae citrinae unciae duæ.

Misceantur exactè ; refrigeratis
adde

Styracis liquidæ unciam u-
nam,

Olei destillati Menthæ
Caryophyl-
lorum,

Pars II.

Olei destillati Absinthii

ana scru-
pulum u-
num.

Serventur.

Virtute roborante & carminativa
instructum est ; adeoque abdomini
circa umbilicum & scrobiculum
cordis inunctum, sæpe prodest in
debilitate ventriculi, affectibus fla-
tulentis, vomitu, diarrhœa, colica
flatulenta ; quin & membris pa-
ralyticis, aut alio modo debilitatis
cum fructu inungi potest.

UNGUENTUM

ad

TABIDA MEMBRA.

REC. Olei Laurini uncias tres,
Juniperini,
Laterini, sive
Philosophorum,
Castorei,
Spicæ,
Petrae rubri ana un-
ciam semis,

Axungiae Caponis,
Cati sylvestris,
Anatis,
Anseris ana un-
ciam unam,
Hominis unciam
unam semis.

Pulveris Euphorbii unciam
semis,
Aluminis plumosi,
Herbæ Sabinæ ana
drachmas
duas,

Saponis Veneti,
Spiritus Vini rectificati ana
uncias tres.

Fiat,

Saponem,

in

Spiritu vini,

solvendo, & cum reliquis com-
miscendo,

Unguentum.

Ad ariduram partium, è causa fri-
gida, commendatur ; prodest pa-
ralyticis.

B b b b

UN-

UNGUENTUM

contra

VERMES.

REC. Radicum Filicis,
Bryoniæ,
Allii *ana unciam
unam se-
mis,*

Herbarum Abrotani,
Absinthii,
Tanaceti *ana
drachmas
duas,*

Butyri recentis *libram u-
nam.*

Contusa coquantur lento igne,
sub perpetua agitatione, ad hu-
miditatis consumptionem. Ex-
primantur, in expresso dissol-
vatur

Ceræ flavæ *uncia una semis,*
refrigescant; refrigeratis insperge

Pulveris Aloës hepaticæ
*unciam u-
nam,*

Trochiscorum Al-
handal *un-
ciam semis;*

probè subactis adde

Fellis Tauri,

ad

Mellis consistentiam inspif-
fati *uncias
duas.*

Serventur.

*Abdomini inunctum, vel linteis ap-
plicatum, vermes enecat, expellit,
& alvum laxat. Aquâ sâpona-
ceâ rursus elui & ablui debet.*

UNGUENTUM VIRIDE
POTABILE.

REC. Herbar. recent. Abrotani,
Artemisiæ,
Bellidis,
Betonicæ,
Fœniculi,
Hyssoi,
Menthæ,
Matrisylvæ,
Millefolii,

Herbar. recent. Majoranæ,
Plantaginis,
Veronicæ,
Verbenæ,
Salviæ,
Rutæ *ana un-
ciam u-
nam,*

Baccarum Juniperi viridum
*uncias
tres,*

Butyri recentis, non fali-
ti *libras
tres.*

Incisa & contusa misceantur &
coquantur,
cum

Butyro,
leni igne, ad humiditatis eva-
porationem, exprimantur &
colentur.

*Tam externus, quàm internus ejus
est usus; datur ex alto lapsis,
parturientibus & vulneratis, coch-
lear unum aut alterum, cum
juscule; externè ad sugillationes,
& leniendos partium dolores, ad-
hibetur.*

UNGUENTUM

de

U V I S.

REC. Succu Uvarum nigrarum mi-
norum,

Aquæ Rosarum fragrantis,
Butyri recentis *ana uncias
sedecim,*

Ceræ flavæ odoratæ *uncias
quatuor.*

Coquantur lento igne, in vase fi-
gulino, spumam sub coctione;
cochleari ligneo, semper aufe-
rendo, donec spumare desierit;
effundantur refrigerata.

Unguentum ab adhærentibus fæ-
cibus mundatum, denuo lenif-
simo igne liquetur, atque in
patinas, vel vasa porcellanea,
prius

Aquâ Rosarum

hume-

humectata, effundatur. Refrigeratum inter chartas, in scatula, loco frigido, fervetur.

Dosis grana quindecim ad viginti quinque.

Refrigerat, & leniter adstringit; ad fissuras labiorum oris, mammarum papillas, hæmorrhoides & intertrigines adhibetur.

UNICORNU MARINUM
PRÆPARATUM.

Limâ in scobem redactum in subtilissimum pollinem teritur.

UNGULA ALCIS PRÆPARATA.

Cordiale, antispasmodicum, nervinum prædicatur, sed vix unquam laudabilem effectum producit.

Limâ in scobem, & postea in alcohol aut pollinem redigitur.

Pro specifico antepileptico habetur, & fere omnibus pulveribus antepilepticis admiscetur. *Dosis* scrupulus semis ad drachmam semis.

FINIS.



SYLLABUS
MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM
ET
COMPOSITORUM,
IN
PHARMACOPOEA
HELVETICA
COMPREHENSORUM,
IN
CLASSES ALPHABETICAS
DIVISUS,
QUI TAM
MEDICIS
QUAM
PHARMACOPOEIS
CANONIS
LOCO ESSE POTEST.

BASILEÆ,

Sumptibus & Literis,
Joh. Rod. Im-Hof & Filii,
1771.





CLASSIS PRIMA. A C E T A.

Acetum Aromaticum, five Odoratum.
Bezoardicum.

Sylvii.

Calendulæ.
Destillatum.
Hystericum.
Lavendulæ.
Liliorum Convallium.
Lithargyrii, five Saturninum.
Odoratum, five Aromaticum.
Papaveris rheados vel erratici.
Rosarum.
Rubi Idæi.
Rutaceum.
Sambuci florum.
Saturninum, five Lithargyrii.
Scilliticum.
Simplex.
Tunicæ florum.

CLASSIS SECUNDA. AQUÆ SIMPLICES CUM VINO DESTILLATÆ.

Aqua Cinnamomi.
Corticum Aurantiorum.
Liliorum convallium.

Aqua Melissæ.
Typhorum Cervi.
Veronicæ.
Zedoariæ.

CLASSIS TERTIA.
AQUÆ SIMPLICES
SINE
VINO DESTILLATÆ.

Aqua Abrotani.
Absinthii.
Acaciarum è floribus.
Acetosæ.
Acetofellæ.
Angelicæ.
Anisi.
Anserinæ.
Ari.
Armoraciæ, sive Raphani rusticani.
Artemisiæ.
Aurantiorum Corticum.
Florum.
Beccabungæ.
Bellidis.
Betonicæ.
Borraginis.
Brunellæ.
Buglossi.
Bursæ pastoris.
Calendulæ.
Cardui benedicti.
Mariæ.
Carvi.
Caryophyllorum aromaticorum.
Centaurii minoris.
Ceraforum nigrorum.
Chærefolii.

Aqua

Aqua Chamomillæ.
 Cheiri florum.
 Cichorii.
 Cinnamomi.
 Citri è Corticibus.
 Floribus.
 Cochleariæ.
 Consolidæ minoris, five Prunellæ.
 Cumini.
 Cyani Florum.
 Endiviæ, five Intybi.
 Euphrasiæ.
 Farfaræ, five Tussilaginis.
 Florum omnium.
 Fœniculi Herbæ.
 Seminis.
 Fragariæ.
 Fragorum.
 Fumariæ.
 Galegæ.
 Hederæ terrestris.
 Hepaticæ nobilis.
 Hyssopi.
 Intybi, five Endiviæ.
 Lactucæ.
 Lavendulæ.
 Levistici.
 Liliorum Alborum.
 Convallium.
 Majoranæ.
 Matricariæ.
 Melissæ.
 Mellis.
 Menthæ.
 Myrrhæ.
 Nasturtii.
 Nivis.
 Papaveris rheados.

Aqua Paralyseos, five Primulæ veris.
 Petrofelini.
 Pœoniæ florum.
 Plantaginis.
 Portulacæ.
 Primulæ veris, five Paralyseos.
 Prunellæ, five Consolidæ minoris.
 Quercûs foliorum.
 Raphani hortensis è radice.
 Rusticani, five Armoraciæ.
 Rorismarini foliorum.
 Rosarum.
 Rubi Idæi è fructibus.
 Salviæ.
 Sambuci florum.
 Saxifragiæ.
 Scabiosæ.
 Scordii.
 Scorzoneræ.
 Sedi, five sempervivi.
 Serpilli.
 Sigilli Salomonis.
 Spermatis ranarum.
 Tanaceti.
 Taraxaci.
 Telephii.
 Tunicæ florum.
 Tussilaginis, five Farfaræ.
 Valerianæ.
 Verbenæ.
 Veronicæ.
 Urticæ.

CLASSIS QUARTA. AQUÆ SIMPLICES

SINE

DESTILLATIONE PARANDÆ.

Aqua Benedicta Rulandi, seu Vinum Emeticum.
 Calcis vivæ.

CLAS-

CLASSIS QUINTA.
 AQUÆ COMPOSITÆ
 SINE
 DESTILLATIONE PARANDÆ.

Aqua Aluminosa Londinensis.
 Cardiaca officinalis.
 perlata.
 Carminativa sex feminum.
 Cosmetica.
 Epileptica puerorum.
 Grisea.
 Hermetica.
 Mercurialis ad usus externos.
 Millepedum.
 Ophthalmica.
 Paregorica.
 Sapphirina.
 ad Tormina infantum.

CLASSIS SEXTA.
 AQUÆ COMPOSITÆ
 CUM
 VINO DESTILLATÆ.

Aqua Acustica.
 Anhaltina.
 Antimelancholica.
 Apoplectica spirituoſa.
 minus spirituoſa.
 Asthmatica.
 Benedicta Serpilli.
 Carbunculi.
 Carminativa spirituoſa.
 Cephalica Caroli V.
 Diuretica è nucleis.
 Embryonum, five Balsamum.
 Correctior.

D d d d 2

Aqua

Aqua Epidemica Londinensis.

Epileptica Langii.

Ad Gonorrhœam Hoffmanni.

Riverii.

Hirundinum cum Castoreo.

Hungarica, five Reginae.

Hysterica.

Ligni Sassafras.

Magnanimitatis.

Mastichina.

Melissæ spirituosa Carmelitarum.

Hysterica.

Odorifera.

Panis.

Prophylactica Sylvii, five Acetum Bezoardicum.

Salviæ composita.

Stomachica.

Theriacalis simplex.

Typhorum Cervi composita.

Vitæ Mulierum, five Aqua embryonum.

Vulneraria spirituosa (*EAU d'ARQUEBUSADE.*)

Vinosa.

Zedoariæ anisata.

CLASSIS SEPTIMA.
AQUÆ COMPOSITÆ
SINE
VINO DESTILLATÆ.

Aqua Animalis, five Destillatum equinum.

Antihectica.

Antiscorbutica temperata.

Caponis.

Carminativa, five Physagoga.

Cordialis Cinnamomi.

è Corde cervi.

Cornu cervi Citrata.

Fortis.

Aqua

Aqua Hirundinum.
 Looch fani & experti.
 Nephritica.
 Physagoga, five Carminativa.
 Regis.
 Theriacalis composita.
 Visceralis Maucharti.

CLASSIS OCTAVA. AXUNGIÆ, MEDULLÆ, SEVA.

Aqua Anatis.
 Anguillæ.
 Anseris.
 Ardeæ.
 Aschiæ.
 Canis.
 Caponis.
 Castorei.
 Cati fylvestris.
 Equi ex collo.
 Gallinæ.
 Humana.
 Leporis.
 Lucii piscis.
 Lupi.
 Muris montani.
 Porci domestici.
 Serpentum.
 Taxi.
 Viperarum.
 Ursi.
 Vulpis.
 Medulla Cervi.
 Vituli.

Sevum Arietis.
Cervi.
Hirci.

CLASSIS NONA.
BALSAMA
SIMPLICIA & COMPOSITA.
I. SIMPLICIA.

Balsamum Angelicæ.
Caryophyllorum aromaticorum.
Cinnamomi.
Lavendulæ.
Ligni Rhodii.
Macis.
Majoranæ.
Rorismarini.
Rutæ.
Succini.

II. COMPOSITA.

Balsamum Apoplecticum.
Arcæi.
Cephalicum Saxonicum.
Commendatoris, five Persicum.
Cosmeticum.
Embryonum.
Hystericum.
Locatelli.
Loimicum.
Magicum.
Odontalgicum.
Pectorale Meibomii.
Persicum, five Commendatoris.
Samaritanum.
Somniferum.
Succini.

Balsa-

Balsamum Sulphuris Amygdalatum.

Anisatum.

Rulandi.

Vitæ.

Vulnerarium Dippelii,
vide Liquor.
Mindereri.
Viride.

CLASSIS DECIMA. CONDITA.

Conditum Ananas.

Aurantiorum corticum.

Berberum.

Calami aromatici.

Caryophyllorum aromaticorum.

Ceraforum acidorum.

Cichorii radicum.

Citri carnis.

corticum.

Cornorum.

Cydoniorum, five Marmelada.

Cynosbatos.

Enulæ radicum.

Eryngii radicum.

Fragorum.

Nucum Indicarum.

Juglandium.

Prunorum.

Ribium.

Rubi Idæi.

Satyrii radicum.

Scorzoneræ radicum.

Uvarum.

Zingiberis in India confecti.

CLASSIS UNDECIMA. CONFECTIONES LIQUIDAE.

Confectio Alkermes Completa.
 Incompleta.
 de Cinnamomo Regia.
 Hamech.
 de Hyacintho completa.
 Incompleta

ET

CONSECTIONS SACCHARATÆ SICCÆ.

Confectio Anisi Laxativa.
 Simplex.
 Cinæ, five Santonici.
 Coriandri.
 Cubebæ.
 Fœniculi.
 Sinapis.

CLASSIS DUODECIMA. CONSERVAE.

Conserva Absinthii.
 Acetosæ.
 Acetofellæ.
 Anthos Florum.
 Aurantiorum è pulpa.
 Florum.
 Beccabungæ.
 Bellidis florum.
 Betonicæ florum.
 Borraginis florum.
 Buglossi florum.

Confer-

Conserva Centaurii florum.
 Cichorii florum.
 Citri è pulpa.
 Cochleariæ.
 Euphrasiæ foliorum.
 Majoranæ.
 Menthæ.
 Millepedum.
 Papaveris erratici.
 Paralyseos.
 Pœoniæ.
 Rosarum pallidarum.
 rubrarum simplex.
 Vitriolata.
 Salviæ florum.
 Spagyrica completa.
 incompleta.
 Tunicæ florum.
 Violarum florum.

CLASSIS DECIMA TERTIA. DECOCTA.

Decoctum Album.
 Amarum.
 Antifebrile.
 Avenaceum Loweri, five
 species pro Decocto Avenæ,
 five
 Bromium.
 Cornu Cervi Citratum.
 Diæteticum Sydenhami.
 Limacum.
 Passulatum.
 Pini.
 Tamarindorum.
 Traumaticum.
 Anti-Venereum.

CLASSIS DECIMA QUARTA. ELÆOSACCHARA.

Elæosaccharum Anisi.

Aurantiorum corticum.

Cardiacum.

Cephalicum.

Camerarii, five Pulvis ster-
nutatorius.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Citri corticum.

Errhinum.

Foeniculi.

Macis.

Nucis Moschatæ.

Spermatis Ceti.

Succini.

CLASSIS DECIMA QUINTA. ELECTUARIA.

Electuarium de Acoro, five Diacori.

Baccis Lauri.

Catholicum.

Chalybeatum.

Diacassia cum Manna.

Diacydonium compositum aromaticum.

Jalappinum.

Simplex.

Diafatyrium.

Diafscordium Fracastorii.

Anti - febrile.

Gingivale.

Hiera Picra simplex.

Anti - hydropicum.

Electua-

Electuarium Lenitivum Florenzolæ. Obsolevit.
 de Manna.
 Mithridatium Damocratis.
 Orvietanum.
 Pectorale.
 Resumptivum.
 Tararindorum.
 Tetrapharmacum, five Theriaca Pauperum.
 Theriacæ Andromachi.
 Diateffaron.

CLASSIS DECIMA SEXTA. ELIXIRIA.

Elixir Acidum Dippelii.
 Anti-febrile.
 Aperitivum Clauderi.
 Cordiale & Stomachicum, vulgo GARRUS.
 Mastichinum, five Spiritus Mastichinus.
 Myrrhæ Londinense.
 Pectorale Balsamicum Edinburgense.
 Regis Daniæ.
 Wedelii.
 Polychrestum Hallense.
 Prophylacticum amarum.
 Proprietatis album Helmontii.
 dulce, vel sine acido.
 sine acido Boerhav.
 cum acido Boerhav.
 Paracelsi.
 cum Rhabarbaro.
 Salutis.
 Stomachicum, viscerale, tempera-
 tum Hoffm.
 Spirituosum Hoff-
 manni, vel
 Essentia Balsamica.

Elixir Vitæ Matthioli completum.

Incompletum juxta *Disp. Vienn.*

Vitæ Mulierum, five Aqua Embryonum.

Vitrioli Mynsichti.

Uterinum.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. EMPLASTRA, ET CERATA.

Emplastrum album coctum, five de Cerussa.

de Ammoniaco.

Anodynum.

Ant-apoplecticum.

Epilepticum Cratonis.

Antipodagricum.

de Baccis Lauri.

five Ceratum de Betonica.

Camphoratum Stahlii.

Capucinatorum.

Catarrhale. *Dispens. Brandenb.*

Cephalicum. *Dispens. Brandenb.*

de Cerussa, five album coctum.

Cicuta cum Ammoniaco.

five Ceratum Citrinum.

ad Clavos & verrucas pedum.

de Crusta panis.

Cumino.

Defensivum Fel. Würzii.

Rubrum Wepferi.

Diabotanium Blondelli.

Diachylon simplex.

cum Gummi.

Diapalma, aliàs Diachalciteos.

Diaphoreticum Mynsichti.

Dia-

Emplastrum Diapompholygos.

Diafulphuris Rulandi.

Divinum.

Febrifugum Michaëlis.

Filii Zachariæ.

ad Fonticulos.

Fracturas & Luxationes.

de Galbano crocatum Mynsichti.

ad Ganglia.

Griseum, five de lapide Calaminari.

ad Hernias, five Rupturas.

Hydropem Fulleri.

de Hyoscyamo.

Hyftericum. Vid. Matricale.

Sydenhami, vid. Matricale
Sydenhami.

Incognitum, five Santalinum.

Ischiadicum.

Magneticum.

Malaëticum.

Mammillare.

Matricale, vel Hyftericum.

Sydenhami.

de Meliloto.

Mercuriale.

five Ceratum de Minio rubrum.

Miraculosum.

è Mucilaginibus.

Nervinum Hoffmanni.

de Nicotiana Le Mort.

Norimbergenfe.

Odontalgicum.

Opodeldoch.

Oxycroceum.

è Plumbo, five Saturninum Mynsichti.

de Ranis Vigonis cum Mercurio.
fine Mercurio.

Gggg

Em-

Emplastrum Regium Burrhi.

sive Ceratum Santalinum, aliàs Incognitum.

Saturnatum, sive è Plumbo Mynfichti.
de Scrophularia.

Spermate Ceti.

Ranarum.

Spleneticum.

Stipticum Crollii.

Stomachicum de Tacamahaca.

Suppedaneum Boerhavii.

Triapharmacum.

ad Vermes.

Vesicatorium.

mitius.

Viride. *Dispens. Argent.*

CLASSIS DECIMA OCTAVA. EMULSIONES.

Emulsio Analeptica.

Anodyna & temperans.

Externi usûs pro Frontali.

Lubricans Diuretica.

Violata Mynfichti.

CLASSIS DECIMA NONA. ENEMATA, SIVE CLYSTERES.

Enema Anodynum & Balsamicum.

Emolliens & Laxans.

Intestina emolliens, aperiens, anodynum.

CLAS-

CLASSIS VIGESIMA. ESSENTIÆ.

Essentia Absinthii composita.
simplex.

Alexipharmaca Stahlîi.

Temperatior , five sim-
plicior Stahlîi.

Amara.

Ambraë Liquida.

Sicca.

Angelicæ.

Anodyna officinalis.

five Laudanum liquidum Sydenhami.

Ant-arthritis I. M. Hoffmanni sine Opio.

Ejusdem cum Opio.

Anti-hydrica Hoffmanni.

Ant-asthmatica & Antihydrica. A.

Alia ejusdem virtutis & usûs. B.

Antiscorbutica.

Balsamica F. Hoffmanni, five Elixir Proprieta-
tis stomachicum , viscerale, tem-
peratum & spirituosum.

Gmelini.

Balsami Peruviani.

Benzoës composita.

simplex.

Cardamomi.

Cardui benedicti.

Carminativa Wedelii.

Castorei.

Carminativa.

Catechu, five Terræ Catechu.

Centaurii minoris.

Cephalica.

Gggg 2

Essen-

Essentia Chinæ chinæ, five Corticis Peruviani simplex.
 Corticum Aurantiorum Spirituosa.
 cum Vino Malvatico.

Cascarillæ.

Culilawan.

Croci.

Vinosa, five Tinctura Croci vinosa.

Dulcis.

Fuliginis Clauderi.

Fumariæ.

Galangæ.

Gentianæ.

Hyperici.

Levisticæ.

Ligni Sassafras composita.
 simplex.

Lignorum.

Lumbricorum terrestrium.

Macis.

Martiatæ aperitiva.

Millefolii.

Millepedum.

Myrrhæ.

Alcalifata.

Pimpinellæ albæ.

Pini.

Populi vulneraria.

Scillæ.

Scordii herbæ.

Serpentariæ Virginianæ.

Spicæ Indicæ.

Stomachica.

Polychresta.

Succini.

Alcalifata.

Terræ Catechu, five Japonicæ.

Theriacalis.

Essen-

Essentia Trāvmatīca W.
 Trīfolīī fibrīnī.
 Valerīanæ composīta.
 Vincetoxīcī.

CLASSIS VIGESIMA PRIMA. EXTRACTA SIMPLICIA & COMPOSITA.

I°. EXTRACTA SIMPLICIA.

Extractum Abrotani.
 Abfinthii.
 Agarici.
 Aloës gummosum.
 Ligni.
 Angelicæ.
 Aristolochiæ Clematitidis rad.
 Longæ.
 Rotundæ.
 Artemisiæ.
 Asari radicūm.
 Bellidis florum.
 Borraginis.
 Bryoniæ.
 Buglossi.
 Calami aromatici.
 Cardui benedicti.
 Mariæ.
 Caryophyllatæ radicūm.
 Castorei.
 Chamædryos.
 Chamæpityos.
 Chamomillæ.
 Cichorii radicūm.

Extractum Cochleariæ.

Colocynthis.

Corticum Carcarillæ.

China chinæ.

Croci.

Cucumeris asinini, five Elaterium.

Enulæ radicum.

Efulæ radicum.

Filicis radicum.

Foliorum Sennæ.

Fumariæ.

Gentianæ radicum.

Guajaci è ligno.

Hederæ terrestris.

Hellebori nigri.

Hyperici è floribus.

Jalappæ.

Iridis Florentinæ.

Nostratis.

Ligni Aloës.

Guajaci.

Lupuli.

Marrubii albi.

Mechoacannæ albæ.

Melissæ.

Menthæ.

Meu.

Myrrhæ gummosum.

Nicotianæ.

Opii aquosum.

Papaveris.

Poconæ.

Pimpinellæ.

Pini è summitatibus.

Plantaginis.

Rhabarbari simplex.

Rutæ.

Extractum

Extractum Sabinæ è summitatibus.

Sarsaparillæ.

Sassafras.

Scordii.

Sennæ foliorum.

Symphyti majoris radicem.

Tanaceti.

Taraxaci radicem.

Tormentillæ radicem.

Trifolii fibrini.

Turpethi.

Verbasci florum.

Veronicæ.

Zedoariæ.

II°.

EXTRACTA COMPOSITA.

Extractum Anodynum.

Catholicum.

Diacarthami.

Liquiritiæ gummosum, five Gluten pectorale.

Martis pomatum.

Panchymagogum.

CLASSIS VIGESIMA SECUNDA.

GELATINÆ,

ET

GLUTINA.

Gelatina Analeptica.

Cornu Cervi citrata.

simplicior.

Gluten Aquaticum, five Sperma ranarum.

Pectorale, five Extractum Liquiritiæ gummosum.

CLASSIS VIGESIMA TERTIA.
 INFUSA,
 ET
 JULAPIA.

Infusum Laxativum Mannagettæ.
 Viennense.

Julapium Rosatum.
 Sambucinum.
 Violarum.

CLASSIS VIGESIMA QUARTA.
 LAPIDES
 PRÆPARATI.

Lapides Cancrorum citrati, &
 præparati, five Oculi Cancrorum.

Lapis Alabaſtri.

Arſenicalis, five Magnes Arſenicalis.

Calaminaris præparatus.

Divinus, five Ophthalmicus.

Hæmatites præparatus.

Hyacinthus.

Infernalis.

five Magnes Arſenicalis.

Martialis, five Globuli martiales.

Medicamentofus.

Nephriticus.

Percarum præparatus.

Prunellæ, five Nitrum tabulatum.

Pumicis.

Specularis præparatus.

Spongiæ.

CLASSIS VIGESIMA QUINTA. LAUDANA.

Laudanum Diureticum, five Urinarium Michaël,
 Hystericum.
 Liquidum Sydenhami, five Essentia Ano-
 dyna Sydenh.
 Opiatum.
 Cydoniatum.

CLASSIS VIGESIMA SEXTA. LIQUAMINA, E T LIQUORES.

Lilium Paracelsi, five Tinctura Metallorum.
 Liquamen florum Verbasci, five Oleum Verbasci.
 five Liquor Myrrhæ, vel Oleum Myrrhæ
 per Deliquium.
 Liquor Anodynus mineralis Hoffmanni.
 Aperitivus, five salinus laxativus.
 Camphoratus.
 Cornu Cervi fuccinatus.
 five Guttæ Anglicanæ Cephalicæ.
 Oleum Myrrhæ per Deliquium.
 Nitri fixi, five Nitrum alcalisatum.
 Oleosus Sylvii, five Sal volatile Oleosum.
 Tartari, aliàs Oleum Tartari per deliquium.
 Spleneticus.
 Terræ foliatæ Tartari.
 Visceralis.
 Vulnerarius mineralis, five Balsamum vulnera-
 rium minerale Dip-
 pelii.

Liquor Vulnerarius vegetabilis, five Balsamum vulnerarium vegetabile
Dippelii.

CLASSIS VIGESIMA SEPTIMA. L O O C H.

Looch ad Asthma, five de Scilla.
de Farfara.

Pulmone Vulpis. }
Sanum & expertum.
Saponatum. *Pharm. Edinb.*

CLASSIS VIGESIMA OCTAVA. MAGISTERIA.

Magisterium, five Materia perlata Antimonii Diaphoretici.

Coralliorum.

Gummi Guttæ, five Gummi Guttæ
præparatum.

five Resina Jalappæ.

Marcafitæ.

Margaritarum.

Matris Perlarum.

Oculorum Cancrorum.

Saturni.

five Resina Scammonii.

CLASSIS VIGESIMA NONA. M A S S Æ.

Massa Liquiritiæ alba, five Pasta Althææ.
Fusca.
pro Fornace odorifera, five fumalis.

CLASSIS TRIGESIMA. MELLA, MUCHARUM, E T PARATA EX MELLE.

Mel Anthosatum.
Despumatum simplex.
Mercuriale.
Rosatum simplex.
solutivum.
Sambuci.
Violarum.
Hydromel simplex.
Mucharum Rosarum.
Oxymel simplex.
Scilliticum.
Oxyfaccharum Scilliticum Londinense, five Syrupus
de Scilla.

CLASSIS TRIGESIMA PRIMA. MIXTURA.

Mixtura simplex alba.
Ludovici.

Mixtura simplex Ordinaria.

Tonico-nervina Stahlii.

CLASSIS TRIGESIMA SECUNDA.

M O R S U L I,

ET

PANIS.

Morsuli ad ardorem ventriculi, vulgo *Sodam.*

Antimoniales Kunckelii.

Imperatoris.

Purgantes.

Rosati, sive Saccharum rosatum tabulatum.
ad Scabiem.

seu Tabulæ strumales.

Contra Vermes.

Panis Cydoniorum cum aromatibus.

sive aromatibus.

CLASSIS TRIGESIMA TERTIA.

O L E A

DESTILLATA.

Oleum Absinthii.

Ammoniacy.

Anethi.

Angelicæ.

Animale Dippelii.

Anisi.

Antimonii, sive Butyrum Antimonii.

Artemisiæ.

Aurantiorum è Corticibus.

Benzoës.

Oleum

Oleum Buxi è ligno.

Calami aromatici.

Camphoræ liquidum, five Butyraceum.

Cardamomi.

Carvi.

Caryophyllorum aromaticorum.

Ceræ.

Chamomillæ.

Chærefolii.

Cinnamomi.

Citri è Corticibus.

Coriandri.

Cornu Cervi.

Corticum Aurantiorum.

Citri.

Cumini.

Foeniculi.

Galbani.

Guajaci è ligno.

Hyssopi.

Juniperi è baccis.

è Lateribus, five Philosophorum rectificatum.

Lavendulæ.

Lauri è baccis.

Ligni Buxi.

Guajaci.

Rhodii.

Santali Citrini.

Sassafras.

Macis.

Majoranæ.

Mastiches.

Melissæ.

Menthæ.

Millefolii.

Myrrhæ.

Oleum Nucis Moschatae.

Origani.

Petræ album.

nigrum.

rubrum.

Philosophorum, five Laterinum rectificatum.

Piperis.

Pulegii.

Rhodii ligni.

Rorismarini.

Rutæ.

Sabinæ.

Salviæ.

Santali Citrini.

Saponis.

Sassafras ligni.

Saturejæ.

Serpilli.

Spicæ.

Succini.

Sulphuris.

Tacamahacæ.

Tanaceti.

Tartari, five Spiritus Tartari simplex.

Fœtidum.

Terebinthinæ.

Terræ.

Thymi.

Vitrioli.

rectificatum.

Zedoariæ.

Zingiberis.

CLASSIS TRIGESIMA QUARTA.
O L E A
COCTA, EXPRESSA, INFUSA,
ET PER
DELIQUIUM PARATA.

I°.

OLEA COCTA.

Oleum Anagallidis.

Anethi.

Cacao, five Butyrum Cacao coctum.

Capparum.

Carminativum.

Chamomillæ.

Cheiri.

Colocynthidis.

Euphorbii.

Florum Sambuci.

Slotani.

Formicarum.

Hyoscyami.

Hyperici.

Lauri è baccis.

Liliorum alborum.

Lumbricorum terrestrium.

Majoranæ.

Mastichinum.

Menthæ.

Momordicæ.

Rosarum.

Rutæ.

Sambuci.

Oleum Scorpionum simplex.

Septem florum.

de Spermate ranarum.

Violarum.

Vulpinum.

II^o.

OLEA EXPRESSA.

Oleum Abfinthii.

Amygdalarum amararum.
dulcium.

Armeniacorum è nucleis.

Avellanarum è nucleis.

Bezoardicum Wedelii.

Cacao, five Butyrum Cacao expreffum.

Cannabinum è feminibus.

Castorei.

Ceraforum è nuleis.

Costinum.

Cucumerum è feminibus.

Cucurbitarum è feminibus.

Erucæ è feminibus.

Foeniculi è feminibus.

Lini.

Melonum è feminibus.

Nicotianæ.

Nucistæ, vel Nucis Moschatæ.

Nucum Juglandium.

Ovorum.

Papaveris è feminibus.

Perficorum è nucleis.

Raphani è feminibus.

Raporum è feminibus.

Ricini è feminibus.

Semenum Cannabis.

Cucumerum.

Cucurbitarum.

Oleum

Oleum Seminum Erucæ.
 Foeniculi.
 Melonum.
 Papaveris.
 Raphani.
 Raporum.
 Ricini.
 Sinapi.

III°.

OLEA PER DELIQUIUM
 PARATA.

Oleum, five Liquor Myrrhæ.
 Liquamen Verbasci florum.
 Tartari.

CLASSIS TRIGESIMA QUINTA.
 PASTÆ. PASTILLI.
 BACILLI. CANDELÆ.

Pasta Althææ.
 Regia stomachalis.
 Pastilli fumales, five Massa ad Fornacem.
 Bacilli ad Fornacem, five Massa ad Fornacem.
 de Liquiritia Albi.
 Citrini.
 Candelæ fumales completæ.
 incompletæ.

CLASSIS TRIGESIMA SEXTA.
 PILULÆ.

Pilulæ Aloephanginæ.
 Aperientes Stahlîi (*extemp.*)

Pars II.

LIII

Pilulæ

Pilulæ Balsamicæ, feu Polychrestæ Beccheri & Stahl
ad exemplar.
 sine extractis Aloës & Hellebori nigri.

Simpliciores.

Cachecticæ (*extemp.*)

de Cynoglossò.

Emanuelis.

Foetidæ minores Sydenhami. (*extemp.*)

de Gummatibus . feu Succis.

Hydropicæ Bontii.

Stahl. (*extemp.**)

Ictericæ. (*extemp.*)

Lucis majores, feu Opticæ.

Martiales Sydenhami.

Mastichinæ.

Mercuriales. (*extemp.*)

Pectorales. (*extemp.*)

Polychrestæ Balsamicæ.

Saponatæ. (*extemp.*)

Scilliticæ Edinburgensium. (*extemp.*)

Starckey, feu Matthiæ.

de Styrace sine Ambra.

Succino auctæ.

Cratonis.

Tartareæ Bontii.

Schroederi.

de Terebinthina.

Travmaticæ. (*extemp.*)

de Tribus Rufi.

CLASSIS TRIGESIMA SEPTIMA.

P R Æ P A R A T A
C H E M I C A.

Æris flores, five

Æs viride crystallifatum.
ustum.

Æthiops Antimonialis.
Mineralis.

Alumen Saccharinum.
Tinctum Mynsichti.
ustum.

Antihecticum Poterii, five Diaphoreticum Joviale.

Antimonium Diaphoreticum Martiale.
simplex.

Arcanum duplicatum, five Nitrum vitriolatum.
Tartari, five Terra foliata Tartari.

Aurum fulminans.

Bezoardicum animale.
Joviale.
Martiale.
Minerale.

Caput mortuum Vitrioli, five Colcothar.

Cauterium potentiale.

Chalybs Sulphure præparatus.

Cinnabaris Antimonii.
Factitia.

Nativa rectificata.

Colcothar, five Caput mortuum Vitrioli.

Cornu Cervi auratum.

Cremor & Crystalli Tartari.

Crocus Martis adstringens.
aperitivus.

Antimonialis Stahlii.

Metallorum.

LIII 2

Crocus

Crocus Solis.

Veneris.

Diacrydium glycyrrhizatum, five cum Liquiritia præparatum.

Sulphuratum.

Diaphoreticum Joviale, five Antihecticum Poterii.

Martiale, five Antimonium diaphoreticum Martiale.

Flores Benzoës.

Salis Ammoniaci martiales.

simplices.

Sulphuris.

Viridis Æris, five Æs viride crySTALLIFATUM.

Globuli, aut Glandes carminativæ.

Bezoardici.

Martiales (*Boules Martiales*)

Moschati albi.

Hepar Antimonii, five Crocus Metallorum.

Sulphuris.

Kermes minerale, five Sulphur. Antimonii rubrum.

Lac Sulphuris.

Virginis.

Magnesia alba.

Materia perlata.

Mercurius dulcis.

præcipitatus albus, five cosmeticus.

ruber.

Viridis.

Sublimatus corrosivus.

Vitæ.

Nitrum alcalifatum, vel fixum, five Liquor Nitri fixi.

Antimoniatum.

CrySTALLIFATUM & depuratum.

Papaverinum.

Perlalum.

Nitrum

Nitrum Saturninum.

Tabulatum, five Lapis Prunellæ.

Violatum.

Vitriolatum, five Arcanum duplicatum.

Panacea Mercurialis.

Phlegma, five Ros Vitrioli.

Plumbum ustum.

Pocula emetica, five scyphi vomitorii.

Regulus Antimonii Martialis.

Medicinalis.

simplex.

Ros Vitrioli, seu Phlegma.

Saccharum lactis.

Saturni.

Sapo tartareus, five corrector Starckeii.

Medicatus.

Scyphi vomitorii, five Pocula emetica.

Solutio Coralliorum.

Matris Perlarum.

Oculorum Cancrorum.

Specificum Jalappinum.

Spongiarum tostio.

Sulphur Antimonii rubrum, five Kermes minerale.

Auratum Antimonii.

Tertiæ præcipitationis.

Suppositoria contra ascarides.

Tartarus chalybeatus.

emeticus.

solubilis, five tartarifatus, *Sal vegetabile dictus.*

vitriolatus.

Tackeni.

Terra foliata Tartari, five Arcanum Tartari.

Vitrioli dulcis, five Vitrioli terra dulcis.

Theriaca Diateffaron. Vid. Electuaria.

Pauperum. Vid. Electuaria.

Turpethum minerale.

Vitriolum Martis.

Pars II.

M m m m

Vitrum

Vitrum Antimonii ceratum.

Hyacinthinum.

CLASSIS TRIGESIMA OCTAVA.
 PRÆPARATA
 SIMPLICITER TALIA.

Præparatum Alcis Cornu.

Alabaſtri.

Ari radicum.

Boli Armenæ.

Chalybis, five Alcohol Martis.

Cinnabaris Antimonii.

factitiæ.

nativæ.

Concharum.

citratum, five acido Citri fa-
 turatum.

Coralliorum alborum.

rubrorum.

Cornu Alcis.

Cervi fine igne.

uſti.

Rhinocerotis.

Cranii humani.

Cretæ albæ.

Cryſtalli montanæ.

mineralis.

Dentium Apri.

Hippopotami.

Eboris fine igne.

uſti, five Spodii.

Gluten aquaticum, five ſperma ranarum.

Gummi Gutta.

Præpa-

Præparatum Hepatis Anguillæ.

Lapidum, five Oculorum Cancrorum.

Mandibularum Lucii piscis.

Margaritarum.

Matris Perlarum.

Citratum, five acido citri
faturatum.

Oculorum, five Lapidum Cancrorum.

citratum, five acido Citri fa-
taturatum.

Pulmonum Vulpis.

Scillæ.

Succini albi.

Testium equi.

Tutiæ.

Ventriculorum Gallinarum.

Ungularum Alcis.

Unicornu fossilis.

marini, five veri.

CLASSIS TRIGESIMA NONA.

P U L P Æ.

Pulpa Cassiæ.

Colocynthis.

Passularum.

Prunorum.

Tamarindorum.

Passulæ laxativæ.

Rhabarbarinæ.

Pruna laxativa.

Pulticula Mannæ.

CLASSIS QUADRAGESIMA. PULVERES COMPOSITI

ET

T R A G E Æ.

Pulvis Absorbens.

Alexipharmacus Camerarii.

ruber.

Anodynus Camerarii.

Ludovici.

Antarthriticus. (*extemp.*)

Antatrophicus.

Anticachecticus. (*extemp.*)

Wedelii. (*extemp.*)

Antispasmodicus, seu ad motus irregulares.

(*extemp.*)

nitrosus.

Contra acredinem.

Bezoardicus Hallensium.

Ludovici, sive Bezoardicum Mar-
tiale.

Cachecticus Quercetani incompletus.

Contra casum. (*extemp.*)

Cephalicus Camerarii cum saccharo.

Contrayervæ compositus.

Cordialis Cellensis.

Cornachinus, sive Comitibus de Warwick.

Dentifricius.

Diaphoreticus. (*extemp.*)

Dysentericus.

ad Dysuriam, sive mitigans Wepferi.

Epilepticus Marchionis.

mirabilis Mynsichti.

Erysipelatodes Wedelii. (*extemp.*)

Pulvis

Pulvis ad Flatus.

Fumalis Haugii.

Odoratus.

Galactopæus.

Hystericus.

Lenitivus tartarifatus. (*extemp.*)

Masticatorius Wepferi.

ad Partum.

Pectoralis resolvens. (*extemp.*)

Præcipitans Stahlii.

Resolvens Stahlii.

compositus.

Scillæ compositus Stahlii.

Sief Album.

Sternutatorius.

Albus, five Elæofaccharum cepha-
licum Camerarii.

Stomachicus Birckmanni.

Strumalis.

Temperans.

ad Tormina Infantum.

Contra Vermes.

Viennensis albus Virgineus diaphoreticus.

Vitæ Imperatoris.

Tragea aromatica Gabelchoveri.

Officinalis.

Granorum Actes.

Ophthalmica.

CLASSIS
QUADRAGESIMA PRIMA.
ROB. ROOB. ROHOB.

Roob Acaciæ vulgaris.

Berberum.

Ceraforum acidorum.

Pars II.

Nnnn

Roob

Roob Cornorum.
 Cydoniorum.
 Cynosbati.
 Ebuli.
 Juniperi è baccis.
 Mororum.
 Nucum.
 Omphacii.
 Ribium.
 Rubi Idæi.
 Sambuci è baccis.
 Simplex, feu Sapa.

CLASSIS
 QUADRAGESIMA SECUNDA.
 ROTULÆ,
 SEU
 TABELLÆ ET SUCCOLADÆ.

Rotulæ Berberum.
 Diaireos.
 Manus Christi, five Saccharum perlatum.
 Contra Vermes.
 Succolada composita.
 Regia.
 simplex.

CLASSIS
 QUADRAGESIMA TERTIA.
 SACCCHARA.

Saccharum clarificatum.
 Glycyrrhizatum.
 Lactis.

Saccharum

Saccharum Perlatum, five Rotulæ manus Christi.
 Rosatum tabulatum.
 Saturni crySTALLIFATUM.

C L A S S I S QUADRAGESIMA QUARTA. SALIA VARIA.

Sal Abfinthii.

Anglicum volatile ficcum.

Aperitivum extemporaneum Hoffmanni.

Cinerum clavellatorum.

Coralliorum.

Cornu Cervi volatile.

Digestivum, seu febrifugum Sylvii.

Essentiale Acetofellæ.

Acetofæ.

Febrifugum.

Sylvii, seu digestivum.

Lapidum, seu Oculorum Cancrorum.

Lumbricorum volatile.

Matris Perlarum.

Mirabile Glauberi.

Oculorum, seu Lapidum Cancrorum.

Polychrestum Lemmeri è Nitro & Sulphure.
 de Seignette.

Sedativum Hombergii.

Succini volatile.

Tartari fixum.

Volatile.

Tackénii.

Vegetabile, five Tartarus solubilis.

Volatile oleosum, five Liquor oleosus Sylvii.

Urinæ.

C L A S S I S
QUADRAGESIMA QUINTA.
S P E C I E S
AROMATICÆ, ALTERANTSE
E T
PURGANTES.

Species Diambrae.
Dianifi.
Dianthos.
Aromaticæ Caryophyllatæ.
Rosatæ completæ.
incompletæ.
de Hyacintho.
Diajalappæ Mynsichti.
Imperatoris pro Mosulis, &
Trageis.
Diaireos simplices.
Diatragacanthæ.

C L A S S I S
QUADRAGESIMA SEXTA.
S P E C I E S
P R O
D E C O C T I S,
E T
EPITHEMATIBUS.

Species Decocti antinephritici, five nephro-catharti-
cum Foresti.
Avenæ, five Bromii.
Carminativi.
Cephalici pro Epithemate.

Species

Species Decocti Emollientis.

Florum & fructuum.

ad Gangrænam.

pro Gargarismate adstringente.

Emolliente.

Lignorum.

Nigri.

Pectoralis.

pro Potu Infantum.

Ptifana Regia.

Vino Absinthiaco.

Vulnerarii.

Cephalicæ pro Cucuphis.

pro Epithemate cordis & pulsuum.

Tabaci pro Fumo Camerarii.

Officinales.

C L A S S I S
QUADRAGESIMA SEPTIMA.
SPIRITUS SIMPLICES
E
REGNO ANIMALI,
E T
V E G E T A B I L I.

Spiritus Angelicæ.

Anisi.

Anthos, five Rorismarini.

Ceraforum nigrorum.

Cochleariæ.

Cornu Cervi.

Corticum Aurantiorum.

Citri.

Croci.

Cydoniorum.

Ebuli.

Pars II.

Oooo

Spiritus

Spiritus Formicarum.

Fragorum.

Fuliginis.

Guajaci è ligno.

Juniperi è baccis.

Lavendulæ.

Liliorum convallium.

Lumbricorum vinosus.

volatilis.

Melissæ.

Menthæ.

Panis.

Rorismarini, five Anthos.

Rosarum abstractitius.

per fermentationem.

Pomorum redolentium.

Sambuci è baccis.

florum.

Serpilli.

Tartari simplex.

volatilis, five Sal Tartari volatile.

Terebinthinæ.

Trifolii fibrini.

Vini rectificatus.

simplex.

Urinæ.

C L A S S I S QUADRAGESIMA OCTAVA. SPIRITUS COMPOSITI.

Spiritus Balsami Peruviani juxta Hoffmannum.

Bezoardicus Buffii.

Carminativus de tribus.

Castorei Londinensis.

Cornu Cervi ad usus externos.

Spiritu

Spiritus Formicarum compositus, five Aqua Magnanimi-
mitatis.

Mastichinus.

Matricalis.

Nervinus ad mentem Hoffmanni.

Salis Ammoniaci Anisatus.

Aromaticus *Pharm. Edinburg.*

Succinatus, five Effentia fuc-
cini Spiritu Salis Am-
moniaci extracta.

Volatilis vinosus.

urinofus.

Theriacalis.

Camphoratus.

Vini Camphoratus.

Tartarifatus.

C L A S S I S
QUADRAGESIMA NONA.
S P I R I T U S
REGNI MINERALIS,
ET
CLYSSUS ANTIMONII.

Spiritus Æruginis, five viridis Æris & Veneris.

Carminativus de tribus.

Nitri acidus.

Concentratus, seu fumans.

Dulcis.

Salis coagulatus.

communis acidus.

concentratus, five Glauberianus.

Salis communis dulcis.

Sulphuris per Campanam.

aliâ methodo.

O o o o 2

Spiritus

Spiritus Vitrioli coagulatus.
 dulcis, five Liquor anodynus.
 simplex.
 rectificatus.

Clyffus Antimonii.

CLASSIS QUINQUAGESIMA.
 SUCCI DEPURATI,
 ET
 DEFÆCATI
 PRO
 ROOB & SYRUPIS.

Succus Acetofellæ.
 Acetofæ.
 Bellidis.
 Berberum.
 Betonicæ.
 Borruginis.
 Bryoniæ radicum.
 Buglossi.
 Cardui benedicti.
 Ceraforum acidorum.
 Citri.
 Cochleariæ.
 Cydoniorum.
 Ebuli granorum.
 Eryfimi.
 Fragorum.
 Fumariæ.
 Granatorum acido - dulcium.
 Kermes granorum.
 Mercurialis.
 Mororum.
 Myrtillorum.
 Nicotianæ.

Succus

Succus Nucum viridium.
 Omphacii.
 Pimpinellæ.
 Plantaginis.
 Polygoni.
 Ribium.
 Rosarum.
 Rubi Idæi.
 Sambuci è baccis.
 Scabiosæ.
 Sedi majoris, vel sempervivi.
 Spinæ cervinæ.
 Symphyti majoris radicum, & foliorum.
 Tussilaginis.
 Uvarum albarum.

C L A S S I S
 QUINQUAGESIMA PRIMA.
 SYRUPUS SIMPLICES,
 S E U
 COMPOSITI.
 I°. SIMPLICES.

Syrupus Acaciæ florum.
 Acetofellæ.
 Acetofæ.
 Acetositatis Citri.
 de Agresta.
 Ammoniaco.
 Aurantiorum è corticibus.
 Bellidis.
 Berberum.
 Betonicæ.
 Borraginis.
 Brassicæ rubræ.
 Bryoniæ.
 Buglossi.
 Capillorum Veneris Monspeliens.

Pars II.

P p p p

Syrupus

Syrupus Cardui benedicti.

Cascarillæ è Corticibus.

Centaurii minoris.

Ceraforum acidorum.

Chamomillæ.

Cinnamomi.

Citri è toto.

Cochleariæ.

Contrayervæ simplex.

Corticum Aurantiorum.

Cascarillæ.

Citri.

Ligni Sassafras.

Croci.

Cydoniorum.

Emeticus simplex.

Enulæ, five Helenii.

Farfaræ, five Tussilaginis è floribus.

Fragorum.

de Fumaria.

Granatorum.

Hederæ terrestris.

Helenii, five Cnulæ.

Hyperici.

Ligni Sassafras è corticibus.

Mastichinus.

Menthæ.

Melissæ.

Mororum.

Myrtillorum.

Nucistæ.

Papaveris albi.

erratici.

Paralyseos florum, five Primulæ veris.

Perficorum è floribus.

Poeoniæ florum.

Ribium.

Rosarum Siccarum.

simplex.

Rubi Idæi.

Scordii.

Sedi majoris, five sempervivi.

Syrupus

Syrupus Sulphuris, five Arcanum Bechicum Willisii.
 Tussilaginis, five Farfaræ florum.
 Tunicæ florum.
 Veronicæ.
 Violarum.

II°. C O M P O S I T I.

Syrupus de Absinthio.
 Althæa Fernelii.
 Artemisia.
 Balsamicus.
 Capillorum Veneris.
 Cardiacus.
 de Cichorio cum Rhabarbaro.
 Contrayervæ.
 Corticis Peruviani.
 Diacodion, five de capitibus Papaveris, seu
 Diacodium liquidum Montani.
 Crocatum.
 Domesticus, five de Spina cervina.
 Emeticus Angeli Salæ.
 de Eryfimo Lobelii.
 Glycyrrhizæ.
 Granorum Kermes.
 Hyssopi.
 de Jujubis.
 Liquiritiæ, five Glycyrrhizæ.
 de Manna laxativus.
 Mercurialis, five Prophylacticus.
 de Musco querno ad Tussim convulsivam.
 Nicotiana.
 Rhabarbari chalybeatus.
 de Rhabarbaro Deodati.
 Rorellæ.
 Rosarum solutivus.
 de Scilla, five Oxysaccharum Scilliticum
 Londinense.
 Stoechade.

Syrupus è Symphyto Fernelii.
Violarum solutivus.

CLASSIS

QUINQUAGESIMA SECUNDA.

TINCTURÆ.

Tinctura Anodyna, five Essentia Anodyna.

Antimonii acris Hoffmanni.

Tartarifata.

Antiphthifica Gramanni.

Aquilegiæ florum.

Aromatica Londinensis.

Asæ foetidæ.

dulcis, five Essentia Benzoes composita.
simplex.

Bellidis florum.

Bezoardica officinalis.

Cantharidum. *Pharm. Edinburg.*

Coralliorum.

Castorei, five Essentia Castorei.

Croci, five Essentia Croci.

Vinosa.

Gingivalis balsamica.

Hellebori composita, *obsoleta.*

Laccæ.

Martis adstringens.

aperitiva, five Aroph Paracelsi.

tartarifata Ludovici.

cum Arcano Tartari, five

è Vitriolo Zwelferi.

Coerulea Etneri.

Cydoniata.

Helleborata.

pomata.

Tinctura

Acris.

T R O C H I S C I.

Albi Rhazæ.

Alhandal.

Aliptæ Moschati.

Alkekengi cum Opio.

fine Opio. *Obsoleti.*

Alkermes completi.

incompleti.

de Ambra.

Anthelmintici, five Hermetici Scretæ.

Bechici albi.

citrini.

majores.

nigri.

rubri.

Trochisci de Carabe.

Catechu, five Muscerdæ.

de Cremore Tartari.

Escharotici.

Galliæ Moschataæ.

Hermetici, five anthelmintici Scretæ.

de Myrrha.

Scilla.

Sublinguales ad Prophylaxin à contagio
Gaubii.

de Terra Catechu ad Sputum cruentum.

Vipera.

C L A S S I S QUINQUAGESIMA QUARTA. V I N A.

Vinum Ceraforum.

Cydoniorum.

Emeticum, five Aqua benedicta Rulandi.

Granatorum.

Hippocraticum.

Ribium.

Rubi Idæi.

C L A S S I S QUINQUAGESIMA QUINTA. U N G U E N T A.

Unguentum Ægyptiacum.

Agrippæ.

Alabastrinum.

Album Camphoratum.
simplex.

Unguentum

Unguentum Albuminum.

Althææ.

ad Ambusta.

Anodynum.

Antatrophicum.

Apostolorum.

de Arthanita.

Aureum.

Basilicum.

Calendulæ florum.

Carminativum.

Clysmaticum.

Comitiffæ.

Defensivum, aliàs *Balsamum universale dictum.*

Digestivum.

Digitalis.

Enulatum.

Epispasticum.

mitius,

Florum Naphæ, five Pomatum.

Fuscum.

Wurzii, five Purpureum.

Griseum, five Neapolitanum.

de Hyoscyamo.

Jasmini.

Infrigidans Galeni.

Lavendulæ.

de Linaria.

Liquiritia.

Lithargyrio, aliàs Nutritum.

Majoranæ.

Malvæ.

Martiatum.

de Minio camphoratum, aliàs Rubrum.

Mundificans Stahlî.

Neapolitanum, five Griseum.

Nervinum.

Unguentum de Nicotiana.

Nihili ad Oculos.

Nutritum, five de Lithargyrio.

Ophthalmicum Hans Sloane.

Rubrum, five Balsamum
ophthalmicum
rubrum.

ad Paralyfin.

Pectorale.

Pediculorum.

Pomatum, five florum Naphæ *Phar. Paris.*

Diapompholygos.

Populeum.

Purpureum, seu fuscum Wurzii.

Resumptivum.

Rosatum.

simplex.

Rubrum ad labia oris.

Potabile.

Santalinum.

Saponatum.

ad Scabiem.

Zelleri.

Somniferum.

Spleneticum.

Stomachale.

ad Tabida membra.

Contra Vermes.

Viride potabile.

de Uvis.





INDEX

I.

MORBORUM ET CURATIONUM.

A.

ABORTUM PROHIBENTIA, FOETUM ROBORANTIA.

Externè.

Unguentum Comitissæ.
Balsamum hystericum.

Internè.

Aqua sive Balsamum Embryonum.
Carbunculi.
Elixir vitæ Mulierum.
Syrupus Cydoniorum.

ABSCESSUS. vid. SUPPURATIO.

*

ACIDUM ABSORBENTIA,
CORRIGENTIA.

Antimonium diaphoreticum simplex.
Aqua calcis vivæ.
epileptica puerorum.
Bezoardicum martiale.
Chalybs præparatus, sive alcohol martis.
Sulphure præparatus.
Conchæ citratæ.

Pars II.

Conchæ præparatæ.
Corallia alba præparata.
rubra præparata.
Cornu cervi philosophicè præparatum.
ustum.
Creta alba præparata.
Crocus Martis aperitivus.

Antimoniatus
Stahlîi.

Decoctum amarum.
Ebur philosophicè præparatum.
ustum album, sive Spodium.
Magnesia alba.
Mater Perlarum præparata.
Oculi Cancrorum, & chelæ.
Pulvis absorbens.
contra acredinem.
præcipitans Stahlîi.
Rotulæ manus Christi, sive Saccharum
perlatum.
Sal Tartari fixum.
Spiritus Fuliginis.
Tartari oleum per deliquium.
Tinctura Tartari.
Trochisci adversus acidum ventriculi.
Testæ ovorum præparatæ.
Unicorum fossile.
verum.

R r r r

ABSTER.

A B S T E R G E N T I A. vid. Syrupus Myrtillorum.
D E T E R G E N T I A. è Rosæ ficcis.
de Symphyto Fernelii.
Granatorum.

*

ADSTRINGENTIA.

Externæ.

Acetum Saturni.
Colcothar.
Emplastrum defensivum Würzii.
rubrum Wep-
feri.
Diapalma, aliàs Diachal-
citeos.
de Spermate ranarum.
Lapis Calaminaris præparatus.
Hæmatites præparatus.
Hyacinthi præparatus.
Oleum Terebinthinæ destillatum.
Saccharum Saturni.
Species decocti pro gargarismate ad-
stringente.
Unguentum Comitissæ.

Internæ.

Chalybs præparatus, five Alcohol mar-
tis.
Sulphure præparatus.
Conditum Cydoniorum, five Marme-
lada, Miva.
Confectio de Hyacintho.
Conserva florum Bellidis.
Rosarum rubrarum vitriolata.
Cornu cervi ustum.
Creta alba præparata.
Crocus Martis adstringens.
Decoctum traumaticum.
Diacydonium simplex.
Electuarium Diascordium Fracastorii.
Mithridatium Damocratis.
Extractum Plantaginis.
Symphyti majoris radicum.
Tormentillæ radicum.
Liquor vulnerarius mineralis, five Bal-
samum vulnerarium minerale Dip-
pelii.
Roob Omphacii.
Cornorum.
Ribium.
Spiritus Vitrioli simplex.
Tinctura Martis adstringens.
aperitiva, five Aroph
Paracelsi.
Cydoniata.
Pomata.
Vitriolum Martis.
Syrupus Berberum.
de Agresta.
Cydoniorum.

Species de Hyacintho.

AGRYPNIA, PERVIGILIUM,
VIGILIÆ NIMIÆ,
INSOMNUS.*Externæ.*

Aqua Paregorica.
Emplastrum Suppedaneum Boerhaave.
Balsamum Somniferum.

Internæ.

Sulphur Vitrioli anodynum, five Ens
Veneris Boylei.

ALEXIPHARMACA, ALEXITERIA,
BEZOARDICA.

Acetum bezoardicum.
Aqua prophylactica Sylvii.
Zedoariæ cum vino.
Cornu cervi citrata.
epidémica Londinensis.
theriacalis simplex.
composita.
typhorum cervi composita.
Bezoardicum animale.
minerale.
Conditum Eaulæ.
Cornu cervi philosophicè præparatum.
Crocus solis.
Ebur philosophicè præparatum.
Electuarium Diascordium Fracastorii.
Mithridatium Damocratis.
Theriaceæ Andromachi.
Elixir prophylacticum amarum.
stomachicum spirituosum Hoffm.
Essentia alexipharmaca Stahlî.
Angelicæ.
Benzoes simplex.
Myrrhæ.
alcalifata.
Pimpinellæ albæ.
Theriacalis.
Scordii.
Serpentariæ Virginianæ.
Spicæ Indicæ.
Valerianæ composita.
Vincetoxici.
Extractum Rutæ.
Scordii.
Angelicæ.
Zedoariæ.
Pimpinellæ.
Croci.

Globuli

Globuli bezoardici.
 Liquor anodynus mineralis Hoffm.
 Mixtura simplex alba.
 Ludovici.
 Ordinaria.
 Chelæ, Lapides, Oculi Cancrorum ci-
 trati.
 Oleum destillatum Rutæ.
 Angelicæ.
 Calami aromatici.
 Zedoariæ.
 Orvietanum.
 Pulvis alexipharmaeus ruber.
 Camerarii.
 Pulvis bezoardicus Hallensis.
 Diaphoreticus (*extemp.*)
 Roob Ebuli.
 Juniperi.
 Sambuci.
 Spiritus Angelicæ.
 Bezoardicus Bussii.
 Ebuli.
 Sambuci è baccis.
 floribus.
 Fuliginis.
 Theriacalis.
 Syrupus Cardui benedicti.
 Contrayervæ compositus.
 simplex.
 Corticum Citri.
 Crocii.
 Granorum Kermes.
 Scordii.
 Theriaca Diatesaron.
 Tinctura bezoardica officinalis.
 Rhabarbari composita.

ALVI FLUXUS, DIARRHOEA.

Externæ.

Emplastrum de Tacamahaca.
 Oleum Absinthii expressum.
 Mastichinum coctum.
 Unguentum stomachale.

Internæ.

Aqua Mastichinæ.
 Bolus Armena.
 Conditum Cydoniorum, five Marme-
 lada, Miva.
 Confectio de Hyacintho.
 Conserva Menthæ.
 Cornu cervi ustum.
 Crystallus montana præparata.
 Decoctum album.
 Diacydonium simplex.
 compositum aromati-
 cum.
 Electuarium Diascordium Fracastorii.
 Mithridatum Damocratis.

Electuarium Theriacæ Andromachi.
 Elixir acidum Dippelii.
 stomachicum Spirituosum Hoff-
 manni.
 Essentia Populi vulneraria.
 Terræ Catechu.
 travmatica.
 Extractum Menthæ.
 Oleum Nucis Moschatae expressum.
 Panis Cydoniorum.
 Pulvis Dysentericus.
 resolvens compositus.
 Roob Cornorum.
 Cynosbatos.
 Species Diatragacanthæ Frigidæ.
 Syrupus Cydoniorum.
 Myrtillorum.
 Nucistæ.
 Rhabarbari chalybeatus.
 Rosarum siccarum.
 è Symphyto Fernelii.
 Tinctura Martis adstringens.
 Trochisci de Carabe.

AMBUSTA, INFLAMMATIONES.

Aqua vulneraria.
 Calcis vivæ.
 Saphirina.
 Balsamum Sulphuris Rulandi.
 Emplastrum de Minio rubrum.
 Saponatum Barbette.
 Saturninum Mynsichti.
 de Spermate ranarum.
 Verbasci.
 Gluten aquaticum, five sperma rana-
 rum.
 Species decocti ad gangrænam.
 Unguentum album camphoratum.
 simplex.
 albuminum.
 ad ambustâ.
 Calendulæ florum.
 defensivum.
 de Lithargyrio, aliàs nu-
 tritum.
 Minio camphoratum,
 aliàs rubrum.
 Populeum.

ANALEPTICA, RESTAURANTIA.

Externæ.

Spiritus croci.
 nervinus ad mentem Hoffm.

Internæ.

Aqua Ceraforum nigrosum.
 Cinnamomi vinosa.
 Cornu cervi citrata.

Aqua Panis.
 Confectio Alkermes.
 Cinnamomi regia.
 Diacydonium compositum aromaticum.
 Elæosaccharum Cardiacum.
 Cinnamomi.
 Electuarium Diafatyrium.
 Emulsio analeptica.
 Essentia Ambræ liquida.
 ficca.
 dulcis.
 Extractum ligni Aloes.
 Gelatina analeptica.
 Cornu cervi citrata.
 Pulvis cordialis Zellenfis.
 Spiritus Balsami Peruviani juxta Hoffmannum.
 Formicarum.
 Syrupus Cinnamomi.
 Syrupus Citri è toto.
 Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Fragorum.
 Granatorum.
 Granorum Kermes.
 Rubi Idæi.
 Tunicæ florum.

A N A S A R C A.

Aqua Millepedum.
 Electuarium antihydopicum.
 Regulus Antimonii medicinalis.

ANGINA, ET EJUS SPECIES.

Externæ.

Emplastra è Meliloto.
 de Spermate Ceti.
 alia, præter fomenta aut cataplasmata emollientia aut resolventia.
 Enema emolliens & laxans.
 Oleum Rosatum.
 Sal volatile oleosum, five liquor oleosus Sylvii.
 Urinæ.
 Spiritus Cornu cervi.
 Fuliginis.
 Salis Ammoniaci volatilis.
 Species decocti pro gargarismate emolliente.
 Roob Nucum.

Internæ.

Gelatina Cornu cervi.
 Syrupus Mororum.
 è succo Citri.
 Rubi Idæi &c.

ANIMI DELIQUIUM, LIPOTHYMIA, SYNCOPE.

Externæ.

Acetum aromaticum, five odoratum.
 Rutæ.
 Aqua odorifera.
 Melissæ Spirituosa composita.
 Spiritus Lavendulæ.

Internæ.

Acetum.
 Aqua Cinnamomi vinosa.
 Anhaltina.
 apoplectica spirituosa.
 Cordialis Cinnamomi.
 Hungarica.
 Cardiaca officinalis.
 perlata.
 Balsamum vitæ.
 Diacydonium compositum aromaticum.
 Elixir vitæ Matthioli.
 Mulierum.
 Oleum corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Species Dianthos.
 Spiritus Pomorum redolentium.
 Sambuci è baccis.
 Borraginis.
 Buglossi.
 Vinum Hippocraticum.

ANODYNA, PAREGORICA, DOLORES SEDANTIA.

Externæ.

Emplastrum Anodynum.
 Catarrhale.
 Enema Anodynum & balsamicum.
 ejusdem virtutis Fuller.
 Oleum laterinum, five philosophorum.
 Terebinthinæ.
 Chamomillæ.
 Cheiri.
 Florum Slotani.
 Hyperici.
 Liliorum alborum.
 Lumbricorum terrestrium.
 Nucis Moschatæ expressum.
 Papaveris.
 Septem florum.
 Verbasci.
 Hyoscyami.
 Violarum.
 Sal volatile Urinæ.
 Unguentum Anodynum.
 de Hyoscyamo.
 Populeum.

Internæ.

Interne.

Elæosaccharum Nucis Moschatae.
 Electuarium Dilaſcordium Fracaſtorii.
 Mithridatium Damocratis.
 Emulſio Anodyna.
 Effentia Anodyna officinalis.
 vid. Laudanum li-
 quidum Syden-
 hami.
 Caſtorei Carminativa,
 Crocii.
 Extractum Anodynum.
 Angelicae.
 Crocii.
 Liquor Anodynus mineralis.
 Mixtura ſimplex alba.
 Ludovici.
 Oleum animale Dippelii.
 Nucis Moschatae deſtillatum.
 exprefſum.
 Cerae.
 Tacamahacae.
 Papaveris.
 Pilulae de Cynogloſſo.
 Starckey.
 Pulvis abſorbens.
 anodynus Camerarii.
 Ludovici.
 Sal ſedativum Hombergii.
 Spiritus Nitri dulcis.
 Sambuci florum.
 Serpilli.
 Theriacalis.
 Syrupus Croci.
 Diacodion Crocatum.
 Papaveris albi.
 Pœoniae è floribus.
 Tinctura Martis aperitiva, ſive Aroph
 Paracelli.
 ANOREXIA. vid. APPETITUS
 PROSTRATUS.

*

ANTHELMINTICA, VERMES
 NECANTIA.

Externe.

Emplaſtrum ad vermes.
 Oleum Colocynthis.
 Rutae.
 Suppoſitorium contra aſcarides.
 Unguentum de Arthanita.
 contra vermes.

Interne.

Æthiops Antimonialis.
 Conditum Enulae.
 Pars II.

Confectio feminis Cinae.
 Conſerva florum Centaurii.
 Abſinthii.
 Mithridatium Damocratis.
 Elixir prophylacticum amarum.
 Proprietatis cum Rhabarbaro.
 Effentia Abſinthii compoſita.
 ſimplex.
 amara.
 Centaurii minoris.
 Gentianae.
 Martis aperitiva.
 Myrrhae.

alcalifata.
 Extractum Abſinthii.
 Abrotani.
 Cardui benedicti.
 Centaurii minoris.
 Marrubii albi.
 Tanaceti.
 Gentianae.
 Myrrhae.

Morſuli contra Vermes.
 Oleum deſtillatum Abſinthii.
 Tanaceti.
 Zedoariae.

Pulvis contra Vermes.
 Rotulae contra Vermes.
 Syrupus Bryoniae.
 Hyperici.
 Scordii.
 Trochiſci anthelmintici, ſive Hermetici
 Scretæ.

ANTHRACES PESTILENTIALES.

Magnes arſenicalis.

ANTISPASMODICA, CONTRAC-
 TIONES ET SPASMOS IN-
 HIBENTIA, ANTEPI-
 LEPTICA.

Externe.

Acetum hyſtericum.
 Emplaſtrum Saponatum Barbette.
 de Galbano crocatum
 Mynſichti.
 Oleum Terebinthinæ deſtillatum.
 Florum Slotani.
 Lumbricorum terreſtrium.
 Spiritus Vini.
 Liliorum convallium.
 Lumbricorum volatilis.

Interne.

Aqua Liliorum Convallium.
 Cum vino.

- Aqua Animalis, vel hippenterorum, Conserva Beccabungæ.
 five destillatum equinum. Millepedum.
 Hysterica. Spagyrica.
 Epileptica Langii. Crocus Martis aperitivus.
 Puerorum. Antimoniatus
 ad tormina infantum. Stahlii.
 Cornu cervi philosophicè præparatum. Decoctum amarum.
 Ebur philosophicè præparatum. antifebrile.
 ustum album, five Spodium. Pini.
 Elixir vitæ Matthioli. Electuarium chalybeatum.
 Vitrioli Mynsichti. Elixir aperitivum Clauderi.
 Essentia antarthritica cum opio. pectorale Wedelii.
 five opio. prophylacticum amarum.
 Castorei Carminativa. Extractum Chamæpityos,
 Extractum Chamomillæ. Cichorii.
 Castorei. Filicis.
 Pœoniæ. Veronicæ.
 Lapis Prunellæ, five Nitrum tabulatum. Liquor aperitivus, five Salinus laxati-
 Liquor anodynus mineralis. vus.
 Cornu Cervi succinatus. Lumbrici terrestres præparati.
 albus. Millepedes præparati.
 Lumbrici Terrestres præparati. Oleum destillatum Artemisiæ.
 Millepedes præparati. Myrrhæ.
 Nitrum Crystallisatum. Terebinthinæ.
 Oleum animale Dippelii. Pilulæ aperientes Stahlii (*extemp.*)
 Buxi è ligno. Sal Tartari Volatile.
 Galbani. Tackeenii.
 Cacao, five Butyrum Cacao Sapo Medicatus.
 coctum, vel expressum. Spiritus Juniperi è baccis.
 Pulvis antispasmodicus, five ad motus Salis coagulatus.
 irregulares. Vitrioli coagulatus.
 antispasmodicus nitrosus. Tartarus vitriolatus.
 Cephalicus Camerarii. Tackeenii.
 Epilepticus Marchionis.
 mirabilis Mynsichti.
 Syrupus Pœoniæ è floribus.
 Sal Sedativum Hombergii.
 Spiritus Bezoardicus Bussii.
 Carminativus de tribus.
 Cornu cervi.
 Succinum album præparatum.
 Unicornu marinum præparatum.
 Ungula Alcis præparata.

A P E R I E N T I A.

- Aqua Calcis vivæ.
 animalis, vel Hippenterorum,
 five destillatum equinum.
 Millepedum.
 Arcanum duplicatum, five Nitrum Vi-
 triolatum.
 Tartari, five Terra foliata
 Tartari.
 Chalybs præparatus, five alcohol Mar-
 tis.
 Sulphure præparatus.
 Conditum Cichorii.
 Eryngii.
 Confectio feminis Sinapis.
 Conserva Cichorii florum.

A P H O N I A, L O Q U E L Æ
A B O L I T I O.

- Aqua Liliorum Convallium cum vino.
 Emplastrum vesicatorium.
 Pulvis masticatorius Wepferi.
 Sternutatorius albus, five E-
 læosaccharum Cephalicum
 Camerarii.
 Syrupus de Eryfimo Lobelii.

APHRODISIACA, VENEREM
STIMULANTIA.

- Aqua Magnanimitatis.
 Conditum Eryngii.
 Electuarium Diasatyrum.
 Essentia Ambræ liquida.
 Oleum feminis Erucæ.
 Spiritus Formicarum.

APHTHÆ, ULCERA ORIS ET
FAUCIUM.

- Aqua Mellis.
 Decoctum Malvæ.
 Raparum.
 Electuarium

Electuarium de Manna.
Species Emollientes.
Decocti pro gargarismate.
Gelatina Cornu cervi simplicior.
Oleum Myrrhæ per deliquium.
Roob Mororum.
Nucum.
simplex, seu Sapa.
Spiritus Cochleariæ.
Syrupus Mororum.
Paralyseos, five Primulæ veris.
Rosarum simplex.
Sedi Majoris, five Sempervivi.
Violarum.

APOPHLEGMATICA.

Errhina omnia.
Pulvis Masticatorius.
Tinctura odontalgica Maur. Hoffmanni.

APOPLEXIA, EJUSQUE SPECIES.

Externæ.

Balsamum apoplecticum.
Cephalicum.
Succini.
Vitæ.
Emplastrum suppedaneum Boerhaavii.
vesicatorium.
Enemata.
Sal volatile Cornu cervi.
oleosum Sylvii.
Succini.
Species pro cucuphis.
Spiritus Lumbricorum volatilis.
Salis Ammoniaci volatilis.
Syrupus emeticus.
Pulvis sternutatorius.
albus, five Elæo-
saccharum Ce-
phalicum Ca-
merarii.

Internæ.

Aqua Anhaltina.
apoplectica spirituosâ.
minus talis.
benedicta Serpilli.
Carbunculi.
Cephalica Caroli V.
Melissæ spirituosâ Carmelitarum.
Salviæ composita.
Conserva Primulæ veris.
Elæosaccharum Cinnamomi.
Succini.
Essentia Ambræ liquida.
Sicca.
Castorei.
Corticum Aurantiorum.

Essentia Succini.
Extractum Castorei.
Crocii.
Zedoariæ.
Liquor Cornu cervi succinatus.
Mel Anthosatum.
Oleum destillatum Anthos, five Ro-
rismarini.
Anethi.
Cinnamomi.
Lavendulæ.
Ligni Rhodii.
Melissæ.
Nucis Moschatae.
Rosarum.
Thymi.
Succini.

Syrupus Betonicæ.
Paralyseos florum.
de Stoechade.
Veronicæ.
Pœoniæ.
Trochisci Alkermes completi.

APOSTEMATATA.

Balsamum Sulphuris anisatum.
Vid. ULCERA.

APPETITUS PROSTRATUS,
ANOREXIA.

Internæ.

Aqua Corticum Aurantiorum.
cum vi-
no.
Citri.
Cordialis Cinnamomi.
Mastichina.
Zedoariæ cum vino.
Conditum Corticum Aurantiorum.
Citri.
Decoctum amarum.
Elæosaccharum Corticum Aurantiorum.
Citri.
Electuarium baccarum Lauri.
Elixir aperitivum Clauderi.
Proprietatis dulce.
fine acido Boerhaa-
vii.
cum acido Boerhaa-
vii.
Stomachicum viscerale tempera-
tum.
Vitrioli Mynsichti.
Essentia Macis.
Spiritus Salis dulcis.
Tinctura Martis aperitiva Tartarifata
Ludovici.
Stomachica.
S s s s 2
Vinum

Vinum Hippocraticum.

ARDOR VENTRICULI. Vid.
SODA.

*

ARTHRITIS, MORBUS ARTICULARIS.

Externè.

Aqua Anhaltina.

Paregorica.

Emplastrum Antipodagricum.

Miraculosum.

Nervinum Hoffmanni.

Essentia carminativa.

Oleum laterinum, sive Philosopho-
rum.

Saponis.

Sapo medicatus.

Spiritus Lumbricorum vinosus.

Internè.

Æthiops Antimonialis.

Aqua florum omnium.

Animalis, seu Hippenterorum,
sive destillatum Equinum.

Millepedum.

Arcanum Tartari, sive terra foliata
Tartari.

Bezoardicum animale.

Decoctum diætetikum Sydenhami.

Pini.

Elixir acidum Dippelii.

Essentia antarthritica cum opio.
sive opio.

Ligni Sassafras composita.

Lumbricorum Terrestrium.

Pini.

Extractum Pini.

Ligni Guajaci.

Liquor camphoratus.

Terræ foliatæ Tartari.

Lumbrici terrestres præparati.

Morsuli Antimoniales Kunckelii.

Pulvis antarthriticus.

Syrupus domesticus, sive de Spina Cer-
vina.

ASTHMA, RESPIRATIO DIFFICI- LIS, ANHELOSA.

Internè.

Aqua asthmatica.

benedicta Serpilli.

Millepedum.

Balsamum Sulphuris anisatum.

Conditum Enulæ.

Confectio seminis Foeniculi.

Conserva Millepedum.

Elæosaccharum spermatis Ceti.

Electuarium antihydopicum.

Elixir pectorale Wedelii.

Essentia antarthritica cum opio.
sive opio.

Millepedum.

Scillæ.

Extractum Chamæpityos.

Marrubii albi.

Zedoariæ.

Ireos Florentinæ.

nostratis.

Scordii.

Trifolii fibrini.

Flores Benzoës.

Looch ad Asthma, sive de Scilla.

Oxymel Scilliticum.

Passa Althææ.

Pilulæ Pectorales.

Scilliticæ.

Pulvis Pectoralis resolvens.

Scilliticus compositus Stahlîi.

Syrupus de Ammoniaco.

Balsamicus.

Brassicæ rubræ.

Hyssopi.

de Nicotiana.

Rorellæ.

de Scilla, sive Oxysaccharum
scilliticum Londinense.

Sulphuris, sive Arcanum be-
chicum Willisii.

ATROPHIA, TABES.

Externè.

Oleum Euphorbii.

Unguentum Antatrophum.

Internè.

Æthiops mineralis.

Aqua antihectica.

Visceralis Maucharti.

Decoctum Limacum.

Pulvis antatrophus.

Sulphur Vitrioli anodynum, sive Ens
veneris Boylei.

Syrupus Rhabarbari chalybeatus.

AURIUM AFFECTUS, ACOVISTI- CA. GRAVITAS AUDI- TUS.

Externè.

Oleum Laurinum.

Sacculi cephalici.

AURIUM

AURIUM DOLORES, TINNITUS, Emplastrum Catarrhale.
SUSURRUS, OTALGICA. Odontalgicum.
Vesicatorium.

Externè.

Aqua Acovistica.
Paregorica.
Balsamum Sulphuris Rulandi.
Emplastrum Anodynum.

Oleum feminis Ricini.

Internè.

Spiritus Salis Ammoniaci succinatus.
Pilulæ de Succino Cratonis.

B.

B A L S A M I C A.

Externè.

Enema anodynum & balsamicum.
ejusdem virtutis Fuller.
Essentia Balsami Peruviani.
Oleum Myrrhæ per deliquium.
septem florum.

Internè.

Aqua Veronicæ cum vino.
Anhaltina.
Balsamum Pectorale Meibomii.
Persicum, five Commenda-
toris.

Decoctum Pini.

Elixir aperitivum Claudi.
Pectorale balsamicum Edinbur-
genfe.
Wedelii.

Proprietatis album Helmontii.
dulce, vel sine aci-
do.
cum acido Boerhaa-
vii.
sine acido Boerhaa-
vii.

Essentia balsamica Gmelini.
Myrrhæ.
alcalifata.

Succini.

Extractum Abrotani.
Myrrhæ gummosum.

Oleum destillatum Salviæ.
Calami aromatici.

Pilulæ Balsamicæ, five Polychrestæ
Beccheri & Stahl.
Polychrestæ balsamicæ.
de Terebinthina.

Pilulæ de Tribus Ruffi.

Sapo Tartareus.

Spiritus Balsami Peruviani juxta Hof-
mannum.

Syrupus balsamicus.

B E C H I C A. Vid. T U S S I S.

*

B E Z O A R D I C A. Vid.
A L E X I P H A R M A C A.

*

B I L E M R E F R A E N A N T I A.

Internè.

Acetum.

Clyffus Antimonii.

Conditum Berberum.

Ceraforum acidorum.

Conserva Citri è pulpa.

Decoctum Tamarindorum.

Roob Berberum.

Ribium.

Spiritus Salis concentratus, five Glau-
berianus.

Syrupus Acetosæ.

Acetofellæ.

Acetositatis Citri.

de Agresta.

Berberum.

Ceraforum acidorum.

Granatorum.

Ribium.

Succus Citri.

Rotulæ Berberum.

Trochisci de cremore Tartari.

C.

CACHEXIA, MALUS CORPORIS
HABITUS.

Internè.

Acetum Scilliticum.
Pars II.

Antimonium Diaphoreticum Martiale.
Aqua Millepedum.

Arcanum Tartari, five Terra foliata Tar-
tari.

Chalybs præparatus, five Alcohol Mar-
tis.

T t t t

Chalybs

Chalybs sulphure præparatus.

Conserva Menthæ.

Millepedum.

Spagyrica.

Cremor & Crystalli Tartari.

Crocus Martis aperitivus.

Antimoniatus
Stahlii.

Decoctum amarum.

Diagrydium Liquiritiatum.

Electuarium Chalybeatum.

anthhydropicum.

Elixir aperitivum Clauderi.

Proprietatis dulce.

cum acido Boerhaa-
vii.

cum Rhabarbaro,

Stomachicum temperatum Hoff-
manni.

Essentia antihydropica.

Fuliginis Clauderi.

Stomachica polychresta.

Extractum Fumariæ.

Menthæ.

Sassafras.

Diacarthami.

Martis pomatum.

Liquor visceralis.

Pilulæ Cachecticæ.

Martiales Sydenhami.

Scilliticæ.

Pulvis anticachecticus (*extemp.*)

Cachecticus Quercetani incom-
pletus.

Sal volatile Urinæ.

Scilla præparata.

Syrupus de Absinthio compositus.

domesticus, sive de Spina Cer-
vina.

Tartarus chalybeatus.

Vitriolatus.

Tackenii.

Tinctura Martis aperitiva, sive Aroph
Paracelsi.

Cydoniata.

pomata.

CALCULUM COMMINUENTIA,
LITHONTRIPTICA, SAXI-
FRAGA, NATOS E CAL-
CULO DOLORES
SEDANTIA.

Externè.

Enema emolliens, aperiens *Gaub.*

Emplastrum Anodynum.

Oleum seminis Raphani.

Internè.

Aqua florum omnium.

Fragorum.

benedicta Serpilli.

diuretica è nucleis.

Calcis vivæ.

Decoctum Passulatum.

Elixir acidum Dippelii.

Emulsio lubricans diuretica.

Lapis Percarum præparatus.

Pulpa Cassiæ.

Pulvis Scilliticus compositus Stahlii.

Sal aperitivum extemporaneum Hoff-
manni.

Sal Volatile Urinæ.

Sapo medicatus.

Species decocti antinephritici.

Spiritus Salis concentratus, sive Glau-
berianus.

dulcis.

Syrupus Betonicæ.

Hyperici.

C A N C E R, C A R C I N U S;
C A R C I N O M A.

Externè.

Emplastrum Diapompholygos.

Gluten aquaticum, sive sperma rana-
rum.

Internè.

Æthiops Antimonialis.

CANINA RABIES, MORSUS CANIS.
RABIDI, HYDROPHOBIA,
AQUÆ METUS.

Internè.

Bezoardicum animale.

Mithridatium Damocratis.

Theriaca Andromachi.

Turpethum minerale.

C A C O C H Y M I A.

Internè.

Diagrydium Liquiritiatum.

Electuarium Tamarindorum.

Elixir stomachicum temperatum Hoff-
manni.

CARDIACA, SPIRITUS REFICIEN-
TIA, CORDIALIA.

Internè.

Aqua vel Balsamum Embryonum.

Cardiaca officinalis.

Aqua

Aqua Cardiaca perlata.
Ceraforum nigrorum.
Cinnamomi vinosa.
Cordialis Cinnamomi.
Corticum Aurantiorum cum vi-
no.
Rubi Idæi.
Typhorum cervi composita.
vitæ Mulierum.

Conditum Corticum Aurantiorum.
Citri.

Nucum Juglandium.

Confectio de Hyacintho completa.
incompleta.

Conserva florum Borraginis.
Tunicæ.

Crocus Solis.

Diacydonium compositum aromaticum.

Elæosaccharum Corticum Aurantiorum.
Citri.

Cardiacum.

Caryophyllorum aro-
maticorum.

Cinnamomi.

Elixir cordiale & stomachicum vulgo
GARRUS.

Proprietatis album Helmontii.

Emusio Analeptica.

Essentia Ambraë liquina.
sicca.

Extractum Melissæ.

Croci.

Globuli bezoardici.

Oleum Caryophyllorum aromaticorum.
Cinnamomi.

Pulvis Cordialis Zellenfis.

Roob Rubi Idæi.

Spiritus Pomorum redolentium.

Liliorum convallium.

Melissæ.

Syrupus Cardiacus.

Cinnamomi.

Corticum Citri.

Melissæ.

Vinum Hippocraticum.

CARDIALGIA, CARDIOGMOS,
PASSIO CARDIACA, MOR-
BUS CARDIACUS.

Externè.

Aqua Anhaltina.

Paregorica.

Balneum emolliens.

Paregoricum.

Emplastrum Anodynum.

de Meliloto.

Tacamahaca.

Internè.

Creta alba præparata.

Elixir Prophylacticum amarum.

Essentia Cephalica.

Pulvis Cordialis Zellenfis.

Sal Absinthii.

Syrupus Menthæ.

Tabulæ manus Christi, five Saccha-
rum Perlatum.

CARIES OSSIUM, TEREDO.

Essentia Galangæ.

CARMINANTIA, CARMINATIVA,
FLATUS DISCUTIENTIA.

Externè.

Balsamum stomachicum.

Emplastrum de Cumino.

Globuli carminativi.

Oleum destillatum Saturejæ.
Anethi.

Carminativum.

Chamomillæ.

Laurinum.

Menthæ.

Nucis Moschataë.

Species Decocti Carminativi.

Unguentum spleneticum.

Stomachale.

Internè.

Aqua Absinthii.

Anisi.

Foeniculi.

Carvi.

Cumini.

Corticum Aurantiorum.

cum vi-
no.

Citri.

Cinnamomi vinosa.

Zedoariæ cum vino.

anisata.

Carminativa ordinaria.

spirituosa.

sex feminum.

Cordialis Cinnamomi.

five Balsamum Embryonum.

vitæ Mulierum.

Hysterica.

Ligni Sassafras composita.

Melissæ spiritiosa Carmelitarum.

Theriacalis simplex.

composita.

Vulneraria.

ad Tormina Infantum.

Balsamum vitæ.

- Conditum Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Calami aromatici.
 Confectio feminis Anisi.
 Coriandri.
 Foeniculi.
 Conserva Majoranæ.
 Menthæ.
 Elæosaccharum Anisi.
 Foeniculi.
 Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Macis.
 Electuarium de Acoro.
 Baccis Lauri.
 Elixir Cordiale stomachicum.
 pectorale regis Daniæ.
 Proprietatis album Helmontii.
 Salutis.
 stomachicum temperatum Hoff-
 manni.
 vitæ Matthioli.
 Vitrioli Mynsichti.
 Essentia Absinthii composita.
 simplex.
 Alexipharmaca Stahlîi.
 Amara.
 Angelicæ.
 Balsamica Gmelini.
 Benzoës composita.
 simplex.
 Carminativa Wedelii.
 Corticum Aurantiorum spiri-
 tuosa.
 Corticum Aurantiorum cum vi-
 no.
 Levistici.
 Macis.
 Spicæ Indicæ.
 Extractum Chamomillæ.
 Melissæ.
 Menthæ.
 Angelicæ.
 Liquor visceralis.
 Mel Anthosatum.
 Mixture simplex alba.
 Oleum destillatum Chamomillæ.
 Majoranæ.
 Angelicæ.
 Anisi.
 Coriandri.
 Cumini.
 Foeniculi.
 Juniperi è baccis.
 Cardamomi.
 Macis.
 Calami aromatici.
 Pulvis ad flatum.
 Lenitivus tartarifatus.
 vitæ Imperatoris.
- Species Dianisi.
 Dianthos.
 aromaticæ Caryophyllatæ.
 Rosatæ.
 Spiritus Angelicæ.
 Anisi.
 Carminativus de tribus.
 Cochleariæ.
 Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Juniperi è baccis.
 Mastichinus.
 Melissæ.
 Menthæ.
 Nitri dulcis.
 Salis Ammoniaci anisatus.
 aromaticus.
 Syrupus de Absinthio compositus.
 Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Domesticus, five de Spina Cer-
 vina.
 Menthæ.
 Nucistæ.
 Theriaca Diatesaron.
 Tinctura bezoardica officinalis.
 Martis cum vino Malvatico,
 & Pomis Aurantiis.
 Proprietatis Mynsichti.
 Tragea aromatica Gabelkoveri.
 officinalis.
- C A S U S, L A P S U S.
- Decoctum traumaticum.
 Pulvis ad casum.
- CATARRHALIA, CONTRA DE-
FLUXIONES.
- Externæ.*
 Emplastrum de Bëtonica.
 Cephalicum.
 Oleum Camphoræ liquidum & buty-
 raceum.
 Pulvis Catarrhalis Haugii.
 Syrupus emeticus ad clysmata..
- Internæ.*
 Aqua Apoplectica spiritiuosa.
 benedicta Serpilli.
 Hungariæ.
 Ligni Sassafras composita.
 Balsamum Sulphuris Anisatum.
 Succinatum.
 Vitæ.
 Bacilli de Liquiritia albi.
 citrini.
 Conditum Enulæ.
 Conserva Majoranæ.

Decoctum Pini.
 Elæosaccharum Anisi.
 Cephalicum.
 Spermatis Ceti.
 Electuarium Pectorale.
 Elixir pectorale Wedelii.
 Stomachicum spirituosum Hoff-
 manni.
 Essentia alexipharmaca Stahlîi.
 Ligni Sassafras composita.
 Succini.
 Extractum Zedoariæ.
 Sarsaparillæ.
 Sassafras.
 Ligni Guajaci.
 Liquiritiæ gummosum, sive
 Gluten pectorale.
 Massa Liquiritiæ fusca.
 Pilulæ de Styraçe sine Ambra.
 Succino Cratonis.
 Pulvis Scilliticus compositus Stahlîi.
 Roob Juniperi.
 Species aromaticæ Caryophyllatæ.
 Spiritus Salis Ammoniaci succinatus.
 Syrupus Croci.
 Granorum Kermes.
 Mastichinus.
 de Nicotiana.
 Trochisci bechici citrini.
 Nigri.
 Rubri.

CEPHALICA, CAPITIS AFFECTI-
 BUS PROSPICIENTIA.

Externæ.

Aqua Melissæ spirituosâ Carmelitanum.
 Paregorica.
 Balsamum Cephalicum Saxonicum.
 Somniferum.
 Emplastrum anodynum.
 de Betonica.
 Cephalicum.
 Emulsio externi usûs pro frontali.
 Oleum destillatum Succini.
 Cinnamomi.
 Nucis Moschatæ expressum.
 Sal volatile oleosum Sylvii
 Species Cephalicæ pro cucuphis.
 Epithemate.
 Unguentum de Minio camphoratum,
 aliàs rubrum.

Internæ.

Aqua Anhaltina.
 benedicta Serpilli.
 Carbunculi.
 Cephalica Caroli V.
 Epileptica puerorum.
 Hungarica.
 Pars II.

Aqua Liliorum Convallium cum vino.
 Melissæ cum vino.
 Balsamum Angelicæ.
 Apoplecticum.
 vitæ.
 Confectio feminis Coriandri.
 Conserva florum Anthos.
 Betonicæ.
 Paralyseos è floribus.
 Florum Tunicæ.
 Euphrasie.
 Elæosaccharum Cephalicum.
 Cinnamomi.
 Caryophyllorum aro-
 maticorum.
 Nucis Moschatæ.
 Succini.
 Essentia Ambraë liquida.
 Sicca.
 Cephalica.
 Extractum Aloës ligni.
 Crocî.
 Guttæ Anglicanæ cephalicæ.
 Liquor Cornu cervi succinatus.
 visceralis.
 Mel Anthosatum.
 Oleum destillatum Artemisiæ.
 Lavendulæ.
 Majoranæ.
 Caryophyllorum
 aromaticorum.
 Serpilli.

Pulvis cephalicus Camerarii.
 Species Diambraë.
 Dianthos.
 aromaticæ rosatæ.
 de Hyacintho.
 Spiritus Anthos.
 Cerasorum nigrorum.
 Juniperi è baccis.
 Salis Ammoniaci aromaticus.
 succinatus.

Syrupus Betonicæ.
 Paralyseos.
 Pœoniæ.
 de Stœchade.
 Trochisci Alkermes completi.
 de Ambra.

CHLOROSIS, MORBUS VIRGI-
 NEUS, VULGO ICTERUS
 ALBUS.

Internæ.

Chalybs præparatus, sive Alcohol Mar-
 tis.
 Sulphure præparatus.
 Conditum Enulæ.
 Crocus Martis aperitivus.

U u u u

Crocus

Crocus Martis aperitivus Antimoniatus
 Stahlii.
 Electuarium chalybeatum.
 Elixir aperitivum Clauderi.
 Proprietatis dulce.
 cum acido Boerhaavii.
 Essentia Martiata aperitiva.
 Pilulæ martiales Sydenhami.
 Pulvis cachecticus Quercetani incompletus.
 Syrupus Bryoniæ.

CLAVI ET VERRUCÆ.

Externæ.

Aqua Mercurialis.
 Cera Sigillaris viridis.
 Emplastrum de Cicuta cum Ammoniac.
 ad clavos & verrucas pedum.
 Galbani.
 Viride.

Spiritus Nitri acidus.

COLICA PASSIO, COLICUS DOLOR.

Externæ.

Aqua Anhaltina.
 Melissæ spirituosæ Carmelitarum.
 Paregorica.
 Balneum emolliens.
 Paregoricum.
 Emplastrum anodynum.
 de Tacamahaca.
 Enemata.
 Oleum Chamomillæ.
 Rutæ.
 Unguentum Carminativum.
 Majoranæ.
 stomachale.

Internæ.

Aqua florum omnium.
 animalis, sive destillatum equinum, aliàs Hippenterorum.
 Carminativa.
 spirituosæ.
 Balsamum Angelicæ.
 Sulphuris anisatum.
 Elixir Cordiale stomachicum vulgo GARRUS.
 pectorale Regis Daniæ.
 prophylacticum amarum.
 Essentia Castorei.
 Macis.
 Pimpinellæ albæ.
 Vincetoxici.

Extractum Enulæ.
 Lapis Percarum præparatus.
 Mel Anthosatum.
 Oleum destillatum Rutæ.
 Thymi.
 Carvi.
 Lauri è baccis.
 Galbani.
 Zedoariæ.

Amygdalarum.
 Nucum Juglandium.
 Sal volatile oleosum Sylvii.
 Spiritus Carminativus de tribus.
 Croci.
 Juniperi è baccis.
 Mastichinus.
 Nitri dulcis.
 Syrupus Chamomillæ.

C O M A.

Externæ.

Aqua Liliorum convallium cum vino.
 Anhaltina.
 apoplectica spirituosæ.
 Emplastrum cephalicum.
 suppedaneum Boerhaavii.
 vesicatorium.

CONTRACTURA, CONTRACTIO SENSIM FACTA, FLEXIO IMPEDITA.

Externæ.

Emplastrum Filii Zachariæ.
 Oleum Lumbricorum terrestrium expressum.
 Nucum Juglandium.
 Spiritus Tartari simplex.

C O N T U S A.

Externæ.

Balsamum Locatelli.
 Emplastrum de Betonica.
 Diapalmæ, aliàs Diachalciteos.
 Oxycroceum.
 de spermate Ceti.
 Species decocti ad gangrænam.
 Spiritus Lumbricorum volatilis.
 Unguentum rubrum potabile.

Internæ.

Aqua Hungarica.
 Vulneraria.
 Decoctum traumaticum.
 Pulvis contra casum.
 Sanguis Hirci præparatus.

CON

CONVULSIONES. Vid. ANTISPAS-
MODICA.

*

CORDIALIA. Vid. CARDIACA.

*

CORYZA, GRAVEDO.

Externè.

Elæosaccharum Errhinum.
Emplastrum cephalicum.
vesicatorium.

Internè.

Aqua apoplectica spirituosâ.
Elixir pectorale Wedelii.

CORYZA UTERINA. Vid. FLUOR
ALBUS.

*

CUTANEI AFFECTUS, PSORICA.

Externè.

Oleum seminis Ricini.

Oleum ovorum.

Unguentum de Lithargyrio, aliàs nu-
tritum.

Mundificans Stahlî.

Ophthalmicum rubrum.

Internè.

Essentia Fumariæ.

Pimpinellæ albæ.

Vincetoxici.

Mercurius dulcis.

Oleum destillatum Ligni Sassafras.

Santali Citri-
ni.

Panacea Mercurialis.

Regulus Antimonii Medicinalis.

Species decocti Lignorum.

Sulphur Antimonii auratum.

Syrupus de Fumaria.

Ligni Sassafras.

Tinctura Antimonii acris Hoffmanni.
Tartarifata.

D.

DEMULCENTIA.

Externè.

Balneum Emolliens.
Emplastrum de Galbano crocatum Myn-
sichti.
Oleum Rosatum.
Verbasci.

Internè.

Aqua visceralis Maucharti.
ad Tormina Infantum.
Balsamum pectorale Meibomii.
Sulphuris Rulandi.
Bacilli de Liquiritia.
Conditum Satyrii.
Scorzoneræ.
Conserva Borraginis.
Buglossi.
Rosarum pallidarum.
Violarum.
Decoctum album.
Limonum.
Elæosaccharum spermatis Ceti.
Electuarium pectorale.
resumptivum.
Extractum Borraginis.
Buglossi.
Verbasci.

Extractum Symphyti Majoris.
Taraxaci.

Gelatina Cornu cervi simplex.

Looch sanum & expertum.

Pasta Althææ.

Species Diaireos.

Diatragacanthæ frigidæ.

pro decocto Avenæ, sive Bro-
mio.

Syrupus de Althæa.

Papaveris albi.

erratici.

Diacodion.

de Jujubis.

Trochisci bechici albi.

citrini.

nigri.

DENTALGIA, DOLOR DENTIUM,
ODONTALGIA.

Externè.

Aqua Paregorica.

Balsamum Odontalgicum.

Emplastrum Odontalgicum.

Catarrhale.

Vesicatorium.

Oleum Buxi è ligno.

Saponis destillatum.

U u u u 2

Oleum

Oleum Camphoræ liquidum & buty-
raceum.

Species Tabaci pro fumo Camerarii.
officinales.

Spiritus Liliorum convallium.

Unguentum de Minio camphoratum
rubrum.

Interne.

Pilulæ de Succino Cratonis.

Tinctura Odontalgica M. Hoffmanni.

DETERGENTIA, ABSTERGENTIA,
SAPONACEA.

Externe.

Aqua Phagedænica.

Balsamum Perficum.

Emplastrum viride.

Oleum ovorum.

Unguentum Apostolorum.

Purpureum, five fuscum
Würzii.

Interne.

Balsamum Perficum.

Conserva florum Cichorii.

Beccabungæ.

Decoctum Limacum.

Raparum.

Hordei.

Cornu cervi.

Electuarium pectorale.
resumptivum.

Juscula avenacea.

Pilulæ de Gummatibus, five Succis.
Saponatæ.

Sal Polychrestum Lemmery è Nitro &
Sulphure.

Sapo medicatus.

Tartareus.

Serum lactis.

Syrupus de Ammoniaco.

Veronicæ.

DIAPHORETICA. Vid. SUDORI-
FERA.

*

DIARRHOEA. Vid. ALVI FLUXUS.

*

DILUENTIA, ATTENUANTIA.

Interne.

Aqua Nivis.

Decoctum Passulatum.

Tamarindinatum.

Potus infusorum Theæformium.

Acidulæ.

Serum lactis.

Thermæ.

D I S C U T I E N T I A.

Externe.

Emplastrum Ischiadicum.

Spleneticum.

Unguentum de Arthanita.

Calendulæ florum.

pectorale.

Saponatum.

Interne.

Spiritus Serpilli.

DIURETICA, COPIAM SECER-
NENDI LIQUIDI IN RENI-
BUS AUGMENTIA.

Interne.

Aqua Anhaltina.

Animalis, five destillatum Equi-
num aliàs Hippenterorum.

benedicta Serpilli.

Nephritica.

Calcis vivæ.

Millepedum.

Arcanum duplicatum, five nitrum vi-
triolatum.

Tartari, five terra foliata
Tartari.

Conchæ citratæ.

Conditum Enulæ.

Eryngii.

Confectio seminis Sinapi.

Conserva florum Betonicæ.

Cochleariæ.

Majoranæ.

Millepedum.

Decoctum antifebrile.

Pini.

Tamarindorum.

Elæosaccharum Succini.

Electuarium antihydopicum.

Elixir pectorale Regis Daniæ.

Wedelii.

Essentia alexipharmaca Stahlî.

Angelicæ.

antiscorbutica.

Cardamomi.

Carminativa Wedelii.

Lumbricorum Terrestrium.

Millepedum.

Pimpinellæ albæ.

Scillæ.

Serpentariæ Virginianæ.

Essentia

Essentia Spicæ Indicæ.
 Vincetoxici.
 Extractum Cochleariæ.
 Lupuli.
 Marrubii albi.
 Veronicæ.
 Kermes minerale.
 Lapis Percarum præparatus.
 Laudanum diureticum. five Urinarium
 Michael.
 Liquor anodynus mineralis.
 aperitivus, five Salinus laxati-
 vus.
 Cornu cervi succinatus.
 Terræ foliatæ Tartari.
 Lumbrici terrestres præparati.
 Millepedes præparati.
 Oculi Cancrorum citrati.
 Oleum destillatum Rutæ.
 Serpilli.
 Anethi.
 Angelicæ.
 Cumini.
 Carvi.
 Juniperi è baccis.
 Lauri è baccis.
 Succini.
 Pilulæ de Terebinthina.
 Roob Ebuli.
 Cynosbati.
 Juniperi.
 Sambuci.
 Sal Absinthii.
 Digestivum Sylvii.
 mirabile Glauberi.
 polychrestum Lemmery è Nitro
 & Sulphure.
 Volatile Succini.
 Tartari.
 Tackenhii.
 Urinæ.
 Lumbricorum.
 Sapo tartareus.
 Spiritus bezoardicus Buffii.
 Carminativus de tribus.
 Ceraforum nigrorum.
 Fragorum.
 Cochleariæ.
 Cornu cervi.
 Formicarum.
 Fuliginis.
 Juniperi è baccis.
 Lumbricorum volatilis.
 Salis Ammoniaci succinatus.
 volatilis vino-
 fus.
 uri-
 no-
 fus.
 Coagulatus.
 Tartari simplex.
 Pars II.

Spiritus Vitrioli coagulatus.
 Terebinthinæ.
 Guajaci è ligno.
 Syrupus Betonicæ.
 Fragorum.
 Contrayervæ compositus.
 Cochleariæ.
 Granorum Kermes.
 Tartarus tartarifatus, five solubilis *Sal*
vegetabile dictus.
 vitriolatus.
 Tackenhii.
 Tinctura Antimonii tartarifata.
 bezoardica officinalis.
 Coralliorum.
 Tartari.

DOLORES ARTICULORUM. Vid.
 ARTHRITIS.

*

DOLORES AURIUM. Vid.
 OTALGIA.

*

DOLORES CAPITIS. Vid.
 CEPHALICA

*

DOLORES DENTIUM. Vid.
 DENTALGIA.

*

DOLORES LATERIS. Vid.
 PLEURITIS.

*

DOLORES POST PARTUM.

Externe.

Emplastrum anodynum.
 Oleum Chamomillæ.
 Cheiri.

Interne.

Aqua Carminativa.
 Conserva florum Violarum.
 Oleum Amygdalarum dulcium.

DOLORES VENTRIS. Vid. COLI-
 CA, TORMINA.

*

DYSENTERIA.

Externe.

Enema anodynum & balsamicum.
 Ejusdem virtutis Fuller.

X x x x

Interne.

Interne.

Aqua Theriacalis composita.
 Bolus Armena.
 Conditum Cydoniorum, five Marmelada, Miva.
 Satyrii.
 Confectio de Hyacintho.
 Conserva florum Violarum.
 Cornu cervi ustum.
 Decoctum album.
 Electuarium Diascordium Fracastorii.
 Mithridatium Damocratis.
 Theriaceæ Andromachi.
 Elixir acidum Dippelii.
 Extractum Symphyti majoris.
 Tormentillæ.
 Pulvis dysentericus.
 resolvens compositus.
 Tinctura Rhabarbari composita.
 Vitrum Antimonii ceratum.

**DYSPEPSIA, DIFFICULTAS CIBOS
 CONCOQUENDI.**

Externe.

Emplastrum de Tacamahaca.

Interne.

Elæosaccharum Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Electuarium baccarum Lauri.
 Elixir aperitivum Clauderi.
 prophylacticum amarum.

Elixir Proprietatis sine acido Boerhaavii.
 stomachicum temperatum Hoffmanni,
 Essentia Macis.
 Extractum Enulæ.
 Syrupus de Stoechade.

DYSPNOEA. Vid. ASTHMA.

*

DYSTOCIA. PARTUS DIFFICILIS.

Interne.

Aqua Typhorum cervi simplex.
 Pulvis ad partum.

DYSURIA, URINANDI DIFFICULTAS.

Externe.

Balneum emolliens.

Interne.

Elæosaccharum Spermatidis Ceti.
 Laudanum diureticum, five Urinarium Michael.
 Pilulæ Scilliticæ.
 Pulvis ad Dysuriam, five mitigans Wepferi.
 Sal aperitivum extemporaneum Hoffmanni.
 Tartarus vitriolatus.
 Tackenii.

E.

**EMMENAGOGA, MENSES
 MOVENTIA.**

Externe.

Balneum emolliens.
 Infessus super aquam calidam in sella perforata.
 Unguentum de Arthanita.

Interne.

Aqua benedicta Serpilli.
 Mellis.
 Carminativa.
 hysterica.
 Chalybs præparatus, five alcohol Martis.
 Sulphure præparatus.
 Conditum Enulæ.
 Conserva florum Anthos.
 Cichorii.

Conserva Majoranæ.
 Crocus Martis aperitivus.
 Elæosaccharum Succini.
 Electuarium chalybeatum.
 Elixir Myrrhæ Londinense.
 Proprietatis dulce.
 sine acido Boerhaavii.
 cum acido Boerhaavii.

Uterinum.

Essentia Myrrhæ.
 alcalifata.
 Extractum Abrotani.
 Castorei.
 Centaurei minoris.
 Chamædryos.
 Chamæpityos.
 Chamomillæ.
 Croc.
 Marrubii albi.
 Extractum

Extractum Sabinæ.
Aristolochiæ.
Afari.
Enulæ.

Oleum destillatum Hyssopi.
Pulegii.
Sabinæ.
Juniperi è baccis.
Lauri è baccis.
Zedoariæ.
Succini.

Pulvis hystericus.
Spiritus Juniperi è baccis.
Cornu cervi.
Sal volatile Cornu cervi.
Syrupus Artemisiæ.
Bryoniæ.

EMETICA. Vid. VOMITORIA.

*

EMOLLIENTIA, MALACTICA.

Externe.

Emplastrum de Ammoniacō.
Diabotanium Blondelli.
Diachylon simplex.
cum Gummi.
Fili Zachariæ.
de Galbano crocatum
Mynsichti.
Malacticum.
de Meliloto.
è Mucilaginibus.
de ranis sine Mercurio.

Enema emolliens & laxans.
aperiens, anodynum.

Oleum Liliorum alborum.
Species emollientes.
Decoctum pro gargarismate emolliente.
Unguentum clysmaticum.
Fuscum.
de Hyoscyamo.
Malvæ.
pectorale.
Populeum.
resumptivum.

Interne.

Conserva florum Farfaræ.
Elæosaccharum Spermatidis Ceti.
Electuarium pectorale.
resumptivum.
Oleum Cerae.
Ammoniaci.
Tacamahacæ.
Decoctum Limacum.

EPILEPTICA. Vid. ANTISPASMO-
DICA.

*

ERRHINA. Vid. STERNUTATO-
RIA.

*

ERYSIPELAS.

Externe.

Emplastrum album coctum, sive de
Cerussa.
Creta alba præparata.
Pulvis Erysipelatodes Wedelii.
Lapis medicamentosus.

Interne.

Tinctura bezoardica officinalis.

EXPECTORANTIA. Vid. PECTO-
RALIA.

*

EXSICCANTIA.

Externe.

Æs ustum.
Cornu cervi ustum.
Creta alba præparata.
Crocus Martis adstringens.
Veneris.

Emplastrum album coctum, sive de
Cerussa.

Diapalmæ, aliàs Diachal-
citeos.

Diapompholygos.

Diaulphuris Rulandi.

Griseum, sive de lapide
Calaminari.

Miraculosum.

Norimbergense.

Lapis Calaminaris præparatus.

Saccharum Saturni.

Tutia præparata.

Vitrioli terra dulcis.

Unguentum Comitissæ.

defensivum.

de Minio camphoratum,
aliàs rubrum.

Diapompholygos.

Purpureum, sive fuscum
Würzii.

F.

FEBRES INTERMITTENTES.

Externæ.

Emplastrum febrifugum Michaelis.
Oleum Chamomillæ.

Internæ.

Alumen Tinctum Mynsichti.
Arcanum duplicatum, five Nitrum vitriolatum.
Tartari, five Terra foliata Tartari.
Conchæ Citratæ.
præparatæ.
Conserva Absinthii.
Millepedum.
Spagyrica.
Cremor & Cryſtalli Tartari.
Crocus Martis aperitivus Antimoniatus Stahlian.
Decoctum amarum.
antifebrile.
paſſulatum.
Tamarindorum.
Diagrydium Liquiritiatum.
Electuarium antifebrile.
Mithridatium Damocratis.
Tamarindorum.
Elixir antifebrile.
prophylacticum amarum.
proprietas cum acido Boerhaavii.
Eſſentia alexipharmaca Stahlian temperata, vel ſimplicior.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Chinæ chinæ, five corticis Peruviani ſimplex.
Fuliginis Claudi.
Gentianæ.
Trifolii fibrini.
Extractum Gentianæ.
Nicotianæ.
Flores Salis Ammoniaci.
Kermes minerale.
Liquor Terræ foliatæ Tartari.
Oleum deſtillatum Chamomillæ.
animale Dippelii rectificatiſſimum.
Pilulæ tartareæ Schroederi.
Regulus Antimonii medicinalis.
Roſæ Ceraſorum acidorum.
Rotulæ Berberum.
Sal Abſinthii.
aperitivum extemporaneum Hoffmanni.
digestivum Sylvii.
febrifugum.
polychreſtum Lemmery è Nitro & Sulphure.

Spiritus Salis coagulatus.
Vitrioli ſimplex.
Sulphur Vitrioli anodynum, five Ens Veneris Boylei.
Syrupus Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Chamomillæ.
Corticis Peruviani.
Rubi Idæi.
Tartarus chalybeatus.
vitriolatus.
Tackenii.
Theriaca Diateſſaron.
Tinctura Martis aperitiva, five Aroph Paracelſi.
Helleborata.
Rhabarbari compoſita.
ſtomachica martialis Edinburgenſis.

FEBRES MALIGNÆ, CONTAGIO-SÆ, EXANTHEMATICÆ, ARDENTES.

Externæ.

Emplastrum Suppedaneum.
Unguentum Epispasticum.
mitius.
Epithemata cephalica.

Internæ.

Aqua Typhorum cervi ſimplex.
Conserva Citri è pulpa.
Decoctum Cornu cervi citratum.
Emulſio violata Mynsichti.
Eſſentia alexipharmaca Stahlian.
Gelatina Cornu cervi citrata.
Globuli bezoardici.
Mixture ſimplex alba.
Nitrum Antimoniatum.
Cryſtalliſatum.
Perlaturum.
Oleum bezoardicum Wedelii.
Orvietanum.
Pulvis Contrayervæ compoſitus.
Syrupus Citri è toto.
Contrayervæ compoſitus.
ſimplex.
Rubi Idæi.
Sedi majoris, five Sempervivi.
Tinctura bezoardica officinalis.

FEBRIS VERMINOSA.

Internæ.

Aqua Hermetica.
Tinctura Martis è Vitriolo Zwelferi.

FISSURÆ, RHAGADES.

Externè.

Aqua Mercurialis.

Oleum Cerae.

laterinum, five Philosophorum.

Cacao, five butyrum.

Momordicæ.

Myrrhæ. five Liquor.

Ovorum.

Unguentum de Liquiritia.

rubrum ad labia oris.

de Uvis.

FISTULÆ. Vid. ULCERA.

*

FLATUS PELLENTIA. Vid.
CARMINATIVA.

*

FLUOR ALBUS, CORYZA
UTERINA.

Internè.

Elixir uterinum.

Essentia Populi vulneraria.

Extractum Meu.

Vitrum Antimonii ceratum.

FOETUM ROBORANTIA. Vid.

ABORTUM PROHIBEN-
TIA.

*

FONTICULI.

Externè.

Emplastrum ad fonticulos.

FRACTURÆ.

Externè.

Emplastrum ad fracturas & luxatio-
nes.

FUNGUS ARTICULORUM.

Externè.

Oleum laterinum, five Philosopho-
rum.

G.

GALACTOPOEA, GALACTOPHO-
RA, LAC AUGENTIA.

Internè.

Confectio seminis Foeniculi.

Crytallus montana præparata.

Pulvis Galactopœus.

G A N G L I A.

Emplastrum Diaphoreticum Mynsichti.
ad Ganglia.

G A N G R Æ N A.

Externè.

Gluten Aquaticum, five sperma rana-
rum.

Aqua Calcis vivæ.

Lapis medicamentosus.

Species pro decocto ad gangrænam.
decocti nigri.

Unguentum de Lithargyrio, aliàs nu-
tritum.

Internè.

Acetum.

Aqua Vulneraria.

GINGIVARUM AFFECTUS.

Externè.

Electuarium Gingivale.

Roob Mororum.

Spiritus Cochleariæ.

Tinctura Gingivalis balsamicâ.

Laccæ.

Trochisci Catechu, five Muscerdæ.

G O N O R R H O E A.

Externè.

Injectiones.

Internè.

Aqua ad Gonorrhœam Hoffmanni.
Riverii.

Decoctum antivenereum.

Essentia lignorum.

Populi vulneraria.

Morsuli antimoniales Kunckelii.

Sapo tartareus.

Tinctura Cantharidum.

GRAVEDO. Vid. CORYZA.

*

GUTTA ROSACEA.

Balsamum cosmeticum.

Y y y y

H.

H.

HÆMOPTYSIS, SPUTUM
CRUENTUM.*Interne.*

Decoctum traumaticum.
 Essentia terræ Catechu.
 Traumatica.
 Extractum Hederæ terrestris.
 Symphyti majoris.
 Pilulæ de Cynoglossa,
 Syrupus Hederæ terrestris.
 Trochisci de Carabe.
 Terra Catechu ad Sputum
 cruentum.
 Unguentum rubrum potabile.

HÆMORRHAGIA.

Externe.

Globuli martiales.
 Liquor stypticus Weberi.
 Oleum Terebinthinæ.
 Ovorum.
 Spiritus Vitrioli simplex.

Interne.

Confectio de Hyacintho.
 Conserva Rosarum rubrarum simplex.
 Vitrio-
 lata.
 Decoctum traumaticum.
 Diacydonium simplex.
 Dentes Apri præparati.
 Hippopotami præparati.
 Essentia terræ Catechu.
 traumatica.
 Extractum Opii aquosum.
 Liquor vulnerarius mineralis, five Bal-
 samum vulnerarium mine-
 rale Dippelii.
 vulnerarius vegetabilis, five Bal-
 samum vulnerarium vege-
 tabile Dippelii.
 Species de Hyacintho.
 Syrupus è Symphyto Fernelii.
 Trochisci de Carabe.

HÆMORRHAGIA UTERINA.

Interne.

Crocus Martis aperitivus Antimoniatus
 Stahlîi.
 Decoctum traumaticum.
 Diacydonium simplex.
 Essentia Millefolii.
 Traumatica.
 Syrupus è Symphyto Fernelii.
 Trochisci de Carabe.
 Vitrum Antimonii ceratum.

HÆMORRHOIDES.

Externe.

Balneum emolliens.
 paregoricum.
 Oleum ceræ.
 nucleorum Armeniacorum.
 Lini.
 Momordicæ.
 Verbasci.
 Violarum.
 Unguentum de Hyoscyamo.
 Linaria.
 Populeum.
 rosatum.
 de Uvis.

Interne.

Crocus Martis aperitivus Antimoniatus
 Stahlîi.
 Decoctum traumaticum.
 Essentia Millefolii.

HECTICA.

Externe.

Unguentum infrigidans Galeni.
 resumptivum.

Interne.

Aqua antihectica.
 visceralis Maucharti.
 Electuarium resumptivum.
 Saccharum lactis.

HEMIPILEGIA.

Externe.

Aqua Liliorum convallium cum vino.
 apoplectica spiritiosa.
 Emplastrum visicatorium.

HEPATICA, ICTERICA. Vid.
SPLANCHNICA.

HERNIA.

Externe.

Emplastrum ad hernias, five rupturas.
 Oleum laterinum, five Philosophorum.
 Ovorum.
 Unguentum Comitissæ.

HUMECTANTIA.

Interne.

Conserva Citri è pulpa.
 Decoctum

Decoctum Cornu cervi-citratum.
passulatum.
Extractum Borraginis.
Buglossi.
Pulpa Tamarindorum.
Species pro decocto Avenaceo, five
Bromio.

HYDROPHOBIA. Vid. CANINA
RABIES.

*

HYDROPS, EJUSQUE SPECIES.

Externè.

Emplastrum album coctum, five de
Cerussa.
de baccis Lauri.
ad hydropem Fulleri.
Unguentum de Arthanita
martiatum.

Internè.

Acetum Scilliticum.
Aqua Millepedum.
Arcanum Tartari, five Terra foliata
Tartari.
Balsamum Sulphuris terebinthinatum.
Conserva Millepedum.
Spagyrica.
Cremor & Crystalli Tartari.
Diagrydium Liquiritiatum.
Elaterium.
Electarium antihydropicum.
Elixir pectorale Wedelii.
Essentia antihydrica Hoffmanni.
antasthmatica & anthydrica
A. & B.
Levisitici.
Scillæ.
stomachica polychresta.
Extractum Tanaceti.
Turpethi.
Bryoniæ.
Esulæ.
Colocynthidis.
Diacarthami.
Nicotianæ.
Gummi Gutta præparatum.
Millepedes præparati.
Pilulæ hydricæ Bontii.
Stahlîi.
martiales Sydenhami.
Sapo Tartareus.
Scilla præparata.
Syrupus domesticus, five de Spina Cer-
vina.
Tartarus vitriolatus.
Tackeniî.
Vitriolum Martis.

HYPNOTICA. Vid. OPIATA.

*

HYPOCHONDRIACA.

Externè.

Emplastrum de Cumino.
miraculosum.
Unguentum Spleneticum.

Internè.

Aqua Melissæ cum vino.
Arcanum duplicatum, five Nitrum vi-
triolatum.
Tartari, five Terra foliata
Tartari.
Chalybs præparatus, five Alcohol Mar-
tis.
Cremor & Crystalli Tartari.
Decoctum amarum.
Elixir Proprietatis cum acido Boerhaa-
vii.
cum Rhabarbaro.

Salutis.

stomachicum temperatum Hoff-
manni.

Extractum Enulæ.

Martis pomatum.

Liquor Terræ foliatæ Tartari.

Visceralis.

Pilulæ martiales Sydenhami.

Pulvis absorbens.

Spiritus Carminativus de tribus.

Tinctura Martis aperitiva, five Aroph
Paracelsi.

Cydoniata.

pomata.

Helleborata.

cum vino Malvatico
& pomis Auran-
tiis.

Rhabarbari, five Anima.

H Y S T E R I C A.

Externè.

Acetum aromaticum, five odoratum.
hystericum.

Balsamum Angelicæ.

hystericum.

Emplastrum de Cumino.

Galbano crocatum

Mynsichti.

hystericum.

Sal volatile Anglicanum Siccum.

Spiritus Lumbricorum volatilis.

Internè.

Aqua Absinthii.

Melissæ cum vino.

Y y y y 2

Aqua

Aqua animalis, sive destillatum equinum, aliàs hippenterorum.

Carminativa.

spirituosa.

Hirundinum cum Castoreo.

Hysterica.

Melissæ hysterica.

Arcanum Tartari, sive Terra foliata Tartari.

Bezoardicum Joviale.

Chalybs præparatus, sive Alcohol Martis.

Sulphure præparatus.

Conserva Menthæ.

Decoctum amarum.

Elixir prophylacticum amarum.

Proprietatis cum acido Boerhaavii.

cum Rhabarbaro.

stomachicum temperatum Hoffmanni.

Essentia Castorei.

Carminativa.

Extractum Menthæ.

Castorei.

Croci.

Laudanum hystericum.

Oleum destillatum Origani.

Galbani.

Pilulæ balsamicæ sive polychrestæ Beccheri & Stahlî.

foetidæ minores Sydenhami.

Pulvis absorbens.

hystericus.

Sal Succini volatile.

Spiritus Carminativus de tribus.

Castorei compositus Londinensis.

Salis Ammoniaci succinatus.

Syrupus de Artemisia.

Menthæ.

Tinctura Ase foetidæ.

I.

ICTERUS.

Externè.

Emplastrum miraculosum.

Unguentum Spleneticum.

Internè.

Antimonium diaphoreticum martiale.

Arcanum Tartari, sive terra foliata Tartari.

Chalybs præparatus, sive Alcohol Martis.

Conserva Centaurii florum.

Millepedum.

Spagyrica.

Elixir Proprietatis cum acido Boerhaavii.

cum Rhabarbaro.

Essentia anarthritica cum opio.

sine opio.

Fuliginis Clauderi.

Lumbricorum terrestrium.

Millepedum.

Extractum Centaurii minoris.

Fumariæ.

Efulæ.

Nicotianæ.

Millepedes præparati.

Pilulæ cachecticæ.

Ictericæ.

Pulvis cachecticus Quercetani incompletus.

Sal volatile Urinæ.

Spiritus Salis coagulatus.

Syrupus de Absinthio compositus.

Centaurii minoris.

Tartarus chalybeatus.

vitriolatus.

Tackenii.

Tinctura Antimonii tartarifata.

Martis aperitiva, sive Aroph Paracelsi.

Rhabarbari, sive Anima.

Tinctura stomachica martialis Edinburgensis.

ILEUS, VOLVULUS.

Externè.

Follis flatûs injectio inanum.

Enemata oleosa, amara.

Epithemata.

IMPETIGO.

Externè.

Aqua Saphirina.

Balneum deterisivum.

Emplastrum de spermate ranarum.

Oleum Ovorum.

Unguentum ophthalmicum.

Internè.

Bezoardicum animale.

Creta alba præparata.

Decoctum antivenereum.

INCIDENTIA.

Internè.

Acetum Scilliticum.

Confectio seminis Anisi.

Conserva Menthæ.

Essentia antiscorbutica.

Enulæ.

Lignorum.

Pimpinellæ albæ.

Elixir

Elixir pectorale Wedelii.
 Extractum Rutæ.
 Scordii.
 Trifolii fibrini.
 Ireos Florentinæ.
 nostratis.
 Taraxaci.
 Flores Benzoës.
 Salis Ammoniaci martiales:
 simplices.
 Oleum Benzoës.
 Olibani.
 Zingiberis.
 Piperis.
 Oxymel Scilliticum.
 simplex.
 Looch ad asthma, five de Scillâ.
 de Farfara.
 Pilulæ de Gummatibus, five succis:
 Saponatæ.
 Radix Ari præparata.
 Sal Absinthii.
 Ammoniacum.
 digestivum Sylvii.
 polychrestum Lemmery è Nitro
 & Sulphure.
 volatile Cornu cervi.
 Scilla præparata
 Spiritus Ceraforum nigrorum.
 Cornu Cervi.
 Salis Ammoniaci anisatus:
 Vitrioli coagulatus.
 Syrupus de Ammoniac.
 Brassicæ rubræ.
 Capillorum Veneris:
 de Erysimi Lobelii.
 Farfaræ è floribus:
 Hysopi.
 de Scillâ:
 Stoechade.
 Tinctura Benzoës, five Essentia Alæ
 dulcis.

I N C R A S S A N T I A.

Interne.

Bacilli de Liquiritia albi.
 citrini.
 Diacodium.
 Extractum Liquiritiæ gummosum, five
 Gluten pectorale.
 Looch de Pumone vulpis:
 sanum & expertum.
 Pasta Althææ.
 Saccharum glycyrrhizatum.
 Species Diatrágacanthæ frigidæ:
 decocti pectoralis.
 Syrupus de Althæa Fernelii.

Syrupus Farfaræ.
 de Jujubis.
 Trochisci bechici albi.
 citrini.
 nigri.

INFLAMMATIONES. Vid. AMBU-
 STA.

*

INFLAMMATIO VENTRICULI.

Interne.

Acetum simplex.
 Rubi Idæi.
 Aquâ Acetosæ.
 Syrupus Sedi majoris, five Sempervivi.

INTERTRIGO, ATTRITUS,
EXCORIATIO.*Externe.*

Creta albâ, præparatâ.
 Emplastrum album coctum, five de Ce-
 russa.
 Semen Lycopodii.

I S C H I A D I C A.

Externe.

Balneum emolliens.
 Emplastrum diaphoreticum Mynsichti:
 Ischiadicum.
 nervinum Hoffmanni.
 vesicatorium.
 Unguentum Saponatum.

Interne.

Vid. Arthritis.

ISCHURIA, URINÆ RETENTIO.

Externe.

Balneum emolliens.
 Unguentum Althææ.

Interne.

Aqua florum omnium.
 Elæosaccharum Spermatidis Ceti.
 Essentia antarthritica sine opio.
 Pilulæ Scilliticæ.
 Sal aperitivum extemporaneum Hoff-
 manni.
 Tartarus vitriolatus.
 Tackeenii.
 Tinctura Antimonii acris.

L.

LAC AUGENTIA. Vid. GALACTO-
POEA.

*

LAXANTIA.

Externè.

Enema emolliens & laxans.

Oleum Cerae.

Colocynthis.

Unguentum contra vermes.

Internè.

Conserva Rosarum pallidarum.

Electarium Diacassiae cum Manna.

de Manna.

Tamarindorum.

Elixir aperitivum Clauderi.

prophylacticum amarum.

Proprietatis dulce.

sine acido Boerhaa-
vii.

Extractum Aloës gummosum.

Rhabbarbari simplex.

Foliorum Sennæ.

Infusum laxativum Mannagettæ.

Viennense.

Liquor aperitivus, five Salinus laxati-
vus.

Terræ foliatæ Tartari limpidus.

Magnesia alba.

Mel mercuriale.

rosatum solutivum.

Mercurius dulcis.

Passulæ & Pruna laxativa.

Rhabbarbarinæ.

Pilulæ Aloëphanginæ.

aperientes Stahlî.

balsamicæ, five polychrestæ Bec-
cheri & Stahlî.

Emanuelis.

Mastichinæ.

Pulpa Cassiæ.

Tamarindorum.

Pulticula Mannæ.

Sal mirabile Glauberi.

Sapo medicatus.

Species pro Ptisana regia.

Syrupus Acaciæ florum.

de Cichorio cum Rhabbarbaro.

Manna laxativus.

Mercurialis, five prophylacti-
cus.

Perlicorum è floribus.

de Rhabbarbaro Deodati.

Rosarum simplex.

solutivus.

Violarum solutivus.

Tinctura Aloës.

LETHARGUS, AFFECTUS SOPO-
ROSUS.

Externè.

Acetum aromaticum, five odoratum.

Emplastrum vesicatorium.

Suppedaneum Boerhaavii.

Errhina omnia.

Spiritus Salis Ammoniaci volatilis.

Unguentum epispasticum.

Internè.

Acetum simplex.

Aqua Anhaltina.

apoplectica spiritiosa.

Liliorum convallium cum vino.

LEUCOPHLEGMATIA.

Internè.

Acetum Scilliticum.

Essentia antihydrica Hoffmanni.

Levistici.

Pulvis Cachecticus Quercetani.

LIPOTHYMIA. Vid. ANIMI DELI-
QUIUM.

*

LIPPITUDO.

Externè.

Emplastrum vesicatorium.

Trochisci albi Rhazæ.

Unguentum ophthalmicum rubrum.

LITHONTRIPTICA. Vid. CALCU-
LUS.

LOCHIA.

Internè.

Aqua hysterica.

Crocus Martis aperitivus antimoniatus
Stahlî.

Pulvis hystericus.

Syrupus de Artemisia.

LOCHIA NIMIA. Vid. HÆMORR-
HAGIA.

*

LOIMICA, CONTRA PESTEM.

Internè.

Acetum bezoardicum, five Aqua pro-
phylactica Sylvii.

Balsamum

Balsamum Angelicæ.
Elixir Proprietatis Paracelsi.
Roob Juniperi.
Spiritus Fuliginis.
Trochisci sublinguales ad prophylaxin
à contagio.

LUBRICANTIA.

Externè.

Oleum Liliorum alborum &c.

Internè.

Electarium de Manna.
pectorale.
resumptivum.
Bacilli de Liquiritia albi.
citri.
Decoctum Liniacum.

LUES VENEREA.

Externè.

Emplastrum mercuriale.
Unguentum Neapolitanum, five Gri-
feum.

Internè.

Æthiops Antimonialis.
Bezoardicum animale.
Decoctum antivenereum.
Essentia Lignorum.
Extractum Sarsaparillæ.
Sassafras.
Guajaci.
Mercurius dulcis.
Corrosivus.
Oleum ligni Guajaci.
Sassafras.
Panacea Mercurialis.
Pilulæ mercuriales.
Species decocti lignorum.

Spiritus ligni Guajaci.
Sulphur Antimonii auratum.
Syrupus ligni Sassafras.
Tinctura Antimonii acris Hoffmanni.

LUMBRICI.

Externè.

Emplastrum ad vermes.
Oleum Colocynthis.

Internè.

Aqua calcis vivæ.
Hermetica.
Cornu cervi ustum.
Decoctum amarum.
Elixir aperitivum Clauderi.
prophylacticum amarum.
Proprietatis cum acido Boerhaa-
vii.
Extractum Filicis.
Oleum Absinthii expressum.
femini Ricini.
Sulphur Vitrioli anodynum, five Ens
Veneris Boylei.
Theriaca Andromachi.
Vitriolum Martis.
Vitrioli Ros, five phlegma.

LUXATIO.

Externè.

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.
ad fracturas & luxationes.
nervinum Hoffmanni.
Globuli martiales.
Spiritus Liliorum convallium.
Lumbricorum volatilis.
Matricalis.

Internè.

Sanguis Hirci præparatus.

M.

MALACTICA. Vid. EMOLLIENTIA. *Internè.*

*

MELANCHOLIA.

Internè.

Aqua Typhorum cervi composita.
Tinctura Martis helleborata.

MORBILLI.

Externè.

Emplastrum suppedaneum Boerhaavii.

Internè.

Cornu cervi philosophicè præpara-
tum.
Ebur philosophicè præparatum.
ustum album, five spodium.
Globuli bezoardici.
Pulvis Contrayervæ compositus.
Syrupus Contrayervæ compositus,
simplex.
Granorum Kermes.

Z z z z z

MOR:

MORSUS CANIS RABIDI. Vid.
CANINA RABIES.

*

M U N D I F I C A N T I A.

Externè.

Aqua aluminosa Londinensis.
Mercurialis.
phagedænica.
Balsamum Sulphuris Rulandi.
vulnerarium viride.
Emplastrum stipticum Crollii.

Mercurius præcipitatus ruber.
viridis.

Mel rosatum simplex.
Oleum Saponis destillatum.
Ligni Rhodii.
Saccharum Saturninum.
Tinctura Aloës.
Trochisci escharotici.
Unguentum Apostolorum.
Ægyptiacum.

Internè.

Sapo medicatus.
Syrupus Hederæ terrestris.

N.

NAUSEA, CONATUS VOMENDI. Syrupus Hederæ terrestris.

Externè.

Emplastrum de Tacamahaca.

Internè.

Diacydonium compositum aromaticum.
Syrupus Cydoniorum.
Menthæ.

N E P H R I T I S.

Externè.

Aqua paregorica.
Balneum paregoricum.
Emplastrum emolliens.
Enema emolliens.
Oleum florum Slotani.
Unguentum Althææ.
anodynum.
infrigidans Galeni.

Internè.

Aqua Fragorum.
diuretica è nucleis.
nephritica. E. N. C.
Calcis vivæ.
Decoctum Pini.
Elixir acidum Dippelii.
Emulsio lubricans diuretica.
Violata Mynsichti.
Extractum Hederæ terrestris.
Lapis Nephriticus præparatus.
Oleum destillatum Tanacetii.
Amygdalarum.
Cacao, sive Butyrum.
Cucumerum.
Cucurbitarum.
Melonum.
Raphani.
Roob Cynosbati.
Saccharum lactis.
Species decocti antinephritici.
pectoralis.

N E R V I N A.

Externè.

Balsamum cephalicum Saxonicum.
Emplastrum cephalicum.
nervinum Hoffmanni.
Regium Burrhi.

Oleum Benzoës.
laterinum.
Costinum.
Florum Slotani.
laurinum.
Lumbricorum terrestrium.
Rutæ.

Spiritus Salis Ammoniaci aromaticus.
volatilis vi-
nosus.

Unguentum martiatum.
nervinum.
Santalinum.
Saponatum.

Internè.

Aqua Liliorum convallium cum vino.
Anhaltina.
Hungarica.
Magnanimitatis.
Odorifera.
Balsamum Angelicæ.
vitæ.
Confectio seminis Cubebarum.
Conserva florum Anthos.
Tunicæ.
Elæosaccharum cephalicum.
Essentia Succini.
Extractum Caryophyllatæ.
Corticum Chinæ chinæ.
Mixture tonico - nervina Stahlî.
Oleum destillatum Melissæ.
Rorismarini.
Salviæ.
animale Dippelii.
Oleum

Oleum destillatum Ceræ.
Terræ.

Spiritus Anthos.
Liliorum convallium.
Melissæ.
Menthæ.

Spiritus nervinus ad mentem Hoffmanni.

Syrupus Melissæ.
Florum Paralyseos.

NODI. Vid. TOPHI.

O.

O B S T R U C T I O N E S.

Flores Salis Ammoniaci.
Liquor Tartari spleneticus.
Terræ foliatæ Tartari.
Mercurius dulcis.
Mixtura tonico - nervina Stahlî.
Oleum animale Dippelii.
Oxymel scilliticum.
Pilulæ balsamicæ, seu Polychrestæ Beccheri & Stahlî.
simpliciores.

de Gummatibus, five Succis.

Scilliticæ.

Tartareæ Bontii.

Regulus Antimonii medicinalis.

Sal Absinthii.

aperitivum extemporaneum Hoffmanni.

Acetosæ,

Acetosellæ.

Volatile Urinæ.

Sapo medicatus.

Tartarus vitriolatus.

Tackeniî.

Tinctura Metallorum, five Liliûm Paracelsi.

Rhabarbari, five Anima.

ODONTALGIA, DENTIUM DOLOR. Vid. DONTALGIA.

*

OTALGIA, AURIUM DOLOR. Vid. AURIUM DOLORES.

*

O D O R I F E R A.

Candelæ Fumales.

Massa ad fornacem, five Pastilli fumales.

Tinctura Benzoës.

Trochisci Galliæ Moschatæ.

Unguentum pomatum, five florum Naphæ.

OPHTHALMICA, AD AFFECTUS OCULORUM.

Externè.

Aqua Ophthalmica.

Emplastrum vesicatorium.

Lapis divinus, five Ophthalmicus.

Nitrum Saturninum.

Sief album.

Trochisci albi Rhazæ.

Tutia præparata.

Unguentum Nihili ad oculos.

Ophthalmicum Hans Sloane.

ane.
rubrum.

Diapompholygos.

Internè.

Pilulæ Lucis majores.

Tragea Ophthalmica.

OPIATA, SOMNIFERA.

Externè.

Unguentum Somniferum.

Internè.

Extractum opii aquosum.

Essentia anodyna Sydenhami.

Laudanum opiatum.

Oleum Nucis Moschatæ expressum.

Pilulæ de Cynoglossò.

Trochisci de Carabe.

ORIS ULCERA. Vid. APHTHÆ.

P.

PALPITATIO CORDIS.

Externè.

Acetum aromaticum, five odoratum, hystericum.

Pars II.

Internè.

Aqua Melissæ cum vino.

Pulvis absorbens.

Spiritus Pomorum redolentium.

Syrupus Borraginis.

Buglossi.

A a a a a

PARA-

P A R A L Y S I S.

Externe.

Aqua Magnanimitatis.
 Effentia Galangæ.
 Oleum laterinum, five philosophorum.
 Succini.
 Castorei.
 Costinum.
 Euphorbii.
 Formicarum.
 Seminis Ricini.
 Sinapi.
 Nicotianæ.
 Spiritus Cornu cervi ad usus externos.
 Formicarum.
 Lavendulæ.
 Salis Ammoniaci volatilis urinofus.
 Unguentum nervinum.
 ad Paralyfin.
 ad membra tabida.

Interne.

Aqua Anhaltina.
 Melissæ.
 Spirituosa Carmelitarum.
 Balsamum vitæ.
 Extractum Zedoariæ.

P A R O T I S.

Externe.

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.

P E C T O R A L I A.

Interne.

Aqua Looch fani & experti.
 Conserva florum Bellidis.
 Betonicæ.
 Salviæ.
 Violarum.
 Electarium pectorale.
 Elixir, pectorale balsamicum Edinburgense.
 Regis Daniæ.
 Effentia Benzoës composita.
 simplex.
 Extractum Angelicæ.
 Bellidis.
 Myrrhæ gummosum.
 Oleum Cacao, five Butyrum.
 Pilulæ pectorales.
 Pulvis pectoralis resolvens.
 Refina Jalappæ.
 Scammonii.
 Rotulæ Diaireos.
 Species decocti florum & fructuum.
 pectoralis.
 Spiritus Anisi.

Syrupus Croci.

Enulæ.

Glycyrrhizæ.

Tinctura Proprietatis Mynsichti.

P E R I P N E U M O N I A.

Interne.

Pulvis resolvens compositus.

P E R N I O N E S.

Externe.

Emplastrum Camphoratum Stahlî.
 Capucinatorum.
 de Minio rubrum.
 Saponatum Barbette.
 Oleum Ceræ.
 Seminis Raparum.

P H T H I S I S.

Interne.

Aqua antihectica.
 visceralis Maucharti.
 Balsamum pectorale Meibomii.
 Sulphuris anisatum.
 Conditum Scorzonæræ.
 Decoctum Limacum.
 Pini.
 travmaticum.
 Elæosaccharum Spermatîs Ceti.
 Electarium pectorale.
 Extractum Taraxaci.
 Myrrhæ gummosum.
 Looch de Farfara.
 Pulmone vulpis.
 Pasta Althææ.
 Syrupus Sulphuris, five Arcanum Béchicum Willisii.

P L E U R I T I S.

Externe.

Emplastrum filii Zachariæ.
 Oleum Lini.
 septem florum.
 Unguentum Althææ.
 pectorale.
 resumptivum.

Interne.

Dentes Apri præparati.
 Hippopotami præparati.
 Lapis Percarum præparatus.
 Mandibulæ Lucii piscis præparatæ.
 Oleum Amygdalarum.
 bezoardicum Wedelii.
 Cacao, five butyrum.
 Lini.
 Pulvis resolvens compositus.

Sanguis

Sanguis Hirci præparatus.
Syrupus Papaveris erratici.

P O D A G R A.

Externe.

Emplastrum saponatum Barbette.
Suppedaneum Boerhaavii.

Interne.

Decoctum diæteticum Sydenhami.
Elixir acidum Dippelii.
Saccharum lactis.

P R O P H Y L A C T I C A.

Interne.

Acetum bezoardicum, five
Aqua Prophylactica Sylvii.
Elixir Prophylacticum amarum.
Trochisci sublinguales ad prophylaxin
à contagio.

PSORICA. Vid. CUTANEI
AFFECTUS.

*

P U R G A N T I A.

Diacydonium Jalappinum.

Diagrydium Liquiritiatum & Sulphu-
ratum.

Elaterium.

Electarium catholicum.

Hiera Picra simplex.

Elixir polychrestum Hallense.

Extractum Agarici.

Catholicum.

Colocynthis.

Hellebori nigri.

Jalappæ.

Nicotianæ.

Panchymagogum.

Gummi Gutta præparatum.

Kermes minerale.

Morfuli purgantes.

Pilulæ de Succino auctæ.

Pulvis Cornachinus, five Comitiss de
Warwick.

Species Diajalappæ Mynsichti.

Specificum Jalappinum.

Syrupus domesticus, five de Spina
Cervina.

Tartarus tartarizatus, five solubilis,
Sal vegetabile dictus.

Trochisci Alhandal.

P U S T U L Æ.

Externe.

Aqua Saphirina.

R.

RABIES CANINA. Vid. CANINA
RABIES.

*

R A C H I T I S.

Interne.

Arcanum Tartari, five Terra foliata
Tartari.

Extractum Filicis.

Sulphur Vitrioli anodynum, five Ens
Veneris Boylei.

RAUCEDO CATARRHALIS.

Interne.

Aqua florum Acaciæ.

Bacilli de Liquiritia Citrini.

Elæosaccharum Spermatiss Ceti.

Electarium de Manna.

Elixir pectorale Wedelii.

Extractum Liquiritiæ gummosum, five
gluten pectorale.

Oleum Amygdalarum dulcium.

Saccharum Glycyrrhizatum.

Syrupus de Eryfimo Lobelii.
Rorellæ.

è Symphito Fernelii.

Trochisci Bechici citrini.

nigri.

rubri.

R E F R I G E R A N T I A.

Externe.

Emplastrum camphoratum Stahlî.
defensivum Würzii.
rubrum Wep-
feri.

Diapompholygos.

Saturninum Mynsichti.

de Spermate ranarum.

Gluten aquaticum, five Sperma rana-
rum.

Oleum Rosatum.

Violatum.

Unguentum Alabastrinum.

album Camphoratum.

simplex.

defensivum.

A a a a a 2

Unguentum

Unguentum de Minio camphoratum, Emplastrum Divinum.

aliàs rubrum.

Infrigidans Galeni.

Populeum.

Santalinum.

de Uvis.

de Galbano crocatum Mynsichti.

Meliloto.

è Mucilaginibus.

Oleum Laurinum.

Liliorum alborum.

Septem florum.

Verbasci, five Liquamen.

Violarum.

Species decocti carminativi.

Unguentum Althææ.

Apostolorum.

Anodynum.

Clysmaticum.

Malvæ.

resumptivum.

Interne.

Acetum simplex.

destillatum.

Rubi Idæi.

Aqua Fragorum.

Nivis.

Clyffus Antimonii.

Conditum Cydoniorum, five Marmelada.

Conserva florum Borraginis.
Buglossi.

Acetosæ.

Acetofellæ.

Citri è pulpa.

Decoctum Cornu cervi citratum.

Emulsio Violata Mynsichti.

Gelatina Cornu cervi simplex.

Nitrum Antimoniatum.

Crystallifatum.

Tabulatum.

Oxyfaccharum simplex.

Phlegma Vitrioli.

Pulpa Prunorum.

Passularum.

Tamarindorum.

Roob Berberum.

Cornorum.

Ceraforum acidorum.

Ribium.

Spiritus Salis concentratus five Glauberianus.

Vitrioli simplex.

Nitri dulcis.

Serum lactis Tamarindinatum.

Syrupus Acetofellæ.

Acetosæ.

Acetositatis Citri.

de Agresta.

Berberum.

Ceraforum acidorum.

Fragorum.

Granatorum.

Myrtillorum.

Mororum.

Rubi Idæi.

Trochisci de Cremore Tartari.

R E L A X A N T I A.

Externe.

Emplastrum de Ammoniaco.

Anodynum.

Diabotanium Blondelli.

Diachylon cum Gummi.
simplex.

Interne.

Conserva florum Farfaræ.

Elæosaccharum Spermatidis Ceti.

Electarium pectorale.

resumptivum.

Decoctum Limacum.

R E S O L V E N T I A.

Externe.

Emplastrum de Ammoniaco.

baccis Lauri.

Camphoratum Stahlîi.

Capucinatorum.

Catarrhale.

de Cicuta cum Ammonia-
co.

Cumino.

Diabotanium Bondelli.

Diachylon cum Gummi.

Diaphoreticum Mynsichti.

Diasulphuris Rulandi.

Divinum.

Filii Zachariæ.

de Galbano crocatum Mynsichti.

Malacticum.

de Meliloto.

Miraculosum.

Norimbergense.

de ranis sine Mercurio.

cum Mercurio.

Regium Burrhi.

Santalinum, aliàs incognitum.

Spiritus nervinus ad mentem Hoffmanni.

Unguentum Agrippæ.

Althææ.

Calendulæ florum,

Interne.

Acetum Scilliticum.

Aqua

Aqua nivis.
 Millepedum.
 Arcanum duplicatum, five Nitrum vitriolatum.
 Tartari, five Terra foliata Tartari.
 Balsamum Sulphuris Rulandi.
 Conditum Cichorii.
 Conserva Cichorii florum.
 Euphrasæ.
 Majoranæ.
 Millepedum.
 Decoctum antifebrile.
 antivenereum.
 Elæosaccharum Spermatidis Ceti.
 Succini.
 Elixir Proprietatis cum acido Boerhaavii.
 Essentia Galangæ.
 Millepedum.
 Pimpinellæ albæ.
 Scillæ.
 Flores Benzoes.
 Salis Ammoniaci simplices.
 Looch ad Asthma, five de Scilla de Farfara.
 Millepedes præparati.
 Oleum destillatum Chamomillæ.
 Benzoës.
 Millefolii.
 Piperis.
 Ammoniaci.
 Tacamachacæ.
 Calami aromatici.
 Succini.
 Amygdalarum dulcium.
 Oxymel simplex.
 Scilliticum.
 Pilulæ Starckey.
 Tartareæ Bontii.
 Pulvis resolvens Stahlîi.
 compositus.
 Scillæ compositus Stahlîi.
 Radix Ari præparata.
 Sal digestivum Sylvii.
 Tartari volatile Tachenii.
 Sapo medicatus.
 Scilla præparata.
 Species Diaireos.
 Spiritus balsami Peruviani juxta Hoffmannum.
 Salis Ammoniaci vinosus.
 anisatus.
 coagulatus.
 Tartari simplex.
 Vitrioli coagulatus.
 Syrupus Bellidis è succo.
 Enulæ.
 Hyssopi.
 de Scilla, five Oxyfaccharum scilliticum Londinense.
 Tartarus tartarifatus, five solubilis sal vegetabile dictus.
 Pars II.

Tinctura Antimonii acris Hoffmanni.
 Tartarifata.

Benzoës.
 Metallorum, five Liliûm Paracelsi.
 Rhabarbari, five Anima.
 Tartari.
 acris.

Trochisci de Scilla.

RESTAURANTIA. Vid. ANALEPTICA.

*

RHEUMATICA.

Externe.

Aqua Anhaltina.
 Melissæ spirituosâ Carmelitarum.
 Paregorica.
 Emplastrum de Hyoscyamo.
 Anodynum.
 Ischiadicum.
 Camphoratum Stahlîi.
 miraculosum.
 nervinum Hoffmanni.
 Saponatum Barbette.
 Oleum destillatum Succini.
 Pulvis fumalis Haugii.
 Spiritus Formicarum.
 Liliorum convallium.
 Lumbricorum vinosus.
 volatilis.
 Serpilli.

Interne.

Antimonium diaphoreticum simplex.
 Extractum Sarsaparillæ.
 Sassafras.
 Mixtura simplex alba.
 Pulvis Anarthriticus.
 Spiritus Juniperi è baccis.

ROBORANTIA.

Externe.

Emplastrum Catarrhale.
 Cephalicum.
 de Cumino.
 Diaphoreticum Mynsichti.
 Divinum.
 Norimbergense.
 Santalinum, aliàs incognitum.
 Oleum Formicarum.
 Laurinum.
 Majoranæ.
 Mastichinum coctum.
 Oleum Nucis Moschatæ expressum.
 Unguentum stomachale.

B b b b b

Interne.

Interne.

Acetum Rubi Idæi.
 aromaticum, five odoratum.
 Aqua Absinthii.
 Fœniculi.
 Carvi.
 Cumini.
 Cinnamomi buglossata.
 cydoniata.
 Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Zedoariæ cum vino.
 Carminativa, five claretum sex
 feminum.
 spirituosa.
 Cordialis Cinnamomi.
 Hungarica.
 Hysterica.
 Magnanimitatis.
 Theriacalis simplex.
 composita.
 Vulneraria.
 Balsamum Angelicæ.
 vitæ.
 Bezoardicum martiale.
 Conditum Ananas.
 Aurantiorum.
 Citri.
 Caryophyllorum aromatico-
 rum.
 Zingiberis.
 Nucum Indicarum.
 Juglandium.
 Cydoniorum, five Marme-
 lada, Miva.
 Calami aromatici.
 Enulæ.
 Confectio Alkermes.
 Seminum Cubearum.
 Conserva florum Centaurii.
 Naphæ.
 Rosarum rubrarum
 simplex.
 Foliorum Absinthii.
 Majoranæ.
 Menthæ.
 Spagyrica.
 Crocus Martis aperitivus.
 antimoniatus
 Stahlii.
 Decoctum amarum.
 Diacydonium simplex.
 Elæosaccharum Cardiacum.
 Cephalicum.
 Cinnamomi.
 Electarium de Acoro.
 baccis Lauri.
 Chalybeatum.
 Diascordium Fracastorii.
 Mithridatum Damocratis.
 Elixir aperitivum Clauderi.
 pectorale Regis Daniæ.

Elixir pectorale Wedelii.
 Proprietatis dulce.
 fine acido Boerhaa-
 vii.
 stomachicum spirituosum Hoff-
 manni.
 vitæ Matthioli.
 Vitrioli Mynsichti.
 Uterinum.
 Effentia Alexipharmaca Stahlii.
 amara.
 Cardamomi.
 Croci.
 dulcis.
 Galangæ.
 Martis aperitiva.
 Extractum Abrotani.
 Centaurii minoris.
 Lupuli.
 Melissæ.
 Plantaginis.
 Enulæ.
 Filicis.
 Mel Anthosatum.
 Mixtura Tonico-nervina Stahlii.
 Oleum destillatum Hyssopi.
 Cinnamomi.
 Mastiches.
 Tacamahacæ.
 Zingiberis.
 Nucis Moschatae.
 Pasta Regia stomachalis, five Martius
 Panis.
 Pilulæ Aloephanginæ.
 Polychrestæ balsamicæ.
 Pulvis vitæ Imperatoris.
 Roob Cydoniorum.
 Species Diambrae.
 Dianisi.
 aromaticæ Caryophyllatæ.
 Rosatæ.
 Spiritus Balsami Peruviani juxta Hoff-
 mannum.
 Cydoniorum.
 Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Panis.
 Succolada composita.
 Regia.
 simplex.
 Syrupus Berberum.
 Cardiacus.
 Cinnamomi.
 Corticum Aurantiorum.
 Citri.
 Hyssopi.
 Menthæ.
 Mercurialis, five prophylacti-
 cus.
 de Stœchade.
 Tinctura aromatica Londinensis.
 Coralliorum.

Tinctura

Tinctura Croci vinosa.
Martis aperitiva tartarifata Ludovici.
Cydoniata.
pomata.
è Vitriolo Zwelferi.
Rhabarbari composita.

Tinctura stomachalis martialis Edin-
burgensis.
Tragea aromatica Gabelckoveri.
officinalis.
Vinum Hippocraticum.
Vitriolum Martis.

RUCTUS. Vid. CARMINATIVA.

S.

SALIVANTIA, SALIVALIA, SALIVAM EDUCENTIA.

Externe.

Cinnabaris in Suffitu.
Cingulum mercuriale.
Mercurius vivus per fumum admissus.
Pediluvia ex Mercurio dulci.
Soleæ ex Mercurio amalgamato plantis
pedum suppositæ.
Unguentum Neapolitanum.

Interne.

Mercurius dulcis.
Panacea Mercurialis.
Turbith minerale.

SAPONACEA. Vid. DETERGENTIA.

*

SCABIES.

Externe.

Aqua Mercurialis.
Phagedænica.
Saphirina.
Balneum deterfivum.
Lapis medicamentosus.
Mercurius præcipitatus ruber.
Oleum Nicotianæ.
Unguentum Enulatum.
de Lithargyrio, aliàs nutritum.
Mundificans Stahlian.
de Nicotiana.
ad scabiem.
Zelleri.

Æthiops Antimonialis.
Antimonium diaphoreticum simplex.
Bezoardicum animale.
Decoctum antivenereum.
Essentia Ligni Sassafras.
Extractum Fumariæ.
Sarsaparillæ.
Flores Sulphuris.
Mercurius dulcis.
Morsuli Antimoniales Kunckelii.
ad Scabiem.
Regulus Antimonii medicinalis.

Saccharum lactis.
Species decocti Lignorum.
Sulphur Antimonii auratum.
Syrupus de Fumaria.
Sulphuris, five Arcanum be-
chicum Willisii.
Tinctura sulphuris.

SCIRRHUS.

Externe.

Emplastrum de Cicuta cum Ammonia-
co.
Diabotanium Blondelli.
de Galbano crocatum Myn-
sichti.
ranis cum Mercurio.
Oleum Laterinum, five Philosopho-
rum.

SCORBUTUS.

Externe.

Electarium gingivale.
Tinctura gingivalis balsamica.
Laccæ.

Interne.

Æthiops Antimonialis.
Aqua Cochleariæ.
animalis, seu Hippenterorum,
five destillatum Equinum.
antiscorbutica temperata.
Calcis vivæ.
Conserva Acetosæ.
Acetosellæ.
Cochleariæ.
Beccabungæ.
Decoctum Pini.
Elixir acidum Dippelii.
Proprietatis cum acido Boerhaa-
vii.
Essentia Lignorum.
Lumbricorum terrestrium.
Pini.
Scordii.
Trifolii fibrini.
Extractum Cochleariæ.
Trifolii fibrini.
Pini.

B b b b b 2

Extractum

Extractum Diacarthami.
 Sal volatile Urinæ.
 Spiritus Cochleariæ.
 Theriacalis.
 Succus Berberum.
 Citri.
 Ribium.
 Syrupus Cochleariæ.
 Tinctura Sulphuris.

SCROPHULÆ, STRUMÆ.

Externè.

Emplastrum diasulphuris Rulandi.
 de Galbano crocatum Myn-
 sichti.
 Scrophularia.

Extractum Rutæ.
 Magnes arsenicalis.
 Morfuli, five Tabulæ strumales.
 Oleum Laterinum, five Philosopho-
 rum.
 Pulvis strumalis.
 Sapo medicatus.
 Spongia tosta.
 Unguentum de Nicotiana.

S E R P I G O.

Externè.

Aqua Mercurialis ad usus externos.
 Saphirina.
 Lac Virginis.
 Oleum ovorum.

Internè.

Æthiops Antimonialis.

S I N G U L T U S.

Externè.

Balsamum stomachicum.
 Emplastrum de Galbano crocatum
 Mynsichti.

Internè.

Aqua Mastichina.
 Electuarium Diascordium Fracastorii.
 de Manna.
 Theriaca Andromachi.
 Oleum Menthæ destillatum.

SITIM SEDANTIA.

Internè.

Acetum simplex.
 Rubi Idæi.
 bezoardicum Sylvii.

Clyffus Antimonii.
 Aqua Acetosæ.
 Conditum Berberum.
 Ceraforum.
 Cornorum.
 Cynosbati.
 Fragorum.
 Prunorum.
 Ribium.
 Rubi Idæi.
 Uvarum.

Conserva Citri è pulpa.
 Decoctum Cornu cervi citratum.
 Passulatum.
 Tamarindorum.

Pulvis Viennensis albus.

Roob Berberum.
 Ceraforum.
 Cornorum.
 Cydoniorum.
 Omphacii.
 Ribium.

Rotulæ Berberum.
 Syrupus Acetofellæ.

Acetosæ.
 Acetositatis Citri.
 de Agresta.
 Berberum.
 Ceraforum acidorum.
 Granatorum.
 Ribium.

Tinctura florum Bellidis.

Trochisci de cremore Tartari.

SODA, ARDOR VENTRICULI.

Internè.

Cornu cervi ustum.
 Creta alba præparata.
 Elixir Vitrioli Mynsichti.
 Magnesia alba.
 Morfuli ad ardorem Ventriculi.
 Pulvis contra acredinem.
 Sal Absinthii.
 Tartari.

SOMNIFERA. Vid. OPIATA.

*

SOPOROSI AFFECTUS. Vid.
LETHARGUS.

*

SPASMI. Vid. ANTISPASMODICA.

*

S P H A C E L U S.

Externè.

Species pro decocto ad gangrænam.
 Internè.

Interne.

Acetum.

SPLANCHNICA, SPLENETICA,
HEPATICA, ICTERICA.

Externe.

Emplastrum Spleneticum.
de Cicuta cum Ammoniaco.
baccis Lauri.
Hyoscyamo.
Unguentum Spleneticum.
Santalinum, aliàs incog-
nitum.

Conserva Anthos.

Spagyrica.

Decoctum antivenereum.

Electarium chalybeatum.

Elixir aperitivum Clauderi.

prophylacticum amarum.

Proprietatis dulce.

uterinum.

Extractum Abrotani.

Sal Cornu cervi volatile.

Lumbricorum volatile.

Tartarus vitriolatus.

Tackenii.

Tinctura Croci vinosa.

STIPTICA. Vid. ADSTRINGENTIA.

Interne.

Confectio visceralis, five Spagyrica.
Crocus Martis aperitivus.
Essentia martiata aperitiva.
Liquor Tartari spleneticus.
Terræ foliatæ Tartari limpidus.
mineralis aperitivus.
Lumbrici terrestres præparati.
Millepedes præparati.
Oleum destillatum Absinthii.
Pulegii.
Capparum.
Sal volatile oleosum Sylvii.
Salia Media.
Sapo medicatus.
Tartarus vitriolatus.
Tackenii.
Solubilis.
Terra foliata Tartari.
Tinctura Tartari tartarifata.
Vitrioli Martis Zwelferi.

SPUTUM CRUENTUM. Vid.
HÆMOPTYSIS.

*

STERNUTATORIA, ERRHINA.

Pulvis sternutatorius.
albus, five Elæo-
saccharum Ce-
phalicum Ca-
merarii.

STIMULANTIA.

Interne.

Aqua Hungarica.
Carminativa, five Claretum sex
feminum.
Confectio feminis Sinapi.
Pars II.

*

STOMACHICA.

Externe.

Balsamum Cephalicum Saxonicum.
stomachicum.
Emplastrum de Crusta panis.
baccis Lauri.
stomachicum de Tacama-
haca.
Oleum Menthæ.
Unguentum stomachale.

Interne.

Aqua Absinthii.
Caryophyllorum aromaticorum.
Cinnamomi Buglossata.
Cydoniata.
cum vino.
Corticum Aurantiorum.
cum vi-
no.

Citri.

Carminativa.

spirituosa.

Cordialis Cinnamomi.

Embryonum, five balsamum.

Ligni Sassafras composita.

Maltichina.

Melissæ spirituosa Carmelitarum.

Myrrhæ.

Panis.

stomachica.

Theriacalis simplex.

composita.

Conditum Corticum Aurantiorum.

Citri.

Cydoniorum, five Marme-
lada.

Nucum Juglandium.

Calami aromatici.

Cichorii.

C c c c c

Confectio

Confectio Cinnamomi regia.
de Hyacintho.
seminis Coriandri.
Fœniculi.

Conserva Florum Centaurii.
Cichorii.
Naphæ.

Absinthii.

Diacydonium compositum aromaticum.
Elæosaccharum Corticum Aurantiorum.
Citri.

Anisi.
Caryophyllorum aro-
maticorum.
Cinnamomi.
Fœniculi.
Macis.
Nucis Moschatæ.

Electarium de Acoro.
baccis Lauri.

Elixir Cordiale & Stomachicum, vul-
go GARRUS.

Prophylacticum amarum.

Proprietatis albumi Helmontii.

dulce.

sine acido Boerhaa-
vii.

cum acido Boerhaa-
vii.

vitæ Matthioli.

Mulierum.

Essentia Absinthii composita.
simplex.

Angelicæ.

Balsamica Gmelini.

Benzoes composita.
simplex.

Cardui benedicti.

Carminativa Wedelii.

Centaurii minoris.

Cephalicæ.

Corticum Aurantiorum spiri-
tuosa.

Aurantiorum cum
vino Malvati-
co.

Galangæ.

Gentianæ.

Stomachica.

Polychrestæ.

Theriacalis.

Trifolii fibrini.

Extractum Absinthii.

Centaurii minoris.

Cardui benedicti.

Chamædryos.

Cichorii.

Gentianæ.

Morsuli Imperatoris.

Oleum destillatum Absinthii.

Anisi.

Calami aromatici.

Caryophyllorum a-
romaticorum.

Cinnamomi.

Coriandri.

Fœniculi.

Macis.

Melissæ.

Menthæ.

Nucis Moschatæ.

Origani.

Saturejæ.

Serpilli.

Thymi.

Pasta regia Stomachalis, sive Martius
panis.

Pulvis Cordialis Zellenfis.

Stomachicus Birckmanni.

Species Dianthos,
aromaticæ Caryophyllatæ.
Rosatæ.

Imperatoris.

pro vino Absinthiaco.

de Hyacintho.

Spiritus Anisi.

Ceraforum nigrorum.

Cydoniorum.

Juniperi è baccis.

Mastichinus.

Melissæ.

Menthæ.

Panis.

Pomorum redolentium.

Rosarum per fermentationem.

Salis Ammoniaci aromaticus.
succinatus.

Succolada Regia.

simplex.

composita.

Syrupus de Absinthio compositus.
Agrestis.

Balsamicus.

Cardui benedicti.

Cinnamomi.

Corticis Peruviani.

Corticum Aurantiorum.

Citri.

Cydoniorum.

Cichorei cum Rhabbarbaro.

Menthæ.

Nucistæ.

de Stoechade.

Tragea aromatica Gabelckoveri.
officinalis.

Theriaca Diatesaron.
pauperum.

Tinctura

Tinctura Martis cum vino Malvatico
& pomis Aurantiis.

Pomata.

Proprietatis Mynsichti.

Stomachica aromatica.

Lipsiensis.

martialis Edinburgensis.

Vinum Hippocraticum.

STRANGURIA, URINÆ STILLICIDIUM.

Interne.

Aqua Fragorum.

Elæosaccharum Spermatidis Ceti.

Laudanum diureticum, sive Urinarium Michael.

Pilulæ de Cynoglossio.

Spiritus Salis concentratus, sive Glaberianus.

STRUMÆ. Vid. SCROPHULÆ.

*

SUDORES IMMODICI, COLLIQUATIVI.

Externe.

Emplastrum Diachylon simplex.

Interne.

Agaricus Trochiscatus.

Confectio de Hyacintho.

SUDORIFERA.

Externe.

Emplastrum Diaphoreticum Mynsichti.

Balnea laconica.

Interne.

Acetum Bezoardicum, sive

Aqua prophylactica Sylvii.

Animalis, seu Hippenterorum,
sive destillatum equinum.

Bezoardicum animale,
minerale.

Conchæ citratæ.

præparatæ.

Conserva florum Betonicæ.

Decoctum antivenereum.

Diascordium Fracastorii.

Elæosaccharum Succini.

Essentia Lumbricorum.

Lignorum.

Pimpinellæ albæ.

Myrrhæ.

Scordii.

Serpentariæ Virginianæ.

Vincetoxici.

Extractum Chamæpityos.

Flores Benzoës.

Globuli bezoardici.

Liquor anodynus mineralis.

Cornu cervi succinatus.

albus.

Mithridatium Damocratis.

Mixtura simplex alba.

Ludovici.

Oculi Cancrorum citrati.

Oleum destillatum Absinthii

Ligni Rhodii.

Succini.

Pulvis diaphoreticus.

Sal digestivum Sylvii.

Tartari volatile.

Spiritus bezoardicus Buffii.

Carminativus de tribus.

Sambuci è baccis.

Cornu cervi.

Fuliginis.

Juniperi è baccis.

Lumbricorum volatilis.

Tartari simplex.

Theriacalis.

Syrupus Contrayervæ compositus.

Theriaca Diatesaron.

Tinctura bezoardica officinalis.

Coralliorum.

SUGILLATIO.

Externe.

Oleum Saponis.

Spiritus Lavendulæ.

Matricalis.

Unguentum viride potabile.

SUFFOCATIO UTERINA.

Externe.

Acetum aromaticum, sive odoratum,
hystericum.

Balsamum hystericum.

Interne.

Aqua Melissæ cum vino.

Hungarica.

Syrupus de Artemisia.

C c c c c a

SUP.

S U P P E D A N E A.

Balsamum Somniferum.
 Emplastrum Suppedaneum Boerhaavii.
 Unguentum Alabastrinum.
 Populeum.

S U P P U R A T I O.

Externe.

Unguentum Basilicum.

T A B E S.

Externe.

Oleum septem florum,
 Unguentum ad membra tabida.

Interne.

Gelatina Cornu cervi citrata.

T E M P E R A N T I A.

Interne.

Aqua Fragorum.
 Decoctum antifebrile.
 Passulatum.
 Lapis Prunellæ, five Nitrum tabulatum.
 Nitrum Antimoniatum.
 CrySTALLISATUM.
 Pulpa Tamarindorum.
 Pulvis antispasmodicus nitrosus.
 Temperans.

T I N E A.

Externe.

Lapis medicamentofus.
 Oleum Laurinum.
 Unguentum Enulatum.
 de Nicotiana.

T O N I C A.

Aqua Veronicæ cum vino.
 Chalybs præparatus, five Alcohol Martis.
 Conditum Cichorii.
 Conserva florum Cichorii.
 Acetosæ.
 Elixir antifebrile.
 Essentia Corticum Aurantiorum spirituo-
 fa.
 cum vi-
 no
 Mal-
 vati-
 co.

Unguentum digestivum.

Interne.

Syrupus Hederæ terrestris.

SUSURRUS ET TINNITUS
AURIUM.*Externe.*

Oleum amygdalarum dulcium.

T.

Essentia Corticum Cascarillæ.
 Gentianæ.

Extractum Absinthii.

Centaurii minoris.

Chamædryos.

Corticum Cascarillæ.

Cichorii.

Gentianæ.

Martis pomatum.

Flores Salis Ammoniaci martiales.

Mixtura tonico-nervina Stahlî.

Spiritus Salis Ammoniaci anilatus.

volatilis vino-
 fus.

Syrupus Corticis Peruviani.

Tinctura Martis aperitiva tartarifata Lu-
 dovici.

cum vino Malvatico &
 pomis Aurantiis.

è Vitriolo Zwelferi.

Stomachica Liptiensis.

martialis Edinbur-
 gensis.

T O P H I, N O D I.

Externe.

Mercurius præcipitatus albus, five
 Cosmeticus.

Oleum Saponis.

Spiritus Fuliginis.

Tartari simplex.

T O R M I N A.

Externe.

Oleum Anagallidis.

Anethi.

Carminativum.

Chamomillæ.

Laurinum.

Unguentum Carminativum.

Majoranæ.

Martiatum.

Interne.

Interne.

Aqua theriacalis composita.
vulneraria.
Zedoariæ anisata.
epileptica puerorum.
Cornu cervi ustum.
Electarium Diascordium Fracastorii.
de Manna.
Essentia Pimpinellæ albæ.
Vincetoxici.
Oleum Amygdalarum dulcium.
Nucis Moschatæ expressum.
Pulvis ad tormina infantum.
Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro,

Decoctum traumaticum.
Essentia Hyperici.
Populi vulneraria.
traumatica.
Extractum Artemisiæ.
Chamæpityos.
Liquor vulnerarius mineralis, sive Bal-
samum vulnerarium minerale Dip-
pelii.
Oleum Artemisiæ destillatum.
Pilulæ traumaticæ.
Sal Absinthii.
Species pro decocto vulnerario.
Syrupus Betonicæ.
Hederæ terrestris.
Hyperici.
Unguentum rubrum potabile.
viride potabile.

TRAUMATICA, VULNERARIA.

Externe.

Balsamum Arcæi.
Locatelli.
Samaritanum.
Sulphuris Rulandi.
Vulnerarium.
Emplastrum album coctum, sive Min-
dereri.
de cerussa.
Ammoniaco.
defensivum Würzii.
diachylon cum Gummi.
simplex.
Diapalmæ, aliàs Diachal-
citeos.
Divinum.
Griseum, sive
de Lapide Calaminari.
Minio.
Norimbergense.
Opodeldoch.
Stipticum Crollii.
Tripharmacum.
Viride.
Globuli martiales.
Oleum Millefolii destillatum.
Hyperici.
Lumbricorum terrestrium.
Tinctura Aloës.
Unguentum aureum.
Basilicum.
digestivum.
Fuscum.

Interne.

Aqua Veronicæ cum vino.
Visceralis Maucharti.
Balsamum Locatelli.
Persicum, sive Commenda-
toris.
Conserva Bellidis florum.
rosarum rubrarum simplex.
vitriolata.

T R E M O R.

Interne.

Aqua Anhaltina.
Oleum feminis Sinapi.
Sal volatile oleosum Sylvi.

T U S S I S.

Externe.

Unguentum pectorale.
rubum potabile, in tussi
ferina.

Interne.

Aqua florum Acaciæ.
Veronicæ cum vino.
Asthmatica.
Looch fani & experti.
Balsamum Angelicæ.
Sulphuris anisatum.
Bacilli de Liquiritia albi.
Citriini.
Confectio feminis Anisi.
Fœniculi.
Conserva Millepedum.
Decoctum Limacum.
Elæosaccharum Spermatidis Ceti.
Electarium resumptivum.
Elixir pectorale Wedelii.
Extractum Liquiritiæ gummosum, sive
Gluten pectorale.
Nicotianæ.
Looch de Farfara.
Pulmone vulpis.
fanum & expertum.
Massa Liquiritiæ fusca.
Oleum Amygdalarum dulcium.
Pulegii destillatum.

D d d d d

Pasta

Pasta Althææ.
 Pilulæ de Cynoglossò.
 pecttorales.
 de Styrace sine Ambra.
 Pulvis pectoralis resolvens.
 Vitæ Imperatoris.
 Rotulæ Diaireos.
 Saccharum Glycyrrhizatum.
 Species Diaireos.
 Diatragacanthæ frigidæ.
 decocti pectoralis.
 Syrupus de Althæa.
 balsamicus.
 Bellidis è Succo.
 Brassicæ rubræ.
 Capillorum Veneris.
 Diacodyon crocatum.
 de Erylimo Lobelii.
 Farfara.
 Hyssopi.

Syrupus de Jujubis.
 Musco querno ad tussim
 convulsivam.
 Rorellæ.
 Sulphuris, five Arcanum Be-
 chicum Willisii.
 è Symphito Fernelii.
 Violarum.
 Trochisci Bechici citrini.
 rubri.
 nigri.

T Y M P A N I T I S.

Externè.
 Emplastrum de baccis Lauri.
 Cumino.
 Oleum Foeniculi expressum.

Internè.

Vid. C A R M I N A T I V A.

V.

V A R I O L Æ.

Externè.

Emplastrum Suppedaneum Boerhaavii.
 Oleum ovorum.
 Unguentum defensivum.

Internè.

Cornu cervi philosophicè præparatum.
 Ebur philosophicè præparatum.
 ustum album, five spodium.
 Globuli bezoardici.
 Mixtura simplex alba.
 Nitrum Crystallifatum.
 Pulvis Contrayervæ compositus.
 Species decocti pectoralis.
 Syrupus Contrayervæ simplex.
 Granorum Kermes.

VERMES. Vid. ANTHELMINTICA.

*

VERRUCÆ. Vid. CLAVI.

*

V E R T I G O.

Externè.

Acetum aromaticum, five odoratum.
 Aqua Odorifera.
 Balsamum apoplecticum.
 hystericum.

Elæosaccharum Errhinum.
 Emplastrum vesicatorium.
 cephalicum.

Internè.

Aqua Cerasorum nigrorum.
 Cinnamomi vinosa.
 Liliorum convallium cum vino.
 Melissæ cum vino.
 Anhaltina.
 Hungarica.
 Hysterica.
 Balsamum vitæ.
 Confectio seminis Cubearum,
 Elixir pectorale Wedelii.
 Essentia Ambræ liquida.

VOMITORIA, EMETICA.

Internè.

Aqua benedicta Rulandi, five vinum
 emeticum.
 Syrupus emeticus.
 Vitrum Antimonii Hyacinthinum.
 Ceratum.

VOMITUS MODERANTIA,
COHIBENTIA.

Externè.

Aqua Anhaltina.
 Melissæ spirituosa Carmelitarum.
 Balsamum stomachicum.

Emplastrum

Emplastrum de crusta panis.
 Tacamachaca.
 Oleum Menthæ destillatum.
 Mastichinum coctum.
 Unguentum stomachale.

Interne.

Aqua Cordialis Cinnamomi.
 Embryonum, sive balsamum.
 Correctior, sive
 Elixir vitæ
 Mulierum.
 Mastichina.
 Theriacalis composita.
 Balsamum vitæ.
 Bolus Armena.
 Conditum Cydoniorum, sive Marmelada.

Conserva Menthæ.
 Cornu cervi ustum.
 Diacydonium simplex.
 compositum aromaticum.
 Diascordium Fracastorii.
 Electarium de Manna.
 Oleum Nucis Moschatæ expressum.
 Mithridatum Damocratis.
 Roob Omphacii.
 Syrupus Berberum.
 Cydoniorum.
 Menthæ.
 Rhabarbari chalybeatus.

VULNERARIA. Vid. TRAUMATICA.

U.

ULCERA, VULNERA, FISTULÆ. *Interne.*

Externe.

Aqua Calcis vivæ.
 Grisea.
 Mercurialis.
 phagedænica.
 Saphirina.
 Emplastrum album coctum, sive de
 Cerussa.
 Citrinum.
 Diapompholygos.
 Diafulphuris.
 Divinum.
 Griseum, sive de lapide calaminari.
 Miraculosum.
 Norimbergense.
 Saturninum Mynsichti.
 de Scrophularia.
 Spermate ranarum.
 Triapharmacum.
 Viride.

Essentia balsami Peruviani.

Lapis medicamentosus.

Oleum Sabinæ.

Laterinum, sive Philosophorum.

Florum Slotani.

Sparadrapum, sive Tela Gualteri.

Unguentum Apostolorum.

digitalis.

de Minio camphoratum
 aliàs rubrum.

Nicotiana.

Balsamum pectorale Meibomii.
 Sulphuris amygdalatum.
 Decoctum antivenereum.
 Extractum Symphiti majoris.
 Flores Sulphuris.
 Mercurius dulcis.
 Syrupus balsamicus.
 Terebinthina cocta.
 Regulus Antimonii medicinalis.
 Sapo medicatus.

URINAM MOVENTIA. Vid. DIURETICA.

*

URINÆ RETENTIO. Vid. ISCHURIA.

*

URINANDI DIFFICULTAS. Vid. DYSURIA.

*

URINÆ STILLICIDIUM. Vid. STRANGURIA.

*

UTERINA.

Externe.

Emplastrum de Spermate Ceti.
 D d d d d 2 Oleum

Oleum Cheiri.
Majoranæ.

Interne.

Aqua Melissæ cum vino.
Conserva florum Betonicæ.
Elæosaccharum Macis.
Nucis Moschataæ.
Essentia Spicæ Indicæ.
Succini.
Valerianæ composita.
Extractum Tanaceti.

Extractum Aristoiuchiæ.
Bryoniæ.
Guttæ Anglicanæ Cephalicæ.
Mel Anthosatum.
Oleum destillatum Millefolii.
Salviæ.
Tanaceti.
Macis.
Piperis.
Spiritus Sambuci è baccis.
Melissæ.
Syrupus Melissæ.
Tinctura Asæ foetidæ.





INDEX

II.

TRILINGUIS

REMEDIORUM SIMPLICIUM

ET

COMPOSITORUM,

QUÆ

IN

PARTE SECUNDA PHARMACOPOEAE

HELVETICÆ

CONTINENTUR.

A

Acetum Aromaticum, sive odoratum.	Wurz-Esig, zum anstreichen.	Vinaigre Aromatique, ou de senteur. Pag. 4
Bezoardicum.	Gist-Esig.	Bezoardique, 5
Sylvii.	Sylvii Gist-Esig.	de Sylvius. 5
Calendulæ.	Ringelblumen-Esig.	de Soucy. 3
Destillatum.	Destillirter Esig.	destillé. 2
Hystericum.	Mutter-Esig.	hystérique, ou contre les vapeurs. 5
Lavendulæ.	Lavendel-Esig.	de Lavande. 3
Liliorum convallium.	Magenblümlein-Esig.	de Muguet. 3
Lithargyrii, sive Saturninum.	Silberglätt-Esig.	Saturne ou de Litharge. 3
		Acetum

Acetum Odoratum sive aromaticum.	Anstreich- oder Wurz-Esig.	Vinaigre de Senteur, ou aromatique. pag. 4
Papaveris rheados, vel erratici.	Klapperrosen-Esig.	de Coquelicoc, ou Pavot rouge. 3
Rosarum.	Rosen-Esig.	Rosat. 2
Rubi Idæi.	Himbeeren-Esig.	de Framboises. 3
Rutaceum.	Kauten-Esig.	de Rüe. 3
Sambuci florum.	Holderblüth-Esig.	de Sureau. 3
Saturninum, sive Lithargyrii.	Silberglätt-Esig.	Saturne, ou de Litharge. 3
Scilliticum.	Meerzwibel-Esig.	de Scille. 4
Simplex.	Gemeiner Esig.	Simple. 1
Tunicæ florum.	Regelein-Esig.	d'œuilletts. 3
Æris flores, sive	CrySTALLISIRTER GRÜNSPAN.	Verd de gris crySTALLISÉ. 5
Æs viride crySTALLISATUM.	Gebrandt Kupfer.	Cuivre brulé. 6
ustum.	Schwarzes Antimonial-pulver.	Æthiops Antimonial. 6
Æthiops Antimonialis.	Mineralisch Wurm-pulver.	Mineral. 6
Mineralis.	Perchenschwamm-Zeltlein.	Agaric en trochisques, ou Trôchisques d'Agaric. 6
Agaricus trochiscatus.	Philosophisch zubereitetes Glend-Horn.	Corne d'Elan préparée. 7
Alcis Cornu philosophicè præparatum.	Gereinigte Aloe.	Aloës depuré. voyés Extrait d'Aloës. 7
Aloë depurata, sive lota, vid. Extractum.	Mit Rosen infuso eingekochte Aloe.	Aloës cuit avec l'infusion de Roses. 7
insuccata rosata.	Mit violen infuso eingekochte Aloe.	Aloës cuit avec l'infusion de violettes. 7
violata.	Alaun-Zucker.	Sucre d'Alun. 7
Alumen Saccharinum.	Mynsichts tingirter Alaun.	Alun teint de Mynsicht. 7
tinctum Mynsichti.	Gebrandter Alaun.	brulé. 7
ustum.	Rhabarbara-tinctur.	Teinture de Rhubarbe.
Anima Rhabarbari. vid. Tinctura.	Poters Schwindsucht-pulver.	Antihectique de Poter. 8
Antihecticum Poterii, seu Diaphoreticum Joviale.	Spießglas-Butter.	Beurre d'Antimoine. 8
Antimonii Butyrum.	Spießglas-Zinnober.	Cinabre d'Antimoine. 8
Cinnabaris.	Schweistreibend Spießglas mit Eisenfeil.	Clyffe d'Antimoine. 8
Clyffus.	Einfaches Schweistreibend Spießglas.	Antimoine diaphoretique martial. 9
Antimonium diaphoreticum martiale.	Zusammengesetzte destillirte Wasser.	simple. 9
simplex.	Einfache destillirte Wasser.	Eaux destillées composées. 16
Aquæ destillatae compositæ.	Stabwurztraut-Wasser.	simples. 9
simplices.	Wermuth-Wasser.	Eau d'Auronne. 11
Aqua Abrotani.	Schlehblüt-Wasser.	d'Absinthe. 11
Absointhii.	Sauerampfer-Wasser.	de fleurs de Prunier sauvage. 12
Acaciæ florum.	Sauerklee-Wasser.	d'Oseille. 11
Acetosæ.	Ohrenwehe-Wasser.	d'Alleluja. 11
Acetosellæ.	Londener Alaun-Wasser.	Acoustique. 16
Acustica.	Gauchheil-Wasser.	Alumineuse de Londres. 30
Aluminosa Londinensis.	Angelic-Wasser.	de Mouron. 11
Anagallidis.	Anhaltisch-Wasser mit Biesem.	d'Angelique. 11
Angelicæ.	ohne Biesem.	Anhaltine complete. 17
Anhaltina completa.		incomplete. 16
incompleta.		

Aqua Animalis , five destilla- tum equinum.	Ross = Wasser.	Eau Animale.	pag. 17
Anisi.	Anis = Wasser.	d'Anis.	12
Anserinæ.	Gänserich = Wasser.	d'Argentine.	10
Antihectica.	Wasser für die Schwindsucht.	contre l'Étiſie.	17
Antimelancholica.	Wasser für die Milzucht.	l'hypocondrie.	18
Antiscorbutica tempera- ta.	Temperirtes Scharbock-Was- ser.	antiscorbutique.	18
Apoplectica minùs spi- rituosa.	Schwächeres Schlag-Wasser.	contre l'apoplexie , moins forte.	18
Spirituosa.	Stärkeres Schlag = Wasser.	plus forte.	18
Ari.	Aron = Wasser.	de pied de Veaux.	11
Artemisiæ.	Benfus = Wasser.	d'Armoise.	11
Asthmatica.	Puft = Wasser.	contre l'asthme.	19
Aurantiorum corticum.	Pomeranzen = Schelfen = Was- ser.	d'Ecorces d'Orange.	13
cum vino.	mit Wein.	avec du vin.	15
florum, vel Naphæ.	Pomeranzen Blüt = Wasser.	de fleurs d'Orange.	12
Balsamica. vid. ad go- norrhoeam.			
Balsami Embryonum.	Kinder = Balsam.	contre l'avortement.	22
Beccabungæ.	Bachbungen = Wasser.	de Becabungæ.	11
Bellidis.	Zeitlosen oder Maslieben- Wasser.	de Baquerette ou pe- tite Marguerite.	11
Benedicta Rulandi seu vinum e- meticum.	Rulands Brech = Wein.	Emetique , ou vin Emetique de Ruland.	30
Serpilli.	Quendel = Wasser.	de Serpolet.	19
Betonicæ.	Betonien = Wasser.	de Betoine.	10
Borraginis.	Borretsch = Wasser.	de Bourrache.	11
Brunellæ.	Brunellen = Wasser.	de Brunelle.	10
Buglossi.	Schsenzungen = Wasser.	de Buglosse.	11
Bursæ pastoris.	Täschelkraut = Wasser.	de Tabouret , ou bourse à Ber- ger.	11
Calcis vivæ.	Ungelöschten Kalk = Wasser.	de Chaux vive.	30
Calendulæ.	Ringelblumen = Wasser.	de Soucy.	10
Caponis.	Capaimen = Wasser.	de Chapon.	19
Carbunculi.	Carfunkel = Wasser.	contre les charbons.	20
Cardiaca officinalis.	Ordinari Herz = Wasser.	Cordiale officinelle.	30
perlata.	Herz = stärkendes Berlen = Was- ser.	perlée.	31
Cardui Benedicti.	Cardo Benedikten = Wasser.	de Chardon benit.	10
Mariæ.	Frauentistel = Wasser.	Marie.	11
Carminativa ordinaria.	Ordinari Wind = Wasser.	Carminative, ou con- tre les vents.	20
Sex femi- num.	Wind = Rosolt.	Carminative, ou Ros- soli des six grai- nes.	10
Spirituosa.	Starkes Wind = Wasser.	Carminative spiritu- euse.	23
Carvi.	Karben , oder Kümmich- Wasser.	de Carvi.	12

Aqua Caryophyllorum aromaticorum.	Würz = Megelein = Wasser.	Eau de Gerofles.	pag. 12
Centaurii minoris.	Tausend Guldenkraut = Wasser.	de petite Centaurée.	10
Cephalica Caroli V.	Caroli V. Haupt = Wasser.	Cephalique de Char-	
		les V.	21
Ceraforum nigrorum.	Schwarzkirschen = Wasser.	de Cerises noires.	12
Chærefolii.	Körbelkraut = Wasser.	de Cerfeuil.	11
Chamomillæ.	Camillen = Wasser.	de Camomille.	11
Cheiri florum.	Gelb = violen = Wasser.	de Giroflée jaune.	12
Cichorii.	Begwarten = Wasser.	de Chicorée.	11
Cinnamomi.	Zimmet = Wasser.	de Canelle.	13
		Buglossée.	13
Buglossata.	mit Ochsen-		
	Zungen.		
Cordialis.	Herz = stärkendes Zimmet-	Cordiale.	21
	Wasser.		
C. vino.	Zimmet = Wasser mit Wein.	Vineuse.	14
Cydoniata.	mit Quit-	Cydoniée.	13
	ten.		
fine vino.	ohne Wein.	sans vin.	
Citri corticum.	Citronen Schelfen = Wasser.	d'Ecorces de citron.	13
florum.	Citronen Blut = Wasser.	de fleurs de citron.	12
Cochleariæ.	Löffelkraut = Wasser.	d'Herbe aux cuillers.	11
Confortativa, sive per-	Kraft = oder Perlen = Wasser.	Confortative.	
lata.			
Consolidæ minoris. vid.			
Prunellæ.			
è Corde Cervi.	Hirsch Herz = Wasser.	du cœur de cerf.	21
Cordialis frigida.	Kühlendes Herz = Wasser.	Cordiale rafraichis-	
		sante.	21
		temperée.	21
temperata.	Temperirtes Herz = Wasser.		
Cornu Cervi citrata.	Hirschhorn = Wasser mit Ci-	de Corne de cerf	
	tronen.	citrée.	22
Corticum Aurantiorum.	Pomeranzenschelfen = Wasser.	d'Ecorces d'Orange.	13
cum vino.	mit Wein.	avec du	
		vin.	15
Citri.	Citronen Schelfen = Wasser.	de citron.	13
Cosmetica.	Schminck = Wasser.	Cosmetique.	31
Cumini.	Kümmel = Wasser.	de Cumin.	12
Cyani florum.	Blaue Korn = Blumen = Was-	de Bleuet.	12
	ser.		
Diuretica è nucleis.	Harntreibend = Wasser aus	de Noyaux diuretique.	22
	Kernen.		
Embryonum correctior,	Verbesserter Kinder = Balsam.	reformée contre l'avor-	
sive Elixir vitæ		tement.	23
mulierum.			
Embryonum ordinaria.	Gemeiner Kinder = Balsam.	Contre l'avortement	
		officinelle.	22
Endiviæ, sive Intybi.	Endivien = Wasser.	d'Endive.	11
Epidemica Londinensis.	Londener Wasser in Gift lauf-	Epidemique de Lon-	
	ten.	dres.	23
Epileptica Langii.	Langens Gicht = Wasser.	Epileptique de Lan-	
		gius.	23
puerorum.	Gicht = Wasser für Kinder.	pour les	
		enfants.	32
Euphrasiæ.	Augen = Trost = Wasser.	d'Euphrasie.	10
Farfaræ, sive Tussilaginis.	Huflattig = Wasser.	de fleurs de pas d'Ane.	10
Florum omnium.	Allerley Blumen = Wasser.	de Mille fleurs.	13
Foeniculi herbæ.	Fenchel = Kraut = Wasser.	d'Herbe de Fenoüil.	11

Aqua Foeniculi seminis.	Fenchelsaamen-Wasser.	Eau de semence de Fe- noüil. pag. 12
Fortis.	Scheide-Wasser.	Forte. 32
Fragariæ.	Erdbeerkraut-Wasser.	de Fraisiert. 10
Fragorum.	Erdbeer-Wasser.	de Fraises. 13
Fumariæ.	Taubenkropf, oder Erdrauch- Wasser.	de Fumeterre. 10
Galegæ.	Geisrauten-Wasser.	de Galega. 10
ad gonorrhæam Hoffm.	Hoffmanns! Tripper-Wasser.	contre la chaudépisse par Hoffm. 23
Riverii.	Rivers Tripper-Wasser.	par River. 25
grisea.	Gundelreben-Wasser.	grise. 32
Hederæ terrestris.	Edel-Leberkraut-Wasser.	de Lierre terrestre, ou Terrette. 11
Hepaticæ nobilis.	Hermetisches Wasser.	d'Hepatique noble. 10
Hermetica.	Schwalben-Wasser mit Bi- bergail.	Hermetique. 32
Hirundinum cum Casto- reo.	ohne Biber- gail.	d'Hirondelles avec du Castor. 24
fine Castoreo.	Ungarisches-Wasser.	sans Castor. 24
Hungarica.	Tsphen-Wasser.	de la Reine. 24
Hyssopi.	Mutter-Wasser.	d'Hyssope. 25
Hysterica.	Endiven-Wasser.	Hysterique. 11
Intybi, sive Endiviæ.	Wachholderbeeren-Wasser.	d'Endive. 11
Juniperi è baccis.	Lattich-Wasser.	de bayes de Gènevre. 11
Lactucæ.	Lavendel-Wasser.	de Laituë. 11
Lavendulæ.	Managetti Laxier-Wasser.	de Lavande. 11
Laxativa Managetti. vid. Infusum.	Wiener Laxier-Wasser.	Laxative de Mana- getti. 24
Viennensis. vid. Infus.	Liebstockel-Wasser.	de Vienne. 11
Levistici.	Sassafras-Wasser.	de Levesche. 11
Ligni Sassafras compo- sita.	Weiß Lilien-Wasser.	de Sassafras composée. 25
Liliorum Alborum.	Mayenblümlein-Wasser.	de fleurs de Lis blancs. 12
Convallium.	mit Wein.	de Muguet. 12
cum vino.	Brust-Wasser.	avec du vin. 15
Looch sani & experti.	Muth-Wasser.	de Looch, contre l'asthme. 25
Magnanimitatis.	Majoran-Wasser.	de Magnanimité. 25
Majoranæ.	Mastix-Wasser.	de Marjolaine. 11
Mastichina.	Metram, oder Mutterkraut- Wasser.	de Mastic. 26
Matricariæ.	Melissen-Wasser.	de Matricaire. 11
Melissæ.	für das Mut- ter-wehe.	de Melisse. 11
antihysterica.	mit Wein.	hysterique. 26
cum vino.	Starkes Melissen-Wasser.	avec du vin. 15
spirituosa com- posita.	Destillirt Honig-Wasser.	spiritueuse, ou Eau des Carmes. 26
Mellis.	Deumenten oder Krausmünz- Wasser.	de Miel. 14
Menthæ.	Mercurial-Wasser zum äusser- lichen Gebrauch.	de Menthe. 11
Mercurialis ad usus ex- ternos.	Mauer-Esel-Wasser.	Mercurielle pour l'u- sage extérieur. 32
Millepedum.	Myrrhen-Wasser.	de Cloportes. 33
Myrrhæ.	Brunnenfress-Wasser.	de Myrrhe. 14
Nasturtii.		de Cresson. 11
Pars II.	[b]	Aqua

Aqua Nephritica.	Stein- und Gries treibendes Wasser.	Eau Nephritique.	pag 26
Nivis.	Schnee-Wasser.	de Neige.	14
Odorifera.	Wasser zum riechen oder anstreichen.	de Senteur.	27
Ophthalmica.	Augen-Wasser.	Ophthalmique ou Collyre.	33
coerulea vel saphirina.	Blau Augen-Wasser.	de couleur bleue.	34
Panis.	Brod-Wasser.	de Pain.	27
Paralyseos florum, sive Primulae veris.	Schlüsselblumen-Wasser.	de Prime vere.	12
Paregorica.	Schmerzenlinderndes-Wasser.	Paregorique ou anodyne.	33
Perlarum confortativa.	Stärkendes Perlen-Wasser.	confortative perlée.	11
Petroselinii.	Petersilien-Wasser.	de Persil.	11
Phagedaenica.	Wasser, das wilde Fleisch wegzuziehen.	pour les chairs baveuses.	33
Physagoga.	Wind-Wasser.	Carminative.	
vid. aqua carminat.			
Poeoniae florum.	Sichtrosen-Wasser.	de fleurs de Pivoine.	12
Plantaginis.	Wegerich-Wasser.	de Plantain.	10
Portulacae.	Burzelkraut-Wasser.	de Pourpier.	11
Primulae veris, sive Paralyseos.	Schlüsselblumen-Wasser.	de Prime vere.	12
Prophylactica Sylvii.	Sylvii bewehrungs-Wasser.	préservative de Sylvius.	
vid. Acetum Bezoardicum.			
Prunellae vel Brunellae, sive consolidae minoris.	Brunellen-Wasser.	de Brunelle.	10
Quercus foliorum.	Eichenlaub-Wasser.	de feuilles de Chêne.	10
Raphani hortensis.	Rettig-Wasser.	de Raifort.	11
rusticani & Armoraciae.	Meerrettig-Wasser.	de grand raifort.	11
Reginae Hungariae vid. Aqua Hungarica.			
Regis.	Gold Scheid-Wasser.	Regale.	34
Rorismarini foliorum.	Rosmarin-Wasser.	de Romarin.	12
Rosarum.	Rosen-Wasser.	de Roses.	12
Rubi Idæi è fructibus.	Himbeer-Wasser.	de Framboises.	14
Rutae hortensis.	Rauten-Wasser.	de Ruë.	12
Salviae composita.	Zusammengesetztes Salben-Wasser.	de Sauge composée.	27
simplex.	Salben-Wasser.	de Sauge.	12
Sambuci florum.	Holderblüht-Wasser.	de fleurs de Sureau.	12
Sapphirina, vel ophthalmica coerulea.	Blau-Augen-Wasser.	Ophthalmique de couleur bleuë.	34
Saxifragiae.	Steinbrech-Wasser.	de Saxifrage.	10
Scabiosae.	Apostemkraut-Wasser.	de Scabieuse.	10
Scordii.	Lachenknoblauch-Wasser.	de Scordium.	10
Scorzoneræ.	Schlangen-Wurz-Wasser.	de Scorfonère.	10
Sedi, vel Sempervivi.	Hauswurz-Wasser.	de Cedon ou Joubarbe.	11
Serpilli.	Quendel-Wasser.	de Serpolet.	12
Sigilli Salomonis.	Weißwurz-Wasser.	de Sceau de Salomon.	10
Solani.	Nachtschatten-Wasser.	de Morelle.	10
Spermatis ranarum.	Froschleich-Wasser.	de frais de Grenouilles.	14
		Aqua	

Aqua Stomachica.	Magen-Wasser.	Eau Stomacale.	pag. 27
Tanaceti.	Rhein- oder Wurmfarn Wasser.	de Tanesie.	12
Taraxaci vel dentis Leonis.	Pfaffenröhrlein-Wasser.	de dent de Lion, ou pilse-enlit.	11
Telephii.	Bundkraut, Knabenkraut, Bruchwurzel-Wasser.	d'Orpin, ou de Graf- fette.	11
Theriacalis composita.	Zusammengesetztes Theriacal- Wasser.	Theriacale composée.	28
simplex.	Theriac Wasser.	simple.	27
ad Tormina infantum.	Leibweh-Wasser; oder Bauch- grimmen-Wasser.	contre les tranchées des enfants.	34
Tunicæ florum.	Regelblumen-Wasser.	de fleurs d'œuillets.	
Tussilaginis. vid. Farfa- ræ.	Huflattig-Wasser.	de pas d'A- ne.	
Typhorum Cervi com- posita.	Zusammengesetztes Hirschkol- ben-Wasser.	de Typhes de Cerf composée.	28
sim- plex.	Einfaches Hirschkolben-Was- ser.	simple.	28
Valerianæ.	Baldrian-Wasser.	de Valeriane.	10
Verbenæ.	Eisenkraut-Wasser.	de Verveine.	10
Veronicæ.	Ehrenpreis-Wasser.	de Veronique.	10
cum vino.	mit Wein.	avec du vin.	15
Visceralis Maucharti.	Maucharts Magen-Wasser.	Viscerale de Mau- chart.	28
Vitæ Mulierum, vel Aqua Embryonum.	Weiber-Aquavit.	de Vie pour les fem- mes.	22. 23.
Urticæ.	Nessel-Wasser.	d'Ortie.	11
Vulneraria spirituosa.	Wund-Wasser mit Brandes- wein.	Vulneraire ou d'Ar- quebusade spiri- tueuse.	29
vinosa.	mit Wein.	avec du vin.	29
Zedoariæ anisata.	Zittwer-Wasser mit Anis.	de Zedoaire anisé.	29
cum vino.	mit Wein.	avec du vin.	16
Arcanum Bechicum Willisii. vid. Syrupus Sul- phuris.			
Arcanum duplicatum, five ni- trum vitriola- tum.	Milz-Salz.	Sel de duobus.	34
Tartari, five Terra foliata Tartari.	Blätterichte Weinstein-Erd.	Terre feuillée de Tartre.	35
Aroph Paracelsi. vid.	Paracelsi eröffnende Stahl- Tinctur.	Aroph de Paracelse.	
Tinctura Martis. Aperitiva.			
Aurum fulminans.	Donner-Gold.	Or fulminant.	35

B.

Bacilli ad fornacem vid. Massa ad fornacem. de Liquiritia albi. citri.	Ofen = Bak.	Masse d'Espagne odorife- rante. pag.
Balneum deterfivum. Emolliens. paregoricum.	Weis gebakten Süßholz. Gelb gebakten Süßholz. Reinigendes Bad. Erweichendes Bad. Lindrendes Bad.	Bâtons de Reglisse blancs. 35 jaunes. 36
Balsama composita. Simplicia.	Zusammengesetzte Balsam. Einfache Balsam.	Bain deterfif. 36 Emollient. 36 Sedatif. 36
Balsamum Angelicæ. Apoplecticum. Arcæi. Caryophyllorum aromaticorum. Cephalicum Saxo- nicum. Cinnamomi. Commendatoris. vid. Persicum. Cosmeticum. Embryonum vid. Aqua Em- bryonum. Hystericum. Lavendulæ. Ligni Rodii.	Angelik = Balsam. Schlag = Balsam. Arcæi Wund = Balsam. Regelein = Balsam. Sächsischer Haupt = Balsam. Zimmet = Balsam. Persischer Wund = Balsam. Schminke = Balsam. Kinder = Balsam. Mutter = Balsam. Lavendel = Balsam. Rosen = Holz = Balsam.	Beaumes composés. 37 Simples. 36 Beaume d'Angelique 37 Apoplectique. 37 d'Arcæus. 38 de Gerosles. 37
Locatelli. Loimicum. Macis.	Locatells = Balsam. Pest = Balsam. Muscate = Blut = Balsam.	Cephalique de Sa- xe. 38 de Canelle. 37 de Perse ou du Commandeur. 38 Cosmetique. 38 Contre l'avorte- ment.
Magicum. Majoranæ. Odontalgicum.	Zauber = Balsam. Majoran = Balsam. Zahn = Balsam.	Hystérique. 38 de Lavande. 37 de Bois de Rho- de, ou Ro- se, ou Cy- pre. 37 de Locatelli. 39 contre la Peste. 39 de Fleurs de Mu- scade. 37 Magique. 39 de Marjolaine. 37 contre le mal de dent. 39
Pectorale Meibo- mii. Persicum.	Meiboms = Brust = Balsam. Persischer Wund = Balsam.	Pectoral de Mei- bom. 39 de Perse ou du Commen- deur. 39
Rorismarini. Rutæ. Samaritanum. Somniferum. Stomachicum. Succini.	Rosmarin = Balsam. Nauten = Balsam. Samariter = Balsam. Schlaf = Balsam. Magen = Balsam. Agtstein = Balsam.	de Romarin. 37 de Rûe. 37 du Samaritain. 40 Somnifer. 40 Stomachique. 40 de Carabe ou d'Ambre 30 jaune.
Sulphuris Amygda- latum. Anisa- tum. Ruland.	Schwefel = Balsam mit Man- del = Del. mit Anis- Del. Rulands Schwefel = Balsam.	de Soufre aman- dé. 40 Anisé. 40 de Ru- land. 41 Bal.

Balsamum Vitæ.	Lebens-Balsam.	Beaume de vie.	pag. 41
Vulnerar.	Wund-Balsam.	Vulneraire,	42
Minerale	Dippels Mineralischer Wund-	Mine-	
Dippe-	Balsam.	ral de	
lii. vid.		Dip-	
vulne-		pel.	
rarius			
Vulnerar. Vegetabi-	Dippels Vegetabilischer Wund-	Vulneraire. Vege-	
le Dip-	Balsam.	tal de	
pelii.		Dip-	
vid. Li-		pel.	
quor			
vulne-			
rarius			
vegeta-			
bilis.			
Vulnerar. Mindere-	Minderers Wund-Balsam.	de Min-	
ri.		derer.	42
Vulnerar. Viride.	Grüner Wund-Balsam.	verd.	42
Bezoardicum animale.	Matter-Pulver.	Poudre de Vipères.	42
Joviale.	Bezoardisch Zinn.	Bezoar Jovial.	42
Martiale.	Bezoardisch Eisen, oder Lu-	Martial, ou Poudre	
	dovici eröffnendes Pulver.	cachectique de	
		Ludovici.	43
Minerale.	Mineralisch-Bezoar, oder Mi-	Mineral.	43
	neralisch Widergift.		
Boli Armenæ præparatio.	Præparierter Armenischer Bo-	Bol d'Arménie préparé.	43
	lus.		
Bromium vid. Species pro	Species zum Haber-Trank.	Herbes pour la Ptifane d'A-	
Decocto Ave-		voine.	
næ.			
Butyrum Antimonii. vid. An-	Spiegelglas-Butter.	Beurre d'Antimoine.	
timonii But.			
Cacao. vid. Ol. ex-	Cacao-Butter.	de Cacao.	
press.			
Majoranæ potabile	Rother Majoran-Butter.	de Marjolaine rouge	
rubrum.		potable.	
viride.	Grüner Majoran-Butter.	verd	
		potable.	
vid. Un-			
guen.			

C.

Candelæ fumales.	Rauch-Kerzlein.	Cloux à Parfum.	43
completæ.	complete.	complets.	44
Caput mortuum Vitrioli. vid.	Todtenkopf vom Vitriol.	Tête morte de Vitriol.	
Colcothar.			
Cassia extracta. vid. Pulpa	Cassien.extract.	Extrait de Cassia.	
Cassia.			
Cauterium potentiale.	Das Corrosif.	Cautère.	44
Cera arborea.	Baum-Wachs.	Cire aux arbres.	44
Sigillaris rubra	Roth Sigil-Wachs.	rouge.	44
viridis.	Grün Sigil-Wachs.	verde.	44

Cerata.	Plaster mit Wachs.	Emplâtre avec de la cire. pag. 44.
Chalybis præparatio.	Zubereitung des Stahls.	Præparation du fer. 44
Chalybs cum Sulphure præ- paratus.	Mit Schwefel præparirtes Eisen,	Fer préparé avec du Sou- fre. 45
Chocolada composita. vid. Succo- lata comp.	Chocolad.	Chocolad composé.
Regia. vid. Succolada. Simplex. vid. Succola- da.		Royal. Simple.
Cinnabaris Antimonii vid. Antim. Cin- nab.	Spiegelglas = Zinnober.	Cinabre d'Antimoine.
Factitia. nativa præpa- rata.	Gemachter Zinnober. Præparierter Berg = Zinnober.	Factice. 45 naturel, ou mine- ral pré- paré. 45
Claretum è feminibus. vid. Aqua Carmi- nativa sex fe- minum.	Claret von Samen.	Eau clâirette.
Colcothar. Colophonia. Conchæ citratæ. præparatæ.	Todten = Kopf vom Vitriol. Geigen = Harz. Meer = Muscheln mit Citronen Saft. Præparirte Meer = Muscheln. Mit Zucker eingemachte Sa- chen.	Colcothar. 46 Colophone, ou Bray sec. 219. Coquilles citrées. 46 préparées. 46 Confitures. 46
Conditum Ananas. Aurantiorum cor- ticum. Berberum. Calami aromatici. Caryophyllorum aromatico- rum. Ceraforum acido- rum. Cichorii radicum. Citri carnis. Corticum. Cornorum. Cydoniorum, five Marmelada. Cynosbatos. Enulæ radicum.	Eingemachte Ananassen. Bomeranzen = Schelfen. Erbselen. Calmus. Negelein. Kirschen, Weich- sel. Wegwart = Wur- zel. Citronat. Eingemachte Citronen = Schel- fen. Dürlützen, oder Ruhr = Kir- schen. Quitten. Hieffen oder Ha- genbutten. Alant = Wurzel.	Ananas confit. 46 Ecorces d'Orange con- fites. 46 47 Calamus aromaticus confit. 48 Cloux de Géroses confits. 46 Cerises confites. 47 Chicorée confite. 48 Citronat. 46 47 Ecorces de Citron con- fites. 46 47 Cornoüilles confites. 47 Coins confits. 47 Gratte - eu confit. 47 Racines d'Aunée confites. 48

Conditum

Conditum Eryngii radicum.	Eingemachte Manns treu- Wurzel.	Racines de chardon Ro- land con- fites. pag. 47
Fragorum.	Erd-Beeren.	Fraises confites. 47
Nucum Indica- rum.	Indianische Nü- se.	Noix d'Inde ou Noix Mu- scades con- fites. 46
Juglan- dium.	Welsche Nüse.	Confites. 47
Prunorum.	Quetschen.	Pruneaux doux confits. 47
Ribium.	Johannes- Traublein.	Grosfeilles confites. 47
Rubi Idæi.	Simbeeren.	Framboises confites. 47
Satyrii radicum.	Stendel- Wurzel.	Racines de Satyrion con- fites. 48
Scorzoneræ.	Scorzoner.	Scorconères confites. 48
Uvarum.	Trauben.	Raisins confits. 47
Zingiberis Indici.	Indianischer Zimber.	Gingembre d'Inde confit. 46
Confectio Alkermes completa.	Alhermes mit Bisam und Ambra.	Confection d'Alkermes complete. 48
incom- pleta.	Ohne Bisam und Ambra.	incomple- te. 48
Anisi laxativa. Simplex.	Rasier- Anis. Ueberzuckerter Anis.	d'Anis laxative. 49 d'Anis, ou Anis sucré. 50 de Sementine. 50
Cinæ, sive Santonici.	Wurm- Camen.	
Cinnamomi Regia.	Königlicher Zimmet Confect.	de Canelle Ro- yale. 49
Coriandri.	Ueberzuckerter Coriander.	Coriandre sucré. 50
Cubebæ.	Ueberzuckerter Cubeben.	Cubebes sucrées. 50
Foeniculi.	Fenchel.	Fenouil sucré. 50
Hamech.	Hamechs- Lattweg.	Confection Hamech. 49
de Hyacintho com- ple- ta.	Hyacinthen- Lattweg mit Bi- sam und Ambra.	de Hyacinthe 49 com- ple- te. 49
in- com- ple- ta.	ohne Bisam und Ambra.	in com- ple- te. 49
Sinapis.	Ueberzuckerter Senf- Camen.	Semence de Moutarde su- cree. 50
Conserva.	Mit Zucker eingemacht.	Conserve. 50
Abinthii.	Wermuth- Zucker.	d'Abünthe. 50
Acetosæ.	Sauer- Ampfer- Zucker.	d'Oseille, ou Aceteuse. 50
Acetosellæ.	Sauer- Alee- Zucker.	d'Alleluja, ou d'oseille sau- vage. 50
Anthos florum.	Rosmarin- Zucker.	de Romarin. 50
Aurantiorum è pul- pa.	Bomeranzen- Zucker.	de la Pulpe d'O- range. 50
Béccabungæ.	Bachbungen- Zucker.	de Becabunge. 50
Bellidis florum.	Zeitlosen, oder Maslieben- Zucker.	de Paquerette, ou petite Mar- guerite.
Betonicæ florum.	Betonien- Zucker.	de Betoine. 50 Centau-

Conserva Borriginis florum.

Buglossi florum.

Centaurei florum.

Cichorii florum.

Citri è pulpa.

Cochleariæ.

Euphrasiæ florum.

Majoranæ.

Menthæ.

Millepedum.

Naphæ sive Auran-
tiorum.Papaveris erratici
florum.Paralyseos, vel Pri-
mulæ ve-
ris.

Pæoniæ florum.

Primulæ veris, sive
Paralyseos.

Rosar. pallidar.

rubrar. Sim-
plex.Vitri-
olata.

Salviæ florum.

Spagyrica completa.

incom-
pleta.

Tunicæ florum.

Violarum.

Visceralis, sive Spa-
gyrica.

Borretsch = Zucker.

Ochsen = Zungen = Zucker.

Tausend Gulden = Blümlein =
Zucker.

Wegwarten = Zucker.

Citronen = Zucker.

Löffel = Kraut = Zucker.

Augen = Trost = Zucker.

Majoran = Zucker.

Deumenten = Zucker.

Maur = Esel = Zucker.

Pomeranzen = Zucker.

Klapperrosen = Zucker.

Schlüsselblumen = Zucker.

Gichtrosen = Zucker.

Schlüsselblumen = Zucker.

Bleicher Rosen = Zucker.

Rother Rosen = Zucker.

mit
Vitri-
ol-
Geist.

Salbey = Zucker.

Stärkender Magen = Zucker
mit Biesem.
ohne Biesem.

Negelblumen = Zucker.

Blauer Viole = Zucker.

Stärkender Magen = Zucker.

Conserve de Bourra-

che. pag. 50

de Buglosse. 50

de petite Centau-
rée. 50

de Chicorée. 50

de la Pulpe de
Citron. 50d'Herbe aux cuil-
lers. 50

d'Euphrase. 50

de Marjolaine. 50

de Mente crepué. 50

de Cloportes. 51

d'Orange. 50

Conserve de Fleurs de Co-

que-
licoc,
ou
Pa-
vot
rou-
ge. 50Conserve de Fleurs de Pri-
me

vere. 50

Pi-
voi-

ne. 50

Prime

vere. 50

Roses

pâles. 50

Conserve de Fleurs de Roses

rou-
ges.
ou de
Pro-
vins. 50
vi-
trio-
lée. 50Sau-
ge. 50Viscerale com-
plete. 51incom-
plete. 51de Fleurs d'Oeil-
letsrou-
ges. 51de Vio-
lettes. 51

Viscerale. 51

Corallia

Corallia alba præparata.	Weisse Corallen.	Corail blanc préparé.	pag. 51
rubra præparata.	Rothe Corallen.	rouge préparé.	51
Cornu Alcis præparatum.	Præparirtes Elends = Horn.	Corne d'Elan préparée.	51
Cervi auratum.	Hirsch = Horn mit Gold.	de Cerf brulée avec	
		de l'or.	52
philosophicè	Ohne Feuer præparirtes	préparée	
præparatum.	Hirsch = Horn, oder	sans feu,	
	weiß = gekochtes Hirsch =	ou philo-	
	Horn.	sophi-	
		que-	
		ment.	52
ustum.	Gebrenntes Hirsch = Horn.	brulée	52
Cornu Rhinocerotis præpa-	Præparirtes Nas = Horn.	Corne de Rhinoceros pré-	
ratum.		paré.	52
Cranium humanum præpara-	Præparirte Menschen = Hirn =	Crane humain préparé.	52
tum.	schaale.		
Cremor & crystalli Tartari.	Weisses Weinstein = Pulver.	Crème & Crystaux de Tar-	
		tre.	52
Creta alba præparata.	Præparirte weisse Kreide.	Craye blanche préparée.	53
Crocus Martis adstringens.	Unhaltendes Stahl = Pulver.	Safran de Mars adstringent.	53
aperitivus.	Eröffnendes Stahl = Pulver.	aperitif.	53
Anti-	Stahls Stahl = Pulver mit	Antimonie	
mo-	Spießglas.	de Stahl.	53
nia-			
tus			
Stah-			
lii.			
Metallorum.	Metallisches Brech = Pulver,	des Metaux.	54
	oder Safran von Spieß-		
	glas.		
Solis.	Gold = Kalch.	d'or.	54
Veneris.	Kupfer = Kalch.	de Cuivre.	54
CrySTALLUS mineralis. vid. Lapis	Getafelter Salpeter.	Crystal mineral.	
Prunellæ, aut			
nitrum tabula-			
tum.			
Montana præparata.	Præparirter Berg = CrySTALL.	préparé.	54

D.

D ecoctum album.	Weisser = Trank.	Decoction blanche.	55
amarum.	Bitter = Trank.	amère.	55
antifebrile.	Fieber = Trank.	ou Apozeme	
		febrifuge.	55
Avenaceum Lo-	Haber = Trank.	d'Avoine.	
weri. vid.			
Species			
pro deco-			
cto Ave-			
naceo.			
Cornu cervi ci-	Hirsch = Horn = Trank mit Ci-	de Corne de cerf	
tratum.	tronen = Saft.	citrée.	55
Diæticum Sy-	Sydenham's Diæts = Trank.	de Regime de	
denhami.		Sydenham	55
Limacum.	Schnecken = Trank.	d'Esqarcot.	56
Passulatum.	Rosinlein = Trank.	de Passules.	56
Pini.	Fichten = Trank.	Pin.	56
Tamarindorum.	Tamarinden = Trank.	Tamarin.	56
Travmaticum.	Wund = Trank.	Vulnèraire.	56
		anti-	

Decoctum anti-venereum.	Franzosen-Trank.	Decoction antivenerien- ne. pag. 57
Dentes Apri præparati.	Præparirte Wild-Schweins- Zahn.	Dents de Sanglier prépa- rées. 57
Hippopotami præpa- ti.	Wallroß, oder See-Pferds Zahn.	d'Hippopotame, ou de cheval ma- rin préparées. 57
Destillatum Equinum. vid. Aqua animalis.		
Diacodium. vid. Syrupus.	Johannis-Brod-Saft.	Syrop de Carouges.
Diacydonium compositum a- romaticum.	Quitten-Lattweg mit Ge- würz.	Cotignac aromatique com- posé. 57
Jalappinum.	Burgirende Quitten-Lattweg.	laxatif avec Jalap. 57
simplex.	Quitten-Lattweg.	simple. 57
Diagrydium Liquiritiatum.	Bereitetes Scammonium mit Süß- Holz.	Scammonée regliffée. 58
Sulphuratum.	mit Schwe- fel.	Souphrée. 58
Diaphoreticum Joviale. vid. Anti- hecti- cum Po- terii.	Poterii Schwind-Pulver.	Antimoine diaphoretique Jovial. 1
Martiale vid. Anti- mo- nium Diapho- reticum martia- le.	Schwitz-Pulver mit Stahl.	Martial.
Diascordium Fracastorii. vid. Electuar.	Fracastors Gift-oder Lachen- Knoblauch-Lattweg.	Diascordium de Fracastor.
Diateffaron. vid. Theriaca.	Theriac vor das Viehe.	Theriacque pour les bêtes.

E.

Ebur philosophicè præpara- tum.	Præparirt Elffenbein.	Yvoir préparée. 58
ustum album, sive Spodium.	Weiß gebrannt Elffenbein.	brulée, ou Spo- dium. 58
Eclegma.		
Elaterium.	Esel-Kürbis-Saft.	Extrait de concombre Sau- vage. 59
Elæosaccharum Anisi.	Anis-Öel-Zucker.	Sucre huilé d'Anis. 59
Aurantiorum Corticum.	Bomeranzen-Öel-Zucker.	d'Ecorce d'O- range. 59
Cardiacum.	Herzstärkender Öel-Zucker.	Cordial. 60
Cephalicum	Hauptstärkender Öel-Zucker.	Cephalique. 60
Came- rarii. vid. Pulvis sternu- tato- rius.	Camerarii Nieß-Pulver.	de Ca- me- ra- ri- us.
Caryophyllo- rum.	Negelein-Öel-Zucker.	de Cloux de Gero- fles. 59
		Elæosac-

Elæosaccharum Cinnamomi.	Zimmet = Del = Zucker.	Sucre huilé de Cannelle.
Citri corti- cum.	Citronen = Del = Zucker.	pag. 59
Errhinum.	Nieß = Del = Zucker, oder weißer Schnupf = Taback.	d'Ecorces de Citron. 59
Foeniculi.	Fenchel = Del = Zucker.	à éternuer. 60
Macis.	Muscat = Del = Zucker.	de Fenoüil. 59
Nucis Mos- chatae.	Muscatnus = Del = Zucker.	Macis, ou Fleurs de Muscade. 59
Spermatis Ce- ti.	Wallrath = Zucker.	de Muscade. 59
Succini.	Agstein = Del = Zucker.	Blanc de Balei- ne. 60
Electuarium de Acoro, sive Diacori.	Acorum, oder Magen = Latt- werg.	d'Ambre jaune, ou de Ca- rabé. 59
Baccis Lauri.	Porbeer = Lattwerg.	Diacorus, ou opiate stoma- chale. 60
Catholicum.	Larier = Lattwerg.	Opiate de Bayes de Lau- rier. 61
Chalybeatum.	Stahl = Lattwerg.	Catholicon. 61
Diacassiae cum Manna.	Lattwerg von Cassia und Man- na.	Martiale. 61
Diacydonium com- posi- tum aro- mati- cum.	Vom Gewürz zusammenge- setzte Quitten = Lattwerg.	de Cassé avec la Manne. 62
Jalap- pi- num.	Burgierende Quitten = Latt- werg.	Cotignac composé d'Epi- ces. 57
Sim- plex.	Gemeine Quitten = Lattwerg.	laxatif avec Ja- lap. 57
Diasatyrium.	Kochzeiter, oder Stendel- Wurz = Lattwerg, oder Krafft = Lattwerg.	simple. 57
Diascordii Fraca- storii.	Fracastorii Gift = oder Lachens- Knoblauch = Lattwerg.	Opiate Diasatyrium. 62
Antifebrile.	Fieber = Lattwerg.	Diascordium. 62
Gingivale.	Mund = oder Zahn = Lattwerg.	Frebrifuge. 63
Hiera Piera Sim- plex.	Bittere Burgier = Lattwerg.	pour les Gencives & les dents. 63
Anti - hydropi- cum.	Wasser = Sucht = Lattwerg.	Purgatif amer Sim- ple. 63
Lenitivum Flo- renzolæ. Ob- solevit.	Larier = Lattwerg.	Contre l'Hydro- pisie. 63
de Manna.	Manna = Lattwerg.	Laxative.
Mithridatium Da- mocratis.	Mithridat.	de Manne. 64
		Mithridat, ou Anti- dote. 64

Electuarium Orvietanum, vid. Or- vie- ta- num.	Orvietti Gift = Rattwerg.	Opiate d'Orvietan.	pag.
Pectorale.	Brust = Rattwerg.	Pectorale.	65
Philonium Roma- num. Ob- solevit.	Schmerzen = stillende Rattwerg.	anodyne.	
Requies Nicolai. Obsole- vit.	Kinder = Theriac, oder Ruhe- Rattwerg.	pour les Enfants.	
Resumptivum.	Stärkende Schwind = Ratt- werg.	contre l'Étisie.	66
Tamarindorum.	Tamarinden = Rattwerg.	de Tamarins.	66
Tetrapharma- cum, five Theriaca paupe- rum.	Armen Theriac.	des Pauvres.	68
Theriaceæ Andro- machi.	Theriac.	Theriacque.	66
Elixir Acidum Dippelii.	Dippels saures Elixir.	Elixir Acide de Dippel.	60
Antifebrile.	Fieber = Elixir.	Febrifuge.	69
Aperitivum Clauderi.	Clauders eröffnend Elixir.	Aperitif.	69
Cordiale & stomachi- cum, vulgo Gar- rus. Pharm. Paris.	Herz und Magenstärkendes E- lixir, oder Safran = E- lixir.	Cordial & stomachi- que, ou Garrus.	70
Mastichinum. vid. Spiri- tus Masti- chinus.	Mastix = Elixir.	de Mastic.	
Myrrhæ Londinense.	Londener Myrrhen = Elixir.	Myrrhe de Lon- dres.	70
Pectorale Balsamicum Edinbur- gense.	Edinburger Brust = Balsam- Elixir.	Pectoral Balsamique d'Edin- bourg.	71
Regis Da- niæ.	Dänisches Brust = Elixir.	du Roi de Danne- marc.	70
Wedelii.	Wedels Brust = Elixir.	de Wedel.	71
Polychrestum Hallen- se.	Hallisches Miltz = Elixir.	Polychreste de Hal- le.	71
Prophylacticum ama- rum.	Bitteres Preservatif = Elixir.	Amer Préservatif.	71
Proprietatis album Hel- montii.	Helmonts weisses Elixir.	de Propriété blanc d'Hel- mont.	72
dulcis. cum Aci- de Boer- havii.	Süß = Magen = Elixir. Boerhaavens Saures Magens- Elixir.	doux. 72 acide de Boer- haa- ve. 73 fin	

Elixir	Proprietatis sine Acido Boerhaa- vii.	Boerhaaves Süßes Magen- Elixir.	Elixir de Propriété doux de Boer- haa- ve. pag. 72
	Paracelsi.	Paracelsi-Magen-Elixir.	de Pa- racel- se. 73
	cum Rha- barbaro.	Exirendes Magen-Elixir.	avec la Rhu- bar- be. 73
Salutis.		Eröffnendes Elixir.	Aperitif. 74
Stomachicum viscerale	tempe- raturum Hoff- manni, sive Es- sentia Balsa- mica tempe- rator.	Hoffmanns temperirtes Ma- gen-Elixir.	Temperé de Hoff- mann. 74
	Spiritu- osum Hoff. sive Es- sentia Balsa- mica.	Starkes Magen- Elixir.	Spiritueux de Hoff- mann. 74
Elixir Vitæ	Matthioli com- ple- tum jux- ta dis- pens. Vien. in- com- ple- tum.	Matthiolen Lebens-Elixir mit Bisem und Ambra.	Elixir de Vie de Matthio- le complet. 75
	Mulierum. vid. Aqua Em- bryonum.	ohne Bisem und Ambra.	incom- plet. 75
Vitrioli Mynsichti.		Mynsichts saures Magen- Elixir.	de Vitriol par Myn- sicht. 75
Uterinum.		Mutter-Elixir.	de Mère. 76
Emplastrum Album coctum, sive de Cerussa.		Bleyweiß-Pflaster.	Emplâtre de Cerusse. 77
de Ammoniaco.		Ammoniac-Pflaster.	Gomme Am- moniac. 77
Anodynum.		Schmerzstillendes-Pflaster.	Anodin. 77
Ant-apoplecti- cum.		Schlagfluß-Pflaster.	contre l'Apople- xie. 77
epilecticum Cratonis.		Cratons Fallendweh-Pflaster.	le Haut- mal. 77
Pars II.		[e]	Em-

Emplastrum Antipodagricum.	Zipperlein-Pflaster.	Emplâtre contre la Gout-
de Baccis Lauri,	Lorbeer-Pflaster.	te. pag. 78
five Ceratum de	Betonien-Pflaster.	de Bayes de Lau-
Betonica.		rier. 78
Camphoratum	Stahls Campfer-Pflaster.	de Betoine. 78
Stahlii.		Camfré de Stahl. 78
Capucinatorum.	Capuciner-Pflaster.	des Capucins. 79
Catarrhale Dispens.	Hauptfluß-Pflaster.	Catarrhal. 79
Brandenb.		
Cephalicum. Disp.	Haupt-Pflaster.	Cephalique. 79
Brandenb.		
de Cernissa. vid.		
Empl. al-		
bum coct.		
Cicuta cum	Schierling- oder Milz-Pflaster.	de Ciguë. 79
Ammono-		
niaco.		
five Ceratum Ci-	Gelb Zug-Pflaster.	Citrinum. 80
trinum.		
ad Clavos & Ver-	Hüneraugen-Pflaster.	pour les Cors aux
rucas pe-		pieds. 80
dum.		
de Cruſta panis.	Brod-Rinden-Pflaster.	de Croute de pain. 80
Cumino.	Rümmich-Pflaster.	Cumin. 80
Defensivum Fel.	Wurzens Defensiv-Pflaster.	Defensif. 80
Würz.		
Rubrum	Wepfers Defensiv-Pflaster.	Rouge. 81
Wepferi.		
Diabotantum	Zertheilend Kräuter-Pflaster.	Diabotantum. 81
Blondelli		
dispens.		
Argent.		
Diachylon	Gemein Diachylum-Pflaster.	Diachylon sim-
simplex.		ple. 81
cum	Diachylum-Pflaster mit Gum-	avec
Gummi.	mi.	Gom-
		mes. 82
Diapalmæ, aliàs	Diapalmen-Pflaster.	Diapalme. 82
Diachal-		
citeos.		
Diaphoreticum	Mynsichts Zertheilend-Pflaster.	Diaphoretique
Mynsichti.		de Myn-
		sicht. 83
Diapompholygos.	Rothlauf-Pflaster, oder weiß	de Pompholyx,
	Nichts-Pflaster.	ou de Cala-
		mine blan-
		che. 83
Diapulphuris Ru-	Schwefel-Pflaster.	Souphre de
landi.		Ruland. 86
Divinum.	Besonder Pflaster.	particulier. 83
Febrifugum Mi-	Michaelis Fieber-Pflaster.	Febrifuge de Mi-
chaëlis.		chaëlis. 84
Filii Zachariæ.	Zacharia Brust-Pflaster.	de Zacharie. 84
ad Fonticulos.	Fontanell-Pflaster.	pour les Cautères. 84
Fracturas &	Beinbruch-Pflaster.	Fractu-
Luxationes.		res. 85
		Em-

Emplastrum de Galbano Crocatum Mynsichti.	Mynsichts Mutter-Pflaster mit Safran.	Emplâtre de Galbanum avec Safran de Mynsicht.
ad Ganglia.	Ueberbein-Pflaster.	pag. 85
Griseum, five de Lapide calaminari.	Gallmey-Pflaster.	pour les Ganglions. 85
ad Hernias, five Rupturas.	Bruch-Pflaster.	Gris, ou de Pierre calaminai- re. 85
Hydropem Fulleri.	Fullers Wassersucht-Pflaster.	pour les Hernies. 86
de Hyoscyamo.	Bilsenkraut-Pflaster.	l'hydropisie. 86
Hystericum. vid. Emplastrum Matricale.	Mutter-Pflaster.	de Jusquiame. 86
Sydenhami. vid. Empl. Matricale Sydenh.	Sydenhams Mutter-Pflaster.	Matrical.
Incognitum. vid. Empl. Satalinum.	Ungeannt oder Sandel-Pflaster.	de Sydenham.
Ischiadicum.	Hust, oder Lendenwehe-Pflaster.	Inconnu, ou Sandalin.
de Lapide Calaminari. vid. Empl. Griseum.	Galmey-Pflaster.	pour la Sciatique. 86
Magneticum.	Magnet-Pflaster.	de Pierre Calaminaire.
Malacticum.	Erweichendes-Pflaster.	d'Aimant Arsenical. 87
Mammillare.	und zertheilendes Brust-Pflaster.	Emollient. 87
Matricale, five Hystericum.	Mutter-Pflaster.	pour le Sein, ou les mamelles. 87
five Hystericum Sydenhami.	Sydenhams Mutter-Pflaster.	Matrical. 87
de Meliloto.	Meliloten, oder Stein-Klee-Pflaster.	de Sydenham. 88
Mercuriale.	Mercurial-Pflaster.	de Melilot. 88
five Ceratum de Minio-rubrum.	Mennig-Pflaster.	Mercurial. 88
Miraculosum.	Wunder-Pflaster.	de Minium, ou Plomb rouge. 88
è Mucilaginibus.	Erweichend Pflaster.	Miraculeux. 88
Nervinum Hoffmanni.	Nerven-Pflaster.	de Mucilages. 89
de Nicotiana Le Mort.	Taback-Pflaster.	pour les nerfs. 89
Norimbergense.	Nürnberg-Pflaster.	de Tabac. 89
		Nürnberg. 89

Emplastrum Odontalgicum.	Zahn-Pflaster.	Emplâtre pour les maux de Dents.
		pag. 90
Opodeldoch.	Röthlich-Bund-Pflaster.	Opodeldoch. 90
Oxycroceum.	Safran-Pflaster.	Oxycroceum, ou de Safran. 90
è Plumbo. vid. Saturninum Mynsicht..	Bley-Pflaster.	Saturnin. 90
de Ranis Vigonis cum Mercurio.	Frosch-Pflaster mit Quecksilber.	de Grenouilles avec Mer- cure. 91
fine Mercurio.	ohne Quecksilber.	sans Mer- cure. 91
Regium Burri.	Royal-Pflaster.	Royal. 91
ad Rupturas, five Hernias. vid. Empl. ad Hernias,	Bruch-Pflaster.	pour les Hernies. 91
five Ceratum Santalinum, aliàs Incognitum.	Sandel- oder Leber-Pflaster.	Santalin, ou in- connu. 92
Saponatum Bar- bette.	Barbette's Seifen-Pflaster.	de Savon de Bar- bette. 92
Saturninum, five è Plumbo Mynsichti.	Bley-Pflaster.	Saturnin. 92
de Scrophularia. Spermate Ceti.	Braunwurz-Pflaster. Wallrath-Pflaster.	de Scrophulaire. Blanc de Ba- leine. 93
Ra- na- rum.	Froschleichen-Pflaster.	Frais de Gre- nouilles. 93
Spleneticum.	Milz-Pflaster.	Splenetique. 93
Stipticum Crollii.	Stich-Pflaster.	Stiptique de Crol- lius. 94
Stomachicum de Tacamahaca.	Tacamahac-Pflaster.	de Tacamaque. 94
Suppedaneum Boerhaavii.	Fuß = Solen-Pflaster.	pour les plantes des piés. 94
Triapharmacum.	Brauner Zug, Braun-Pflaster.	de trois ingre- diens, ou Triaphar- macom. 95
ad Vermes.	Pflaster wider die Würme.	pour les vers. 95
Vesicatorium.	Blasen ziehendes Pflaster.	vesicatoire. 95
Viride. Dispen. Argentorat.	Grün Pflaster.	verd. 96
Emulsio Analeptica.	Stärkende Kühl-Milch.	Emulsion analeptique. 96
Anodyna & temperans.	Linderende Kühl-Milch.	anodyne, tempe- rante. 96
Externi usus pro frontali.	Kühl-Milch zum Ueberschlag.	Frontale. 97
Lubricans diuretica.	Harntreibende Kühl-Milch.	lubrifiante & diureti- que. 97
		Emulsio

Emulsio Violata Mynsichti.	Violen • Saamen • Kühl- Milch.	Emulsion violate de Myn- sicht. pag. 97
Enema Anodynum & Balsa- micum.	Schmerzen • stillende und Bal- samische Clystir.	Lavement Anodin & bal- samique. 97
Emolliens & laxans.	Erweichende und laxirende Clystir.	Emollient laxa- tif. 98
five Clyster intestina emolliens, aperi- ens, anodynus. Gaub. Meth. conc. form.	Eröffnende und linderende Cli- stir.	aperitif, anodin. 98
Eas Veneris Boylei. vid. Sul- phur. Vitrioli A- nodynum.	Schmerzen • stillender Vitriol- Schwefel.	Souphre de Vitriol anodin.
Essentia Absinthii composita.	Zusammengesetzte Vermuth- Essenz.	Essence d'Absinthe compo- sée. 98
simplex.	Vermuth • Essenz.	simple. 98
AlexipharmacaStah- lii.	Stahls Gift • wehrende Es- senz.	Alexitère de Stahl. 99
Tem- pera- ta vel simpli- cior Stah- lii.	Temperirte Gift • wehrende Essenz.	temperée de Stahl. 99
Amara.	Bittere Essenz.	Amère. 99
Ambraë liquida.	Amber • Essenz.	d'Ambre gris. 99
Sicca.	Trockene Amber • Essenz.	Se- che. 99
Angelicaë.	Angelika • Essenz.	d'Angelique. 100
Anodyna officinalis.	Schmerz • stillende Essenz.	Anodyne officinel- le. 100
five Lauda- num li- quidum Syden- hami.	Sydenhams Schmerz • stillende Essenz.	ou Lau- danum liquide de Sy- denham. 100
Ant-arthritica J. M.	Hoffmanns Glieder • Essenz mit opio.	pour le Rhumatif- me avec opium. 100
Hoff- manni cum opio.		
Ejus- dem sine opio.	ohne o- pio.	sans opi- um. 100
Antihydrica Hoff- man- ni.	Wassersucht • Es- senz.	antihydrique. 101
Ant-asthmatica & an- tihydro- pica A.	Luft und Wassersucht • Essenz. A.	antasthmaticque & antihydripi- que. 101
Alia ejusdem virtutis & usüs. B.	Eine desgleichen B.	de la même vertu, que la préce- dente. 101

Essentia Antiscorbutica.

Scharbofs = Essenz.

Essence antiscorbutique.

Aurantiorum corti-
cum.
vid.
Essen-
tia
corti-
cum
au-
ran-
tio-
rum.

Pomeranzen = Schelfen = Es-
senz.

pag. 102
d'Ecorce d'Oran-
ge.

Balsamica F. Hoffmanni. vid.
Elixir
Proprieta-
tis stoma-
chicum,
viscerale
tempera-
tum &
Spirituoso-
sum.

Hoffmanns Balsamische = Es-
senz.

Balsamique de
Hoffmann.

Gmelini.
Balsami Peruviani.

Gmelins Balsamische Essenz,
Peruvianische Balsam = Essenz.

de Gmelin. 102
du Beaume de Pe-
rou. 102

Benzoës composita.

Vermehrte Benzoe = Tinctur.

de Benjoin com-
posée. 102

simplex.

Ordinari Benzoe = Tinctur.

sim-
ple. 103

Cardamomi.

Cardamomen = Essenz.

de Cardamome. 103

Cardui Benedicti.

Cardobenedicten = Essenz.

Chardon benit. 103

Carminativa Wede-
lii.

Wedels Wind und Grimmen-
Essenz.

Carminative de
Wedel. 103

Castorei.

Bibergeil = Essenz.

de Castor. 103

Carminativa.

Wind = zertheilende Bibergeil-
Essenz.

Carmi-
native. 103

Catechu. vid. Essentia
Terræ Cate-
chu.

Japonische Erden = oder Ka-
schou = Essenz.

Cachou.

Centaurii minoris.

Tausend = Gulden = Kraut-
Essenz.

petite centau-
rée. 104

Cephalica.

Haupt = stärkende = Essenz.

Cephalique. 104

Chinæ chinæ, five
Corticis
Peru-
viani
sim-
plex.

Fieber = Rinden = Essenz.

de Quinquina. 104

Corticum Aurantio-
rum Spi-
ri-
tuo-
sa.
cum
vino
Mal-
vati-
co.

Pomeranzen = Essenz mit Wein-
geist.

mit Mal-
vasier.

d'Ecorces d'Oran-
ges spi-
ritueuse. 104

d'Oran-
ges Mal-
voisée. 104

Essentia

Essentia Corticum Cascarillæ.	Schackarillen = Essenz.	Essence de Cascarille. pag.	105
Culilavan.	Bitter Zimmet = Essenz.	Culilavan.	105
Croci.	Safran = Essenz.	Safran.	105
Vinosa. vid.	mit Wein.	Vineuse.	
Tinctura croci.			
Dulcis.	Stärkende Essenz.	douce.	105
Fuliginis Clauderi.	Nus = Tropfen.	de Suye.	105
Fumariæ.	Erdrauch = Essenz.	Fumeterre.	105
Galangæ.	Galanga - Wurzel = Essenz.	Galanga.	106
Gentianæ.	Gentian = Essenz.	Gentiane.	106
Hyperici.	Johannes = Kraut = Essenz.	Millepertius.	106
Levistici.	Liebstöckel = Essenz.	Levesche.	106
Ligni Sassafras simplex.	Einfache Sassafras = Essenz.	Sassafras simplex.	106
composita.	Berwehrte Sassafras = Essenz.	composée.	106
Lignorum.	Holz = Essenz.	des Bois.	106
Lumbricorum terrestrium.	Regenwürmer = Essenz.	de Vers de Terre.	107
Macis.	Muscablüth = Essenz.	Macis.	104
Martiatæ aperitiva.	Eröffnende Essenz mit Stahl.	aperitive martiale.	107
Millefolii.	Schafgarben = Essenz.	de Millefeuille.	107
Millepedum.	Maur = Esel = Essenz.	Cloportes.	107
Myrrhæ.	Myrrhen = Essenz.	Myrrhe.	108
alcalifata.	mit alcali.	alcalifée.	108
Pimpinellæ albæ.	Pimpernell = Essenz.	de Pimprenelle, ou Boucage.	108
Pini sive Abietis.	Tann = Schößlein = Essenz.	chopets de Pin.	108
Populi vulneraria.	Wund = Essenz.	Peuplier vulnéraire.	108
Scillæ.	Meer = Zwiebel = Essenz.	Scille.	108
Scordii herbæ.	Gift = oder Lachen-Knoblauch = Essenz.	Scordium.	108
Serpentariæ Virginianæ.	Virginianische Schlangen-Wurz = Essenz.	Serpentaire.	109
Spicæ Indicæ.	Indianische Spick = Essenz.	de Nard des Indes.	109
Stomachica.	Magen = Essenz.	Stomachique.	109
Polychrestita.	Polychrest = Essenz.	Polychreste.	109
Succini.	Agstein = Essenz.	de Carabé ou d'Ambre Jaune.	109
alcalifata.	mit alcali.	alcalifée.	110
Terræ Catechu, sive Terræ Japonicæ.	Japonische Erden, oder Raschu = Essenz.	Cachou.	110
Theriacalis.	Theriac, oder Gift = Essenz.	Theriacale.	110
Travmatica W.	Wund = Essenz. W.	Vulnéraire.	110
Trifolii fibrini.	Bieber = Klee = Essenz.	de Menyanthe, ou Trefle de Castor.	111
Valerianæ composita.	Baldrian = Essenz.	Valeriane.	111

Essentia Vincetoxici.	Schwalben = Wurz = Essenz.	Essence de Dompte ve- nin. pag. III
Extractum Abrotani.	Stabwurz = Extract.	Extrait d'Auronne. III
Absinthii.	Wermuth = Extract.	d'Absinthe. III
Agarici.	Lerchen = Schwamm = Extract.	d'Agaric. III
Aloës gummosum.	Aloe = Extract.	d'Aloë gommeux. III
Ligni.	Paradies = Holz = Extract.	du bois d'Aloë. III
Angelicae.	Angelic = Extract.	d'Angelique. III
Anodynum.	Schmerz = stillender Extract.	Anodyn. III
Aristolochiae cle- mati- tidis.	Osterlucen = Wurz = Extract.	d'Aristolochie. III
lon- gæ.	Pang Osterlucen = Wurz = Ex- tract.	lon- gue. III
ro- tun- dæ.	Rund Osterlucen = Wurz = Ex- tract.	ron- de. III
Artemisiae.	Beysus = Extract.	d'Armoise. III
Asari radicum.	Hasel = Wurz = Extract.	de la Racine de Ca- baret. III
Bellidis florum.	Zeitlosen = Extract.	de Baquerette. III
Borraginis.	Borretsch = Extract.	Bourrache. III
Bryoniae.	Zaun = Ruben = Extract.	Couleuvrée, ou de la vigne blan- che. III
Buglossi.	Ochsen = Zungen = Extract.	Buglosse. III
Calami aromatici.	Calmus = Extract.	Calamus aro- matique. III
Cardui Benedicti.	Cardobenedicten = Extract.	Chardon benit. III
Mariae.	Frauen = Distel = Extract.	Ma- rie. III
Caryophyllatae.	Benedict = Wurz = Extract.	de Benoite. III
Castorei.	Biebergeil = Extract.	Castoreum. III
Catholicum.	Burgierender = Extract.	Catholicon. III
Chamædryos.	Gamanderle = Extract.	de Germandrée. III
Chamæpityos.	Feld = Enpressen, oder Schlag- kraut = Extract.	d'Jvette. III
Chamomillae.	Chamillen = Extract.	de Camomille. III
Cichorii radicum.	Wegweis = oder Wegwart- Wurz = Extract.	Chicorée. III
Cochleariae.	Pöffel = Kraut = Extract.	d'Herbe aux cuil- lers. III
Colocynthidis.	Coloquinten = Extract.	de coloquinte. III
Corticum Casca- rillae.	Schacarill = Extract.	chacarille. III
chinae chinae.	Fieber = Rinden = Extract.	Quinquina. III
Crocii.	Safran = Extract.	Safran. III
Diacarthami.	Wilder Safran = oder Safflor- Extract.	de Safran batard, III
Enulae radicum.	Alant = Extract.	de la Racine d'Au- née. III
Esulae radicum.	Wolfs = Milch = Wurz = Ex- tract.	Titimale, d'Herbe au lait, d'Esule. III
Filicis radicum.	Farn = Wurz = Extract.	de fougère. III
Foliorum Sennae.	Senne = Blätter = Extract.	Sené. III
Fumariae.	Erdrauch = Extract.	Fumeterre, III Extractum

Extractum Gentianæ radicis.	Gentian-Extract.	Extrait de Gentiane. pag. 113
Guajaci è ligno.	Franzosenholz-Extract.	Bois de Guajac, ou Saint. 114
Hederæ terrestris.	Gundelreben-Extract.	Lierre terrestre, ou Terret- te. 111
Hellebori nigri.	Schwarz Nießwurz-Extract.	d'Hellebore noir. 113.
Hyperici è floribus.	Johannesblumen-Extract.	120
Jalappæ.	Jalappen-Extract.	de Millepertuis. 111
Iridis Florentinæ.	Beilwurz-Extract.	Jalap. 114
nostratis.	Schwertelwurz-Extract.	d'Iris de Florence. 114
Ligni Aloës.	Paradiesholz-Extract.	de Glayeul. 113
Guajaci.	Franzosenholz-Extract.	de Bois d'Aloë. 114
Liquiritiæ gummosum, five Gluten pectorale.	Süßholz-Extract, oder Brust- Leim.	de Guajac. 114
Lupuli.	Hopfenblumen-Extract.	Reglisse gom, meux, ou Royal. 115
Marrubii albi.	Weiser Andorn-Extract.	Houblon. 111
Martis pomatum.	Stahl-Extract mit Aepfelsaft.	Marrube blanc. 111
Mechocannæ albæ.	Weiß Rhabarbara-Extract.	Mars avec le jus de Pommes. 115
Melissæ.	Melissen-Extract.	Mecoacan. 112
Menthæ.	Deumenten-Extract.	Melisse. 111
Meu.	Bährwurz-Extract.	Menthe. 111
Myrrhæ gummosum.	Myrrhen-Extract.	Meum. 112
Nicotianæ.	Taback-Extract.	Myrrhe gom- meux. 115
Opii aquosum.	Opium-Extract.	Tabac. 115
Panchymagogum.	Lapier-Extract.	d'Opium gom- meux. 116
Papaveris.	Klapper-Rosen-Extract.	Purgatif. 116
Pimpinellæ.	Pimpernell-Extract.	de Coquelicot, ou Pavot rouge. 111
Pini è summitatibus.	Tannschößlein-Extract.	Pimprenelle. 113
Plantaginis.	Wegerich-Extract.	des Sommités de Pin. 111
Poeoniæ.	Sichtrosen-Extract.	de Plantain. 111
Rhabarbari simplex.	Rhabarbara-Extract.	Pivoine. 113
Rutæ.	Rauten-Extract.	Rhubarbe sim- ple. 116
Sabinæ è summitatibus.	Seven-Baum-Extract.	Ruë. 111
Sarsaparillæ.	Sarsaparillen-Extract.	des Sommités de Sabine. 111
Sassafras.	Fenchelholz-Extract.	de Sarsapareille. 113
Scordii.	Lachenknoblauch-Extract.	Sassafras. 113
Sennæ foliorum.	Senneblätter-Extract.	Scordium. 111
Symphyti majoris radicum.	Wallwurz, Schwarzwurz, Schneerwurz-Extract.	Sené. 116
Tanaceti.	Rheinfarn-Extract.	grand Confoude, ou d'Oreille d'Ane. 113
Taraxaci radicum.	Pfaffenröhrelein, Wurzel- tract.	Tanesie. 111
Tormentillæ radicum.	Tormentill-Extract.	Pissenlit, ou dent de Lion. 113
Trifolii fibrini.	Bieberklee-Extract.	Tormentille. 113
		Trefle de Ca- stor. 111

Extractum Turpethi.
Verbasci florum.

Veronica.
Zedoaria.

Turbithwurzel-Extract.
Wollblumen-Extract.

Ehrenpreis-Extract.
Zittwer-Extract.

Extrait de Turbit. pag. 113
Bouillon blanc,
ou Molène. 111
Veronique. 111
Zedoire. 113

F.

F El Tauri inspissatum.

Flores Benzoës.
Salis Ammoniaci mar-
tia-
les.
sim-
pli-
ces.

Sulphuris.

Getrocknete oder eingekochte
Ochsen-Gall.

Benzoë-Blumen.
Salmiac Blumen mit Stahl.

Weisse Salmiac-Blumen.

Schwefel-Blumen.

Fiel de Boeuf épaissi.

Fleurs de Benjoin. 116
Sel Ammoniac mar-
tiales. 117
sim-
ples. 117
Soufre. 117

G.

GElatina Analeptica.
Cornu Cervi citrata.

simpli-
cior.

Kraft-Sulz.
Hirschhorn-Sulz mit Citronen-
Saft.
Hirschhorn-Sulz, oder Galren.

Wind-Kugel.

Bezoar-Kugel.
Stahl-Kugel.
Bisam-Kugel.
Froschleisch.

Brust-Leim.

Præparirt Gummi Gutt.
Englische Haupt-Tropfen.

Gelée Analeptique. 118
de Corne de Cerf citrée. 118
simple. 118
Boules carminatives. 118

Glandes, sive Globuli carmi-
nativi.

Globuli Bezoardici.
Martiales.
Moschati albi.

Gluten aquaticum, sive sper-
ma ranarum.

Pectorale. Vid. Ex-
tractum Liquiri-
tiae gummosum.

Gummi Guttæ præparatio.
Guttæ Anglicæ Cephalicæ.

Bezoardiques. 118
Martiales. 119
Musquées blanches. 119
Frais de Grenouilles. 119

Extrait de Reglise gom-
meux, ou
Royal.

Gomme Gutte préparée. 120
Gouttes cephaliques. 120

H.

H Ellebori nigri depuratio.

Hepar Anguillæ præparatum.
Antimonii. Vid. Cro-
cus Metallorum.

Sulphuris.

Herbæ vulnerariæ. Vid. Spe-
cies pro deco-
cto vulne-
rario.

Hydromel simplex.

Schwarz Nies-Wurz Extract.
Præparirte Aal-Leber.
Metallisches Brech-Pulver.

Schwefel-Leber.
Wund-Kräuter.

Süßes Honig-Wasser.

Extrait d'Hellebore noir. 120
Foye d'Anguille préparé. 120
d'Antimoine.

de Souphre. 120
Herbes vulnérables.

Eau de Miel simple. 120

I.

I Nfufum laxativum Manna.
gettæ.

Vien-
nen-
se.

Laxier-Tränklein mit Manna.

Wiener Laxier-Tränklein.

Infusion laxative de Man-
na-
get-
te.

Vien-
ne. 121

Jula-

Julapium Rosatum, five Jule-
pus Rosarum.
Sambucinum.
Violarum.

Rosen-Julep.

Holder-Julep.
Biolen-Julep.

Julep Rosat. pag. 121

de Sureau. 121
Violat. 121

K.

Kermes minerale, five Sul-
phur Antimo-
nii rubrum.

Rothes mineralisches Brech-
Pulver.

Poudre des Chartreux, ou
Kermes mine-
ral. 121

L.

Lac Sulphuris.
Virginis.

Schwefel-Milch.
Jungfern-Milch.

Lait de Souphre. 121
Virginal. 122

Lapides Cancrorum citrati, &
præparati vid.
Oculi Cancro-
rum.

Krebsaugen mit Citronen-Saft.
Præparirte Krebsaugen.

Yeux d'Ecrevisses citrés.
préparés.

Lapis Arsenicalis vid. Magnes
Arsenicalis.

Gift-Magnet.

Aimant Arsenical.

Calaminaris præparatus.

Præparirter Galmen-Stein.

Pierre Calaminaire prépa-
rée. 122

Divinus, five Ophthal-
micus.

Augen-Stein.

Ophthalmique. 122

Hæmatites præparatus.

Præparirter Blut-Stein.

Sanguine prépa-
rée. 122

Hyacinthus præparatus.

Hyacinth.

Hyacinthe prépa-
rée. 122

Infernalis.

Höllen-Stein oder Silber-
Corrosiv.

Infernale. 122

five Magnes arsenicalis.
Martialis. Vid. Globuli
Martiales.

Gift-Magnet.
Stahl-Kugel.

Aimant arsenical. 129
Boules martiales.

Medicamentosus.

Wund- und Heil-Stein.

Pierre medicamentouse. 123

Nephriticus.

Gries-Stein.

Nephretique. 123

Percarum præparatus.

Bersig-Stein præparirt.

de Perche prépa-
rée. 123

Prunellæ, five Nitrum
Tabulatum.

Salpeter-Tafelstein.

Crystal mineral, 123

Pumicis.

Bimsen-Stein.

Pierre Ponce.

Specularis.

Frauen-Eis.

Speculaire, ou Mi-
roir d'Ane.

Spongiarum.

Schwamm-Stein.

d'Eponge.

Laudanum Diureticum, five
Urinosum
Michaël.

Schmerzenstillender Gries-Ex-
tract.

Opiate diuretique de Mi-
chel. 123

Hystericum.

Mutter-
Extract.

Hystérique. 123

Liquidum. Vid.
Essentia Ano-
dyna Syden-
hami.

Sydenhams Schmerzenstillen-
de Essenz.

Essence Anodyne de Syden-
ham.

Opiatum.

Bersetzter Opium-Extract.

Extrait d'opium composé. 124
Cydonié. 124

Cydoni-
atum.

mit
Quit-
ten.

Lilium Paracelsi. Vid. Tinctu-
ra Metallorum.

Metall-Tinctur.

Lilium de Paracelse.

Liquamen Florum Verbasci. Vid. Oleum Verbasci. five Liquor Myrrhæ. Vid. Oleum Myrrhæ.	Wollblumen-Öel. Geflossenes Myrrhen-Öel.	Huile de Bouillon blanc par info- lation. pag. Myrrhe par defail- lance.
Liquor Anodynus Mineralis Hoffmanni. Aperitivus, five Sali- nus laxativus. Camphoratus. Cornu Cervi Succina- tus. al- bus. five Guttæ Anglicanæ. Vid. Guttæ. Myrrhæ per deliqui- um. Vid. O- leum Myrr- hæ. Nitri fixi. Oleofus Sylvii. Vid. Sal volatile oleosum. Stipticus Weberi. Tartari, aliàs Oleum Tartari per de- liqui- um. Spleneti- cus. Terræ foliatæ Tarta- ri. Visceralis. Vulnerarius mineralis, five Balsa- mum vulne- rarium mine- rale; Dippe- lii. vegetabi- lis, five Balsa- mum vulne- rarium vegeta- bile Dipp. Looch ad Asthma, five de Scil- la.	Mineralischer Schmerzenstil- lender-Liquor. Salzichter Laxier-Liquor. Campher-Liquor. Hirschhorn-Geist mit Agtstein. Weiser Hirschhorn-Geist mit Agtstein. Englische Haupt-Tropfen. Geflossenes Myrrhen-Öel. Liquor von fixirtem Salpeter. Sylvii flüßiges, flüchtiges Salz. Blutstillender Liquor. Geflossenes Weinstein-Öel. Milz-Liquor. Geflossene blätterichte Weins- stein-Erde. Visceral-Liquor. Dippels Mineralischer Wund- Balsam. vegetabilischer Wund- Balsam. Meerzwiebel, Rattweg gegen die Engbrüstigkeit.	Liqueur Anodyne minera- le. 124 Aperitive. 125 Camphrée. 125 Esprit de Corne de Cerf Suc- ciné. 125 blanc. 125 Gouttes Cephalique. Huile de Myrrhe par defail- lance. Liqueur de Nitre fixe. 125 ou Esprit volatil huileux de Sylvius. adstringent. 125 Huile de Tartre par defail- lance. 126 Liqueur Splenetique. 126 de Terre feuille- tée de Tar- tre par de- faillance. 126 Viscerale. 126 vulnérable mine- rale. 127 vege- tale de Dip- pel. 127 Looch contre l'Asthme. 127 Looch

Looch de Farfara.

Hufflattig = Lattwerg.

Looch de Pas d'Asne, ou
Tuffila-

Pulmone Vulpis.

Fuchs = Lungen = Lattwerg.

ge. pag. 127

Sanum & expertum.

Husten = Lattwerg.

Poumon de
Renard. 128Saponatum *Pharmacop.*
Edinburg.

Seiffen = Lattwerg.

Sanum. 128

de Savon. 128

Lumbricorum terrestrium
præparatio.

Zubereitete Regen = Würmer.

Vers de Terre préparés. 128

M.

Magisterium Antimonii dia-
phoretici.
vid. Ma-
teria per-
lata.

Spieß = Glas = Magisterium.

Magistère d'Antimoine
diaphore-
tique.

Coralliorum.

Corallen = Magisterium.

de Coraux. 128

Gummæ Gut-
tæ. vid.

Gummi gutt = Magisterium.

Gomme
gutte.

Gummi

Guttæ

præpara-

tio.

Jalappæ. vid.

Jalappen = Magisterium.

de Jalap.

Refina

Jalap-

pæ.

Marcasitæ.

Mineralisches Schminck = Pul-
ver.

Marcassite 129

Margaritarum.

Perlen = Magisterium.

Perles. 129

Matris Perla-
rum.Perlen = Mutter = Magiste-
rium.Nacre de
Perles. 129

Oculorum

Krebsaugen = Magisterium.

d'yeux d'Ecre-
visse. 129Cancro-
rum.

Saturni.

Bley = Magisterium.

de Plomb ou
Saturne. 129

Scammonii.

Scammonium Harz = Magiste-
rium.Scammo-
née.

vid. Refi-

na Scam-

monii.

Magnes Arsenicalis.

Gift = Stein, oder Gift = Mag-
net.

Aimant arsenical. 129

Magnesia alba.

Weisse Magnesia.

Magnésie blanche. 129

Mandibularum Lucii piscis
præpara-
tio.

Præparirte Hecht = Kiefer.

Machoires des brochets
prépa-
rées. 130Margaritæ occidentales præ-
paratæ.Occidentalische
Perlen.Perles occidentales prépa-
rées. 130orientales præpa-
ratæ.Orientalische Per-
len.orientales prépa-
rées. 130Marmelada. vid. Conditum
cydonio-
rum.

Eingemachte Quitten.

Coins confits.

Massa Liquiritiæ alba. vid. Pa-
sta Althææ.

Weisser Brust = Teig.

Pâte de Guimauve blan-
che.Fusca. *Pharm.*
Paris.

Brauner Brust = Teig.

bru-
ne. 130

Pars II.

[h]

Massa

Massa pro fornace odorifera, sive fumalis.	Ofen = Zuck.	Masse d'Espagne odorifé- rante. pag. 130
Mater Perlarum præparata.	Præparirte Berlen = Mutter.	Nacre de Perle préparé.
Materia perlata, sive Magiste- rium Antimonii diaphoretici.	Spießglas = Magisterium.	Magistère d'Antimoine diaphoretique. 131
Mel Anthosatum.	Rosmarin = Honig.	Miel de Romarin. 131
Despumatum simplex.	Geläuterter Honig.	depuré simple. 131
Mercuriale.	Bingel = Kraut = Honig.	Mercurial. 131
Rosatum simplex.	Rosen = Honig.	Rosat simple. 131
solutivum.	Laxier = Rosen = Honig.	Laxatif. 131
Sambuci.	Holder = Honig.	de fleurs de Sureau. 132
violatum.	Violen = Honig.	Violat. 132
Mercurius dulcis.	Süßer Sublimat.	Mercure doux. 132
præcipitatus albus sive cof- me- ti- cus.	Weisser Präcipitat.	précipité blanc. 132
Ru- ber.	Rother Präcipitat.	Rouge. 133
Viri- dis.	Grüner Präcipitat.	Verd. 133
Sublimatus corro- sivus.	Sublimat.	Sublimé corro- sif. 133
Vitæ.	Antimonialisch Brech = Pul- ver.	de vie. 133
Millepedum præparatio.	Præparirte Maur = Esel.	Cloportes préparés. 134
Mithridatium Damocratis. vid. Electuarium Mithrida- tium.	Mithridat.	Mithridat, ou Antidote.
Mixtura simplex alba.	Weisse Bezoar = Mixture.	Mixture simple blanche. 134
Ludovici.	Ludovici Bezoar = Mixture.	de Ludo- vici. 134
Ordinaria.	Ordinari Bezoar = Mixture.	Ordinai- re. 134
Tonico - nervina Stahl's.	Stahl's = Nerven = Mixture.	tonique de Stahl. 135
Morsuli ad ardorem ventricu- li, vulgo Sodam.	Sod = Morsellen.	Tablettes pour l'ardeur de l'Estomac. 135
Antimoniales Kun- chelii.	Runkels Spießglas = Morsel- len.	d'Antimoine de Kunkel. 135
Imperatoris.	Kaiserliche Magen = Morsel- len.	Imperiales. 135
Purgantes.	Burgier = Zucker.	Purgatives. 136
Rosati. vid. Saccha- rum ro- satum tabula- tum.	Rosen = Zucker.	Rosates.
ad Scabiem.	Kräk = Morsellen.	contre la gale. 136 Morsuli

Morsuli seu Tabulæ strumales.
 contra Vermes.
 Mucharum Rosarum.

Kropf = Morzellen.
 Wurm = Zucker.
 Rosen = Infusion.

Tablettes contre les Ecouelles. pag. 136
 contre les vers. 136
 Infusion des Roses. 137

N.

Nitrum alcalisatum, sive fixum.
 vid.
 Liquor Nitri fixi.

Alcalisirter Salpeter.

Nitre alcalisé.

Antimoniatum.
 Crystallisatum & depuratum.
 Papaverinum.
 Perlatum.
 Saturninum.
 Tabulatum vid. Lapis Brunellæ.

Spießglas = Salpeter.
 Gereinigter und Crystallisirter Salpeter.
 Klapper = Rosen = Salpeter.
 Berlen = Mutter = Salpeter.
 Bley = Salpeter.
 Salpeter = Tafelstein.

Antimonié. 137
 depuré & Crystallisé. 137
 pavoté. 138
 Perlé. 137
 Saturnin. 138
 en Tablettes.

Violatum.
 Vitriolatum. vid. Arcanum duplicatum.

Violen = Salpeter.
 Wiltz = Salz.

Violat. 138
 Vitriolat.

O.

Oculi Cancrorum citrati.
 præparati.

Krebs = Augen mit Citronensafft.
 Präparirte Krebs = Augen.

Yeux d'Ecrevisse citrés. 138
 préparés. 138

Oleum Absinthii destillatum.
 expressum.

Destillirt Wermuth = Del.
 Ausgepreßt Wermuth = Del.

Huile d'Absinthe destillée. 138
 par Expression. 147

Ammoniacy.

Ammoniac = Del.

de Gomme Ammoniac. 143

Amygdalarum amarum.
 dulce.

Bitter Mandel = Del.
 Süß Mandel = Del.

d'Amandes amères. 147
 douces. 147

Anagallidis.

Gauchheil, oder Hünnerdarm = Del.

de Mouron. 148

Anethi coctum.
 destillatum.

Gefochtes Dill = Del.
 Distillirt Dill = Del.

d'Anet cuite. 148
 destillée. 139

Angelicæ.

Angelic = Del.

d'Angelique. 140

Animale Dippelii.

Dippels Animalisches = Del.

Animale de Dippel. 140

Anisi.

Anis = Del.

d'Anis. 140

Anthos, vid. Rorismarini.

Antimonii. vid. Butyrum Antimonii.

Spießglas = Del.

d'Antimoine, ou Beurre d'Antimoine.

Armeniacorum è nucleis.

Apricosen = Kern = Del.

de Noyaux d'Abri-cot. 148
 Oleum

Oleum Artemisiæ.	Benfus = Del.	Huile d'Armoise. pag. 139
Avellandarum è nucleis.	Haselnuß = Del.	de Noisettes. 148
Aurantiorum è corticibus.	Pomeranzen = Schalen = Del.	d'Ecorce d'Orange. 143
Benzoës.	Benzoe = Del.	de Benjoin. 141
Bezoardicum Wedelii.	Wedels letzte Tropfen.	Bezoardique de Wedel. 148
Buxi è ligno.	Buchsbaum = Del.	de Buis. 141
Cacao coctum.	Gefochter Cacao - Butter.	ou Beurre de Cacao cuite. 150
expressum.	Ausgeprester Cacao - Butter.	par expression. 151
Calami aromatici.	Calmus = Del.	de Calamus. 145
Camphoræ liquidum, sive butyraceum.	Flüßig Campher = Del.	Camphre liquide. 141
Capparum.	Cappres = Del.	Capres. 148
Cardamomi.	Cardamomen = Del.	Cardamome. 142
Carminativum.	Grimmen = Del.	Carminative. 148
Carvi.	Wiesen = Kümmel = Del.	Carvi. 140
Caryophyllorum aromaticorum.	Nägelein = Del.	Cloux de Gerofles. 141
Castorei.	Bibergeil = Del.	Castor. 149
Ceræ.	Wachs = Del.	Cire. 142
Ceraforum è nucleis.	Kirschen = Kern = Del.	Noyaux de Cerises. 148
Chamomillæ coctum.	Gefochtes Camillen = Del.	Camomille cuite. 149
destillatum.	Destillirt Camillen = Del.	destillée. 139
Chærefolii.	Körbel = Kraut = Del.	Cerfeuil. 139
Cheiri.	Gelbes Biolen = Del.	Giroflée jaune. 149
Cinnamomi.	Zimmet = Del.	de Cannelle. 142
Citri è corticibus destillatum.	Citronen = Del.	d'Ecorces de Citron. 143
Colocynthis.	Coloquinten = Del.	de Coloquinthe. 149
Coriandri destillatum.	Coriander = Del.	Coriandre. 140
Cornu cervi.	Hirsch = Horn = Del.	Corne de cerf. 143
Corticum Aurantiorum.	Pomeranzen = Del.	d'Ecorces d'Orange. 143
Citri.	Citronen = Del.	de Citron. 143
Costinum.	Costus = Del.	de Costus. 149
Cumini.	Kümmel = Del.	Cumin. 140
Euphorbii.	Euphorbium = Del.	d'Euphorbe. 149
Florum Sambuci.	Holder = Del.	de Fleurs de Sureau.
Slotani.	Slotani - Blumen = Del.	Slotan. 150
Foeniculi destillatum.	Destillirtes Fenchel = Del.	Fenouil destillée. 140
expressum.	Ausgeprestes Fenchel = Del.	par expression. 152
Formicarum.	Ameisen = Del.	Fourmils. 150
Galbani.	Galban = Del.	Galbanon. 145
Guajaci è ligno.	Franzosen = Holz = Del.	Guajac. 144
Hyoscyami.	Bilsen = Saamen = Del.	Jusquame. 151
Hyperici.	Johannes = Kraut = Del.	Millepertuis. 151
Hyslopi.	Isopen = Del.	d'Hyssope. 139
		Oleum

Oleum Juniperi è baccis.	Wachholderbeer = Del.	Huile de Bayes de Gène.
è lateribus, sive Philo-	Ziegel = Del.	vre. pag 140
sophi-		Briques. 144
cum		
rectifi-		
catum.		
Lavendulæ.	Lavendel = Del.	Lavande. 139
Lauri è baccis coctum.	Gefochtes Lorbeer = Del.	Bayes de Lau-
		rier par
		coction. 151
destilla-	Destillirtes Lorbeer = Del.	Bayes de Lau-
tum.		rier de-
		stillée. 140
Ligni Buxi.	Buchsbaum = Del.	Bois de Buis. 141
Guajaci.	Franzosen = Holz = Del.	Guajac. 144
Rhodii.	Rosen = Holz = Del.	Roses. 145
Santali citrini.	Gelb Sandel = Holz = Del.	Santal ci-
		trin. 145
Sassafras.	Fenchel = Holz = Del.	Sassafras. 145
Liliorum alborum.	Weis Lillien = Del.	Lis blancs. 151
Lini.	Lein = Del.	Lin. 151
Lumbricorum terre-	Regen = Wurm = Del.	Vers de terre. 152
strium.		
Macis.	Muscat = Blüt = Del.	Macis. 142
Majoranæ coctum.	Gefochtes	de Marjolaine cuite. 152
destillatum.	Destillirtes Majoran = Del.	de-
		stil-
		lée. 139
Mastiches coctum.	Gefochtes	de Mastic cuite. 152
destillatum.	Destillirtes Mastix = Del.	destillée. 144
Melissæ.	Meissen = Del.	Melisse. 139
Melonum è seminibus.	Melonen = Kernen = Del.	de Melon. 152
Menthæ coctum.	Gefochtes	Menthe cuite. 152
destillatum.	Destillirtes Kraus = Münz = Del.	destil-
		lée. 139
Millefolii.	Schafgarben = Del.	de Millefeuille. 139
Momordicæ.	Balsam = Nepsel = Del.	Balsamine. 153
Myrrhæ destillatum.	Destillirtes Myrrhen = Del.	Myrrhe destil-
		lée. 144
per deli-	Geflossenes Myrrhen = Del.	par de-
quium.		fail-
		lan-
		ce. 152
Nicotianæ.	Taback = Del.	Tabac. 153
Nucis Moschatæ destil-	Destillirt	Noix Muscades
la-		destil-
tum.		lée. 142
ex-	Ausgepreß Muscaten = Del.	par
pres-		ex-
sum.		pres-
		sion. 153
Nucistæ, sive Nucis	Muscatnuß = Del.	Musca-
Moschatæ.		des. 142
		& 153
Nucum Juglandium.	Nuß = Del.	Noix. 153
Origani.	Wohlgemuth = Del.	d'Origan. 139
Ovorum.	Ener = Del.	d'Oeufs. 153
Papaveris è Seminibus.	Magsamen = Del.	de Pavot. 154
Perficorum è nucleis.	Birsich = Kernen = Del.	Noyaux de Pe-
		che. 148
Petræ album.	Weis,	Petrole blanc. 145
nigrum.	Schwarz,	noir. 145
rubrum.	Roth,	rouge. 145
	} Stein = Del.	
Pars II.	[i]	Oleum

Oleum Philosophorum, five
Lateri-
num.

Ziegel = Del.

Huile de briques. pag. 144.

Piperis. Pfeffer = Del.
Pulegii. Bolen = Del.
Raphani è Seminibus. Rettig = Saamen = Del.
Raporum è Seminibus. Ruben = Saamen = Del.
Rhodii ligni. Rosen = Holz = Del.
Ricini è Seminibus. Wunder = Baum, Kreuz-
Baum = Del.
Rosarum coctum. Gekochtes Rosen = Del.
Rorismarini five An- Rosmarin = Del.
thos.
Rutæ coctum. Rauten = Del.
destillatum. Destillirtes
Sabinæ. Seben = Baum = Del.
Salviæ. Salben = Del.
Sambuci. Holder = Del.
Santali citrini. Gelb Sandel = Holz = Del.
Saponis. Seifen = Del.
Sassafras è ligno. Fenchel = Holz = Del.
Saturejæ. Bohnen = Kraut, Garten = N-
sop = Del.
Scorpionum simplex. Scorpionen = Del.
Seminum Cannabis. Hanf = Saamen = Del.
Cucume- Gurken = oder Cucumern = Del.
rum.
Cucurbita- Kürbisen = Kernen = Del.
rum.
Erucae. Raucken = Saamen, oder wei-
ses Senf = Del.
Foeniculi. Fenchel = Saamen = Del.
Lini. Lein = Del.
Melonum. Melonen = Kernen = Del.
Papaveris. Magsaamen = Del.
Raphani. Rettig = Saamen = Del.
Raporum. Ruben = Saamen = Del.
Ricini. Wunder = Baum, Kreuz-
Baum = Del.
Sinapi. Senf = Saamen = Del.
Septem florum. Sieben = Blumen = Del.
Serpilli. Quendel = Del.
Sinapi è Seminibus. Senf = Saamen = Del.
de Spermate ranarum. Froschleisch = Del.
Spicæ. Spick = Del.
Succini. Agtstein = Del.
Sulphuris concentra- Schwefel = Del.
tum.
Tacamahacæ. Tacamahac = Del.
Tanaceti. Rhein = Farn = Del.
Tartari, five Spiritus Weinstein = Geist.
Tartari
simplex. Stinckendes Weinstein = Del.
foetidum. Geflossenes Weinstein = Del.
per deliqui-
um.

Poivre. 142
Pouilot. 139
Raifort. 152
Raves. 152
Bois de Roses. 145
Pignons d'In-
de. 152
Roses cuites. 154
Romarin. 139
Rüe cuites. 154
destillée. 139
Sabine. 139
Sauge. 139
Sureau.
Santal citrin. 145
Savon. 145
Bois de Sassa-
fras. 145
Sariette. 139
Scorpion sim-
ple. 154
de chanvre. 152
Concombre. 152
des Courges. 152
de Roquette. 152
Fenouil. 152
Lin. 151
de Melon. 152
pavot. 154
Raifort. 152
Rave. 152
Pignons d'Inde. 152
Moutarde. 152
Sept fleurs. 154
Serpolet. 139
Moutarde. 152
Frais de Gre-
nouilles. 154
d'Aspic.
Ambre jaune, ou
de carabé. 146
de Souphre con-
centrée. 146
Tacamahaca. 144
Tanaisie. 139
Tartre, ou E-
sprit de
Tartre.
puante.
par de
faillan-
ce. 126
Oleum

Oleum Terebinthinæ.	Terbenthin = Del.	Huile de Terbenthine. p.	146
Terræ.	Erde = Del.	Terre.	147
Thymi.	Thimian = Del.	Thym.	139
Verbasci, five Ligua- men Verba- sci florum.	Woll = Blumen = Del.	de fleurs de Bouil- lon blanc.	155
Violarum.	Violen = Del.	de fleurs de violet- tes.	155
Vitrioli rectificatum.	Vitriol = Del.	Vitriol rectifiée.	147
Vulpinum.	Fuchs = Del.	Renard.	155
Zedoariæ.	Zittwer = Del.	Zedoire.	145
Zingiberis.	Zimber = Del.	Gingembre.	145
Orvietanum.	Orvietti Gift = Zattwerg.	Orvietan.	155
Ovorum testæ præparatæ.	Præparirte Eyer = Schalen.	Coques d'œuf préparées.	
Oxymel scilliticum	Saurer Meer = Zwibel = Ho- nig.	Oxymel de Scylle.	156
simplex.	Saurer Honig.	simple.	156
Oxysaccharum sciliticum Lon- dinenfe. vid. Sy- rupus de Scil- la.	Saurer Meer = Zwibel = Zu- cker.	Sucre de Scille vinaigré de Londres ou Syrop de Scille.	

P.

Panacea Mercurialis.	Mercurial Panace.	Panacée Mercurielle.	156
Panis Cydoniorum cum aro- matibus.	Quitten = Brod mit Gewürz.	Pain cydonié avec épices.	156
sine aro- matibus.	ohne Gewürz.	fans épices.	156
Passulæ laxativæ.	Laxier = Rosinlein.	Passules laxatives.	156
Rhabarbarinæ.	Rhabarbara = Rosinlein.	avec Rhu- barbe.	157
Pasta Althææ.	Brust = Teig, Husten = Teig.	Pâte de Guimauve.	157
Regia stomachalis.	Königlicher Magen = Teig.	Royale stomachale.	157
Pastilli fumales. vid. Massa ad fornacem.	Ofen = Lack.	Masse d'Espagne odorife- rante.	
Petroleum. vid. Oleum Petræ.	Stein = Del.	Petrole.	
Philonium Romanum. vid. Electuar.			
Phlegma Vitrioli. vid. Vitrioli Ros.			
Pilulæ Aloëphanginæ.	Aromatische Aloe = Pillen.	Pilules d'Aloe avec épices.	158
Aperientes Stahlîi. <i>ex- temp.</i>	Stahls eröffnende Pillen.	aperitives de Stahl.	158
Balsamicæ, seu Poly- chrestæ Becche- ri & Stahlîi. <i>ad exem- plar.</i>	Becchers und Stahls Bal- samische = Pillen.	balsamiques, ou Polychrestes de Beccher.	159
sine Ex- tractis Aloës & Hellebori nigri. simpli- ciores.	Becchers und Stahls Balsa- mische Pillen ohne Ex- tracten Aloe, und schwarze Nieß = Wurz.	Balsamiques sans extraits d'A- loe & d'Elle- bore noir.	159
Cacheticæ. <i>exemp.</i>	Einfache Balsamische Pillen.	balsamiques sim- ples.	159
	Bleich = Sucht = Pillen.	contre les pâles couleurs.	160

Pilulæ de Cynoglossō.	Hunds - Zungen - Pillen.	Pilules de langue de chien, ou cynoglos- se. pag. 160
Emanuelis.	Immanuel's - Pillen.	d'Emanuel. 160
Fœtidæ minoris Syden- hami <i>extemp.</i>	Mutter - Pillen.	hysteriques de Sy- denham. 160
de Gummatibus, seu Succis.	Gummi, oder Saft - Pillen.	Gommeuses. 160
Hydropicæ Bontii.	Bontii Wassersucht - Pillen.	Contre l'hydropi- sie de Bontius. 161
Stahlii.	Stahl's Wassersucht - Pillen.	de Stahl. 161
Ictericæ <i>extemp.</i>	Gelbsucht - Pillen.	Contre la jaunisse. 161
Lucis Majores, seu opticæ.	Augen - Pillen.	optiques. 161
Martiales Sydenhami. <i>extemp.</i>	Sydenhams Stahl - Pillen.	martiales de Sy- denham. 162
Mastichinæ.	Mastix - Pillen.	de Mastic. 162
Mercuriales. <i>extemp.</i>	Mercurial - Pillen.	Mercurielles. 162
Pectorales. <i>extemp.</i>	Brust - Pillen.	Pectorales. 162
Polychrestæ balsamicæ.	Laxierende Polycrest - Pillen.	Polychrestes. 163
Saponatæ. <i>extemp.</i>	Seifen - Pillen.	de Savon. 163
Scilliticæ Edinburgen- sium. <i>extemp.</i>	Meer - Zwibel - Pillen.	Scille d'Edin- bourg. 163
Starckey, seu Matthiæ.	Starckey Polycrest - Pillen.	Starckey. 163
de Styrace sine Am- bra.	Storax - Pillen ohne Ambra.	Styrax sans Am- bre. 164
Succino auctæ.	Verstärkte Agtstein - Pillen.	Carabé. 164
Cratonis.	Burgstrende Agtstein - Pillen.	de Cra- ton. 164
Tartareæ Bontii.	Bontii Weinstein - Pillen.	Tartre de Bon- tius. 164
Schroederi.	Schröders Weinstein - Pillen.	Schrœ- der. 164
de Terebinthina.	Terpentin - Pillen.	Terebentine. 165
Travmaticæ. <i>extemp.</i>	Wund - Pillen.	Vulneraires. 165
de Tribus Rufi.	Rufi Pillen.	de Rufus. 165
Plumbum ustum.	Gebraunt - Bley.	Plomb brûlé. 165
Pocula Emetica, five Scyphi vomitorii.	Brech - Becher.	Coupes Emetiques. 165
Pruna Laxativa. vid. Passulæ & Pruna.	Laxier - Quetschen.	Prunaux laxatifs.
Pulmones Vulpis præparati.	Præparirte Fuchs - Lungen.	Poumons de Renards pré- parés. 166
Pulpa.	Ausgedruckt - Marck.	Pulpe. 166
Cassîæ.	Cassien - Marck.	de Cassé. 166
Colocynthidis.	Coloquinten - Marck.	Coloquinte. 166
Passularum & pruno- rum.	Rosinlein - und Quetschen- Marck.	Passules & de prunaux. 166
Tamarindorum.	Durchgetriebene Tamarinden.	Tamarins. 166
Pulticula Mannæ.	Manna - Müslein.	Opiate de Manne. 167
Pulvis.	Pulver.	Poudre. 166
Aborbens.	Saur brechend - Pulver.	Aborbente. 166
Alexipharmacus ruber.	Rothes Gift - wehrend - Pul- ver.	alexitére rouge. 167
Came- rarii.	Camerarii Gift - wehrend - Pul- ver.	de Ca- merar. 167
Anodynus Camerarii.	Schmerz - stillend - Pulver.	anodyne de Came- rarius. 167
Ludovici.	Ludwigs Schmerz - stillend - Pulver.	Ludo- vici. 167
		Pulvis

Pulvis Antarthriticus. <i>extemp.</i>	Glieder = Schmerzen = Pulver.	Poudre Contre le rheumatisme.
Antatrophus.	Pulver für das Abnehmen, oder Dörrsucht.	pag. 168
Anticachecticus. <i>extemp.</i>	Eröfnendes Pulver.	Contre l'etisie. 168
We- delii.	Wädels eröfnendes Pulver.	les pâles cou- leurs. 168
Antispasmodicus, seu ad mo- tus irre- gu- lares.	Krampf = Pulver.	les pâles cou- leurs de Wedel. 168
Ni- tro- fus.	Kühlendes Krampf = Pulver.	temperante. 168
Contra Acredinem.	Pulver wider die Schärfe.	ni- treu- fe. 168
Bezoardicus Hallen- sium.	Hallisch = Bezoar = Pulver.	Contre l'acreté. 169
Ludovici. vid, Be- zoardi- cum Mar- tiale.	Bezoardisches Stahl = Pulver.	Bezoardique de Halle. 169
Cachecticus Querce- tani incom- pletus.	Bleichsucht = Pulver.	Ludovici.
Carthusianus. vid. Ker- mes Mine- rale.	Rothes mineralisches Brech- Pulver.	Contre les pâles couleurs. 169
Contra casum. <i>extemp.</i>	Fall = Pulver.	Kermes mineral.
Cephalicus Camerarii cum Saccha- ro.	Camerers Haupt = Pulver mit Zucker.	pour la chute. 169
Contrayervæ compo- tus.	Besonder Gift = Pulver.	Cephalique su- crée. 170
Cordialis Cellensis.	Zellisches rothes Gift = Pulver.	de Contrayerva compo- sée. 170
Cornachinus, five Co- mitis de Warwick.	Burgier = Pulver.	Cordiale de Zell. 170
Dentifricius.	Zahn = Pulver.	Cornachine. 170
Diaphoreticus. <i>extemp.</i>	Schweiß = treibend = Pulver.	Dentifrique. 170
Dysentericus.	Ruhr = Pulver.	Diaphoretique, ou sudori- fique. 171
ad Dysuriam, five Mi- tigans Wep- feri.	Harn = Wind = Pulver.	Dysenterique. 171
Epilepticus Marchio- nis.	Marggrafen = Pulver.	Contre la difficul- té d'uri- ner. 171
		l'Épilepsie du Marg- graf. 171

Pulvis Epilepticus mirabilis Mynsichti.	Mynsichts - Sicht - Pulver.	Poudre Contre l'Epilesie de Mynsicht.
Erysipelatodes Wedellii. <i>extemp.</i>	Bedels äußerliches Rothlauf - Pulver.	pag. 172 l'Erysi- pèle, ou deslica- tive. 172 les vents. 172
ad Flatus.	Wind - Pulver.	
Fumalis Haugii.	Haugens - Rauch - Pulver.	à parfumer. 172
Odoratus.	Wohlriechendes Rauch - Pulver.	à parfum de bon- ne odeur. 173
Galactopæus.	Milch - Pulver.	pour provoquer le lait. 173
Hystericus.	Mutter - Pulver.	Hystérique. 173
Lenitivus tartarificatus. <i>extemp.</i>	Gelind - laxierend - Pulver.	lenitive tartarisée. 173
Masticatorius Wepferi.	Wepfers Kauch - Pulver.	à mâcher. 173
ad Partum.	Pulver zur schwarzen Geburt.	pour accoucher. 174
Pectoralis resolvens. <i>extemp.</i>	Auflösend - Brust - Pulver.	pectorale. 174
Præcipitans Stahl's.	Præcipitir - Pulver.	præcipitante de Stahl. 174
Resolvens Stahl's.	Auflösend - Pulver.	resolutive de Stahl. 174
Compositus.	Zusammen - gesetztes - Auflö- send - Pulver.	com- po- sée. 175
Scillæ compositus Stahl's.	Meer - Zwibel - Pulver.	Scille composée. 175
Sternutatorius.	Nieß - Pulver.	à éternuer. 175
albus five Elæo- fac- cha- rum Ce- phali- cum Came- rarii.	Weißes Nieß - Pulver.	blan- che. 175
Stomachicus Birckmanni.	Magen - Pulver.	Stomachale de Birkmann. 176
Strumalis.	Kropf - Pulver.	Contre les E- croûelles. 176
Temperans.	Temperirtes - Pulver.	Temperante. 176
ad Tormina infantum.	Bauch - Grimmen - Pulver.	Contre les tran- chées. 176
Contra Vermes.	Wurm - Pulver.	Vers. 176
Viennensis albus virgi- neus dia- phoreticus.	Weiß Wiener - Pulver.	blanche de Vien- ne. 177
Vitæ Imperatoris.	Kaiserlich - Lebens - Pulver.	de vie Imperialle. 177
Pumex præparatus,	Præparirter Bimsen - Stein.	Pierre Ponce préparée.

R.

Radicis Ari præparatio.	Præparirte Aron - Wurz.	Racine de pied de Veaux prépa- rée. pag. 178 Regulus
-------------------------	-------------------------	---

Regulus.	Metall = König.	Regule.	pag.
Antimonii Martialis.	Spießglas = König mit Eisen.	d'Antimoine mar-	tial. 178
Medicina-	Medicinalischer Spießglas =	med-	ci-
lis.	König.	nal.	179
simplex.	Spießglas = König.	sim-	ple. 179
Refina.	Harz.	Resine.	
Guajaci. vid. Extrac-	Franzosen = Holz = Extract.	de Guajac.	
tum.			
Jalappæ.	Jalappen = Harz.	Jalap.	180
Scammonii.	Scammonien = Harz.	Scammonée.	180
Rhinocerotis cornu præpa-	Præparirtes Nas = Horn.	Corne de Rhinoceros pré-	
raturum. vid.		parée.	
cornu.			
Ribes conditi. vid. conditum	Eingemachte Johannis = Beer =	Grosfeilles confites.	
Ribium.	lein.		
Rob. Roob. Rohob.	Eingefottener Saft.	Rob.	181
Roob Acaciæ vulgaris.	Schlehen = Saft.	de Prunier Sauvage.	181
Berberum.	Erbfelen = Sau-	d'Epine - vinette.	181
	rach = Weins-		
	Nägelein =		
	Breißelbeer =		
	Saft.		
Ceraforum acidorum.	Eingefottener Weichsel = Saft.	de Cerifes	181
Cornorum.	Dörrlizen = Rattwerg.	Cornouilles.	181
Cydoniorum,	Quitten = Rattwerg.	Coins.	181
Cynosbati,	Hagenbusen = Muesß.	Gratte - cu.	181
Ebuli.	Alttich = Muesß.	d'Yèble.	182
Juniperi.	Wachholder = Muesß.	de Bayes de Génè-	
		vre.	182
Mororum.	Dicker Maulbeer = Saft.	Meures.	182
Nucum.	Nuß = Saft.	Noix.	182
Omphacii.	Eingefochter Saft aus unzei-	Verjus.	182
	tigen Trauben.		
Ribium.	Johannes = Traublein = Muesß.	Grosfeilles.	182
Rubi Idæi.	Himbeeren = Muesß.	Framboise.	182
Sambuci.	Holder = Muesß.	Bayes de Sureau.	183
Simplex, seu Sapa.	Eingefottener Most.	Simple, ou Resi-	
		ne.	183
Ros Vitrioli seu phlegma. vid.	Saurlechtes Vitriol = Wasser.	Phlegme de Vitriol.	
Vitrioli Ros.			
Rotulæ, feu Tabellæ.	Rüchlein.	Tablettes.	183
Berberum.	Rothe Kraft = Rüchlein.	d'Epine - Vinet-	
		te.	183
Diaireos.	Violen = Wurz = Rüchlein.	Diaireos.	183
Manus Christi, five	Berlen = Mutter = Zucker.	de Sucre avec la	
Saccharum		nacre de	
Perlatum.		Perle.	183
Contra Vermes.	Wurm = Rüchlein.	Contre les vers.	183

S.

Saccharum clarificatum.	Geldauterter Zucker.	Sucre depuré.	184
Glycyrrhizatum.	Süß = Holz = Zucker.	Regliffé.	184
Lactis.	Milch = Zucker.	de lait.	184
Perlatum. vid.	Berlen = Mutter = Zucker.	Tablettes de Sucre perlat.	
Rotulæ Ma-			
nus Christi.			
Rosatum tabula-	Getäfelter Rosen = Zucker.	Rosat.	184
tum.			

Saccharum Saturni Crystallifatum.	Crystallisirter Bley = Zucker.	Sucre ou Sel de Saturne. pag. 185
Salia.	Salze.	Sels. 185
Sal. Absinthii.	Wermuth = Salz.	Sel d'Absinthe. 185
Anglicum volatile ficum.	Englisches flüchtiges Salz zum Niesen.	volatil d'Angleterre. 186
Aperitivum extemporaneum Hoffmanni.	Hoffmanns eröffnendes Salz.	aperitif de Hoffmann. 187
Coralliorum.	Corallen = Salz.	de Coraux. 187
Cornu cervi volatile.	Flüchtiges Hirsch = Horn = Salz.	Volatil de Corne de cerf. 187
Digestivum, vel febrifugum Sylvii.	Sylvii Digestiv = Salz.	Digestif, ou febrifuge de Sylvius. 188
Essentiale Acetosellæ.	Buch = Ampfer, oder Sauers Klee = Salz.	d'Alleluja, ou de Pain à coucou. 188
Acetosæ.	Sauer = Ampfer = Salz.	d'Ozeille, de Surelle, ou Vinette. 188
Febrifugum.	Fieber = Salz.	Febrifuge. 189
Sylvii, vid. Sal Digestivum.	Sylvii Fieber, oder Digestiv = Salz.	ou Digestif de Sylvius.
Lapidum, seu oculorum Cancrorum.	Krebsaugen = Salz.	d'yeux d'Ecrevisse. 187
Lumbricorum volatile.	Flüchtiges Regen = Wurm = Salz.	volatil de Vers de terre. 190
Matris Perlarum.	Perlen = Mutter = Salz.	de Narce de Perles. 187
Mirabile Glauberi.	Glaubers Wunder = Salz.	Merveilleux de Glauber. 189
Oculorum Cancrorum.	Krebsaugen = Salz.	d'yeux d'Ecrevisse. 187
Polychrestum Lemery è Nitro & Sulphure.	Lemery Polichrest = Salz.	Polychreste de Lemery. 190
de Seignette.	de Seignette Laxier = Salz.	Seignette. 190
Sedativum Hombergii.	Hombergas stillendes Salz.	Sedatif de Homberg. 190
Succini volatile.	Flüchtiges Agtstein = Salz.	volatil de Carabé, ou d'Ambre jaune. 191
Tartari fixum.	Fixirter Weinstein = Salz.	de Tartre fixe. 191
Volatile.	Flüchtiges Weinstein = Salz.	Volatil de Tartre. 191
Tackeni.	Tackens flüchtiges Weinstein = Salz.	de Taquin. 191
Vegetabile.	Eröffnendes Weinstein = Salz.	vegetal, ou tartre soluble. 192
Volatile oleosum, five Liqueur oleosus Sylvii.	Sylvii flüchtiges Del = Salz.	volatil huileux de Sylvius. 192
Urinæ.	Flüchtiges Urin = Salz.	d'Urine. 192
Sanguis Hirci præparatus.	Præparirter Bock = Blut.	Sang de bouc préparé. 192
Sapa. vid. Roob simplex.	Eingesottener Most.	Refiné simple. 192
Sapo.	Seife.	Savon. 192
Medicatus.	Medicinische Seife.	Medicinal. 192
Tartareus, five corrector Starckey.	Starckens Weinstein = Seife.	de Tartre. 192
Scammonium præparatum.	Præparirte Scammonien.	Scammonée préparée.
vid. Diagrydium.		
Scilla præparata.	Præparirte Meer = Zwibel.	Scille préparée. 194
		Scyphi

Scyphi vomitorii. vid. Pocu- la emetica.	Brech = Becher.	Coupes emetiques. pag.
Sief Album cum opio. fine opio.	Augen = Zelten mit opio. ohne opio.	Collyre blanc avec opium 195 sans opium. 195
Solutio Coralliorum. Matris Perlarum.	Aufgelöste Corallen. Perlen = Mutter.	Solution des Coraux. 196 Nacres de Perle. 195 Yeux d'Ecre- viffe. 195
Oculorum Cancro- rum.	Krebs = Augen.	Toile à Gautier. ou Spa- radrap. 195
Sparadrapum, sive Tela Gual- teri.	Fontanell = Pflaster.	Herbes ou Poudres. 195 Poudre Diambra. 195 d'anis. 195 de Romarin. 196 aromatique giro- flée. 196
Species.	Species.	
Diambrae.	Ambra = Species.	
Dianisi.	Anis = Species.	
Dianthos.	Rosmarin.	
Aromaticæ Caryo- phylla- tæ. rosatæ.	Gewürz = Species mit Nege- lein.	
	Ros- sen.	Rosa- te. 196
de Hyacintho.	Hyacinthen = Species.	pour la confection d'Hyacinthe. 197
Diajalappæ Mynsich- ti.	Jalappen = Species.	Diajalap. 197
Imperatoris pro mor- fulis & Tra- geis.	Triseneth = Species, oder Kan- serliches Magen = Bul- ver.	Imperiale. 197
Diaireos simplices.	Beiel = Wurz = Species.	d'Iris composée. 197
Tabaci pro fumo Ca- merarii. Officinales.	Camerars Rauch = Tabac.	Tabac à fumer de Came- rarius. 198 Offici- nel. 198
Diatragacanthæ frigi- dæ.	Kühlendes Traganth = Pulver.	Diatragacant froid. 198
Decocti antinephri- tici, sive Ne- phro - Ca- tharticum Foretti.	Species zum Nieren = Trank.	Herbes pour la decoction nephretique. 198
pro Decocto Avenæ, sive Bromio.	Species zur Haber = Cur.	Herbes pour la ptisane d'Avoine. 199
Decocti carminativi.	Wind = Species zum Clystier.	Carminatives. 199
Cephalicæ pro cucu- phis.	Haupt = Species zum Kräuter- Sack- lein. Ueber- schlag.	pour les Sachets cephali- ques. 199 aux cataplämes. 200
Epithemate.		
Emollientes.	Erweichende Clystier = Spe- cies.	emollientes. 200
pro Epithemate cor- dis & pulsuum.	Herz, und Puls = Ueberschlag.	Poudre pour les Epithèmes aux pouls & au Cœur. 200
Decocti florum & fructuum.	Blumen = und Frucht = Spe- cies.	Drogues pour la ptisane des fleurs, & fruits. 200
pro Decocto ad gan- grænam.	Species zum Brand = Ueber- schlag.	pour les epithé- mes contre la gangrène. 201
Decocti pro garga- rismate ad- stringente.	anziehenden Gurgel-Was- ser.	adstringentes pour garga- rifer. 201
Pars II.	[1]	Species

Species Decocti pro garga- rismate emollien- te.	Species zum erweichenden Gurgel- Wasser.	Drogues emollientes pour gargariser. pag. 201
Lignorum.	Species zum Holz = Trank.	Herbes pour la decoction des bois. 201
nigri.	Schwarzen Ue- berschlag.	aux Cataplämes noirs. 202
pectoralis.	Brust = Species.	pour la Ptisane pec- torale. 202
pro potu in- fan- tum.	Kinder = Trank = Species.	Drogues pour la ptisane des enfans. 202
potu vul- nera- rio.	Species zum Wund = Trank.	Herbes Vulneraires. 203
Ptisana regia.	Königliche Laxier = Species.	Drogues pour la Ptisane Royale. 203
Vino Ab- fin- thia- co.	Species zum Wermuth- Wein.	le vin d'Ab- sinthe. 203
Specificum Jalappinum.	Gemischtes Jalappa = Pulver.	Poudre de Jalap compo- sée. 203
Sperma ranarum. vid. Gluten Aquaticum.	Frosch = Leich.	Frais de Grenouilles.
Spiritus.	Geist.	Esprit. 204
Æruginis, five Viri- dis Æris, & Veneris.	Grün = Spann = Geist.	de verd de gris. 204
Angelicæ.	Angelic = Spiritus.	d'Angelique. 204
Anisi.	Anis = Geist.	d'Anis. 204
Anthos, five Roris- marini.	Rosmarin = Geist.	de Romarin. 204
Balsami Peruviani juxta Hoff- mannum.	Peruvianischer Balsam = Spiri- tus.	Beaume de Pe- rou. 205
Bezoardicus Bussii.	Bezoardischer Geist.	Bezoardique de Buf- sius. 205
Carminativus de tri- bus.	Besonderer Wind = Spiritus.	Carminatif de trois. 205
Castorei compositus Londinensis.	Londener Bibergeil = Geist.	de Castor composé. 206
Ceraforum nigro- rum.	Schwarz = Kirschen = Bran- denwein.	Cerises noires. 206
Cochleariæ.	Löffel = Kraut = Geist.	de l'Herbe aux cuil- lèrs. 207
Cornu cervi. ad usus exter- nos.	Hirsch = Horn = Geist. zum auß- serli- chen Ge- brauch.	Corne de cerf. 207 pour l'usa- ge ex- ter- ne. 207
Corticum Aurantio- rum.	Pomeranzen = Geist.	d'Orange. 207
Citri.	Citronen = Geist.	de Citron. 208
Croci.	Saffran = Geist.	de Safran. 208
Cydoniorum.	Quitten = Geist.	Coins. 206
		Spiritus

Spiritus Ebuli.		Altich = Geist.	Esprit d'yèble.	pag. 206
Formicarum.		Ameisen = Geist.	de Fourmis.	208
	compo-	Zusammengesetzter		compo-
	situs.	Geist.		sé.
	vid.			
	Aqua			
	Mag-			
	nani-			
	mita-			
	tis.			
Fragorum.		Erdbeeren = Geist.	de Fraises.	206
Fuliginis.		Ruß = Geist.	Suye.	208
Guajaci è ligno.		Franzosen = Holz = Geist.	Bois de Guajac.	209
Juniperi è baccis.		Wach = Holder = Beeren = Geist.	Bayes de Genève.	209
			Lavende.	209
Lavendulæ.		Lavendel = Geist.	Muguet.	210
Liliorum convallium.		Mayen = Blümlein = Geist.	des Vers de Terre	
Lumbricorum vino-		Regenwurm = Geist mit Wein.	vineux.	210
	fus.		Volatil des vers de	
	vola-	Flüchtiger Regenwurm = Geist.	terré.	210
	tilis.		de Mastic.	211
Mastichinus.		Mastix = Geist.	Hysterique.	211
Matricalis.		Mutter = Geist.	de Melisse.	211
Melissæ.		Melissen = Geist.	Menthe.	212
Menthæ.		Deummenthen, oder Kraus-		
		münz = Geist.	pour les nerfs.	212
Nervinus ad mentem		Nerven = Geist.	de Nitre.	212
Hoffmanni.			fumant.	212
Nitri acidus.		Salpeter = Geist.		
Concestratus,		Rauchender Salpeter = Geist.	dulcifié.	213
feu fumans.			Pain.	213
Dulcis.		Bersüßter Salpeter = Geist.	Roses.	213
Panis.		Brod = Geist.	fermenté.	213
Rosarum.		Rosen = Geist.		
	per fermenta-	durch die Gäh-	de Sel Ammoniac anisé.	213
	tionem.	rung.		
Salis Ammoniaci ani-		Salmiac = Geist mit Anis.		
fa-				
tus.				
aro-		Gewürzter Salmiac = Geist.	aro-	
ma-			mati-	
ti-			que.	214
cus.				
phar-				
ma-				
cop.				
E-				
di-				
bur-				
gen.				
Salis Ammoniaci Suc-		Salmiac = Geist mit Agtstein.	de Sel Ammoniac	
cinatus, sive			avec du carabé.	214
Essentia Suc-				
cini Spiritu				
Salis Ammo-				
niaci extrac-				
ta.				
Salis Ammoniaci Vo-		Flüchtiger Salmiac = Geist mit	de Sel Ammoniac	
latis vino-		Wein.	Volatil	
fus.			vineux.	214

Spiritus Salis Ammoniaci Volatilis urinosus.	Flüchtiger Salmiac = Geist mit Kalch.	Esprit de Sel Ammoniac avec la chaux vive. pag. 214
Salis coagulatus.	Coagulirter Salz = Geist.	de Sel coagulé. 215
communis acidus.	Salz = Geist.	acide. 215
concentratus, sive Glauberianus.	Glaubers concentrirter Salz = Geist.	concentré de Glauber. 216
dulcis.	Bersüßter Salz = Geist.	dulcifié. 216
Sambuci florum.	Holder Blut = Geist.	de Fleurs de Sureau. 217
Serpilli.	Quendel = Geist.	de Serpollet. 217
Sulphuris per campanam. alia methodo.	Schwefel = Geist. auf andere Art.	Souphre. 217
Tartari simplex. Volatilis. vid. sal volatile Tartari.	Weinstein = Geist. Flüchtiger Weinstein = Geist.	Tartre simple. 218 volatil.
Terebinthinæ.	Terpenthin = Geist.	Terebenthine. 219
Theriacalis.	Theriac = Geist.	Theriacal. 219
Camphoratus.	mit Campher.	Camfré. 219
Trifolii fibrini.	Biber = Klee = Geist.	Trêfle de Castor. 219
Spiritus Vini Camphoratus. rectificatus.	Campher Brandewein. Rectificirter Brandewein.	Esprit de Vin camfré. 219
Tartarificatus.	Tartarificirter Brandewein.	rectifié. 219
Vitrioli coagulatus.	Coagulirter Vitriol = Geist.	tartarisé. 220
dulcis. Vid. Liquor anodynus.	Bersüßter Vitriol = Geist.	Vitriol coagulé. 224
simplex.	Vitriol = Geist.	dulcifié. 121
Urinæ.	Urin = Geist.	simple. 221
Spodium. vid. Ebur ustum.	Gebrant Elfenbein.	d'Urine. 222
Spongix combustæ.	Gebranter Kropf = Schwamm.	Yvoir brûlé. 222
Succinum præparatum.	Præparirter Agtstein.	Eponges brûlés. 222
Succolada composita.	Schocolade.	Carabé ou Ambre jaune préparé. 222
Regia.	Königliche = Chocolade.	Chocolad composé. 222
simplex.	Gemeine Chocolade.	Royal. 222
Succus Acetosellæ.	Buchampfer oder Sauerklee = Saft.	simple. 223
Acetosæ.	Sauerampfer = Saft.	Jus d'Alleluja, de Pain à Coucou. 223
Bellidis.	Zeitlosen = oder Masliebent = Saft.	d'Ozeille, de Surelle, ou Vinette.
Berberum.	Erbselein, Saurach = Wein = Nagelein, Preiselbeer = Saft.	de Baquerette, ou petite Marguerite.
Betonicæ.	Betonien = Saft.	d'Epine - Vinette.
Borraginis.	Borretsch = Saft.	de Betoine.
Bryoniæ radicum.	Zaunrüben = Saft.	Bourrache.
Buglossi.	Schsenzungen = Saft.	Couleuvrée, de la vigne blanche.
Cardui benedicti.	Cardobenedicten = Saft.	Buglosse.
		de Chardon benit.
		Succus

Succus Ceraforum acidornm.	Weichsel - oder saure Kirschen-Saft.	Jus de Cerises.	pag.
Citri.	Citronen-Saft.	Citron.	223
Cochleariæ.	Löffelkraut-Saft.	l'herbe aux cuillers.	223
Cydoniorum.	Quitten-Saft.	Coins.	223
Ebuli granorum.	Uttich-Saft.	d'Yèble.	
Erysimi.	Begsenf-Saft.	de Velar, ou Tortelle.	
Fragorum.	Erdbeer-Saft.	Fraises.	
Fumariæ.	Taubenkropf, oder Erdrauch-Saft.	Fumeterre.	
Granatorum acido dul-	Granaten-Saft.	Grenates.	
cium,			
Kermes granorum,	Scharlachbeeren, oder Kermes-Körner-Saft.	Graines d'Ecarlatte.	
Mercurialis.	Bingeikraut-Saft.	Mercuriale.	
Mororum.	Maulbeer-Saft.	Meures.	223
Myrtillorum.	Heidelbeeren-Saft.	d'Airelles.	
Nicotianæ.	Tabak-Saft.	de Tabac.	
Nucum viridium.	Grüne Nuß-Saft.	Noix verdes.	
Omphacii.	Unzeitigen Trauben-Saft.	Verjus.	
Pimpinellæ.	Bimbernell-Saft.	Pimprenelle.	
Plantaginis.	Wegerich-Saft.	Plantain.	
Polygoni.	Weggras, Wegtritt-Saft.	Trainasse.	
Ribium.	Johannes-Traublein-Saft.	Grosseilles.	
Rosarum.	Rosen-Saft.	Roses.	
Rubi Idæi.	Himbeer-Saft.	Framboises.	223
Sambuci è baccis.	Holder-Beeren-Saft.	de Bayes de Sureau.	
Scabiosæ.	Apostem-Kraut-Saft.	Scabieuse.	
Sedi majoris, vel sem-	Haus-Wurzel-Saft.	Joubarbe.	
pervivi.			
Spinæ cervinæ.	Creutz-Beer-Saft.	Bayes de Nerprun.	
Symphyti majoris ra-	Wall-Wurzel-Saft.	grande Consoude,	
dicum & Fo-		ou d'oreille	
liorum.		d'ane.	
Tussilaginis.	Huflattig-Saft.	Tussilage.	
Uvarum albarum.	Trauben-Saft.	Raisins blancs.	
Sulphur Antimonii rubrum.	Rothes mineralisches Brech-	Kermes mineral.	
vid. Kermes	Pulver.		
minerale.			
auratum Antimonii.	Guldischer Spießglas-Schwe-	Soufre doré d'Antimoine.	223
	fel.		
vitrioli anodynum,	Schmerz-stillender Vitriol-	de vitriol anodin.	224
sive Ens Ve-	Schwefel.		
neris Boylei.			
Suppositorium contra Ascari-	Stuhl-Zäpflein für die kleine	Suppositoire contre les pe-	
des.	Bauch-Würmer.	tits vers.	225
Syrupus.	Syrup.	Syrop.	
de Absinthio compo-	Vermehrter Wermuth-Sy-	d'Absinthe compo-	
situs.	rup.	sé.	225
Acaciarum florum.	Schlehen-Blut-Syrup.	de Fleurs de Pru-	
		nier Sauvage.	225
Acetosellæ.	Buch-Amfer. Sauer-Ales-	d'Alleluja, ou de	
	Syrup.	Pain à cou-	
		cou.	225
Acetosæ.	Sauer-Amper-Syrup.	d'Ozeille, de Su-	
		relle, ou	
		Vinette.	225
Acetositatis citri.	Citronen-Saft-Syrup.	de jus de citron.	225
de Agrestæ.	Agrest-Syrup.	de Verjus.	226
de Althæa Fernelii.	Fernelii verbesserter Eibisch-	de Guimauve de	
	Syrup.	Fernelius.	226
		Syrupus.	

Syrupus de Ammoniaco.	Ammoniac - Syrup.	Syrop d'Ammoniac. pag. 226
de Artemisia.	Benfuß - Syrup.	d'Armoise. 226
Balsamicus.	Balsamischer - Syrup.	Balsamique. 227
Bellidis è Succo.	Zeitlosen, Maslieben - Syrup.	de Baquerette, Mar- guerite. 227
Berberum.	Erbfelen, Saurach, Weins- Nägelein, Breißel- beer - Syrup.	d'Epine - Vinette. 227
Betonica.	Betonien - Syrup.	de Betoine. 227
Borraginis.	Borretsch - Syrup.	de Bourrache. 227
Buglossi.	Ochsen - Zungen - Syrup.	Buglosse. 227
Brassica rubra.	Roth - Kraut - Syrup.	chou rouge. 228
Bryonia.	Zaun - Rüben - Syrup.	Coulevrée, de la Vigne blanche. 228
Capillorum veneris Simplex Monf- pel.	Frauen - Haar - Syrup.	Capillaire de Montpel- lier. 228
Compositus.	Vermehrter Frauen - Haar- Syrup.	Capillaire com- posé. 228
Cardiacus.	Herz - stärkender - Syrup.	Cordial. 228
Cardui benedicti.	Cardo - Benedikten - Syrup.	de chardon benit. 228
Cascarilla è cortici- bus.	Schacarillen - Rinden - Sy- rup.	d'Ecorce de chaca- rille. 236
Centaurii minoris.	Tausend Gulden - Kraut - Sy- rup.	de petite centauree. 229
Cerasorum acidorum	Weixeln - Syrup.	Cerises. 229
Chamomilla.	Camillen - Syrup.	Camomille. 229
de Cichorio cum Rha- barbaro.	Begwarten - Syrup mit Rha- barbara.	de chicorée avec la Rhubarbe. 229
Cinamomi.	Zimmet - Syrup.	Canelle. 230
Citri è toto.	Citronen - Syrup.	Citron. 230
Cochlearia.	Löffel - Kraut - Syrup.	d'Herbe aux cuil- lers. 230
Contrayerva compo- situs.	Vermehrter Gift - Wurzel- Syrup.	de Contrajerva com- posé. 230
sim- plex.	Gift - Wurzel - Syrup.	sim- ple. 230
Corticum Aurantio- rum.	Pomeranzen - Schelfen - Sy- rup.	d'Ecorce d'Orange. 231
Cascaril- la.	Schacarillen - Rinden - Sy- rup.	de Chaca- rille. 236
Citri.	Citronen - Schelfen - Syrup.	de Citron. 231
Ligni Sas- safras.	Fenchel - Holz - Rinden - Sy- rup.	de Sassa- fras. 235
Corticis Peruviani aut Chinae chi- nae.	Fieber - Rinden - Syrup.	de Quinquina. 231
Croci.	Safran - Syrup.	Safran. 231
Cydoniorum.	Quitten - Syrup.	Coins. 232
Diacodyon, sive de capitibus Papa- veris, seu Dia- codium liqui- dum Montani.	Johannes - Brod - Syrup.	Diacodion, ou de Pavot blanc. 232
Diacodyon croca- tum.	Johannes - Brod - Syrup mit Safran.	de Pavot blanc avec Safran. 232
Domesticus, sive de spina cervina.	Creutz - Beer, Wegdorn - Beer- Syrup.	de Nerprun. 232
emeticus simplex.	Brech - Syrup.	Emetique. 233
Angeli Salæ.	Angeli Salæ Brech - Syrup.	d'Angelus Sala. 233
Enulæ, sive Helenii.	Alant - Syrup.	d'Aunée. 233
		Syrupus

Syrupus de Erylimo Lobelii.	Lobelii auflösender Brust-Syrup.	Syrop de Velar, ou Tor-
Farfaræ è floribus.	Hufflattig-Syrup.	telle. pag. 233
Fragorum.	Erdbeeren-Syrup.	Tussilage. 234
de Fumaria.	Erdranch, Taubenkropf-Syrup.	Syrop de Fraises. pag. 234
Glycyrrhizæ.	Süßholz-Syrup.	Fumeterre. 234
Granatorum.	Granaten-Syrup.	Reglisse. 234
Granorum Kermes.	Scharlachbeer, Kermeskörner-Syrup.	Grenates. 234
Hederæ terrestris.	Gundelreben-Syrup.	Graines d'Ecar-
Hyperici.	Johannisblumen-Syrup.	latte. 234
Hyssopi.	Isfen - Isopen - Syrup.	Lierre terrestre. 235
de Jujubis.	Brustbeeren-Syrup.	Millepertuis. 235
Ligni Sassafras è Cor-	Sassafras - Syrup.	d'Hyssope. 235
ticibus.		de Jujubes. 235
Liquiritiæ. Vid. Sy-	Süßholz-Syrup.	d'Ecorce de Sassa-
rupus Glycyrr.		fras. 235
de Manna laxativus.	Manna-Syrup.	de Reglisse.
Mastichinus.	Mastix-Syrup.	Manne. 235
Menthæ.	Deumenten - Kraus - Balsam-Syrup.	Maltic. 235
Melissæ.	Melissen - Syrup.	Menthe. 246
Mercurialis, five Pro-	Bingelkraut-Syrup.	Melisse. 236
phylacticus.		Mercuriale, ou
Morum.	Maulbeer-Syrup.	de longue vie. 236
de Musco querno ad	Syrup wider den wilden	Meures. 237
tussim convulsi-	Husten.	contre la coquelu-
vam.		che. 237
Myrtillorum.	Heidelbeer-Syrup.	d'Airelles. 237
de Nicotiana.	Tabac-Syrup.	de Tabac. 237
Nucistæ.	Muscatsnuß-Syrup.	Muscade. 238
Papaveris albi.	Weiser Nagsaamen-Syrup,	Pavot blanc. 238
	oder Schlaf-Syrup.	
erratici.	Klapper-Rosen-Syrup.	Coquelicot. 238
Paralyseos, vel Pri-	Schlüsselblumen-Syrup.	Prime - vere. 238
mulæ veris.		
Persicorum è floribus.	Pfirsichblüth-Syrup.	Fleurs des Pê-
		ches. 239
Poeoniæ è floribus.	Sichtrosen-Syrup.	Pivoine. 239
Prophylacticus. Vid.	Bingelkraut-Syrup.	Longue vie.
Syr. Mercu-		
rials.		
Rhabarbari chalybea-	Rhabarbara - Syrup mit	Rhubarbe Mar-
tus.	Stabl.	tial. 239
de Rhabarbaro Deo-	Deodati Rhabarbara-Syrup.	de
dati.		Deo-
		da-
		tus. 239
Ribium.	Johannisträubelein-Syrup.	Grosfeilles. 240
Rorellæ.	Sonnenhau-Syrup.	d'Herbe de la Gout-
		te. 240
Rosarum siccarum.	Dürren Rosen-Syrup.	de Roses sechées. 240
simplex.	Rosen-Syrup.	simple. 240
solutivus.	Laxirender Rosen-Syrup.	laxatif. 240
Rubi Idæi.	Himbeer-Syrup.	Framboises. 241
Scordii.	Lachen Knoblauch-Syrup.	Germandrée
		d'eau. 241
de Scilla, five Oxy-	Meerzwiebel-Syrup.	Scille. 241
faccharum scil-		
liticum Londi-		
nense.		

Syrupus Sedi majoris, sive sempervivi.	Haus = Wurzel = Saft = Syrup.	Syrop de Joubarbe. pag. 241
de spina cervina, sive domesticus.	Kreuz = Beer = Saft = Syrup.	de Bayes de Nerprun. 232
de Stæchade.	Stöchas = Blumen = Syrup.	Stoechas. 241
Sulphuris, sive arcum bechicum Willisii.	Schwefel = Syrup.	Soufre de Willis. 142
à Symphyto Fernelii.	Wall = Wurzel = Syrup.	Grande consoude, ou d'Oreille d'ane. 242
Tussilaginis. vid. Farfaræ	Hustatig = Syrup.	Tussilage.
Tunicæ florum.	Negel = Blumen = Syrup.	d'Oeillet. 242
Veronicæ.	Ehren = Preiß = Syrup.	de Veronique. 242
Violarum purpurearum.	Violen = Syrup.	Violat. 242
Solutivus.	Larier = Violen = Syrup.	laxatif. 243

T.

Tabulæ strumales. vid. Morfili.	Kropf = Tafelstein.	Tablettes contre les Ecroûelles.
Tamarindorum pulpa. vid. Pulpa.	Tamarinden = Marck.	Pulpe de Tamarins.
Tartari oleum per deliquium.	Geflossenes Weinstein = Oel.	Huile de Tartre par défaillance. 243
Tartari terra foliata. vid. Arcanum Tartari.	Blätterichte Weinstein = Erde.	Terre feuilletée de tartre.
Tartarus chalybeatus, emeticus.	Gestählter Weinstein.	Tartre calybé, ou martial. 243
tartarizatus, sive solubilis, sal vegetabile dictus.	Brech = Weinstein.	Emetique. 244
vitriolatus.	Eröfnendes Weinstein = Salz.	Soluble, ou tartarisé. 244
Tackonii.	Bitriolirter Weinstein.	Vitriolé. 244
Tela Gualteri. vid. Sparadrapum.	Tackens vitriolirter Weinstein.	de Taquin. 245
Terebinthina cocta.	Fontanell = Pflaster.	Toile à gautier, ou Sparadrap.
Terra foliata tartari. vid. Arcanum Tartari.	Gefochter Terpentim.	Terebenthine cuite. 245
dulcis vitrioli. vid. Vitrioli terra.	Blätterichte Weinstein = Erde.	Terre feuilletée de Tartre.
Testæ ovorum præparatæ.	Abgesüßte Vitriol = Erde.	de Vitriol edulcorée.
Testes equi præparati. Obsoleverunt.	Præparirte Eyer = Schalen.	Coques d'œuf préparées.
Theriaca. vid. Electuaria.	Præparirte Pferds = Gelle.	Testicules de cheval préparés.
Coelestis.	Theriac.	Theriaque.
Diatestaron.	Himmlicher Theriac.	céleste. 245
Tinctura.	Biche = Theriac.	pour les bêtes. 245
Aloës.	Tincturen.	Teintures. 246
amara Londinensis.	Aloe = Tinctur.	d'Aloë. 246
anodyna. vid. Efsentia.	Bittere Englische Magen = Tinctur.	amère de Londres. 246
Antimonii acris Hoffmanni.	Schmerz = stillende Tinctur.	anodyne.
	Scharffe Spießglas = Tinctur.	d'Antimoine acre. 246
		Tinctura

Tinctura Antimonii tartarifata.	Spießglas = Tinctur.	Teinture d'Antimoine tartarifée.
		pag. 247
antiphthifica Graman- ni.	Schwindsucht = Tinctur.	antiphthique de Gram- man. 247
Aquilegiæ florum.	Ngley = Tinctur.	de Fleurs d'An- colie. 248
aromatica Londinen- fis.	Londener Würz = Tinctur.	aromatique de Londres. 247
Asæ foetidæ.	Teuffels = Dreck, stinckender Ufsant = Tinctur.	d'Asa foetida. 248
Bellidis florum.	Zeitlosen, Maslieben = Tinc- tur.	de Baquerette, Margueri- te. 248
Benzoës, sive Asæ dulcis vid. Ef- sentia.	Benjoin = Tinctur zur Jung- fern = Milch.	de Benjoin.
Bezoardica officinalis.	Bezoar = Tinctur.	Bezoardique of- ficinelle. 248
Cantharidum Pharm. Edinb.	Spanische Mücken = Tinctur.	de Cantharides. 248
Coralliorum.	Corallen = Tinctur.	Coraux. 249
Castorei, vid. Essen- tia.	Bibergeil = Tinctur.	Castor.
Croci. vid. Essentia. Vinosa.	Safran = Tinctur. mit Wein.	Safran. vineu- fe. 249
Gingivalis balsamica.	Balsamische Zahn = Tinctur.	Balsamique pour les genci- ves. 250
Hellebori composita.	Vermehrte schwarze Nießwurz Tinctur.	d'Hellebore noir composée. 250
Laccæ.	Lack = Tinctur.	de gomme lac- que. 250
Martis adstringens.	Unhaltende Stahl = Tinctur.	de Mars astrin- gente. 250
aperitiva, sive Aroph Pa- racelsi.	Paracelsi Eröfnende Stahl Tinctur.	de Mars aperiti- ve. 250
aperitiva tar- tarifata Ludovi- ci.	Ludwigs eröfnende Stahl Tinctur.	Mars aperiti- ve de Lu- dovici. 251
cum Arcano Tartari vid. Tinctura Martis è Vi- trioloZwel- feri.	Zwelfers Stahl = Tinctur.	vitriol de Mars.
Coerulea Ett- neri.	Ettners blaue Stahl = Tinctur.	de Mars bleue. 251
Cydoniata.	Stahl = Tinctur mit Quitten.	cydo- niée. 251
Pomata.	Apfels Saft.	pom- mée. 251
Helleborata.	Schwar- zer Nieß- wurz.	Helle- bo- rée. 252

Tinctura Martis cum vino Malvatico & pomis Aurantiis.	Stahl = Tinctur mit Malva- sier und Pome- ran- zen.	Teinture de Mars Malvoi- fée & oran- gée. pag. 252
è Vitriolo. Zwelferi.	Zwelfers Stahl = Tinctur.	de Vitriol de Mars. 252
Metallorum, five Li- limum Paracelsi.	Metallen = Tinctur.	des Metaux, ou lilimum de Paracelse. 252
Myrrhæ. vid. Essentia.	Myrrhen = Tinctur.	de Myrrhe.
Odontalgica M. Hoff- manni.	Hoffmanns = Tinctur in Zahn- Schmerzen.	pour les douleur des dens. 253
Papaveris è floribus.	Klapper = Rosen = Tinctur.	de Coquelicot, ou Pavot rouge. 248
Proprietatis Mynsich- ti.	Mynsichts Magen = Tinctur.	de propriété de Mynsicht. 253
five anima Rhabarba- ri.	Rhabarbara = Tinctur mit Wasser.	de Rhubarbe. 253
Rhabarbari compofi- ta.	Zusammengesetzte Rhabarba- ra = Tinctur.	de Rhubarbe composée. 254
Rosarum è floribus.	Rosen = Tinctur.	de Roses. 248
Stomachica aromati- ca.	Magen = Tinctur mit Gewürz.	aromatique sto- macale. 254
Stomachica Lipsien- fis.	Leipziger Magen = Tinctur.	Stomacale de Leipfic, 254
Stomachica Martialis Edinburgensis.	Edinburger Magen = Tinctur mit Stahl.	Stomacale Mar- tiale. 254
Sulphuris.	Schwefel = Tinctur.	de Souphre. 255
Tartari.	Weinstein = Tinctur.	de Tarrre. 255
acris.	Scharfe Weinstein = Tinctur.	acre. 255
Tragea	Triseneth, Pfaffen = Futter.	Dragées. 256
aromatica Gabelchove- ri.	Gabelkovers Magen = Trise- neth.	Dragée aromatique de Ga- belkover. 256
officinalis.	Magen = Triseneth.	aromatique offici- nelle. 256
Granorum Actes.	Holder = Triseneth.	pour la dysente- rie. 256
Ophthalmica.	Augen = Triseneth.	Poudre ophthalmique. 256
Trochisci.	Rüchlein, Zeltlein, Täflein.	Trochisques. 257
adversus acidum ventriculi.	Zeltlein wider die Magen- Säure.	Absorbents. 252
albi Rhazæ.	Rhazâ weise Zeltlein.	Blancs de Ra- za. 257
Albandal.	Coloquinten = Zeltlein.	Alhandal. 257
Aliptæ moschati.	Wohlriechende Zeltlein mit Ambra und Bisam.	aromatiques. 257
Alkekengi cum o- pio.	Juden = Kirschen = Zeltlein mit Opio.	de coquerets avec o- pium. 258
fine o- pio.	Juden = Kirschen = Zeltlein oh- ne Opio.	de coquerets sans o- pium. 258
Alkermes completi.	Alkermes = Zeltlein.	d'Alkermes. 258
de Ambra.	Ambra = Zeltlein.	d'Ambre. 258
Anthelmintici, five Hermetici Scre- tæ.	Secretâ Wurm = Zeltlein.	contre les vers. 258

Trochisci

Trochisci Bechici albi.	Weisse Husten = Zeltlein.	Trochisques pectoraux blancs.
		pag. 259
citrini.	Gelbe Husten = Zeltlein.	pectoraux jaunes. 259
majores.	Größere Husten = Zeltlein.	pectoraux gros. 259
nigri.	Schwarze Husten = Zeltlein.	pectoraux noirs. 259
rubri.	Rothc Husten = Zeltlein.	pectoraux rouges. 260
de Carabe.	Agstein = Zeltlein.	de Carabé. 260
Catechu, sive Muscerdæ.	Caschu mit Ambra.	Cachou. 266
de Cremore tartari.	Weinstein = Zeltlein.	Crème de tartre. 260
escharotici.	Aez = Zeltlein.	escarotiques. 261
Gallix moschatae.	Ambra = Zeltlein.	cordiaux. 261
de Myrrha.	Myrrhen = Zeltlein.	de Myrrhe. 261
Scilla.	Meer = Zwiibel = Zeltlein.	de Scille. 261
Sublinguales ad prophylaxin à contagio Gaubii.	Gist = wehrende Mund = Zeltlein.	préservatifs dans la contagion. 261
de terra Catechu ad Sputum cruentum.	Japonische Erden = Zeltlein gegen das Blut = Spehen.	de Cachou contre le crachement de Sang. 262
Vipera.	Vipern = Zeltlein.	de Viperes. 262
Turpethum minerale, sive Mercurius præcipitatus flavus.	Turbith, oder gelber præcipitat.	Turbith mineral, ou Mercure précipité jaune. 262
Tutia præparata.	Præparirte Tutien.	Tutie préparée. 262

V.

Ventriculi gallinarum præparati.	Præparirte Hühner = Mägent Häutlein.	Tuniques préparées des estomacs de poules. 263
Vinum Berberum.	Erbfelen, Saurach, Wein = Mägelein, Preiselbeer = Wein.	Vin d'Epine-vinette. 263
Cydoniorum.	Quitten = Wein.	de Coins. 263
Granatorum.	Granaten = Wein.	Grenates. 263
Hippocraticum.	Würz = Wein.	Hipporas. 263
Rubi Idæi.	Himbeer = Wein.	de Framboises. 263
Vitriolum Martis.	Eisen = Vitriol.	Vitriol de Mars. 263
Vitrioli ros, sive phlegma.	Sauerlechtes Vitriol = Wasfer.	Rosée de vitriol. 263
terra dulcis.	Abgesüßte Vitriol = Erde.	Terre de vitriol edulcorée. 264
Vitrum Antimonii Hyacinthinum.	Rothgelbes Brech = Spießglas.	Verre d'Antimoine de couleur d'hyacinthe. 264
Ceratum.	Rothgelbes Brech = Spießglas mit Wachs geröst.	Ciré. 264

U.

Unguenta.	Salben.	Onguents.	pag.
Unguentum Ægyptiacum.	Reinigende Ægyptische = Salbe.	Onguent Ægyptiac.	264 265
Agrippæ.	Agrippen = Salbe.	d'Agrippa.	265
Alabastrinum.	Alabaster = Salbe.	d'Albâtre.	265
album Camphoratum.	Bleyweiß = Salbe mit Campher.	blanc Camphré.	266
simplex.	Kühl = Bleyweiß, oder Kühl = Salbe.	Simple.	266
albuminum.	Eyer = Weiß = Salbe.	de blanc d'œuf.	266
Althææ.	Erbisch = Salbe.	d'Althea.	266
ad Ambusta.	Brand = Salbe.	Contre les brûlures.	266
Anodynum.	Schmerz = stillende = Salbe.	Anodin.	267
Antatrophum.	Dörrsucht = Salbe.	contre l'Atrophie.	267
Apostolorum.	Grüne Wund = oder Apostel = Salbe.	vulnenaire verd.	267
de Arthanita.	Burgier = oder Schweinbrods = Salbe.	Laxatif.	268
aureum.	Guldene Wund = Salbe.	doré.	268
Basilicum.	Basilien = Salbe.	Basilic.	269
Calendulæ florum.	Ringel, Blümlein = Salbe.	de Fleurs de Soucy.	269
Carminativum.	Wind = Salbe.	Carminatif.	269
Clysmaticum.	Einstier = Salbe.	à Lavemens.	269
Comitissæ.	Grün anhaltende = Salbe.	de la Comtesse.	270
Defensivum, aliàs Balsamum universale.	Defensiv = Salbe.	defensif.	270
Digestivum.	Digestiv = oder Maturier = Salbe.	digestif.	271
Digitalis.	Flocken, oder Fingerhut = Salbe.	de Digitale.	271
Enulatum.	Allant = Salbe.	d'Aunée.	271
Epispasticum.	Spanische Mücken = Salbe.	Epispastique.	271
Epispasticum mitius.	Mildere Spanische Mücken = Salbe.	Epispastique plus doux.	271
Fusum.	Braune Wund = Salbe.	Brun.	272
griseum. vid. Neapolitanum.	Salivations = Salbe.	gris, ou de Mercure.	272
de Hyoscyamo.	Bilsentkraut = Salbe.	de Jusquiame.	272
Jasmini.	Jasmin = Blumen = Salbe.	de Jasmin.	277
Infrigidans Galeni.	Valeni Kühl = Salbe.	Rafrachissant de Galien.	272
Lavendulæ.	Lavendel = Pomade.	de Lavande.	277
de Linaria.	Lein = Kraut = Salbe.	Linaire.	272
de Liquiritia.	Süßholz = Salbe.	Reglisse.	272
de Lithargyrio, aliàs Nutritum.	Silberglett = Salbe.	de Litharge.	273
Majoranæ.	Majoran = Salbe.	de Marjolaine.	273
Malvæ.	Rappelskraut = Salbe.	Mauve.	273
Martiatum.	Stärkende Glieder = Salbe.	Nerval.	273
de Minio camphoratum, aliàs rubrum.	Gecampsferte Mennig = Salbe.	Rouge camphré.	274
Mundificans Stahl.	Reinigende Salbe.	deterfif de Stahl.	274
lii.			

Unguentum Neapolitanum , sive griseum.	Salivations = Salbe.	Onguent de Naples, ou de Mercu- re. pag. 274
Nervinum.	Nerven = Salbe.	pour les nerfs. 274
de Nicotiana.	Taback = Salbe.	de Tabac. 275
Nihili ad oculos.	Augen, oder Nix = Salbe.	aux maux des yeux. 275
Nutritum, vid. ung: de Li- thargyrio.	Silberglett = Salbe.	de Litharge.
Ophthalmicum Hans Sloane.	Hans Sloane Augen = Sal- be.	aux maux des Yeux par Hans Sloa- ne. 275
Ophthalmicum Rubrum, seu Balsamum ophthalmi- cum rubrum.	Rothé Augen = Salbe, oder rother Augen = Balsam.	Rouge pour les maux des yeux. 276
ad Paralyfin.	Rahme Glieder = Salbe.	
Pectorale.	Brust = Salbe.	pectoral. 276
Pediculorum.	Bettler, oder Laus = Salbe.	contre la vermi- ne. 276
Pomatum, sive florum Na- phæ.	Pomeranzen = Blüth = Salbe, oder Pomade.	Pomade. 276
Diapompholy- gos.	Rothlauf = Salbe.	dessicatif. 277
Populeum.	Populeum = Salbe.	populeum. 277
Purpureum, seu fuscum Wür- zii.	Wurzens = Salbe.	brun de Würz. 277
Resumptivum.	Schwind = Salbe.	Restaurant. 278
Rosatum.	Rosen = Salbe, Rosen = Po- made.	Rosat. 277
simplex.	Rosen = Pomade.	simple. 278
Rubrum ad labia oris.	Mund, oder Leffen = Poma- de.	Rouge, ou Po- made aux levres. 279
Rubrum potabile.	Rother Butter.	Rouge potable. 279
Santalinum.	Sandel = Salbe.	Santalin. 279
Saponatum.	Seifen = Salbe.	de Savon. 279
ad Scabiem.	Kräz, oder Rauden = Salbe.	pour la gâle. 280
Zelle- ri.	Zellers Kräz = Salbe.	de Z. l. ler 280

Unguentum Somniferum.	Schlaf = Salbe.	Onguent Somnifer.	280
Spleneticum.	Milz = Salbe.	Splenétique.	280
Stomachale.	Magen = Salbe.	Stomacal.	281
ad Tabida mem- bra.	Salbe wider das Schwinden.	pour le decroit.	281
Contra Vermes.	Burm = Salbe.	contre les vers.	282
Viride potabile.	Grüner Butter.	verd potable.	282
de Uvis.	Trauben = Bomade.	de Raisins.	282
Ungula Alcis præparata.	Præparirte Elends = Klauen.	Ongles d'Elan préparées.	283
Unicornu marinum præpara- tum.	Præparirt Meer = Einhorn.	Licorne veritable prépa- rée.	283
Urinarium Michael. vid. Lau- danum diure- ticum.	Schmerzen = stillender Extract.	Laudanon diuretique de Michel.	

F I N I S.



